Nidos y reproducción de las Aves Argentinas

ISBN 978-987-27043-7-7

Citar como: DE LA PEÑA MR (2013) Nidos y reproducción de las aves argentinas. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Santa Fe, Argentina. 590 pp.

Nidos y reproducción de las Aves Argentinas

Martín R. de la Peña

Ediciones BIOLOGICA

Serie **Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8**

Introducción

El estudio del ciclo reproductivo de un ave es complejo. En primer lugar se tiene que localizar al lugar donde está ubicado un nido, lo ideal es iniciar la observación, desde el comienzo de la construcción.

Si esto no es posible, localizar nidos sin postura, no siempre estos son expuestos, por lo que se necesita una especial habilidad para encontrarlos. Luego las visitas tienen que ser casi diarias, para esto se tiene que vivir cerca de los lugares de estudio. En caso contrario se presentan inconvenientes por la posibilidad de perder parte de la información, sobre todo en los días de lluvia, donde no se puede llegar a los nidos.

Es también un trabajo que requiere mucho tiempo y es de un costo económico elevado.

En muchas oportunidades, un ciclo se completa con la observación de varios nidos. Esto se debe a la alta depredación de los mismos. Se destruyen nidos en construcción o terminados (robo de materiales por otras aves, fuertes vientos), por acción del hombre (tala de árboles, caza, roturación de la tierra, cosecha de cultivos, quemazones) y los huevos y los pichones son rotos o consumidos por muchas especies, no solo de aves (pirincho, chimango) sino de otros animales (culebras, comadreja).

Es por este motivo que para algunas especies el estudio es más completo que para otras. De cualquier manera se brinda información básica que puede ser completada posteriormente.

Para algunas especies se amplía o se corrige la información brindada en libros anteriores (De la Peña, 1995, 1996, 2005).

En muchos casos, durante los últimos días del desarrollo de los pichones, se prefirió no molestarlos, ante la posibilidad que los mismos se escapen de los nidos.

En casos de aves nidífugas, a veces solamente se tuvo la oportunidad de una sola observación, lo mismo que las que nidifican en colonias, las que por razones de distancia o por otros motivos no se pudo tener una continuidad en las visitas.

En general los pichones nacen dentro de las 24 hs. desde la primera eclosión, excepto algunos casos como en patos, gallinetas y otros.

Se trató también de determinar los vegetales que ocupan para sostén de los nidos, en aquellas que que ahí los construyen. De alguna manera esto puede servir como base para la defensa de especies arbóreas frente a una posible tala o destrucción del ambiente.

En el presente libro se ponen todas las observaciones de nidificación, realizadas por el autor.

Agradecimientos

A Leandro Antoniazzi por la dedicación y el entusiasmo puesto en las tareas de pesar huevos y pichones.
A Andrés Pautasso, Nicolás Acosta, Anibal E. Casas, Sergio Galassi, por la colaboración en los trabajos en el campo.
A Máximo Uranga (Panti) y Máximo Uranga (h.) (Kempe), Eduardo Mezquida y Mariano Gelain por brindar información.
A Elda Krüger, Luis Huber y Andrés Pautasso por los dibujos.

Signficado de las términos y abreviaturas

El término **"Residente"** significa que la especie está durante todo el año en la región.
"Visitante estival" que visita la región en primavera-verano para reproducirse. De algunas especies pueden quedar ejemplares aislados el resto del año.
"No observados" son nidos en los cuales por diversas razones (Altura, ubicación) no se puede comprobar el contenido. Sí, se tiene la seguridad que estaban en actividad. Se los cita con la finalidad de ver el área de nidificación, período y vegetal sostén.
"Nido expuesto"son aquellos que por su tamaño o por su ubicación, son de fácil observación, en contraposición a los **"Ocultos"**. Si están cubiertos por hojas o por enredaderas, quedarían como **"Semiexpuestos**".
Nido **"Rudimentario"** es aquel donde el ave deposita los huevos directamente en el suelo, sin trabajar o sin traer materiales. (Dormilones).
"Poco elaborados" son aquellos donde el ave realiza algún trabajo, ya sea ahondando una depresión en el suelo con sus patas o bien acarreando algunos elementos. (Chorlos,Inambúes).
"Elaborados "son aquellos donde el ave aporta materiales diversos para la construcción, tejiéndolos o entretejiéndolos, llegando a formar nidos relativamente simples (Cachirlas) o complejos (Boyeros).

Con relación a la Altura de los nidos desde el suelo, se realizó la siguiente escala :

de 0 a 1,99 metros (baja)Altura
de 2 a 3,99 " (mediana Altura)
de 4 ó más " (altos)

La **N** en la celda indica los meses en que se localizaron nidos.
Las Medidas de los huevos están expresadas en milímetros y los pesos de huevos y de pichones en gramos.
La altura, de los nidos, tomada desde el suelo, en metros.
La **(X)** significa promedios y **(N)** el número de huevos medidos o pesados.
Los pichones en general nacen dentro de las 24 horas de la eclosión del primero. En algunos casos se aclara si existe una mayor demora.
Para cada especie se especifica la fecha y lugar del hallazgo, y el número de la nidada presente en la colección del autor en casos de huevos que fueron colectados.
Se describe el desarrollo de los pichones, pesos y en algunos casos si eran portados de larvas de moscas (*Philornis* sp).


Sobre los pichones:
Plumas. Las plumas no están distribuidas por toda la superficie del cuerpo. Aunque lo cubren, sino que están insertas en zonas bien determinadas que reciben el nombre de **pterilas**, entre las cuales hay zonas sin plumas llamadas **apterilas o apterios.**
Los pichones están cubiertos por plumas blandas y delicadas, contituyen el **plumón**. Tienen una estructura suave y laxa.
Aunque para algunos vaina y cañón pueden ser sinónimos, aquí se denomina **vaina** los primeros días hasta que comienza a abrir la lámina. Luego es llamado **cañón.**
Las plumas del ala se dividen en primarias, las que corresponden al nivel de la mano y las secundarias, a nivel del antebrazo.

Medidas tomadas. Pueden variar dentro de la misma nidada, por eso las Medidas en general son aproximadas. También puede influir el estado sanitario del pichón.
En las primarias las Medidas se tomaron entre la primera y la tercera. En las secundarias y en la cola, en las más largas.
En los miembros inferiores, el largo de la Tibia (Tibiotarso) y del Tarso (Tarsometatarso).
El pico se midió desde la base a la punta.
Para más informaciones anatómicas ver De la Peña (1981).

Formas de los nidos


Son muchas las formas que presentan los nidos. Para clasificarlos se trató de ver su similitud con ciertos objetos. Así pueden tener forma de tacita, taza, tazón, olla, plato playo, plato hondo, cráter, plataforma, redondeado o con forma de saco o bolsa, pelota o globoso.
Pueden ser cerrados (espineros, benteveo) o abiertos (garzas).
Las aves que nidifican en huecos, grietas o túneles, pueden poner o no elementos en la cámara de puesta. Los nidos construidos en estos lugares adoptan muchas veces la forma de esos lugares.





Tacita: son nidos pequeños, de 3-5 cm. de diámetro y 2-3 cm. de profundidad. Pueden estar asentados como el del Piojito azulado (*Polioptila dumicola*) o colgantes como el del Picaflor común (*Chlorostilbon aureoventris*).







Taza: similar al anterior pero más grande, de 5-7 cm. de diámetro y 3-5 cm. de profundidad. Pueden estar asentados como el de los Zorzales o colgantes como el del Chororó (*Taraba major*).

Tazón: similar al anterior pero más grande, 10-12 cm. de diámetro o más y 5-6 cm. de profundidad, como en los de Pirincho (*Guiraguira*) o Pirincho negro (*Crotophaga ani*).






Olla: nidos grandes de varios centímetros de diámetro y de profundidad (Carancho).



Plato playo: nidos de poca profundidad, pero de varios centímetros de diámetro (Mirasoles, algunos Patos).

Plato hondo: similar al anterior pero más profundo, como en de ciertos Patos y Gaviotas.




Cráter: nidos con forma de cono truncado, como el de los Cormoranes y Flamencos.




Plataforma: nidos de dimensiones variables que sobrepasan el diámetro de un nido con forma de plato (Chajá, Cigüeña, Águilas).


Redondeado o con forma de pelota: nidos que tienen iguales o casi iguales Medidas en el alto, ancho y profundidad (Hornero).




Globoso: nidos entretejidos con fibras o palitos, donde las Medidas del ancho, alto y largo no son iguales. En general tienen un túnel de entrada alargado. Pueden ser alargados, tringulares, etc. (Espineros, Pijuíes).




Saco o Bolsa: nidos de fibras entretejidas, alargados en sentido perpendicular al suelo (Boyeros).



Corte esquemático de nidos



. Suiriri (*Suiriri suiriri*).




2. Cacholote (*Pseidoseisura lophotes*).



. Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*).



4. Carpintero campestre (*Colaptes campestris*).



5. Martín pescador grande (*Ceryle torquatus*).

Clasificación de los huevos

Según su forma pueden ser:

Esférico:huevos redondeados (Lechuzas, Lechuzones).

Elíptico: ligeramente alargados, con polos iguales.

Fusiforme: parecido al anterior pero más alargados (Flamencos)

Ovoide: tienen un polo más ancho que el otro. (es el tipo más común)


Cónico o Piriforme: el polo mayor es ancho y el menor angosto, marcando una mayor diferencia que en el ovoide (Chorlos, Teros)

Romboide o Rómbico :polos alargados y la parte central ancha tomando el huevo la forma de rombo (a veces en los Macáes)


Cilíndrico :alargado con polos anchos, romos. (Picaflores)



Elíptico




Cónico




Rómbico



Uniforme



Eliptico




Esférico




Fusiforme




Ovoide



Características de los pichones




Pichón nidícola



Pichón nidífugo




Pichón implume





Pichón con plumón

Principales medidas tomadas









FAMILIA: RHEIDAE

ÑANDÚ. *Rhea americana*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN


E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

TOTAL DE NIDOS: 17

Fecha	Lugar	Contenido	Fecha	Lugar	Contenido
30-11-58	Aguará Grande	18 huevos	06-12-91	Yeso Oeste	12 huevos
05-12-71	Laguna del Palmar	21 huevos	06-12-91	Yeso Oeste	18 huevos
21-10-72	San Agustín	13 huevos	09-11-94	Yeso Oeste	5 huevos
24-11-74	La Pelada	21 huevos	09-11-94	Yeso Oeste	8 huevos
03-01-79	Cayastacito	8 huevos	29-10-95	La Clara	12 huevos
07-12-79	Cayastacito	7 huevos	14-11-96	Ruta 13 y 36	13 huevos
12-12-90	Cayastacito	6 huevos	23-11-99	Manucho	10 huevos
17-12-90	Saladero Cabal	5 huevos	02-12-03	Providencia	12 huevos
06-12-91	Yeso Oeste	6 huevos			

ADULTOS CON PICHONES O JUVENILES

- 24-11-74. La Pelada, macho con 11 pichones.
- 21-01-76. Barrancas, macho con varios pichones.
- 16-05-89. Saladillo Dulce, macho con 6 juveniles.
- 23-11-92. Jacinto Arauz, macho con 5 juveniles.
- 29-10-95. La Clara, macho con 7 pichones.
- 17-11-00. Las Tunas (Entre Ríos), macho con 4 juveniles.



NÚMERO DE NIDOS POR MES

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1									2	6	8

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. Ocultos entre pastos en campos naturales, pastizales, montes con abras, sabanas, palmares o entre arbustos en estepas.

Características.

Expuesto. Depresión en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas. Algunos con un reborde de estos elementos con el agregado de palitos o tallos de yuyos.

Medidas :

Diámetro : de 0,80 a 1,20 m.

Profundidad : hasta 10-15 cm.

Reborde : 10 cm. de ancho y 4 cm. de alto.

HUEVOS

Postura variable.

Elípticos. Amarillo recién puestos. Luego blanquecinos.

Medidas y pesos :

De 120 a 141 x 81 a 103

X= 129,3 x 90,8 (N= 18)

Peso de las cáscaras : de 58,3 a 91,4

X= 71 (N= 18)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
5	07-12-79	Cayastacito	135,0 x 97,0	89,587
			137,0 x 99,0	78,795
			137,0 x 99,0	91,430
			141,0 x 98,0	77,823
			135,0 x 99,0	78,181
			141,0 x 103,0	79,220
			136,0 x 94,0	77,437
787	12-12-90	Cayastacito	123,0 x 85,0	66,8
			123,0 x 89,0	73,0
			125,0 x 89,0	68,6
			126,0 x 85,0	68,4
			126,0 x 89,0	70,0
			128,0 x 86,0	66,6
788	17-12-90	Saladero Cabal	120,0 x 86,0	59,6
			122,0 x 86,0	58,3
			123,0 x 86,0	64,2
			125,0 x 85,0	63,4
			126,0 x 81,0	66,4

RITMO DE PUESTA E INCUBACIÓN

En un nido controlado, ponían 3 hembras, en días alternos (día por medio).

Período de incubación : 31-35 días.

PICHONES

Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer.
Descripción: Región periocular gris-celeste. Ventralmente blanquecino con ocráceo en el cuello. Dorsalmente pardo con dos líneas blancas.

OBSERVACIONES

El macho incuba y cuida a los pichones. En algunos casos cuando está en el nido permite que una persona se aproxime a pocos metros del mismo.

Suele ser muy agresivo con las hembras y con perros que se aproximen a ellos.

La especie era abundante, con tropas de muchos ejemplares. Va desapareciendo por la matanza para extracción de las plumas y consumo de la carne. Los pichones son capturados para llevarlos al cautiverio, sufriendo elevadas pérdidas por muertes.

También se nota la depredación por parte de personas que consumen los huevos o por animales que los rompen. (Peludos, Mulitas)

Van quedando en predios más o menos protegidos, en algunos de los cuales, tienen éxito reproductivo.


CHOIQUE.*Rhea pennata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

TOTAL DE NIDOS: 5

Fecha	Lugar	Contenido
06-11-79	Florentino Ameghino	12 huevos
11-10-87	Península Valdés	1 huevo
11-10-87	Península Valdés	1 huevo
06-10-88	Punta Tombo	6 huevos
06-10-88	Punta Tombo	7 huevos



ADULTOS CON PICHONES O JUVENILES

- 01-02-72. Comandante Piedrabuena, macho con 6 juveniles.
- 25-11-73. Península Valdés, adultos con 7, 9 y 20 pichones.
- 25-01-74. Gdor. Gregores, pareja con 6 pichones.
- 31-01-74. Comandante Piedrabuena, macho con 16 pichones.
- 01-02-74. Camarones, pareja con 6 pichones.
- 06-11-79. De Punta Tombo a Río Turbio por rutas 3 y 293 varios adultos con pichones, desde 6 a 16.

NÚMERO DE NIDOS POR MES

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									4	1	

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. En excavaciones semiocultas por arbustos.

Características.

Expuesto. Depresión en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas y reborde de pastos.

Medidas :

Diámetro : de 0,70 a 1,20 m.

Profundidad : hasta 10-20 cm.

HUEVOS

Postura variable, de 9 a 25.

Elípticos. Amarillo-verdoso, luego amarillentos.

Medidas y pesos :

De 121 a 135 x 89,6 a 91

X= 129,6 x 90,2 (N= 3)

Peso lleno : 558 (N= 1)

Peso de las cáscaras : de 73,7 a 80,4

X= 77,3 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
6	06-11-79	Florentino Ameghino	121,0 x 91,0		73,775
27	11-10-87	Península Valdés	135,0 x 90,0	558	78,0
40	11-10-87	Península Valdés	133,0 x 89,6		80,4

PICHONES

Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer.


Descripción: Dorsalmente, gris marrón con rayas blanquecinas. Ventralmente blanquecino.

FAMILIA: TINAMIDAE

TATAUPÁ COMÚN. *Crypturellus tataupa*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos: 1

Fecha	Lugar	Contenido
02-11-75	Golondrina	5 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos, plantas o arbustos.

Características.

Oculto. Depresión en la tierra. Puede o no tener una base de pastos u hojas.

HUEVOS

Pone de 4 a 6.

Elípticos. Violáceos, opacos.

Medidas y pesos :

De 41,3 a 43,5 x 30,8 a 31,7

X= 42,1 x 31,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 1,657 a 1,835

X= 1,721 (N= 4)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
7	02-11-75	Golondrina	41,3 x 31,0	l,714
			41,6 x 31,3	l,680
			42,0 x 30,8	1,657
			43,5 x 31,7	1,835

COLORADA. *Rhynchotus rufescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 5



Fecha	Lugar	Contenido
27-11-71	Villa San José	11 huevos
15-11-74	Sauce de Luna	6 huevos
15-11-74	Sauce de Luna	8 huevos
26-09-89	Las Claritas	10 huevos
17-01-99	Sauce de Luna	4 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. Entre pastos en campos naturales, pastizales, orillas de montes, pajonales.

Características.

Oculto. Depresión en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas. Algunos con un reborde de estos elementos.

Medidas :

Diámetro : de 25 a 30 cm.

Reborde : 3 cm. de espesor.

HUEVOS

Postura de hasta 11 huevos.

Elípticos u ovoidales. Grises a vinosos con tono rosado, brillantes.

Medidas y pesos :

De 52,5 a 61,1 x 39,5 a 47,5

X= 57,8 x 43,4 (N= 25)

Peso de las cáscaras : de 3,56 a 5,01

X= 4,1 (N= 25)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
8	27-11-71	Villa San José	54,2 x 42,5	4,172
			54,3 x 43,8	4,000
			55,0 x 43,7	4,464
			56,3 x 43,8	4,241
			57,0 x 44,4	4,081
			57,5 x 44,6	4,423
			58,0 x 44,7	4,099
			58,4 x 44,0	4,502
			58,7 x 45,0	4,117
			60,7 x 44,0	3,885
			61,1 x 44,0	4,800
10	15-11-74	Sauce de Luna	58,2 x 44,0	4,340
			59,2 x 45,5	4,741
			59,3 x 43,0	4,492
			59,6 x 47,5	5,014
			60,0 x 43,4	4,985
			60,2 x 43,1	4,600
			60,5 x 43,2	4,445
			60,5 x 46,0	4,651
	15-11-74	Sauce de Luna	52,5 x 41,2	3,564
			53,7 x 40,2	3,420
			53,9 x 42,0	3,918
			54,8 x 40,7	3,718
			55,0 x 39,5	3,497
			55,8 x 42,3	3,660

PICHONES

Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer.

Descripción :

Cabeza ocrácea rayada de negro. Dorsalmente ocráceo manchado de negro. Ventralmente blanquecino. Alas ocráceo-rojizo.

INAMBÚ MONTARAZ. *Nothoprocta cinerascens*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N				N

Total de nidos: 2

Fecha	Lugar	Contenido
05-12-73	Aguará Grande	4 huevos
18-08-85	Villa Santa Isabel	5 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En el suelo. Entre matas de pastos, en la base de arbustos o yuyos grandes, en montes. Características.

Oculto. Depresión en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas. Algunos con un reborde de estos elementos.

Medidas:

Diámetro : de 15 a 20 cm.

Profundidad : 1 a 4,5 cm.

Reborde : 2 a 4 cm.

HUEVOS

Pone hasta 13 huevos.

Elípticos u ovoidales. Gris vinoso, brillantes.

Medidas y pesos :

De 45,1 a 48,4 x 34,1 a 38,1

X= 46,8 x 36,7 (N= 9)


Peso de las cáscaras : de 2 a 2,5

X= 2,2 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
675	05-12-73	Aguará Grande	45,1 x 35,3	2,000
			46,5 x 35,9	2,027
			47,2 x 36,0	2,010
			48,0 x 34,l	2,020
79	18-08-85	Villa Santa Isabel	45,9 x 37,6	2,5
			46,8 x 37,6	2,3
			47,0 x 38,0	2,5
			47,0 x 38,0	2,5
			48,4 x 38,1	2,3

INAMBÚ SILBÓN. *Nothoprocta pentlandii*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido
27-11-82	Embalse	8 huevos
20-12-83	Paraje Chuhume	8 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. Entre matas de pastos, en la base de arbustos o yuyos grandes.

Características.

Oculto. Depresión en la tierra. Forra la base con pastos y plumas. Algunos con un reborde de estos elementos.

Medidas :

Diámetro : de 15 a 22 cm.

Profundidad : 3 a 6 cm.

Reborde : 2 a 4 cm.

HUEVOS

Pone de 8 a 12 huevos.

Elípticos u ovoidales. Gris vinoso, brillantes.

Medidas y pesos :

De 45,7 a 49,7 x 33,8 a 37,6

X= 47 x 36,3 (N= 16)

Peso de las cáscaras : de 1,8 a 2,3

X= 2,1 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
14	27-11-82	Embalse	45,7 x 33,8	2,0
			47,4 x 36,0	2,0
			47,6 x 35,4	2,1
			47,7 x 35,0	2,0
			47,8 x 35,6	1,8
			47,8 x 36,8	2,3
			47,9 x 35,1	2,1
			48,5 x 37,1	2,0
52	20-12-83	Paraje Chuhume	46,0 x 36,3	2,3
			46,5 x 37,0	2,2
			46,8 x 36,0	2,0
			47,0 x 37,1	2,3
			47,0 x 37,0	2,2
			48,3 x 36,8	2,1
			48,4 x 36,7	2,0
			49,7 x 37,6	2,3

INAMBÚ PÁLIDO. *Nothura darwinii*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido
28-11-98	Santa Rosa (La Pampa)	2 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. Entre matas de pastos, en la base de arbustos o yuyos grandes.

Características.

Oculto. Depresión o concavidad en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas.

Medida.


Diámetro : de 8 a 10 cm.

HUEVOS

Postura de hasta 8 huevos.

Elípticos u ovoidales. Marrones con tinte vinoso o violeta grisáceo, brillantes.

INAMBÚ COMÚN. *Nothura maculosa*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N					N	N	N	N

Total de nidos : 24

Fecha	Lugar	Contenido	Fecha	Lugar	Contenido
18-10-70	Sarmiento	7 huevos	11-11-95	Esperanza	2 huevos
25-10-70	Esperanza	5 huevos	19-11-95	Esperanza	7 huevos
13-10-72	Cayastacito	4 huevos	04-01-96	Esperanza	6 huevos
24-11-79	Humboldt	3 huevos	04-01-96	Esperanza	8 huevos
24-11-79	Humboldt	2 huevos	15-10-98	Esperanza	3 huevos
24-11-79	Humboldt	9 huevos	15-10-98	Esperanza	5 huevos
15-11-83	Esperanza	7 huevos	05-01-01	Esperanza	3 huevos
13-04-88	Esperanza	4 huevos	23-12-03	Esperanza	5 huevos
29-10-89	Esperanza	3 huevos	09-09-04	Esperanza	5 huevos
01-11-89	Esperanza	6 huevos	24-09-04	Esperanza	5 huevos
02-10-91	Malabrigo	5 huevos	20-01-07	Franck	4 huevos
06-10-95	Franck	6 huevos	18-12-08	Esperanza	5 huevos

09-01-94. Esperanza, adulto con 8 pichones cruzando una ruta.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4			1					2	8	7	2

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. Entre matas de pastos, en la base de arbustos o yuyos grandes.

Características.

Oculto. Depresión o concavidad en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas. Algunos con un reborde de estos elementos.

Medida.

Diámetro : de 8 a 10 cm.

HUEVOS

Postura de hasta 10 huevos.

Elípticos u ovoidales. Gris a marrón vinoso, brillantes.

Medidas y pesos :

De 36,7 a 46,7 x 27,4 a 33,1

X= 42,9 x 31 (N= 46)

Peso lleno : de 18,2 a 22,8 X= 20,6 (N= 20)

Peso de las cáscaras : de 0,94 a 1,60 X= 1,39 (N= 34)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
11	18-10-70	Sarmiento	42,4 x 30,7		1,231
			43,3 x 31,8		1,495
			44,4 x 29,6		1,554
			44,4 x 30,7		1,279
			45,5 x 30,5		1,587
			46,0 x 30,8		1,352
			46,7 x 30,7		1,292
12	24-11-79	Humboldt	41,4 x 31,3		1,031
			42,6 x 29,3		1,222
			43,2 x 31,2		1,322
13	24-11-79	Humboldt	36,7 x 27,4		1,088
			39,0 x 30,8		1,389
			39,4 x 30,2		1,200
			39,7 x 28,9		0,949
			39,9 x 31,0		1,289
			40,6 x 29,7		1,228
			41,1 x 30,7		1,313
			41,3 x 31,2		1,217
			42,9 x 30,7		1,285
627	15-11-83	Esperanza	41,3 x 32,0	18,6	1,350
			41,4 x 32,8	20,5	1,280
			42,6 x 33,1	21,1	1,451
			42,9 x 30,3	18,2	1,267
			43,1 x 31,7	20,4	1,346
			43,3 x 32,0	20,0	1,471
			43,9 x 31,2	18,5	1,246
301	29-10-89	Esperanza	43,2 x 29,9	19,0	1,4
			44,6 x 31,8	21,7	1,5
			45,0 x 31,5	21,1	1,5
882	15-10-98	Esperanza	41,3 x 31,0		1,5
			42,5 x 31,4		1,5
			43,1 x 33,4		1,5
			43,7 x 32,0		1,6
			45,2 x 32,5		1,5
	09-09-04	Esperanza	41,4 x 30,3	21,4	
			42,2 x 30,2	19,6	
			42,4 x 31,3	20,4	
			42,4 x 30,0	20,0	
			43,2 x 32,0	22,0	
	24-09-04	Esperanza	43,7 x 30,0	20,1	
			44,0 x 31,5	21,9	
			44,3 x 31,2	22,5	
			44,5 x 31,0	21,6	
			45,0 x 31,5	22,8	

RITMO DE PUESTA E INCUBACIÓN

Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación 16-17 días.

PICHONES

Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer.

Descripción :
Cabeza rayada de pardo y crema. Garganta blanca. Línea malar negra. Lateral del cuello, ocráceo. Dorsalmente jaspeado de pardo oscuro, blanquecino y ocráceo. Ventralmente blanquecino.

OBSERVACIONES

Se produce la destrucción de nidos por diversos motivos. El anegamiento por grandes lluvias, Iguanas y otros animales que consumen huevos, cortadoras de pastos, roturación de la tierra.
El 07-07-87 en Esperanza, se observó un ejemplar albino.

MARTINETA COMÚN. *Eudromia elegans*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido
10-11-75	Cármen de Patagones	6 huevos
04-11-79	Península Valdés	6 huevos
04-11-79	Península Valdés	2 huevos
04-11-79	Península Valdés	6 huevos
10-11-88	Puerto Madryn	6 huevos

03-02-71. Península Valdés, adultos con juveniles.
04-02-72. Puerto Madryn, una pareja con 3 pichones chicos.
04-11-79. Península Valdés, adultos con pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
En el suelo. En la base de arbustos o yuyos grandes.
Características.
Oculto. Depresión o concavidad en la tierra. Puede o no tener una base de pastos y/o plumas. Algunos con un reborde de estos elementos.
Medidas :
Diámetro : de 20 a 22 cm.
Profundidad . 2 a 5 cm.

HUEVOS

Postura de hasta 13 huevos.
Elípticos u ovoidales. Verdes, brillantes.

Medidas y pesos :
De 46,3 a 62,5 x 36,6 a 42 X= 52,1 x 40,1 (N= 20)
Peso de las cáscaras : de 2,2 a 3,8 X= 2,96 (N= 20)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
128	10-11-75	Cármen de Patagones	55,6 x 41,2	3,875
			56,5 x 41,6	3,660
			56,8 x 42,0	3,700
			59,8 x 41,3	3,844
			59,1 x 41,7	3,763
			62,5 x 41,6	3,740
15	04-11-79	Península Valdés	52,7 x 38,3	2,729
			53,2 x 39,0	2,707
16	04-11-79	Península Valdés	48,7 x 41,8	2,640
			49,3 x 41,8	2,900
			49,7 x 40,7	2,621
			49,0 x 40,3	2,212
			49,7 x 42,0	2,903
			49,6 x 41,4	3,105
673	10-11-88	Puerto Madryn	46,3 x 36,6	2,3
			46,9 x 38,1	2,6
			48,0 x 38,6	2,4
			48,9 x 39,5	2,6
			49,6 x 38,7	2,7
			50,0 x 39,5	2,7

PICHONES

Cabeza grisácea con copete oscuro. Dos líneas blancas, una por arriba de los ojos, baja hasta el cuello y la otra desde la base del pico, por debajo de los ojos, hasta el cuello.
Dorsalmente moteado y estriado de grisáceo, blanquecino y negro. Ventralmente grisáceo jaspeado de pardo oscuro.

QUIULA PATAGÓNICA.*Tinamotis ingoufi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

25-01-74. Gobernador Gregores, pareja con 16 juveniles

Juvenil


Cabeza parda con estrías blanquecinas. Dos líneas blanquecinas a los lados de la cabeza hasta el cuello. Garganta blanquecina. Pecho grisáceo. Resto de ventral blanquecino.
Dorsalmente gris con manchas negras y ocráceas. Primarias y secundarias rojizo-canela.

FAMILIA: *ANHIMIDAE*

CHAJÁ *Chauna torquata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N						N	N	N	N	N	N



Total de nidos : 21

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
13-12-71	Aguará Grande	5 huevos	Juncal
24-10-72	Marcelino Escalada	5 huevos	Bañado
19-09-79	Mburucuyá	1 huevo	Bañado
19-09-79	Mburucuyá	4 huevo	Bañado
02-01-82	Morteros	3 huevos	Juncal
24-11-83	Aguará Grande	3 huevos	Bañado
13-10-86	Llambi Campbell	4 huevos	Juncal
08-11-86	Llambi Campbell	5 huevos	Juncal
25-09-87	Llambi Campbell	5 huevos	Juncal
29-09-89	Calchaquí	6 huevos	Bañado
08-11-89	Los Amores	3 huevos	Bañado
08-11-89	Los Amores	3 huevos	Bañado
08-11-89	Los Amores	2 huevos	Bañado
08-11-89	Los Amores	1 huevos	Bañado
15-07-93	Calchaquí	No observado	Bañado
15-07-93	Calchaquí	No observado	Bañado
15-07-93	Calchaquí	No observado	Bañado
15-07-93	Calchaquí	No observado	Bañado
05-08-93	Calchaquí	6 huevos	Bañado
14-11-96	Paraje 29	En construcción	Bañado
28-10-98	Calchaquí	7 huevos	Bañado

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1						4	1	4	3	7	1

11-06-76. Toba. Bandada de unos 140 ejemplares, volando en círculo, muy alto.
12-06-76. Los Amores. Pareja con 5 pichones chicos.
06-12-91. Yeso Oeste. Pareja con 3 pichones.
05-08-93. Calchaquí. Pareja con 2 pichones chicos.
28-10-98. Calchaquí. Pareja con 3 pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente. En bañados, orillas de lagunas o claros de agua en esteros con juncales o en espadañales.

Ubicación.

Asentados sobre el suelo.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos, espadañas u otras plantas acuáticas.

Un nido fue construido con Paja brava y otro con Duraznillo del agua.

Medidas :

Diámetro total : de 60 a 120 cm.
Depresión central : 20 a 25 cm.
Profundidad : 2 a 5 cm.
Alto : 30 a 40 cm.

HUEVOS

Pone de 5 a 7 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco con tono grisáceo.

Medidas y pesos :

De 84,2 a 91,5 x 54,9 a 62,5
X= 88,3 x 57,6 (N= 19)
Peso lleno : de 132 a 159,1
X= 144,4 (N= 14)
Peso de las cáscaras : de 11 a 16 X= 13,7 (N= 19)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
74	13-12-71	Aguará Grande	88,5 x 62,2		15,450
			88,7 x 62,5		15,332
			89,5 x 62,5		14,974
			89,7 x 61,4		15,226
			89,7 x 62,0		14,817
629	24-11-83	Aguará Grande	84,2 x 55,0	159,1	11,053
			84,2 x 55,7	139,4	11,285
			91,5 x 56,7	137,5	13,160
652	08-11-86	Llambi Campbell	86,4 x 56,8	148,6	14,3
			86,4 x 54,9	138,0	16,0
			88,7 x 57,8	158,3	15,5
			87,8 x 57,9	152,5	15,0
			91,5 x 57,4	155,4	15,5
676	29-09-89	Calchaquí	85,2 x 55,4	132,0	14,0
			88,2 x 56,5	148,0	12,0
			88,7 x 56,8	143,0	13,5
			89,8 x 57,5	144,0	12,5
			87,9 x 57,0	142,0	14,0
			90,0 x 56,6	146,0	14,5

PICHONES

Descripción.

Pico plomizo. Patas rojizas. Plumón compacto amarillo-verdoso. Ventralmente más pálido.

OBSERVACIONES

La pareja construye.


FAMILIA: ANATIDAE

SIRIRÍ COLORADO *Dendrocygna bicolor*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
05-01-79	Candioti	5 huevos	Entre pastos, en un campo inundado

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el suelo, entre pastos.
Características.
Oculto. Poco elaborado. Plataforma plana, con base de pastos.
Medida :
Diámetro total : 25 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.
Ovoidales. De color blanco ocráceo.
Medidas y pesos :
De 53,8 a 55,2 x 40 a 42,3 X= 54,5 x 41,1 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 5,27 a 5,68 X= 5,39 (N= 5)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
75	05-01-79	Candioti	53,8 x 42,4	5,275
			54,4 x 41,3	5,689
			55,0 x 41,0	5,280
			55,2 x 40,0	5,410
			54,3 x 40,9	5,324

SIRIRÍ PAMPA *Dendrocygna viduata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N		

Total de nidos : 4



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
13-10-72	Cayastacito	8 huevos	Entre tréboles
16-08-73	Cayastacito	12 huevos	Entre pastos
16-08-73	Cayastacito	12 huevos	Entre pastos
16-08-73	Cayastacito	12 huevos	Entre pastos

11-12-02. Paso de los Libres. Pareja con 5 pichones en una arrocera.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos o sembrados. Características. Oculto. Poco elaborado. Los huevos son puestos sobre la tierra o a veces cubre la base con pastos.

Medidas:

Diámetro total : 25 cm.

HUEVOS

Pone hasta 15 huevos.

Ovoidales. De color blanco ocráceo.

Medidas y pesos :

De 48,2 a 51,7 x 37,5 a 39 X= 50,6 x 37,9 (N= 8)

Peso de las cáscaras : de 3,41 a 3,76 X= 3,66 (N= 8)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
76	13-10-72	Cayastacito	48,2 x 38,8	3,714
			50,0 x 39,0	3,628
			50,5 x 39,0	3,763
			50,8 x 39,0	3,717
			51,4 x 38,0	3,418
			51,4 x 37,8	3,680
			51,5 x 38,7	3,677
			51,7 x 37,5	3,742

PICHONES

Descripción. Dorsalmente pardo oliváceo. Ventralmente amarillento. Franja amarilla en la nuca. Cejas amarillas. Línea ocular oscura. Debajo de los ojos amarillento. Amarillento en el extremo de las alas y en la base de la cola.

SIRIRÍ DE VIENTRE NEGRO *Dendrocygna autumnalis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
07-01-13	Isla Verde	16 huevos	Hueco en Mora (*)


(*) Nido localizado por Panti Uranga, en las afueras de la población y a 3 metros de altura. El hueco tenía una profundidad de70-80 cm.

CISNE DE CUELLO NEGRO *Cygnus melancoryphus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N			N	N

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
19-08-91	Aguará Grande	5 huevos	Laguna con juncal
10-08-99	Isla Verde	3 huevos	Laguna con juncal
10-08-99	Isla Verde	4 huevos	Laguna con juncal

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En lagunas, claros de agua en esteros.

Características.

Expuesto. Elaborado. Gran plataforma de juncos. Depresión central con trozos de juncos y plumas.

Medidas :

Diámetro total : 110 a 120 cm.

Depresión central : 25-30 cm.

Profundidad : 8 cm.

Alto : 40 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidal alargado. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 99 a 104 x 67 a 69,5

X= 101,9 x 68 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 22,2 a 24,7

X= 23,8 (N= 4)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
808	19-08-91	Aguará Grande	99,0 x 69,5	24,7
			100,7 x 67,8	22,2
			104,0 x 68,0	23,8
			104,0 x 67,0	24,5

OBSERVACIONES

24-01-74. Lago Argentino. En una laguna, varias parejas con 3 y 4 pichones cada una.

COSCOROBA *Coscoroba coscoroba*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Total de nidos : 11

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
20-11-77	Miguel Escalada	4 huevos	Laguna con juncal
09-01-79	Miguel Escalada	5 huevos	Laguna con juncal
24-12-79	Miguel Escalada	4 huevos	Laguna con juncal
24-12-79	Miguel Escalada	6 huevos	Laguna con juncal
19-08-91	Aguará Grande	4 huevos	Laguna con juncal
04-12-91	Arias	4 huevos	Laguna con juncal
10-10-98	Isla Verde	5 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
10-08-99	Isla Verde	4 huevos	Laguna con juncal
25-01-10	Isla Verde	5 huevos	Laguna con juncal
25-01-10	Isla Verde	5 huevos	Laguna con juncal
25-01-10	Isla Verde	5 huevos	Laguna con juncal

28-11-98. Puelches. Adulto con 3 pichones grandes.
31-10-00. Wildermuth. Pareja con 5 pichones grandes.
15-11-10. Ruta 13 y Río Salado (Aº Saladillo). Muchos juveniles.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en lagunas con juncales.

Características.

Expuesto. Elaborado. Asentados o no sobre el fondo de la laguna.

Gran plataforma, elevada, a veces con forma de cono. En la parte superior una depresión.

Medidas :

Diámetro total : 90 a 100 cm.

Depresión central : 20 a 25 cm.

Profundidad : 8 a 10 cm.

Alto : 25 a 70 cm.

HUEVOS

Pone de 5 a 7 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 87 a 95,5 x 58 a 61,8 X= 90,2 x 58,8 (N= 21)

Peso lleno : de 168,5 a 185

X= 176 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 15,8 a 21,9

X= 18,9 (N= 21)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
77	20-11-77	Miguel Escalada	89,7 x 60,0		19,621
			91,0 x 60,8		18,103
			91,0 x 61,0		21,793
			91,4 x 60,6		20,280
78	09-01-79	Miguel Escalada	84,3 x 52,8		21,934
			87,0 x 58,0		20,000
			87,0 x 58,7		18,301
			88,6 x 58,3		19,937
			89,0 x 58,0		15,873
	24-12-79	Miguel Escalada	86,8 x 60,3		20,521
			90,3 x 60,8		16,762
			90,4 x 61,0		17,968
			90,7 x 61,8		20,309
80	19-08-91	Aguará Grande	88,5 x 60,7		21,2
			91,6 x 60,2		19,0
			93,7 x 59,4		20,6
			95,5 x 59,6		17,6
23	04-12-91	Arias	90,3 x 58,7	185,0	18,0
			90,8 x 57,5	174,5	18,4
			91,5 x 59,6	168,5	18,8
			91,5 x 61,3	178,0	18,8

OBSERVACIONES

Cuando deja el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con plumas y trozos de juncos. En un nido colocó muchos caparazones de caracoles.

CAUQUÉN COMÚN *Chloephaga picta*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-01-72	Lapataia	6 huevos	Entre pastos
15-11-75	Río Turbio	2 huevos	Entre pastos
10-11-79	La Esperanza	5 huevos	Entre pastos
11-11-79	Río Turbio	2 huevos	Entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos, cerca o lejos de ambientes acuáticos.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera depresión o no del suelo, forrada con pastos. A veces con un reborde de pastos y plumón.

Medida :

Diámetro total : de 22 a 30 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.

Ovoidales. De color ocre.

Medidas y pesos :

De 74,2 a 78,6 x 49,5 a 52,6

X= 77,8 x 51,1 (N= 9)

Peso de las cáscaras : de 9,7 a 10,5 X= 10,1 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
81	15-11-75	Río Turbio	77,7 x 51,4	9,945
			78,6 x 50,9	10,426
82	10-11-79	La Esperanza	75,6 x 50,8	
			75,5 x 52,6	
			77,4 x 51,0	
			78,2 x 51,7	
			77,3 x 51,0	
83	11-11-79	Río Turbio	74,2 x 49,5	9,883
			76,9 x 51,3	10,103

PICHONES

Descripción.

El juvenil es pardusco, barrado de negro y blanco en el pecho y flancos.

OBSERVACIONES

02-02-72. Río Grande. Parejas con 3 a 8 pichones.


28-01-74. Río Turbio. Varias parejas con pichones.

11-11-79. Río Turbio. Juntan los huevos para emplearlos en las panaderías.

CAUQUÉN REAL *Chloephaga poliocephala*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
10-11-79	Río Turbio	2 huevos	Entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos, cerca del agua.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación o no. Coloca pastos en la base.

Medida :

Diámetro total : de 22 a 25 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 6 huevos.

Ovoidales. De color ocre.

Medidas y pesos :

De 69,9 a 72 x 46,3 a 47 X= 70,9 x 46,6 (N= 2)

Peso de las cáscaras :

X= 9,01 (N= 2)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
84	10-11-79	Río Turbio	69,9 x 46,3	9,020
			72,0 x 47,0	9,006

PATO REAL *Cairina moschata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
03-11-77	Reconquista	5 huevos	Hueco en árbol

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos en los árboles.

Características.

Oculto. En la base coloca cortezas, hojas, nervaduras, plumas. Suele tapar a los huevos con estos elementos.

HUEVOS

Pone hasta 13 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 61,5 a 62,8 x 44,7 a 45,5

X= 62 x 44,9 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 8,26 a 8,85

X= 8,51 (N= 5)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
99	03-11-77	Reconquista	61,5 x 44,7	8,451
			61,8 x 45,5	8,265
			62,0 x 44,8	8,852
			62,4 x 45,0	8,600
			62,8 x 44,8	8,392


PICHONES

Descripción. Plumón pardo oscuro en la parte dorsal. Ventralmente amarillento. Pequeñas manchas amarillas en las alas y lados de la rabadilla. Amarillo en la frente y mejillas. Línea oscura detrás de los ojos.

PATO DE COLLAR *Callonetta leucophrys*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-03-78	Santa Rosa (S. Fe)	5 pichones y 2 huevos	Hueco en Paraíso	3,50
08-11-78	Esperanza	12 huevos	Hueco en Paraíso	3,50
08-11-89	Los Amores	No observado	Nido de Cotorra	8,00
08-11-89	Los Amores	No observado	Nido de Cotorra	12,00
08-11-89	Los Amores	No observado	Hueco en árbol	5,00
08-11-89	Los Amores	5 huevos	Hueco en árbol	4,50
29-10-09	Villa Roda	No observado	Nido de Cotorra	10,00

22-11-75. Aguará. Pareja con 6 pichones.
14-11-86. Aguará. Una hembra con 6 pichones.
26-01-87. Esperanza. Adulto con 1 pichón.
26-05-96. Esperanza. Pareja con 4 pichones grandes.
12-02-97. Fortín Olmos. Pareja con 5 pichones chicos.
20-02-07. Esperanza. Pareja con 12 pichones.
28-11-12. Villa Roda. Pareja con 13 pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles o en nidos de Cotorra (*Myiopsitta monachus*)

Características.

Oculto. Coloca plumón en la base. Puede ocupar el mismo hueco en más de una oportunidad.

Medidas :

Un hueco :

Diámetro total : 15 cm.

Profundidad : 100 cm.

HUEVOS

Pone hasta 13 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :

De 42,6 a 49,2 x 31,9 a 36,2
X= 47,9 x 34,7 (N= 14)
Peso de las cáscaras : de 2,57 a 3,24
X= 2,79 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
93	07-03-78	Santa Rosa (S. Fe)	42,6 x 31,9	2,586
			46,5 x 34,8	2,702
94	08-11-78	Esperanza	43,8 x 33,4	2,699
			44,8 x 33,5	3,063
			45,9 x 33,6	2,735
			46,5 x 33,7	3,245
			47,1 x 35,5	2,599
			47,4 x 35,6	2,577
			48,2 x 35,3	2,925
			48,2 x 35,8	3,188
			48,7 x 35,5	3,150
			48,7 x 35,8	3,066
			48,9 x 35,4	2,911
			49,2 x 36,2	3,159

PICHONES

Descripción. Pico gris con punta rosada. Patas grisáceas. Dorsalmente gris pardusco con dos manchas blancas en la rabadilla. Ventralmente blanco. Cara blanca. Línea ocular oscura. Cejas blancas. Mancha blanca en las alas.

OBSERVACIONES

La pareja observada en Aguará, el 22-11-75, estaban en un charco en un claro de un monte. Al ser sorprendidos los padres volaron y los pichones zambulleron. Al rato volvieron, y la madre se arrastraba con las alas abiertas llevando bajo las mismas algunos pichones, los cuales se escondieron muy rápido entre los yuyos.
En el nido de Santa Rosa, los pichones al salir la madre del nido, se tiraron al suelo.


PATO CUTIRÍ *Amazonetta brasiliensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
20-02-78	Villa Elisa	10 huevos	Entre pastos
15-12-78	Cayastacito	5 huevos	Entre pastos



20-11-91. Nogoyá. Pareja con 4 pichones.
07-12-01. Esperanza. Pareja con 5 pichones.
09-01-02. Laguna del Palmar. Una hembra con 14 pichones.

11-12-02. Paso de los Libres. Pareja con 3 pichones.
12-05-08. Esperanza. Pareja con 12 pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el suelo, entre pastos, a veces lejos de ambientes acuáticos.
Características.
Semioculto. La base cubierta con pastos
Medidas :
Diámetro total : de 19 a 23 cm.

HUEVOS

Pone hasta 14 huevos.
Ovoidales. De color ocre, claro o intenso.
Medidas y pesos :
De 47,2 a 54 x 34,8 a 38,1 X= 51,9 x 37 (N= 15)
Peso de las cáscaras : de 2,43 a 3,03 X= 2,84 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
97	20-02-78	Villa Elisa	49,7 x 36,7	2,860
			50,0 x 37,8	2,847
			51,5 x 34,8	2,827
			51,9 x 36,3	2,560
			52,0 x 36,9	2,866
			52,0 x 37,8	2,436
			52,7 x 37,2	2,585
			53,0 x 38,1	2,877
			53,3 x 37,8	2,925
			54,0 x 37,5	2,855
98	15-12-78	Cayastacito	47,2 x 37,0	2,886
			47,3 x 37,0	3,030
			47,8 x 37,0	2,946
			48,0 x 36,8	2,874
			49,3 x 36,5	2,942

PICHONES

Descripción. Plumón pardo oscuro dorsalmente. Ventralmente amarillento. Frente, cara y cejas amarillentas. Mancha amarillenta en las alas y a los lados de la rabadilla. Línea ocular oscura.


QUETRO VOLADOR *Tachyeres patachonicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
05-11-79	Punta Clara	4 huevos	Cerca del mar
07-11-79	Puerto Deseado	1 huevo	En una isla



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, en costas marinas, islas o islotes. Protegidos o no por arbustos.

Características.

Expuesto o semiocultos. Poco elaborado. Base y reborde de plumón y pastos.

Medidas :

Diámetro total : 30 cm.
Profundidad : 14 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 5 huevos.

Ovoidales. De color ocre blanquecino.

Medidas y pesos :

De 73 a 88 x 51,2 a 56,5 X= 78,6 a 53,1 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 9,66 a 15,5 X= 12,7 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
87	05-11-79	Punta Clara	73,0 x 53,2	10,287
			75,5 x 51,2	10,164
			78,2 x 51,8	10,030
			78,2 x 52,2	9,664
86	07-11-79	Puerto Deseado	88 x 56,5	15,578


QUETRO AUSTRAL *Tachyeres pteneres*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-01-72	Lapataia	6 huevos	Debajo de arbustos



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, en costas marinas. Debajo de unos arbustos.

Características.

Expuesto o semiocultos. Poco elaborado. Base y reborde de plumón, de unos 10 cm.

Medidas :

Diámetro total : 30 cm.
Profundidad : 10 cm.

HUEVOS

Pone de 6 a 7 huevos.

Ovoidales. De color ocre blanquecino.

Medidas y pesos :

De 80,5 a 90,8 x 53,5 a 56,5
X= 85,6 x 54,5 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 12 a 14,3 X= 13,3 (N= 6)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
85	30-01-72	Lapataia	80,5 x 53,5	14,311
			85,0 x 53,5	13,036
			85,5 x 55,5	14,000
			86,1 x 54,5	12,007
			86,2 x 55,4	13,587
			90,8 x 55,1	13,051

PATO CRESTÓN *Lophonetta specularioides*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
07-11-79	Puerto Deseado	4 huevos	Entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En el suelo, entre pastos o debajo de arbustos.

Características. Semioculto. La base forrada con pastos.


HUEVOS

Pone hasta 8 huevos.
Ovoidales. De color crema.

PATO OVERO *Anas sibilatrix*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
10-11-79	La Esperanza	1 huevo	Entre pastos
10-11-79	La Esperanza	5 huevos	Entre pastos

27-01-74. El Calafate. Algunas parejas con pichones.
27-11-91. Gobernador Mancilla. Una pareja con 3 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.
Semioculto. La base cubierta de pastos

Medidas:

Diámetro total : 22 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.

Ovoidales. De color ocre.

Medida y peso :

De 58,8 x 41,2 (N= 1)

Peso de las cáscaras: 4,19 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
89	10-11-79	La Esperanza	58,8 x 41,2	4,198

PATO BARCINO *Anas flavirostris*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
01-11-78	Valle Encantado	4 huevos	En el suelo de una gruta
01-10-98	Isla Verde	9 huevos	Entre pastos
19-11-07	Esperanza	6 huevos	Nido de Cotorra (a 4 m. del suelo)

05-12-77. Valle Encantado. Pareja con 1 pichón.
14-11-80. Pampa de Achala. Una pareja con 3 pichones y otra con 4.
05-12-81. Pampa de Achala. Adulto con 5 pichones.
25-11-90. Pampa de Achala. Una pareja con 3 pichones chicos y otra con 4 pichones grandes.
11-12-93. Ongamira. Pareja con 6 pichones chicos.
20-11-97. Pampa de Achala. Una pareja con 3 pichones.
21-11-98. Arroyo La Fragua. Pareja con 4 pichones.
28-09-12. Esperanza. Adulto con 6 pichones recién nacidos en nido de Cotorra. Iban hacia un ambiente acuático.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos o en grutas o cuevas, en nidos de Cotorra. Cerca o alejado del agua.

Características.

Oculto o semioculto. La base tapizada con pastos y puede o no tener un reborde de pastos y plumas.

Medida :

Diámetro total : 19 cm.

HUEVOS

Pone hasta 9 huevos.

Ovoidales. De color ocre blanquecino.

Medidas y pesos :

De 44,0 a 56,3 x 33,4 a 39,3

X= 50,4 x 36,4 (N= 10)

Peso lleno : de 27,5 a 29,8 X= 28,7 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 3,01 a 3,27

X= 3,15 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
88	01-11-78	Valle Encantado	52,8 x 37,9		3,138
			55,0 x 39,3		3,278
			55,3 x 39,3		3,010
			56,3 x 39,3		3,197
	19-11-07	Esperanza	46,0 x 34,0	27,5	
			45,0 x 33,5	29,7	
			47,2 x 33,4	29,8	
			46,5 x 34,2	29,5	
			48,8 x 34,1	28,0	
			44,0 x 34,2	29,0	

PICHONES

Descripción.
Dorsalmente pardo. Ventralmente blanquecino.
El juvenil es parecido al adulto, pero de colores más apagados.

OBSERVACIONES

El nido de Isla Verde estaba a 120 m. de una laguna, entre pastos de 50 cm. de altura. Tenía un túnel de 15 cm. de diámetro y 1 m. de largo, en el fondo y oculto por los pastos, estaba el nido.

PATO MAICERO *Anas georgia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
13-10-72	Cayastacito	8 huevos	Entre tréboles y cardos
16-11-76	Cayastacito	8 huevos	Espartillo, a 40 cm. del suelo
16-11-76	Cayastacito	8 huevos	Albardón
22-02-79	Abra Pampa	7 huevos	Base de arbustos
04-12-91	Arias	9 huevos	Entre pastos

El 08-10-99 en Ruta 13 y 36, había una pareja con un pichón chico.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Construye el nido en campos naturales, sembrados, albardones, lomadas, cerca o lejos del agua.

Ubicación.

En el suelo o en el centro de espartillos.

Características.

Semioculto. Tiene un reborde de pastos y plumón oscuro.

Medidas :

Diámetro total : de 18 a 25 cm.
Profundidad : 1 a 7 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.
Ovoidales. De color ocre.

Medidas y pesos :

De 49 a 55,7 x 35,8 a 38,8 X= 53 x 37,5 (N= 15)
Peso de las cáscaras : de 3,02 a 3,70 X= 3,37 (N= 15)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
90	13-10-72	Cayastacito	52,3 x 36,8	3,333
			54,3 x 37,7	3,387
			54,8 x 38,2	3,453
			54,9 x 38,8	3,599
			55,3 x 38,3	3,496
			55,4 x 38,8	3,707
			55,5 x 38,0	3,537
			55,7 x 38,7	3,625
91	22-02-79	Abra Pampa	49,0 x 36,0	3,494
			50,4 x 36,5	3,474
			51,3 x 35,8	3,414
			51,4 x 37,6	3,283
			51,9 x 37,4	3,021
			52,4 x 36,5	3,272
			53,4 x 37,2	3,203

PATO GARGANTILLA *Anas bahamensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-12-90	Isla Verde	11 huevos	Entre pastos
15-12-90	Isla Verde	3 huevos	Entre pastos

09-12-12. Balnearia. Pareja con 6 pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos. A veces lejos del agua.

Características.

Semioculto. Reborde de pastos y plumas.

Medida :

Diámetro total : 20 cm.

HUEVOS

Pone hasta 12 huevos.

Ovoidales. De color crema.

Medidas y pesos :

De 52 a 53,3 x 36 a 36,3 X= 53 x 36,1 (N= 11)

Peso de las cáscaras : de 3 a 3,3 X= 3,1 (N= 11)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
804	15-12-90	Isla Verde	52,0 x 36,3	3,2
			52,8 x 36,0	3,1

52,8 x 36,2	3,1
52,9 x 36,2	3,2
53,0 x 36,0	3,2
53,0 x 36,0	3,3
53,0 x 36,1	3,0
53,3 x 36,1	3,l
53,3 x 36,3	3,2
53,3 x 36,0	3,0
53,5 x 36,2	3,0

PATO CAPUCHINO *Anas versicolor*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N		



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
04-08-78	Cayastacito	5 huevos	Entre pastos
04-08-78	Cayastacito	5 huevos	Entre pastos
15-01-07	Franck	5 huevos	Entre pastos

17-09-79. Loreto. Varias parejas algunas con pichones
23-08-86. San Javier. Pareja con 3 pichones.
20-10-86. Saladero Cabal. Dos parejas con 4 pichones cada una.
01-10-90. Los Amores. Una pareja con 4 y otra con 5 pichones.
07-10-99. Gato Colorado. Cañada de las Víboras. Pareja con 2 pichones chicos.
08-10-99. Ruta 13 y 36. Una pareja con 5 pichones grandes y otra con 3 chicos.
25-09-00. Cayastá. Pareja con 6 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el suelo, entre pastos.
Características.
Oculto. Rudimentario. Coloca pastos en la base.
Medida :
Diámetro total : 14 cm.

HUEVOS

Pone hasta 8 huevos.
Ovoidales o elípticos. De color ocre.
Medidas y pesos :
De 49,5 a 51,3 x 36,4 a 37,5
X= 50,5 x 37 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 2,85 a 2,92
X= 2,91 (N= 5)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
92	04-08-78	Cayastacito	49,5 x 37,1	2,910
			50,3 x 37,5	2,851
			50,5 x 36,4	2,892
			50,9 x 36,9	2,920
			51,3 x 37,4	2,916

PICHONES	OBSERVACIONES
Descripción. Dorsalmente pardo oscuro. Ventralmente blanquecino. Franja ocular oscura. Manchas blanquecinas a los lados del dorso y en las alas.	10-10-79. Jacinto Arauz. Un ejemplar albino junto a uno normal.

PATO COLORADO *Anas cyanoptera*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
08-12-90	Isla Verde	4 huevos	Entre pastos
19-01-92	Isla Verde	7 huevos	Entre pastos
05-02-92	Isla Verde	3 huevos	Entre pastos

28-11-98. Puelches. Pareja con 10 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el suelo, entre pastos.
Características.
Semioculto. Forra la base con pastos. Reborde de pastos y plumón.
Medidas :
Diámetro total : de 14 a 15 cm.
Profundidad : 4 a 5 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.
Ovoidales. De color crema.
Medidas y pesos :
De 46,5 a 51,5 x 35,4 a 36,5
X= 49,5 x 36 (N= 12)
Peso lleno : 36,2 (N= 1)
Peso de las cáscaras : de 2,6 a 2,9 X= 2,6 (N= 12)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
803	08-12-90	Isla Verde	49,3 x 34,8		2,2
			49,7 x 34,5		2,6
			50,0 x 35,5		2,7
			51,8 x 34,5		2,8
826	19-01-92	Isla Verde	46,5 x 36,2		2,8
			47,8 x 36,5		2,6
			48,0 x 35,4		2,8
			48,7 x 37,0		2,9
			49,0 x 36,4		2,6
			50,0 x 36,5		2,6
			50,0 x 36,2		2,9
825	05-02-92	Isla Verde	51,5 x 36,4	36,2	2,9

OBSERVACIONES

Los nidos estaban desde 2 a 50 m. del agua.

PATO CUCHARA *Anas platalea*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
09-01-91	Isla Verde	3 huevos	Entre pastos
10-02-98	Isla Verde	3 huevos	Entre pastos
10-02-98	Isla Verde	4 huevos	Entre pastos
10-02-98	Isla Verde	6 huevos	Entre pastos
10-02-98	Isla Verde	7 huevos	Entre pastos
10-02-98	Isla Verde	10 huevos	Entre pastos

28-11-98. Puelches. Pareja con 5 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos. Desde pocos metros a 50 del agua.

Características.

Semioculto. Base con pastos y reborde de pastos y plumas.

Medida :

Diámetro total : 20 cm.

HUEVOS

Pone hasta 10 huevos.

Ovoidales. De color crema.

Medidas y pesos :


De 47,3 a 48 x 35 a 35,7 X= 47,6 x 35,5 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de2,6 a 2,8 X= 2,7 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
805	09-01-91	Isla Verde	47,3 x 35,3	2,6
			47,3 x 35,0	2,6
			48,0 x 35,7	2,6
			48,0 x 35,3	2,8

PATO PICAZO *Netta peposaca*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N

Total de nidos :5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
19-12-72	Aguará Grande	19 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Espadañal
19-12-72	Aguará Grande	6 huevos	Espadañal
01-09-79	Miguel Escalada	3 huevos y 4 de *H. atricapilla*	Juncal
05-02-92	Isla Verde	11 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Juncal
31-10-00	Wildermuth	13 huevos y 5 de *H. atricapilla*	Juncal

03-01-97. Ruta 13 y 98. Un macho con 2 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En juncales y en espadañales densos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de olla, profundo. Emplea en la construcción trozos de juncos u hojas de espadañas. Algunos tienen plumón.

Medidas :

Diámetro total : 25 a 45 cm.

Diámetro interno : 35 cm.
Profundidad : 7 a 15 cm.
Alto : 30 cm.

HUEVOS

Pone hasta 16 huevos, a veces más.

Ovoidales o elípticos. De color ocre.

Medidas y pesos :

De 53,5 a 60 x 40,1 a 44,7 X= 58 x 42,4 (N= 22)

Peso de las cáscaras : de 4,8 a 7,2 X= 6,4 (N= 22)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
95	19-12-72	Aguará Grande	53,5 x 41,0	6,069
			54,4 x 41,8	6,606
			54,9 x 42,0	5,427
			55,0 x 44,0	6,146
			56,4 x 40,1	4,843
			57,0 x 41,7	6,522
			57,2 x 42,3	5,747
			57,6 x 42,0	6,150
			57,6 x 40,5	6,375
			57,8 x 43,3	6,514
			57,8 x 40,7	5,615
			57,9 x 43,3	6,216
			58,0 x 42,3	6,058
			59,1 x 43,7	5,544
			59,4 x 43,9	5,758
			59,6 x 42,7	5,666
			60,0 x 42,8	4,822
			60,0 x 41,8	6,430
			60,0 x 43,0	6,437
96	01-09-79	Miguel Escalada	59,9 x 42,3	7,207
			61,3 x 43,4	6,684
			62,1 x 44,7	7,202

PICHONES	OBSERVACIONES
Descripción. Dorsalmente pardo. Ventralmente amarillento. Alas pardas con banda posterior amarillenta. Dos manchas amarillentas a los lados del dorso.	15-10-84. Campo Andino. Un ejemplar albino, junto a varios normales

PATO DE CABEZA NEGRA *Heteronetta atricapilla*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos parasitados : 32
Total de especies parasitadas : 12

Fecha	Lugar	Contenido
11-12-72	Aguará Grande	2 huevos en uno de *Fulica leucoptera*
19-12-72	Aguará Grande	2 huevos en uno de *Netta peposaca*
19-12-72	Aguará Grande	8 huevos en uno de *Aramus guarauna*
27-10-75	Aguará Grande	1 huevo en uno de *Phimosus infuscatus*
09-01-79	Miguel Escalada	2 huevos en uno de *Phimosus infuscatus*
09-01-79	Miguel Escalada	4 huevos en uno de *Netta peposaca*
09-01-79	Miguel Escalada	1 huevo en uno de *Fulica leucoptera*
24-01-79	Miguel Escalada	3 huevos en uno de *Aramus guarauna*
24-01-79	Miguel Escalada	1 huevo en uno de *Phimosus infuscatus*
22-12-81	Morteros	1 huevo en un nido de *Chroicocephalus maculipennis*
22-12-81	Morteros	1 huevo en un nido de *Chroicocephalus maculipennis*
02-01-82	Morteros	1 huevo en un nido de *Plegadis chihi*
02-01-82	Morteros	1 huevo en un nido de *Rostrhamus sociabilis*
11-11-86	Teodelina	1 huevo en un nido de *Fulica rufifrons*
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	1 huevo en un nido de *Phimosus infuscatus*
04-12-91	Arias	1 huevo en un nido de *Plegadis chihi*
04-12-91	Arias	2 huevos en un nido de *Plegadis chihi*
04-12-91	Arias (*)	1 huevo en un nido de *Plegadis chihi*
04-12-91	Arias	1 huevo en un nido de *Fulica armillata*
04-12-91	Arias	1 huevo en un nido de *Oxiura vittata*
04-12-91	Arias	1 huevo en un nido de *Chroicocephalus maculipennis*
04-12-91	Isla Verde	2 huevos en un nido de *Nycticorax nycticorax*
10-01-92	Isla Verde	2 huevos en un nido de *Fulica armillata*
05-02-91	Isla Verde	2 huevos en un nido de *Fulica armillata*
05-02-91	Isla Verde	2 huevos en un nido de *Netta peposaca*
10-10-98	Isla Verde	2 huevos en un nido de *Coscoroba coscoroba*
21-10-98	Isla Verde	1 huevo en un nido de *Fulica leucoptera*
31-10-00	Wildermuth	1 huevo en un nido de *Fulica armillata*
31-10-00	Wildermuth	1 huevo en un nido de *Fulica armillata*
31-10-00	Wildermuth	1 huevo en un nido de *Fulica armillata*
31-10-00	Wildermuth	2 huevos en un nido de *Fulica armillata*
31-10-00	Wildermuth	4huevos en un nido de *Netta peposaca*

(*) Este nido tenía el huevo y 2 pichones de *Plegadis chihi.*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Especie parásita. Deposita el o los huevos en nidos de otras aves acuáticas.

HUEVOS

Pone de 1 a 8 huevos por nido parasitado.

Ovoidales o elípticos. De color ocre, ocre verdoso, grisáceos o blanco grisáceos.

Medidas y pesos :

De 54,8 a 63 x 36,5 a 47,7

X= 59 x 42,8 (N= 24)

Peso lleno : de 52 a 63

X= 57,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 5 a 6,7

X= 5,86 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
152	11-12-72	Aguará Grande	56,2 x 43,3		6,033
			60,0 x 44,4		5,700
95	19-12-72	Aguará Grande	54,8 x 41,5		6,240
			58,5 x 43,5		6,030
66	09-01-79	Miguel Escalada	55,5 x 41,5		6,143
			59,3 x 43,0		5,236
96	09-01-79	Miguel Escalada	59,3 x 43,4		6,607
			60,3 x 44,5		6,341
			61,3 x 43,9		6,757
			62,0 x 43,3		6,346
154	09-01-79	Miguel Escalada	58,2 x 43,5		5,721
136	24-01-79	Miguel Escalada	57,8 x 42,4		5,438
			58,3 x 44,4		5,320
			58,9 x 47,0		5,543
70	24-01-79	Miguel Escalada	57,8 x 42,8		5,467
196	22-12-81	Morteros	56,9 x 36,5		5,571
197	22-12-81	Morteros	58,4 x 43,8		5,000
71	02-01-82	Morteros	56,5 x 40,9		5,096
112	02-01-82	Morteros	63,0 x 43,3		6,000
752	17-11-90	Cacique Ariacaiquín	59,6 x 44,3	58,5	5,400
811	04-12-91	Arias	60,0 x 47,7	52,0	6,000
812	04-12-91	Arias	57,9 x 42,0	57,0	6,300
			58,7 x 44,3	57,0	6,000
824	04-12-91	Isla Verde	59,5 x 43,3		5,600
			60,4 x 42,7		5,700
653	05-02-92	Isla Verde	60,8 x 44,7	63,0	6,500

PATO FIERRO *Nomonyx dominicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

06-02-03. Río Salado y ruta 4. Pareja con 3 pichones.

PICHONES

Descripción. Dorsalmente pardo. Dos bandas blancas, una por arriba y otra por debajo de los ojos. Dos manchas blancas, a cada lado del dorso, cerca de las alas y en la rabadilla. Ventralmente blanquecino.

PATO ZAMBULLIDOR GRANDE *Oxyura jamaicensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-12-84	Perito Moreno	2 huevos	Juncal

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sobre el agua, en juncales

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de olla, construido con juncos. Internamente plumón.

Medidas :

Diámetro total : 35 a 40 cm.

Diámetro interno : 18 a 20 cm.

Profundidad : 8 cm.

Alto : 20 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 7 huevos.

Elípticos. De color blanco. Cáscaras rugosa, granulosa.

Medidas y pesos :

De 70,7 a 71,9 x 52,8

X= 71,3 x 52,8 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 10 a 10,9 X= 10,4 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
384	15-12-84	Perito Moreno	70,7 x 52,8	10,0
			71,9 x 52,8	10,9


PATO ZAMBULLIDOR CHICO *Oxyura vittata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										**N**	**N**

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
19-12-72	Aguará Grande	8 huevos	Espadañal
16-12-73	Aguará Grande	4 huevos	Espadañal
22-12-81	Morteros	7 huevos	Gramillón
02-01-82	Morteros	2 huevos	Espadañal
15-12-84	Perito Moreno	3 huevos	Juncal



04-12-91 Arias 3 huevos y 1 de *H. atricapilla* Juncal
05-02-92. En Isla Verde, una pareja con un pichón.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en juncales y espadañales. También entre gramillones, en las lagunas y esteros.

Características.

Semioculto. Elaborado. Tiene forma de olla, profundo, construido con hojas, fibras, tallos de gramillas, juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 30 a 40 cm.
Diámetro interno : de 16 a 18 cm.
Profundidad : de 10 a 15 cm.
Alto : de 20 a 26 cm.

HUEVOS

Pone hasta 8 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco, cáscaras granulosa.

Medidas y pesos :

De 63 a 67,9 x 45,5 a 49
X= 63,8 x 47,1 (N= 15)
Peso de las cáscaras : de 7,66 a 10,13
X= 8,85 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
100	19-12-72	Aguará Grande	64,5 x 47,0		10,136
			64,5 x 46,9		8,542
			64,5 x 46,4		9,580
			65,1 x 47,2		8,457
			65,8 x 45,5		9,290
			65,8 x 46,4		8.805
			67,3 x 49,0		8,998
			67,9 x 47,0		9,693
101	02-01-82	Morteros	64,5 x 46,9		8,639
			64,7 x 45,6		7,662
374	15-12-84	Perito Moreno	63,0 x 47,4		9,0
			64,4 x 47,8		9,0
			66,0 x 47,8		8,6

FAMILIA: CRACIDAE

PAVA DE MONTE COMÚN *Penelope obscura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-11-92	San R. de la N. Orán	1 huevo	Árbol	5,00
15-12-00	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Árbol	2,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. Oculto por enredaderas.

Características.

Oculto o semioculto. Elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pastos y hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 50 a 60 cm.

Alto : 10 a 12 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Elípticos. De color blanco. Cáscaras casi lisa.

Medida y peso :

82,3 x 53,8 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 9,7 (N= 1)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
835	22-11-92	San R. de la N. Orán	82,3 x 53,8	9,7

CHARATA *Ortalis canicollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-12-79	Colmena (*)	2 huevos	Árbol	3,50
08-12-79	Colmena	2 huevos	Árbol	3,50
05-12-80	La Criolla	2 huevos	Árbol	3,50
24-11-83	Aguará Grande (*)	4 huevos	Árbol	2,80
09-11-89	Los Amores	3 huevos	Tala	3,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. A veces cubierto por enredaderas.

Características.

Semioculto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos de yuyos, hojas, pajas.

Medidas :

Diámetro total : de 18 a 30 cm.

Profundidad : 3 cm.

Alto : 10 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Elípticos. De color blanco. Cáscaras rugosa.

Medidas y pesos :

De 59,4 a 66 x 40,4 a 44,2 X= 63,5 x 42,1 (N= 13)

Peso lleno : de 56,6 a 66X= 62,4 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 6,78 a 11 X= 9,6 (N= 13)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	08-12-79	Colmena	60,0 x 41,0		9,107
			62,3 x 40,4		6,787
129	08-12-79	Colmena	59,4 x 41,5		9,257
			59,6 x 41,0		8,471
130	05-12-80	La Criolla	64,3 x 43,7		9,085
			65,3 x 43,4		10,168
628	24-11-83	Aguará Grande	60,0 x 44,2	60,42	8,123
			61,0 x 42,8	56,60	8,100
			62,9 x 44,0	61,53	9,090
			63,7 x 43,6	61,10	9,043
725	09-11-89	Los Amores	64,9 x 42,2	65,70	11,0
			65,1 x 41,8	65,70	10,3
			66,0 x 41,9	66,00	11,0

OBSERVACIONES

(*). Nidos cubiertos por enredaderas, bastante ocultos. En uno el ave permanecía en el nido mientras se la observaba a pocos centímetros de distancia.

04-03-10. Jesús María. Un adulto con dos pichones comiendo en la orilla de un camino.

MUITÚ *Crax fasciolata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-11-72	Pirané	2 huevos	Árbol, oculto por enredadera	4,00
02-12-73	Pirané	1 huevo	Árbol, oculto por enredadera	3,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. Cubiertos por enredaderas.

Características.

Oculto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos de yuyos. Internamente hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 40 a 60 cm.

Profundidad : 10 a 20 cm.

Alto : 20 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco. Cáscaras rugosa.

Medidas y pesos :

De 78,1 a 81 x 55,5 a 58,4 - X= 76,1 x 56,7 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 15,9 a 20,67 X= 19 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
131	22-11-72	Pirané	78,7 x 56,4	20,366
			81,0 x 58,4	15,972
132	02-12-73	Pirané	78,6 x 55,5	20,673

FAMILIA: ODONTOPHORIDAE

CODORNIZ DE CALIFORNIA *Callipepla californica*


El 29-01-76 en Confluencia una pareja andaba con 15 pichones.

FAMILIA: PODICIPEDIDAE

MACÁ COMÚN. *Rollandia rolland*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



Total de nidos : 89

Fecha	Lugar	Contenido
11-11-72	Aguará Grande	3 huevos
19-12-72 (*)	Aguará Grande	3 huevos
24-03-77	Cayastacito	4 huevos
11-11-86	Teodelina	2 huevos
05-02-92	Isla Verde	2 huevos
05-02-92	Isla Verde	3 huevos
05-02-92	Isla Verde	3 huevos
05-02-92	Isla Verde	4 huevos
21-10-98 (*)	Isla Verde	2 huevos
01-12-00 (*)	Garré	1 huevo

21-10-01. Villa Roda, un adulto con un pichón chico.

(*) 19-12-72. Aguará Grande, (aparte del citado en la tabla) había 10 nidos con 3 huevos cada uno.
(*) 21-10-98. Isla Verde, (aparte del citado en la tabla) colonia con 60 nidos, en una superficie de 100 x 100 m. Contenido : 8 con 1 huevo, 10 con 2 huevos, 39 con 3 huevos y 3 con 4 huevos.
(*) 01-12-00. Garré, 7 nidos en construcción.
01-12-00. Catriló, un nido en construcción.
21-10-01. Villa Roda. Adulto con un pichón chico.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el agua. En lagunas, juncales, esteros, zanjones.

Características.

Semioculto. Plataforma flotante de materiales vegetales. (trozos de juncos, repollitos del agua, gramillón)

Cuando deja el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con materiales vegetales.

Medidas :

Diámetro de la plataforma : de 19 a 45 cm.

Diámetro de la parte central : de 9 a 15 cm. y 2-3 cm. de profundidad.

Espesor total : 8 a 15 cm.

HUEVOS

Postura de 3 a 4 huevos, a veces más.

Elípticos. Blanco o crema ocráceo. A veces con tono celeste.

Medidas y pesos :

De 38,5 a 43 x 26,5 a 30,9 X= 40,3 x 28,5 (N= 16)

Peso lleno : 14 a 14,5 - X= 14,2 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 1,6 a 2 - X= 1,8 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
17	11-11-72	Aguará Grande	38,8 x 27,3		1,640
			40,7 x 27,6		1,571
			41,5 x 27,5		1,664
18	19-12-72	Aguará Grande	41,0 x 29,0		1,974
			41,7 x 28,0		1,820
			41,7 x 28,6		1,912
19	24-03-77	Cayastacito	40,8 x 30,8		1,957
			41,5 x 30,5		1,935
			41,8 x 30,9		1,993
			43,0 x 30,4		2,073
20	24-03-77	Cayastacito	39,8 x 28,6		1,958
			40,9 x 29,0		1,964
			41,2 x 29,0		1,842
			41,3 x 29,1		1,937
654	11-11-86	Teodelina	38,5 x 26,8	14,0	1,6
			40,8 x 26,5	14,5	1,7

PICHONES

Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer. Son llevados en el lomo por los adultos.
Un pichón demoró 6 minutos en salir del huevo.

Descripción :
El pico tiene dos franjas oscuras y dos blanquecinas, con punta clara. La cabeza, posterior y lados del cuello, rayado de canela y pardo oscuro. Dorsalmente pardo oscuro. Ventralmente blanquecino con tono canela.

OBSERVACIONES.

Fuera de la época reproductiva se pueden formar grupos de cientos de ejemplares.

MACÁ DE PICO GRUESO. *Podilymbus podiceps*


PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N		N									N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido
19-12-72	Aguará Grande	7 huevos
24-03-77	Cayastacito	4 huevos
05-01-79	Candioti	1 huevo y 1 pichón
24-01-79	Esperanza	5 huevos
06-01-92	Isla Verde	2 huevos
06-01-92	Isla Verde	5 huevos

13-12-75. Esperanza, pareja con 5 pichones.



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el agua. En lagunas, juncales, esteros, bañados, zanjones.

Características.

Semioculto. Plataforma flotante de materiales vegetales. (trozos de juncos, repollitos del agua, gramillón).

Cuando deja el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con materiales vegetales.

Medidas :

Diámetro de la plataforma : de 35 a 40 cm.

Diámetro de la parte central : de 12 a 15 cm. y 4 cm. de profundidad.

Espesor total : 20 a 25 cm.

HUEVOS

Postura de 6 a 8 huevos.

Elípticos. Blanco o crema ocráceo. A veces con tono celeste.

Medidas y pesos :

De 42,2 a 46,3 x 30,2 a 32,3 - X= 44,8 x 31,2 (N= 14)

Peso de las cáscaras : de 1,8 a 2,7 X= 2,1 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
21	19-12-72	Aguará	44,0 x 31,0	1,820
			42,2 x 30,7	1,954
			42,4 x 30,2	2,057
			45,2 x 31,3	2,258
			45,4 x 31,0	2,065
			45,7 x 31,3	2,130
			45,8 x 31,8	2,195
822	06-01-92	Isla Verde	45,5 x 31,7	2,1
			46,2 x 31,0	2,4
823	06-01-92	Isla Verde	42,5 x 31,4	2,5
			45,4 x 31,9	2,3
			46,3 x 31,0	2,4
			46,3 x 31,7	2,6
			46,5 x 32,3	2,7

PICHONES

Descripción :

Cabeza pardo oscuro. Dos franjas blanquecinas a cada lado por arriba de los ojos.Canela en la nuca. Dorsalmente negro con rayas blanquecinas. Ventralmente blanquecino. Garganta y anterior del cuello con estrías.

OBSERVACIONES


Los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer.

MACÁ GRANDE. *Podiceps major*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N						

Total de nidos : 2



Fecha	Lugar	Contenido
03-06-96	Monte Vera	1 huevo
03-06-96	Monte Vera	2 huevos

01-03-92. Wildermuth, una pareja con 2 pichones.
15-06-98. Villa Roda, un adulto llevaba un pichón sobre el lomo.
15-07-98. Villa Roda, dos adultos con 2 pichones cada uno y otro con 1 pichón.
25-05-01. Villa Carlos Paz, en el Lago San Roque, una pareja con un pichón y otra con 2 (uno iba en ellomo) y un ejemplar solitario con un pichón y otro con 2 (uno iba en el lomo).
20-07-03. Ruta 70 y río Salado. Un adulto llevaba un pichón en el lomo mientras nadaba.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el agua. En lagunas, juncales, esteros, zanjones.
Características.
Semioculto. Plataforma flotante de materiales vegetales. (trozos de juncos, repollitos del agua, gramillón)


Cuando deja el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con materiales vegetales.
Medidas :
Diámetro de la plataforma : de 45 a 50 cm.
Diámetro de la parte central : de 18 a 20 cm. y 2-4 cm. de profundidad.

HUEVOS

Postura de 3 a 4 huevos.
Elípticos. Blanco ocráceo.

MACÁ PLATEADO. *Podiceps occipitalis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 11

Fecha	Lugar	Contenido	Fecha	Lugar	Contenido
10-01-92	Isla Verde	1 huevo	21-10-98	Isla Verde	2 huevos
10-01-92	Isla Verde	3 huevo	21-10-98	Isla Verde	2 huevos
10-01-92	Isla Verde	4 huevo	21-10-98	Isla Verde	2 huevos
21-10-98	Isla Verde	1 huevo	21-10-98	Isla Verde	2 huevos
21-10-98	Isla Verde	1 huevo	21-10-98	Isla Verde	3 huevos
21-10-98	Isla Verde	1 huevo			

04-12-91. Arias, varias parejas con pichones.
25-01-10. Isla Verde. Unos 60 nidos con 3 ó 4 huevos cada uno.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En el agua. En lagunas, juncales.
Características.

Semioculto. Plataforma flotante de materiales vegetales. (trozos de juncos, repollitos del agua) Cuando deja el nido por propia iniciativa, cubre los huevos con materiales vegetales.

Medidas :

Diámetro de la plataforma : de 35 a 40 cm.

Diámetro de la parte central : de 13 a 20 cm. y 2 cm. de profundidad.

Espesor total : 10 a 15 cm.

HUEVOS

Postura de 3 a 5 huevos.

Elípticos. Color crema o blanco amarillento.

Medidas y pesos :

De 41,7 a 45,4 x 28,2 a 28,8

X= 43,6 x 28,3 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 1,6 a 1,9

X= 1,67 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
820	10-01-92	Isla Verde	41,7 x 28,2	1,9
821	10-01-92	Isla Verde	44,3 x 28,8	1,6
			45,4 x 28,2	1,6
			43,0 x 28,3	1,6

FAMILIA: SPHENISCIDAE

PINGÜINO PATAGÓNICO. *Spheniscus magellanicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de colonias : 6

Fecha	Lugar	Contenido
26-11-73	Punta Tombo	Huevos y pichones
29-01-74	Cabo Vírgenes	Pichones
01-02-74	Cabo Dos Bahías	Pichones
05-11-79	Punta Tombo	Huevos
07-11-79	Puerto Deseado	Huevos
28-11-00	Península Valdés (*)	Huevos

(*). Pequeña colonia al norte de Punta Delgada

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

Formas y medidas muy variables.

NIDO

Nidifica en colonias.

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Expuesto, poco elaborado o elaborado. Madrigueras o depresiones, en la base de arbustos, en partes libres o al reparo de rocas.

MedidaS :

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. Blancos.

Medidas y pesos :

De 71,2 a 79,4 x 53,9 a 57,6

X= 74,6 x 55,7 (N= 8)

Peso de las cáscaras : de 13,8 a 16,4

X= 14,7 (N= 8)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
1	26-11-73	Punta Tombo	77,6 x 57,6	16,134
			79,4 x 55,8	16,850
2	05-11-79	Punta Tombo	74,6 x 56,1	13,865
			75,0 x 53,9	14,549
3	05-11-79	Punta Tombo	71,2 x 55,0	13,974
			72,8 x 56,4	14,448
4	05-11-79	Punta Tombo	73,7 x 56,0	14,551
			74,6 x 55,2	14,546

PICHONES

Descripción: Nacen con los ojos cerrados. Dorsalmente pardo oscuro. Ventralmente grisáceo blanquecino.

FAMILIA: CICONIIDAE

CIGÜEÑA AMERICANA *Ciconia maguari*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N	N	N

Total de nidos : 35

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
10-12-72	San Vicente	2 pichones	Juncal
22-11-74	Aguará	2 pichones	Juncal
19-11-75	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
19-11-75	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
06-09-77	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
06-09-77	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
10-08-78	Llambi Campbell	2 huevos	Juncal
10-08-78	Llambi Campbell	1 pichón	Juncal
10-08-78	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
24-12-79	Miguel Escalada	3 pichones	Juncal
24-12-79	Miguel Escalada	3 pichones	Juncal
24-12-79	Miguel Escalada	3 pichones	Juncal
15-10-83	Llambi Campbell	Pichones (1)	Juncal
27-10-83	Cayastacito	3 pichones	Juncal
13-10-86	Llambi Campbell	2 huevos	Juncal
05-09-87	Llambi Campbell	3 pichones	Juncal
08-11-89	Los Amores	En construcción	Juncal
08-11-89	Los Amores	En construcción	Juncal
02-10-90	Los Amores	2 pichones	Juncal
02-10-90	Los Amores	3 pichones	Juncal
15-07-93	Calchaquí	Huevos, pichones (2)	Juncal
05-08-93	Calchaquí	4 pichones	Juncal
28-10-98	Calchaquí	Pichones (3)	Juncal

(1). Cinco nidos con pichones.
(2). Cinco nidos : 1 en construcción, 1 con 3 huevos y 3 con 3 pichones cada uno.
(3). Cinco nidos con 3 pichones cada uno.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						5	4	3	14	5	4

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente o en colonias dispersas. En juncales o espadañales.

Ubicación.

Asentados sobre el suelo.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos. En la depresión central, puede colocar repollitos y fibras finas de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 1,20 m. a 1,80 m.
Depresión central : 35 a 45 cm.
Profundidad : 8 a 10 cm.
Alto : 40 cm.

HUEVOS

Pone 3, raro 4 huevos.
Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 73 a 78 x 51 a 54,1
X= 75,7 x 53 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 9,9 a 12,4 X= 11,1 (N= 5)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
64	10-08-78	Llambi Campbell	73,0 x 53,7	10,399
			74,8 x 51,0	9,994

PICHONES

Descripción.
Región gular implume, de color naranja-amarillento. Plumón blanco. A partir de los cuatro días aparecen plumas negras en la cabeza y cuello. Dorsalmente gris oscuro salpicado de blanco.

Alimentación.
Los adultos los alimentan con Dientudo (*Hoplias malabaricus*), Anguila (*Synbranchus marmoratus*).

OBSERVACIONES

15-07-93. En Calchaquí los cinco nidos estaban separados por 15-20 m. cada uno.

YABIRÚ *Jabiru mycteria*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N		



Total de nidos: 11

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
19-11-76	Los Amores	No observado	Árbol seco	10,00
08-11-89	Los Amores	No observado	Árbol seco	11,00
08-11-89	Los Amores	No observado	Algarrobo	9,00
08-11-89	Los Amores	Sin postura	Algarrobo	6,00
02-10-90	Los Amores	3 pichones	Algarrobo	6,00
02-10-90	Los Amores	No observado	Palmera blanca	8,00
09-09-98	Huanqueros	3 pichones (1)	Eucaliptus	20,00
07-10-99	Huanqueros	3 pichones	Eucaliptus	20,00
07-10-99	Aguará Grande	3 pichones (2)	Eucaliptus	15,00
01-08-00	Huanqueros	No observado	Eucaliptus	20,00
28-08-00	Aguará Grande	No observado	Eucaliptus	15,00

(1). Este nido fue ocupado durante tres años.
(2). Construido sobre uno de *Myiopsitta monachus* en actividad. En el año 2000, fue ocupado nuevamente.

FAMILIA: PHALACROCORACIDAE

BIGUÁ.*Phalacrocorax brasilianus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N			N	N	N	N

Total de colonias : 13



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a
25-11-73	Isla de los Pájaros	2 a 3 huevos y pichones	Arbusto	
19-04-77	Monte Vera	4 a 5 huevos y pichones	Aliso del río	*Anhinga anhinga*
04-11-79	Isla de los Pájaros	1 a 4 huevos	Arbusto	
07-11-79	Puerto Deseado	3 huevos	Arbusto	
18-03-81	Arrufó	3 huevos	Chañar	*Bubulcus ibis*
05-05-83	Los Cerrillos	Huevos y pichones	Chañar y algarrobo	
13-06-89	Cayastá	Huevos y pichones	Timbó colorado	
14-06-95	Río San Vicente	3 a 4 huevos	Timbó colorado	
02-09-95	Alejandra	Huevos	Timbó colorado	
17-02-98	Campo Garay	Huevos	Chañar	*B. ibis, E. alba, E. thula, N. nycticorax y B. striatus*
28-11-00	Punta Loma	3 huevos	Acantilado	*Ph. magellanicus*
30-06-07	Helvecia	1 a 5 huevos		
14-12-09	Alejandra	Huevos		*E. thula, A.anhinga, E. alba, A. cocoi y B. ibis*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies de aves.

Forma las colonias en campos o en islas inundadas y en islotes marinos.

Ubicación.

En arbusto, árboles o acantilados.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajas, algas, plumas.

Medidas :

Diámetro total : 40 a 45 cm.

Diámetro interno : de 35 a 40 cm.

Profundidad : 3 a 4,5 cm.

Alto : 18 a 20 cm.

Altura desde el suelo :

En árboles y en arbustos.

Nido más bajo : 0,30 m.

Nido más alto : 12 m.

HUEVOS

Postura de 3 a 5 huevos.

Fusiformes, ovoidales alargados o elípticos. De color celeste pálido recubierto de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 51,7 a 62,8 x 34,8 a 40,7 Peso de las cáscaras : de 2,8 a 4,5 X = 3,9
X= 57,2 x 37 (N= 22) (N= 22)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
22	25-11-73	Isla de los Pájaros	51,7 x 36,8	2,809
			56,5 x 36,5	3,749
			58,0 x 35,5	3,968
24	04-11-79	Isla de los Pájaros	55,3 x 35,2	4,073
			55,2 x 37,0	3,893
			55,3 x 35,0	3,651
			55,5 x 37,0	3,516
25	04-11-79	Isla de los Pájaros	59,0 x 40,7	4,457
			59,8 x 40,7	4,381
			62,8 x 37,9	3,116
26	04-11-79	Isla de los Pájaros	54,6 x 38,0	4,513
			54,9 x 35,7	3,570
			56,0 x 40,2	3,966
			58,6 x 37,6	3,761
	04-11-79	Isla de los Pájaros	54,4 x 34,8	3,978
			55,5 x 37,0	3,212
			58,0 x 38,2	4,519
			58,8 x 37,6	4,496

PICHONES

Descripción :
Piel oscura. Pico blanquecino en la base, resto oscuro.
Tienen el cuerpo cubierto de plumón negro.

OBSERVACIONES

En la colonia de Monte Vera había unos 4.000 nidos, casi todos con 4 ó 5 huevos.

En la de Cayastá unos 1.000, con 3 a 110 nidos por árbol. En general con 40-50 nidos por planta.
En la de Helvecia, varios núcleos con 150, 200, 400 y 500 nidos cada uno. Había de 30 a 100 nidos por árbol.
Las colonias en el área litoral se forman en campos o en islas inundadas. Si el nivel de agua desciende, en general son abandonadas.
En una colonia se pueden ver nidos con huevos, con pichones y en construcción, por el agregado de nuevas parejas.
A veces son colonias puras o asociadas a otras especies coloniales.


CORMORÁN GRIS. *Phalacrocorax gaimardi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de colonias : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
07-11-79	Puerto Deseado	2 y 3 huevos	Acantilado



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otros Cormoranes.

Ubicación.

En acantilados.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de cráter. Emplea algas, barro y externamente materias fecales.

Medidas :

Diámetro : 20 a 25 cm.

Profundidad : 3 a 5 cm.

Alto : 9 a 13 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Fusiformes, ovoidales alargados. De color celeste pálido recubiertos de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 59,4 a 62,5 x 36,9 a 38,64

X= 60,7 x 37,4 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 4,4 a 5,2 X= 4,7 (N= 6)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
38	07-11-79	Puerto Deseado	60,4 x 37,8	4,940
			61,0 x 36,9	4,999
			62,5 x 37,0	4,519
39	07-11-79	Puerto Deseado	59,4 x 37,4	4,462
			60,2 x 37,1	5,239
			61,2 x 38,6	4,725

CORMORÁN DE CUELLO NEGRO. *Phalacrocorax magellanicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de colonias: 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
04-11-79	Isla de los Pájaros	3 huevos	Arbustos y el suelo
05-11-79	Punta Tombo	En construcción	Suelo
07-11-79	Puerto Deseado	3 huevos	Acantilado
28-11-00	Punta Loma	3 huevos	Acantilado

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otros Cormoranes.

Ubicación.

En el suelo, en acantilados o en islotes, a veces sobre arbustos a baja altura .

Características.

Expuesto. Tiene forma de cráter. Emplea algas, barro y pastos.

Medidas :

Diámetro : 20 a 25 cm.
Profundidad : 5 cm.
Alto : 13 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales, alargados. De color celeste pálido recubiertos de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 53,8 a 59,4 x 34,1 a 36,4
X= 56,8 x 35,2 (N= 9)
Peso de las cáscaras : de 3,3 a 3,8 X= 3,4 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
28	04-11-79	Isla de los Pájaros	55,4 x 36,3	3,789
			57,0 x 35,6	3,579
			58,7 x 34,1	3,478
29	04-11-79	Isla de los Pájaros	56,9 x 35,8	3,761
			57,6 x 36,4	3,519
			59,4 x 35,0	3,356
30	04-11-79	Isla de los Pájaros	53,8 x 34,4	3,322
			55,0 x 34,4	3,850
			58,2 x 34,7	3,392

GUANAY. *Phalacrocorax bougainvillii*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de colonias : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
05-11-79	Punta Tombo	3 huevos	Suelo

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otros Cormoranes.

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de cráter. Emplea algas, barro, excrementos.

Medidas :

Diámetro : 23 a 24 cm.
Profundidad : 3 a 4 cm.
Alto : 9 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales, alargados. De color celeste pálido recubiertos de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 56,9 a 66,3 x 37 a 42 X= 61,7 x 39,6 (N= 9)
Peso de las cáscaras : de 5,6 a 6,8 X= 6,1 (N= 9)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
31	05-11-79	Punta Tombo	57,8 x 40,3	5,670
			62,2 x 37,5	6,137
			64,0 x 37,0	6,330
32	05-11-79	Punta Tombo	56,9 x 39,3	6,883
			59,7 x 42,0	6,181
			61,8 x 39,5	6,535
33	05-11-79	Punta Tombo	62,6 x 39,7	6,106
			64,7 x 40,5	5,795
			66,3 x 40,9	6,019

CORMORÁN IMPERIAL. *Phalacrocorax atriceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de colonias : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-11-73	Punta Tombo	3 huevos	Suelo
05-11-79	Punta Tombo	3 huevos	Suelo
07-11-79	Puerto Deseado	3 huevos	Acantilado

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otros Cormoranes.

Ubicación.

En el suelo, en islotes, costas marinas o en acantilados.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de cráter. Emplea algas, barro y materias fecales externamente.

Medidas :

Diámetro : 20 a 25 cm.
Profundidad : 3 a 5 cm.
Alto : 9 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales, alargados. De color celeste pálido recubiertos de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 54,4 a 65,5 x 35 a 43,3 X= 57,2 x 40,2 (N= 12)

Peso de las cáscaras : de 3,8 a 7,1 X= 5,5 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
36	26-11-73	Punta Tombo	58,2 x 35,0	5,252
			60,3 x 40,3	3,808
			60,3 x 37,7	4,080

35	05-11-79	Punta Tombo	54,4 x 39,6	5,816
			59,3 x 43,0	7,169
			59,4 x 43,3	5,990
37	05-11-79	Punta Tombo	60,6 x 40,4	4,669
			63,2 x 42,0	6,943
			65,7 x 41,4	4,759
34	05-11-79	Punta Tombo	60,5 x 41,0	4,871
			64,0 x 39,8	6,477
			65,5 x 40,8	5,891

FAMLIA: ANHINGIDAE

ANINGA. *Anhinga anhinga*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N		N							N	N

Total de colonias: 5



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
19-04-77	Monte Vera	Huevos y pichones	Aliso de río	*Ph. brasilianus*
28-02-80	Monte Vera	Huevos y pichones	Aliso de río	*A. alba, E. thula y B. ibis*
15-12-83	Isla El Rico	Pichones	Aliso de río	*A. alba, E. thula* y *A. cocoi*
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. alba, E. thula, B. ibis, N. nycticorax, A. cocoi, P. ajaja* y *Ph. infuscatus*
14-12-09	Alejandra	Huevos	Timbó colorado y Aliso de río	*E. thula, Ph. brasilianus, E. alba, A. cocoi y B. ibis*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, generalmente asociado con otras especies de aves.

Ubicación.

Expuesto. Elaborado. Sostenido en ramas u otras plantas acuáticas. En islas inundadas, esteros, juncales.

Características.

Plataforma de palitos. Internamente hojas.

Medidas :

Diámetro total : 45 a 50 cm.

Diámetro interno : de 20 a 35 cm.

Altura : 18 a 20 cm.

Profundidad : 5 cm.

Altura desde el suelo :

Desde 1 a 5 metros.

HUEVOS

Postura de 3 ó 4 huevos.

Ovoidales, alargados. De color celeste, recubiertos de material calcáreo blanquecino..

Medidas y pesos :

De 49,5 a 52,3 x 33,4 a 35,3 -X= 51,1 x 34,5 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 2,6 a 3,4 X= 3 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	19-04-77	Monte Vera	51,1 x 34,7	2,623
			52,3 x 33,4	2,722
41	28-02-80	Monte Vera	49,5 x 34,5	3,486
			50,7 x 34,5	3,230
			52,0 x 35,3	3,042

PICHONES	OBSERVACIONES
Descripción: Nacen con los ojos cerrados. Implumes. Pico negro. Patas rosadas. Luego de unos días adquieren plumón blanquecino o blanquecino amarillento, suave, denso. Alas y cola oscuros.	19-04-77. Monte Vera. Colonia con 9 nidos. 28-02-80. Monte Vera. Colonia con unos 50 nidos. 15-12-83. Isla El Rico. Colonia con unos 50 nidos. 11-12-02. Bonpland. Colonia con 10 nidos.


FAMILIA: ARDEIDAE

HOCÓ COLORADO. *Tigrisoma lineatum*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-11-92	Isla los Marinos	Huevos	Sauce	7,00
28-10-98	Calchaquí	Pichones	Juncal	
09-01-02	Calchaquí	Huevos	Juncal	

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente. En islas o en juncales.

Ubicación.

En ramas de árboles o en juncales.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, con y sin espinas, ramitas o juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 40 a 100 cm.

Profundidad : 3 a 4 cm.

Alto : 10 a 30 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos. De color blanco tiza o celeste pálido, sin manchas o con tenues y escasas manchitas grises y/o rayitas castañas, más concentradas en el polo mayor.

Elípticos.

Medidas y pesos :

De 62,3 a 63,2 x 46 a 46,5 X= 62,6 x 46,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 5,5 X= 5,5 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
838	25-11-92	Isla los Marinos	62,3 x 46,5	5,5
			62,5 x 46,2	5,5
	09-01-02	Calchaquí	62,6 x 46,4	
			63,2 x 46,0	

PICHONES


Descripción: Pico gris-verdoso. Patas grises. Plumón blanquecino-grisáceo.

MIRASOL COMÚN. *Ixobrychus involucris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 11



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
19-12-72	Aguará Grande	Huevos	Juncal	24-12-79	Miguel Escalada	Huevos	Juncal
16-01-73	Aguará Grande	Huevos	Juncal	24-12-79	Miguel Escalada	Huevos	Juncal
16-01-73	Aguará Grande	Pichones	Juncal	24-12-79	Miguel Escalada	Pichones	Juncal
22-11-75	Aguará Grande	Huevos	Juncal	24-12-79	Miguel Escalada	Pichones	Juncal
04-01-78	Cayastacito	Pichones	Juncal	03-01-87	Esperanza	Huevos	Juncal
24-01-79	Miguel Escalada	Huevos	Juncal				

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5										1	5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente. En juncales.

Ubicación.

Entre los juncos. Cerca del agua (de 10 a 30 cm).

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos, a veces con forma de cono invertido. Gruesos externamente. Finos en la parte interna y a veces casi perpendicular al suelo..

Medidas :

Diámetro total : de 30 a 40 cm.

Diámetro interno : de 11 a 17 cm.

Profundidad : 2,5 a 5 cm.

Alto : 12 a 16 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos. De color verde.

Medidas y pesos :

De 29,3 a 32,8 x 23,9 a 25,7

X= 30,9 x 24,8 (N= 12)

Peso de las cáscaras : de 0,49 a 0,73

X= 0,60 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
61	19-12-72	Aguará Grande	31,7 x 25,0	0,641
			31,9 x 24,6	0,611
			32,8 x 24,6	0,654
	22-11-75	Aguará Grande	30,0 x 24,0	
			31,0 x 24,0	
			31,0 x 24,0	
62	24-01-79	Miguel Escalada	30,8 x 24,7	0,621
			31,3 x 25,2	0,630
			32,8 x 25,7	0,736
63	24-12-79	Miguel Escalada	29,3 x 23,9	0,492
			30,0 x 25,4	0,559
			31,3 x 24,9	0,530

PICHONES

Descripción: Plumón amarillento.

GARZA BRUJA. *Nycticorax nycticorax*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N			N		N	N	N	N



Total de colonias localizadas : 25

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
26-11-73	Isla de los Pájaros	Huevos	Arbustos	
22-11-74	Aguará Grande	Huevos	Juncal	
18-11-75	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	
19-04-77	Monte Vera	Pichones	Alisal	*P. brasilianus, E. alba*
06-09-77	Llambi Campbell	Huevos	Juncal	*A. cocoi*
05-01-79	Candioti	Huevos y pichones	Cina-cina	
09-01-79	Miguel Escalada	Huevos	Juncal	*Ph. infuscatus*
18-01-81	Arrufó	Huevos	Chañares	*P. brasilianus, A. cocoi, A. alba,B. ibis* y *B. striata*
08-10-83	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi*
27-10-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi, A. alba* y *E. thula*
05-12-83	Cayastacito	Huevos	Juncal	
13-10-86	Llambi Campbell	Huevos	Juncal	
20-10-86	Saladero Cabal	Huevos y pichones	Espadañal	*Ph. infuscatus*
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	Huevos	Juncal	
23-02-91	Wildermuth	Huevos y pichones	Juncal	
04-12-91	Isla Verde	Huevos	Juncal	
01-03-92	Wildermuth	Pichones	Juncal	
02-12-92	Wildermuth	Huevos y pichones	Juncal	
17-07-97	Paraná	Pichones	Guayabos, Paraísos, Ligustros	
17-02-98	Campo Garay	Huevos y pichones	Chañares	*P. brasilianus, A. alba,E. thula, B. ibis* y *B. striata*
28-10-98	Calchaquí	Huevos	Juncal	
09-01-02	Calchaquí	Huevos y pichones	Juncal	
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. cocoi, A. alba, E. thula, B. ibis, Ph. infuscatus, A.anhinga* y *P. ajaja*
08-02-03	Abra Pampa	Huevos	Juncal	*P. ridgwayi*
18-09-07	Paraná	Pichones	Guayabos, Paraísos, Ligustros	

22-11-74. Aguará Grande, nido solitario con 3 huevos.
19-04-79. Monte Vera, colonia con unos 150 nidos.
08-12-90. Cacique Ariacaiquín, dos nidos solitarios, con 2 y 3 huevos respectivamente.
17-07-97. Paraná, colonia con unos 250 nidos.
28-10-98. Calchaquí, nido solitario con 3 huevos.

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	3	1	1			1		2	5	3	5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias. A veces nidos solitarios. En juncales, islotes, arboledas, campos o islas inundadas.

Ubicación.

Sostenido en juncos, espadañas, en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos, espadañas o palitos.

Medidas :

Diámetro total : de 30 a 40 cm.
Profundidad : 3 a 4 cm.
Alto : 8 a 20 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. De color celeste verdoso.

Medidas y pesos :

De 49,2 a 56,2 x 35,5 a 38,85 X= 51,9 x 37 (N= 12)

Peso de las cáscaras : de 2,21 a 2,83 X= 2,49 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
57	26-11-73	Isla de los Pájaros	49,2 x 38,3	2,425
			51,5 x 38,8	2,831
58	22-11-74	Aguará Grande	51,2 x 35,5	2,547
			55,2 x 35,9	2,268
			56,2 x 36,2	2,574
59	18-11-75	Llambi Campbell	50,4 x 37,5	2,710
			50,9 x 37,0	2,455
			51,7 x 36,6	2,375
60	06-09-77	Llambi Campbell	49,4 x 36,4	2,792
			51,6 x 36,5	2,661
			52,5 x 37,4	2,676
			53,4 x 37,5	2,218

PICHONES

Descripción: Ojos amarillos. Pico y patas color natural. Cavidad bucal rosada, el paladar más fuerte. Cuerpo cubierto de plumón gris oscuro. En la cabeza, plumón alargado, blanco. Ventralmente blanquecino.

12 días. Dorsalmente gris, más oscuro en la cabeza. Ventralmente crema. Láminas de las plumas del dorso ocráceas. Cañones de las plumas alares grises.

Alimentación. Los padres traen al nido para alimentarlos, Dientudo (*Hoplias malabaricus*), Anguila (*Synbranchus marmoratus*) y Mojarras.

OBSERVACIONES.

En la colonia de Isla Verde (04-12-91) había un nido con 4 huevos propios y 2 de *Heteronetta atricapilla*.

GARCITA AZULADA. *Butorides striata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 36



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-02-71	Esperanza	3 huevos	Cina-cina
20-11-71	Río Leyes	No observado	Curupí
19-12-72	Aguará Grande	3 huevos	Espadañal
19-12-72	Aguará Grande	3 pichones	Juncal
20-12-72	Esperanza	4 huevos	Cina-cina
16-01-73	Aguará Grande	2 huevos	Juncal
21-11-73	Esperanza	4 huevos	Duraznillo blanco
16-12-73	Aguará Grande	1 huevo	Espadañal
16-12-73	Aguará Grande	3 pichones	Espadañal
05-01-74	Esperanza	3 huevos	Juncal
05-01-79	Candioti	4 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	2 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	2 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	3 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	3 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	2 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	1 huevos	Cina-cina
05-01-79	Candioti	1 huevos	Cina-cina
24-12-79	Miguel Escalada	3 huevos	Juncal
28-10-86	Manucho	1 huevo	Curupí
01-12-90	Esperanza	3 huevos	Cina-cina
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	2 huevos	Juncal
24-12-93	Esperanza	2 pichones	Espadañal
24-12-93	Esperanza	3 pichones	Espadañal
01-01-94	Esperanza	3 huevos	Espadañal
02-01-94	Esperanza	2 huevos	Espadañal
04-01-94	Esperanza	3 huevos	Cina-cina
07-01-94	Río Salado y ruta 4	3 huevos	Juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	3 huevos	Juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	3 huevos	Juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	2 pichones	Juncal
17-02-98	Campo Garay	2 huevos	Chilca negra
17-02-98	Campo Garay	2 huevos	Chilca negra
07-11-00	Esperanza	3 huevos	Juncal
07-12-01	Esperanza	3 huevos	Cina-cina
28-11-04	Esperanza	4 pichones	Juncal

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
17	3								1	4	11

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 8 días	Pone un huevo cada dos días	20-21 días	15-16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente o a veces en grupos o colonias dispersas.

En juncales, en arboledas o islas inundadas, orillas de esteros, de ríos, de lagunas o bañados.

Ubicación.

Sostenido en juncos, espadañas, en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, de juncos y/o espadañas.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 38 cm.

Profundidad : 1 a 7 cm.

Alto : 2 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 3 a 5 huevos. A veces más.

Elípticos. De color celeste.

Medidas y pesos :

De 36,8 a 40 x 28,6 a 30,2 X= 38,1 x 29,6 (N= 14)

Peso de las cáscaras : de 0,85 a 1,04 X= 0,96 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
43	26-02-71	Esperanza	38,0 x 30,2	0,980
			39,5 x 28,7	0,964
			40,0 x 29,5	0,932
44	20-12-72	Esperanza	37,0 x 29,3	0,965
			37,0 x 29,0	0,961
			37,0 x 28,6	1,014
			37,8 x 29,6	1,014
45	05-01-79	Candioti	36,8 x 30,2	0,885
			37,0 x 29,9	0,861
			38,5 x 28,7	0,915
			38,8 x 29,3	0,854
46	24-12-79	Miguel Escalada	38,1 x 29,9	1,049
			39,0 x 30,0	1,026
			39,1 x 30,2	1,024

PICHONES

Descripción :

Plumón ralo, gris pálido. Pardusco en la corona. Piel desnuda en garganta y cuello anterior, amarillo-verdosa.

OBSERVACIONES

12-12-98. Villa Ocampo, un huevo estaba depositado sobre un Irupé.

GARCITA BUEYERA. *Bubulcus ibis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	**N**	N	N						**N**	N	**N**



Total de colonias localizadas : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
11-12-72	Azul	Pichones	Juncal	*A. alba* y *E. thula*
01-03-79	Esperanza	Huevos y pichones	Cina-cina	*A. alba* y *E. thula*
28-02-80	Monte Vera	Huevos y pichones	Alisal	*A. anhinga, A. alba* y *E. thula*
18-03-81	Arrufó	Huevos	Chañares	*P. brasilianus, A. alba,E. thula* y *N. nycticorax*
10-10-90	Bernardo de Irigoyen	Huevos y pichones	Eucaliptus, Casuarina, Acacia blanca, Acacia negra, Paraíso, Caña bambú.	
23-02-91	Wildermuth	Pichones	Juncal	*A. alba* y *B. ibis*

04-12-91	Arias	Huevos	Juncal	*P. chihi* y *C. maculipennis*
01-03-92	Wildermuth	Pichones	Juncal	
17-02-98	Campo Garay	Huevos	Chañares	*P. brasilianus, A. alba,E. thula, B. striata* y *N. nycticorax*
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. cocoi, A. alba, E. thula, N. nycticorax, Ph. infuscatus, A. anhinga y P. ajaja*
17-01-06	Franck	Pichones	Arboleda	
12-02-07	Franck	Pichones	Arboleda	*A. alba*
08-02-07	Wildermuth	Pichones	Juncal	*P. chihi*
18-12-08	Franck	Huevos-Pichones	Arboleda	
14-12-09	Alejandra	Huevos	Timbó colorado y Aliso de río	*E. thula, A.anhinga, E. alba, A. cocoi y Ph. brasilianus*
06-04-11	Logroño	Pichones	Chañares	

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	5	3	1						1		5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias. En juncales, o en campos o islas inundadas. También en arboledas alejadas del agua.

Generalmente asociada a otras especies de aves.

Ubicación.

En juncales, o en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos o de juncos, con y sin pajitas o tallos de yuyos, pastos y hojas en el interior.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 25 cm.
Profundidad : 2 a 5 cm.
Alto : 10 a 15 cm.

HUEVOS

Pone hasta 5 huevos.
Elípticos. De color celeste.

Medidas y pesos :

De 43,7 a 49,8 x 31,8 a 34,7
X= 47,6 x 32,8 (N= 12)
Peso de las cáscaras : de 1,39 a 2,50
X= 1,55 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
47	01-03-79	Esperanza	46,4 x 34,3	2,500
			46,7 x 32,2	1,644
48	01-03-79	Esperanza	44,1 x 34,0	1,724
49	28-02-80	Monte Vera	47,3 x 33,4	1,592
			49,8 x 34,2	1,856
50	18-03-81	Arrufó	43,7 x 34,7	1,731
			44,4 x 32,8	1,609
			47,4 x 32,0	1,399
			48,9 x 32,0	1,567
51	18-03-81	Arrufó	45,7 x 31,8	1,502
			45,9 x 33,2	1,633
			48,2 x 32,9	1,568

PICHONES

Descripción :


Pico córneo con punta amarillenta. Piel gris verdosa. Plumón blanco.

Alimentación.
Los adultos les llevan lauchas y langostas.

OBSERVACIONES

La colonia de Arrufó (18-03-81) tenía unos 3.000 nidos, con 1-2 hasta 25-30 por árbol.
La colonia de Bernardo de Irigoyen (10-10-90) tenía unos 2.500 nidos. Estaba en un campo seco y no había ambientes acuáticos en las proximidades.
Los árboles contenían de 6-7 nidos hasta 90. Por un fuerte viento, en una noche murieron unos 350 pichones. En Arias (04-12-91) había unos 1.200 nidos. En Wildermuth (01-03-92) 400 nidos y en Campo Garay(17-02-98) unos 3.500.


Esquema de la COLONIA "BERNARDO DE IRIGOYEN"



Colonia (17-01-06. Franck) en arboleda en una casa rural. Estaba compuesta por :
58 Pata de vaca (*Bauhinia forficata*) con 280 nidos
40 Acacia blanca (*Robinia pseudo-acacia*) con 300 nidos
35 Ligustros (*Ligustrum lucidum*) con 640 nidos
19 Ombúes (*Phytolacca dioica*) con 450 nidos
9 Eucaliptus (*Eucaliptus camaldulensis*) con 300 nidos
7 Paraisos (*Melia azedarach*) con 120 nidos
5 Tipa blanca (*Tijuana tipu*) con 60 nidos
3 Moras (*Morus alba*) con 160 nidos
2 Higueras (*Ficus carica*) con 10 nidos
1 Palmera Fénix (*Phoenix canariensis*) con 15 nidos
1 Araucaria (*Araucaria angustifolia*) con 30 nidos
1 Naranjo amargo (*Citrus aurantium*) con 30 nidos

1 Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*) con 10 nidos
Caña tacuara (*Guadua sp.*) con 60 nidos
Caña de Castilla (*Arundo donax*) con 70 nidos
Total de nidos aproximadamente : 2.535. El nido más bajo está a 1,60 m. y el más alto a 25 metros. Tenían de 1 a 3-4 pichones. Muy pocos con huevos. Construidos con palitos. Internamente algunos tienen pajas y tallos de Lino.


Esquema de la "COLONIA FRANCK"



GARZA MORA. *Ardea cocoi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N	N	N



Total de colonias: 23

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
12-12-58	Aguará	Huevos y pichones	Juncal	
10-12-72	San Vicente	Pichones	Juncal	
18-12-74	Llambi Campbell	Pichones	Juncal	
18-11-75	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	
30-11-75	Llambi Campbell	Pichones	Juncal	
16-10-76	Llambi Campbell	Huevos	Juncal	
06-09-77	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	
10-08-78	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	
11-11-78	Llambi Campbell	Pichones	Juncal	
26-11-80	Puerto Algarrobo	Pichones	Sauzal	
08-10-83	Llambi Campbell	Huevos y pichones		

13-10-83	La Brava	Huevos y pichones	Juncal	
27-10-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	*A. alba, E. thula* y *N. nycticorax*
05-12-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	
15-12-83	Isla El Rico	Pichones	Alisal	*A. alba, E. thula* y *A. anhinga*
13-10-86	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	
05-09-87	Llambi Campbell	Huevos	Juncal	
08-11-89	Los Amores	Pichones	Juncal	
17-11-90 (*)	Cacique Ariacaiquín	Huevos	Juncal	
08-12-90 (*)	Cacique Ariacaiquín	Huevos	Juncal	
25-09-99	Calchaquí	Pichones	Juncal	
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. anhinga, A. alba, E. thula, B. ibis, N. nycticorax, P. ajaja*y *P. infuscatus*
14-12-09	Alejandra	Huevos	Timbó colorado y Aliso de río	*E. thula, A.anhinga, E. alba, B. ibis y Ph. brasilianus*

(*). 17-11-90. Cacique Ariacaiquín, nido solitario, próximo a una colonia de *Phimosus infuscatus.*
(*). 08-12-90. Cacique Ariacaiquín, dos nidos solitarios, cerca de colonias de *Phimosus infuscatus* y *Rosthramus sociabilis.*

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							1	3	5	6	8

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces asociada a otras especies de aves. Raro nidos solitarios.
Generalmente en juncales. También en islas inundadas.
Ubicación.

En juncales o en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma grande, sólida de juncos solamente o con el agregado de palitos o ramitas, en los juncales. En islas emplea palitos.

Medidas :

Diámetro total : de 60 a 90 cm.
Profundidad : 9 a 15 cm.
Alto : de 25 a 60 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Elípticos u ovoidales. De color celeste.
Medidas y pesos :
De 60,3 a 69,3 x 44,8 a 47,3
X= 65,1 x 46,1 (N= 16)
Peso lleno : de 61,24 a 81,40
X= 71,1 (N= 10)
Peso de las cáscaras : de 5,18 a 7,25
X= 5,99 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
42	18-11-75	Llambi Campbell	63,7 x 47,0		5,416
			64,0 x 44,8		5,399
			64,3 x 45,5		5,184

615	13-10-83	La Brava	67,1 x 45,4	73,105	6,748
			66,8 x 45,1	72,111	5,783
616	13-10-83	La Brava	60,3 x 46,3	61,245	6,210
			65,4 x 46,2	67,516	6,610
			69,3 x 45,1	63,310	5,900
631	05-12-83	Cayastacito	65,8 x 47,3	80,7	6,940
			67,4 x 47,3	81,4	7,250
663	05-09-87	Llambi Campbell	63,8 x 45,3	72,6	6,03
			64,5 x 45,6	69,5	5,87
			66,5 x 46,8	70,6	5,65

PICHONES

Descripción :
Iris amarillo. Pico, maxilar superior gris verdoso. Mandíbula amarilla. Patas amarillo verdosas. Plumón, largo y fino, poco abundante, blanco grisáceo. Copete blanco.

Alimentación.
Los padres traen al nido para alimentarlos, Cascarados (*Callichthys sp., Hoplosternum sp*.), Dientudo (*Hoplias malabaricus*), Anguila (*Synbranchus marmoratus*).


OBSERVACIONES

De la colonia de Llambi Campbell se tienen antecedentes de nidificación desde el año 1930, en 1995 se desagotó el estero y desapareció el ambiente. Las colonias en este lugar tenían de 70 a 150 nidos, según los años.
En Puerto Algarrobo había de 3 a 8 nidos por árbol, muy altos sobre el agua (de 8 a 10 m). Unos 200 nidos.

GARZA BLANCA. *Ardea alba*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N	N						N	N	N



Total de colonias : 17

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
12-12-58	Aguará Grande	Huevos y pichones	Juncal	
11-12-72	Azul	Pichones	Juncal	
19-04-77	Monte Vera	Pichones	Alisal	*P. brasilianus*
01-03-79	Esperanza	Huevos y pichones	Cina-cina	*E. thula* y *B. ibis*
28-02-80	Monte Vera	Pichones	Alisal	*A. anhinga, E. thula* y *B. ibis*
18-03-81	Arrufó	Huevos	Chañares	*P. brasilianus, E. thula,B. ibis* y *N. nycticorax*
27-10-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi, E. thula* y *N. nycticorax*
05-12-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi* y *E. thula*
15-12-83	Isla El Rico	Huevos y pichones	Alisal	*A. anhinga, A. cocoi* y *E. thula*
18-11-86	Llambi Campbell	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi*
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	Huevos y pichones	Juncal	
23-02-91	Wildermuth	Pichones	Juncal	*E. thula* y *B. ibis*
01-03-92	Wildermuth	Pichones	Juncal	
17-02-98	Campo Garay	Huevos	Chañares	*P. brasilianus, E. thula,B. ibis, B. striata* y *N. nycticorax*
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí	*A. anhinga, A. cocoi, E. thula, B.*

			colorado	*ibis, N. nycticorax, P. ajaja* y *Ph. infuscatus*
12-02-07	Franck	Pichones	Ombúes	*Bubulcus ibis*
14-12-09	Alejandra	Huevos	Timbó colorado y Aliso de río	*E. thula, A.anhinga, Ph. brasilianus, A. cocoi y B. ibis*

08-12-90. Cacique Ariacaiquín, nido solitario, cerca de una colonia de *Phimosus infuscatus y Rostrhamus sociabilis.*

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4	3	1						1	1	7

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias. Raro nidos solitarios. En juncales, o en campos o islas inundadas.

Generalmente asociada a otras especies de aves.

Ubicación.

En juncales, o en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos o de juncos, con y sin pajitas o tallos de yuyos, en el interior.

Medidas :

Diámetro total : de 30 a 60 cm.

Profundidad : 2 a 6 cm.

Alto : 12 a 60 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. De color celeste o celeste verdoso.

Medidas y pesos :

De 52,6 a 59,1 x 37,3 a 42,3

X= 55,7 x 39,9 (N= 15)

Peso lleno : 46,7 a 49

X= 48,1 (N= 5)


Peso de las cáscaras : de 3,2 a 4,2 X= 3,7 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
53	18-03-81	Arrufó	55,7 x 40,2		3,518
			56,3 x 41,2		3,616
			56,7 x 40,0		3,940
54	18-03-81	Arrufó	58,8 x 39,8		3,616
			59,1 x 39,5		3,518
			57,5 x 40,8		3,940
621	27-10-83	Cayastacito	52,6 x 42,3	48,630	4,210
			53,7 x 41,0	46,750	4,105
			54,5 x 41,3	48,100	4,185
632	05-12-83	Cayastacito	55,5 x 40,2	48,400	3,720
			56,2 x 40,3	49,050	3,710
633	15-12-83	Isla El Rico	56,5 x 41,7	49,600	4,200
657	18-11-86	Llambi Campbell	53,0 x 37,3		3,2
			53,5 x 39,6		3,5
			55,4 x 39,6		3,9

PICHONES	OBSERVACIONES
Descripción: Pico y patas verde-amarillentos. Punta del maxilar superior, oscura. Iris y región periocular amarillos. Plumón blanco, largo, escaso. Más abundante dorsalmente. Garganta y ventral del cuello implumes.	La colonia del 01-03-92 en Wildermuth, tenía unos 200 nidos.

CHIFLÓN. *Syrigma sibilatrix*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 19

Fecha	Lugar	Ubicación	Contenido	Altura
28-09-70	Videla	Eucaliptus	3 huevos	4,00
30-09-72	Marcelino Escalada	Eucaliptus	En construcción	6,00
13-10-72	Cayastacito	Eucaliptus	En construcción	6,50
01-10-73	Sarmiento	Jacarandá	No observado	8,00
15-11-74	Colmena	No identificado	3 huevos	4,00
29-10-88	Esperanza	Eucaliptus	En construcción	7,00
31-10-89	Soledad	Ombú	En construcción	7,00
31-10-89	Soledad	Olivo	1 huevo	10,00
13-12-91	Malabrigo	Quebracho colorado	3 pichones	6,00
13-12-91	Malabrigo	Quebracho colorado	1 huevo	8,00
08-12-95	Esperanza	Paraíso	3 huevos	5,50
29-01-97	Wildermuth	Eucaliptus	3 pichones	6,50
01-12-98	Esperanza	Acacia negra	2 huevos	3,00
26-11-02	Esperanza	Pino	2 pichones	11,00
26-11-02	Esperanza	Palo borracho	1 pichón	10,00
01-10-03	Esperanza	Ciprés	En construcción	4,50
10-10-08	Humboldt	Fresno americano	En construcción	7,00
12-11-09	Humboldt	Fresno americano	3 huevos	10,00
03-12-12	Esperanza	Casuarina	3 pichones	9,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								2	7	4	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
7-15 días	Pone en días alternos	28-29 días	40-41 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles.

Características. Expuesto. Rudimentario. Plataforma de palitos con y sin espinas, colocados en forma laxa. Internamente palitos finos.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 40 cm.
Profundidad : 3 a 4 cm.
Alto : 8 a 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos. Base verdosa o sepia con tenues pintas grises y pardas.

Medidas y pesos :

De 46 a 48,2 x 35 a 37,5 - X= 46, x 36,4 (N= 6)
Peso de las cáscaras : de 1,88 a 1,99 X= 1,95 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	28-09-70	Videla	46,0 x 37,0	
			46,0 x 37,5	
			46,0 x 37,0	
56	15-11-74	Colmena	46,5 x 36,3	1,953
			46,7 x 35,0	1,991
			48,2 x 35,7	1,882

PICHONES

Descripción :
Nace con los ojos abiertos. Piel amarillenta. Patas y dedos amarillo-verdoso. Cuerpo cubierto de plumón blanco-amarillento.
A los 18 días, dorsalmente es gris. Rabadilla y cola más claros. Cuello, pecho y abdomen blanco amarillento con estrías grises.
Cubiertas alares grises con manchas ocráceas. Primarias grises.

OBSERVACIONES

Durante el cortejo la pareja se enfrenta, estiran el cuello erizando las plumas en forma conjunta con las de la cabeza.
La pareja interviene en la construcción del nido. Emiten un chiflido cada vez que vuelven al lugar elegido con el acarreo de los elementos. No juntan los que se caen, buscan nuevos palitos hasta 150 m. del lugar. Suele estar uno posado en la plataforma y el otro los alcanza.

GARCITA BLANCA. *Egretta thula*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	**N**	**N**							**N**	**N**	**N**

Total de colonias : 10



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
11-12-72	Azul	Pichones	Juncal	
01-03-79	Esperanza	Huevos y pichones	Cina-cina	*A. alba* y *B. ibis*
28-02-80	Monte Vera	Pichones	Alisal	*A. anhinga, A. alba* y *B. ibis*
18-03-81	Arrufó	Huevos	Chañares	*P. brasialinus, A. alba,B. ibis* y *N. nycticorax*
27-10-83	Cayastacito	Huevos y pichones	Juncal	*A. cocoi, A. alba* y *N. nycticorax*
15-12-83	Isla El Rico	Huevos y pichones	Alisal	*A. anhinga, A. cocoi* y *A. alba*
23-02-91	Wildermuth	Pichones	Juncal	*A. alba* y *B. ibis*
17-02-98	Campo Garay	Huevos	Chañares	*P. brasialinus, A. alba,B. ibis, B. striata* y *N. nycticorax*
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. anhinga, A. cocoi, A. alba,*

14-12-09	Alejandra	Huevos	Timbó colorado y Aliso de río	*B. ibis, N. nycticorax, Ph. infuscatus* y *P. ajaja* *Ph. brasilianus, A.anhinga, E. alba, A. cocoi y B. ibis*

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3	2							1		4

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias. En juncales, o en campos o islas inundadas.
Generalmente asociada a otras especies de aves.
Ubicación.

En juncales, o en ramas de árboles o arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos o de juncos, con y sin pajitas o tallos de yuyos, en el interior.
Medidas :

Diámetro total : de 20 a 40 cm.
Profundidad : 3 a 4 cm.
Alto : 12 a 40 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos. Elípticos, algunos ovoidales. De color celeste.
Medidas y pesos :

De 40,2 a 44,1 x 30,6 a 31,8
X= 42,1, x 31,4 (N= 16)
Peso lleno : de 18,4 a 21,6 X= 19,4 (N= 12)
Peso de las cáscaras : de 1,24 a 1,85 X= 1,53 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
55	11-12-72	Azul	42,8 x 32,4		1,496
			42,8 x 32,7		1,428
620	27-10-83	Cayastacito	41,8 x 31,4	20,000	1,650
			43,4 x 31,0	20,254	1,680
			44,1 x 31,5	21,605	1,750
624	27-10-83	Cayastacito	40,7 x 31,0	18,085	1,507
			41,8 x 31,5	19,142	1,580
			43,2 x 30,7	18,120	1,453
625	27-10-83	Cayastacito	40,2 x 31,8	19,285	1,577
			41,0 x 31,4	18,423	1,467
			42,6 x 31,3	19,528	1,248
			43,4 x31,5	18,124	1,336
633	15-12-83	Isla El Rico	41,2 x 30,6	19,850	1,850
			41,3 x 30,9	20,500	1,520

PICHONES

Descripción: Pico y patas amarillos. Plumón blanco. Garganta implume.

OBSERVACIONES

En la colonia de El Rico (15-12-83) se localizó un nido con 2 huevos propios y uno putrefacto de *Ardea alba.* La colonia de Wuildermuth (01-03-92) tenía unos 800 nidos.

CUERVILLO DE CAÑADA. *Plegadis chihi*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Total de colonias : 9

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
12-12-58	Aguará Grande	Pichones	Juncal
01-12-72	Azul	Pichones	Juncal
02-01-82	Morteros (1)	Huevos	Juncal
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	Pichones	Juncal
04-12-91	Arias (2)	Huevos y pichones	Juncal
05-02-92	Isla Verde	Huevos y pichones	Juncal
01-03-92	Wildermuth (3)	Pichones	Juncal
07-11-94	Wildermuth	Huevos	Juncal
08-02-07	Wildermuth	Pichones	Juncal

(1). Un nido con 1 huevo propio, tenía 1 huevo de *Heteronetta atricapilla*
(2). Un nido tenía 2 pichones propios y 2 huevos de *Heteronetta atricapilla*
(2). Otro nido tenía 1 huevo propio y 1 de *Heteronetta atricapilla*
(3). Esta colonia tenía unos 1.000 nidos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias en juncales.

Ubicación.

Asentados sobre el agua o sostenidos por Juncos, a distancia variable sobre la misma.

Hasta 80-90 cm..

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo, de juncos. Internamente gramíneas.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 35 cm.

Diámetro interno : de 11 a 15 cm.

Profundidad : 3 a 5 cm.

Alto : 15 a 20 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color turquesa.

Medidas y pesos :

De 48 a 57 x 33,7 a 36,1 X= 51,1 x 34,9 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 2,1 a 2,4 X= 2,2 (N= 7)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
71	02-01-82	Morteros	48,0 x 33,7	2,291
72	02-01-82	Morteros	48,1 x 36,1	2,353
			50,2 x 35,9	2,390
			52,3 x 35,1	2,440
589	02-01-82	Morteros	51,8 x 33,8	2,345
			57,0 x 35,3	2,140
811	04-12-91	Arias	51,0 x 35,0	2,2

PICHONES

Descripción: Plumón pardo oscuro, casi negro.

CUERVILLO PUNEÑO *Plegadis ridgwayi*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de colonias : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
08-02-03	Abra Pampa	Huevos y pichones	Juncal (*)

(*). Colonia con 15 nidos, cerca de una de *Nycticorax nycticorax*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, en juncales.

Ubicación.

Sostenidos por Juncos, a distancia variable sobre el agua. Entre 50 y 80 cm.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 35 cm.

Alto : 15 a 20 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color turquesa.

Medidas y pesos :


De 54,4 a 57,4 x 35 a 38,4 X= 56,2 x 36,6 (N= 5)

Peso de las cáscaras : 2,8 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
936	08-02-03	Abra Pampa	56,1 x 35,0	2,8
	08-02-03	Abra Pampa	57,3 x 38,4	
			57,4 x 35,2	
	08-02-03	Abra Pampa	54,5 x 37,5	
			56,0 x 37,0	

CUERVILLO DE CARA PELADA. *Phimosus infuscatus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de colonias : 5

Total de nidos solitarios : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	
01-11-73	Aguará Grande	2 huevos	Espadañal	Solitario
01-11-74	Aguará Grande	3 huevos	Espadañal	Solitario
10-10-75	Aguará Grande	3 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal	Solitario
10-10-75	Aguará Grande	2 huevos	Juncal	Solitario
09-01-79	Miguel Escalada	Huevos (*)	Juncal	Colonia
24-01-79	Miguel Escalada	3 huevos	Juncal	Solitario
24-01-79	Miguel Escalada	2 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal	Solitario
02-01-82	Morteros	En construcción	Juncal	Colonia
20-10-86	Saladero Cabal (l)	Huevos	Espadañal	Colonia
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	Huevos y pichones	Juncal	Colonia
11-12-02	Bonpland (2)	Pichones	Sarandí colorado	Colonia

(*). Un nido tenía 2 huevos propios y 2 de *Heteronetta atricapilla*
(1). Colonia junto a una de *Nycticorax nicticorax*
(2). Colonia junto a *A. anhinga*, *A. cocoi*, *A. alba*, *E. thula*, *B. ibis*, *N. nycticorax* y *P. ajaja*.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica solitariamente o en colonias.

Ubicación.

Asentados sobre el agua o sostenidos por Juncos o Espadañas, a distancia variable sobre la misma.
(hasta 1 m.)

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo, de palitos con y sin espinas, juncos o gramillón. Internamente pajitas, hojas de espadañas.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 35 cm.
Profundidad : 1 a 5 cm.
Alto : 8 a 20 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.
Ovoidales. De color celeste verdoso.

Medidas y pesos :

De 44,5 a 50,3 x 32,7 a 36,5 X= 47,4 x 34,6 (N= 27)

Peso lleno : de 25,3 a 28,4 X= 26,9 (N= 8)
Peso de las cáscaras : de 1,8 a 2,4 X= 2 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
68	01-11-73	Aguará Grande	44,9 x 33,6		2,066
			45,5 x 34,3		2,246
	10-10-75	Aguará Grande	47,5 x 36,5		
			48,0 x 35,0		
			49,0 x 36,0		
65	01-11-74	Aguará Grande	48,0 x 35,5		2,073
			48,6 x 36,5		2,281
			50,3 x 35,8		2,073
66	09-01-79	Miguel Escalada	45,6 x 34,3		2,356
			49,6 x 35,5		2,048
67	24-01-79	Miguel Escalada	47,0 x 35,3		2,114
			48,5 x 34,5		2,161
			49,4 x 35,0		2,158
69	09-01-79	Miguel Escalada	46,9 x 33,5		1,905
			47,0 x 32,7		1,953

70	24-01-79	Miguel Escalada	48,3 x 35,9		2,408
			49,8 x 35,7		2,449
639	20-10-86	Saladero Cabal	46,5 x 33,0		2,0
			46,9 x 33,0		2,0
751	17-11-90	Cacique Ariacaiquín	44,5 x 34,3	26,6	2,2
			45,5 x 33,3	28,4	1,8
			46,0 x 34,5	25,8	2,0
			48,2 x 34,1	26,8	2,2
752	17-11-90	Cacique Ariacaiquín	44,5 x 33,9	27,7	2,0
			47,7 x 34,0	25,3	2,2
			47,8 x 34,5	27,5	2,0
			48,6 x 34,0	27,7	2,2


PICHONES

Descripción: Plumón pardo oscuro, casi negro.

BANDURRIA MORA*Theristicus caerulescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-10-91	La Hierra	2 pichones	Casuarina	6,00
06-11-98	Mercedes	2 pichones	Palmera yatay	4,00
08-11-98	Mercedes	Pichones	Eucaliptus	13,00
08-11-98	Mercedes	Pichones	Eucaliptus	15,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos y ramitas.

Medidas :

Diámetro total : de 40 a 60 cm.

Alto : 30 cm.

Ubicación.

En ramas de árboles.

Características.

ESPÁTULA ROSADA. *Platalea ajaja*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de colonias : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Asociada a :
11-12-72	Azul	Huevos y pichones	Juncal	
11-12-02	Bonpland	Pichones	Sarandí colorado	*A. anhinga,A. cocoi, A. alba, E. thula, B. ibis, N. nycticorax* y *Ph. infuscatus*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, en juncales.

Ubicación.

Sostenidos por Juncos, a distancia variable sobre el agua.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 40 a 45 cm.

Diámetro interno : de 20 a 25 cm.

Profundidad : 7 cm.

Alto : 20 a 25 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color ocráceo con manchas y pintas castañas y grises.

Medidas y pesos :

De 58,8 a 66,8 x 42,5a 45 - X= 64 x 43,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 5,01 a 6,85 X= 5,92 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
73	11-12-72	Azul	58,8 x 42,5	5,820
			63,7 x 43,4	6,037
			66,8 x 43,5	5,016

PICHONES

Descripción: Plumón blanco.

FAMILIA: CATHARTIDAE

JOTE DE CABEZA COLORADA *Cathartes aura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-11-71	La Gallareta	1 huevo	Hueco en Ombú
20-11-80	La Gallareta	2 huevos	Hueco en Ombú

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Entre rocas, en cuevas o en huecos en troncos de árboles.

Características.

Oculto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre el suelo.

Medida.

Un hueco en un Ombú, tenía la entrada a 3 m. del suelo, con un diámetro de 35-40 cm. En la base medía 1,50 m.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color verdoso o blanquecino con pintas y manchas grandes castañas, más concentradas en el polo mayor y pintas grises espaciadas.

Medidas y pesos :

De 70,7 a 72,1 x 49,9 a 51,8 x 5

X= 71,4 x 50,7 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 8,2 a 9,5

X= 8,9 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
420	15-11-71	La Gallareta	71,4 x 51,8	9,501
102	20-11-80	La Gallareta	70,7 x 50,4	8,234
			72,1 x 49,9	8,399

PICHONES

Descripción. Cuerpo cubierto de plumón blanquecino.

JOTE DE CABEZA NEGRA *Coragyps atratus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	



Total de nidos : 11

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-11-74	Colmena	2 huevos	Hueco en Ombú
15-11-74	Colmena	2 huevos	Hueco en Ombú
15-11-74	Colmena	2 pichones	Hueco en Ombú
18-09-89	Morteros	2 pichones	Suelo
02-10-90	Los Amores	1 huevo	Hueco en árbol
07-11-90	Morteros	2 pichones	Suelo
12-12-07	Elisa (*)	2 pichones	Suelo (en tronco hueco de Paraíso)
08-11-08	Elisa (*)	2 pichones	Suelo (en tronco hueco de Paraíso)
20-09-09	Elisa (*)	2 huevos	Suelo (en tronco hueco de Paraíso)
30-11-10	Elisa (*)	1 huevo	Suelo (en tronco hueco de Paraíso)

(*) Ocupó el mismo lugar. Nido localizado por Víctor Merlino.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas en rocas, en huecos en árboles o en el suelo.

Características.

Oculto o semioculto por matorrales. Rudimentario

Los huevos son puestos sobre el suelo.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino, blanco grisáceo o verdosos con manchas castañas y pintas grises. Algunos con pocas pintas y manchas. A veces las manchas más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :.

De 71 a 74,3 x 49 a 52,8 X= 72,1 x 51,1 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 9,23 a 10,46 X= 9,4 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
103	15-11-74	Colmena	71,0 x 51,8	9,406
			72,2 x 52,8	10,462
104	15-11-74	Colmena	71,5 x 50,5	9,237
			72,7 x 51,6	7,753
744	02-10-90	Los Amores	74,3 x 49,0	10,200

PICHONES

Descripción: Cuerpo cubierto de plumón blanco amarillento.

FAMILIA: ACCIPITRIDAE

MILANO BLANCO *Elanus leucurus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N			N		N	N	N	N	N	N



Total de nidos : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
19-10-71	Esperanza	2 huevos	Ñandubay	3,50
27-11-71	Villa San José	2 pichones	Aromo	4,00
25-10-72	Villa San José	1 huevo	Aromo	4,00
22-10-73	Galvez	2 huevos	Paraíso	4,50
16-11-89	Esperanza	2 huevos	Paraíso	6,00
18-12-90	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,40
18-12-90	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,60
26-05-96	Esperanza	4 huevos	Algarrobo	4,00
24-10-96	Pilar	En construcción	Paraíso	5,00
01-08-98	Esperanza	2 huevos	Paraíso	4,50
09-12-98	Esperanza	En construcción	Curupí	5,40
06-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1			1			1		4	2	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12 a 15 días	Pone en días alternos	29 a 30 días	37 a 40 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma profunda (con forma de tazón) .Emplea palitos con y sin espinas. Internamente pajitas.

Medidas :

Diámetro total : de 30 a 35 cm.

Diámetro interno : 15 a 16 cm.

Alto : de 10 a 15 cm.

Profundidad : de 5 a 13 cm.

HUEVOS

Pone de 2 a 4.

Ovoidales o elípticos. De color crema, ocre o blanquecinos, manchados de castaño claro y oscuro, por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 38,2 a 41,7 x 31,5 a 32,7 X= 39,7 x 31,6 (N= 11)

Peso lleno : X=21,7 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 1,5 a 1,76 X= 1,5 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
114	19-10-71	Esperanza	39,0 x 32,2		1,577
			39,8 x 31,9		1,598
115	25-10-72	Villa San José	38,2 x 32,0		1,762
116	22-10-73	Galvez	40,0 x 31,6		1,634
			40,2 x 31,5		1,560
729	16-11-89	Esperanza	40,4 x 31,6	21,7	1,7
			41,0 x 32,2	21,7	1,6
864	26-05-96	Esperanza	38,4 x 32,7		1,5
			39,6 x 32,0		1,6
			39,7 x 31,3		1,5
			41,7 x 32,0		1,5

PICHONES

Nacen escalonados, entre 24 a 48 horas o más.
Descripción: Cuerpo cubierto de plumón grisáceo.

OBSERVACIONES

El nido del 16-11-89 estaba construido sobre uno en actividad de *Passer domesticus*

AGUILUCHO PAMPA *Busarellus nigricollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-95	Florencia	1 pichón	Maní guaycurú	8,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En árboles altos.
Características.
Expuesto. Elaborado. Plataforma grande de palos.


Medida :
Diámetro total : 80 cm.
Alto : 25 cm.

OBSERVACIONES

El 23-11-72 en Cañada Ombú se vio a un adulto comiendo una Ñacaninà (*Hydrodynastes gigas*) muerta, en la orilla de un estero.

CARACOLERO *Rostrhamus sociabilis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de colonias : 17
Total de nidos solitarios : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-11-71	Aguará Grande	Huevos y pichones	Colonia en juncal
19-12-72	Aguará Grande	Huevos y pichones	Colonia en juncal
01-11-73	Aguará Grande	Huevos	Colonia en juncal
10-10-75	Aguará Grande	Huevos	Colonia en juncal
24-12-79	Miguel Escalada	Huevos y pichones	Colonia en juncal
02-01-82	Morteros	Huevos	Colonia en juncal
24-11-86	Aguará Grande	Huevos	Colonia en juncal
10-10-86	Llambi Campbell	Huevos	Colonia en juncal
08-11-89	Los Amores	Huevos	Colonia en juncal y paja brava
08-11-89	Los Amores	En construcción	Colonia en juncal
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	Pichones	Colonia en juncal
15-12-90	Cayastá	En construcción	Colonia en juncal
23-02-91	Wildermuth	Pichones	Solitario en juncal
02-12-92	Wildermuth	Pichones	Colonia y solitario en juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	Pichones	Solitario en juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	Huevos y pichones	Colonia en juncal
09-01-02	Calchaquí	Pichones	Colonia en juncal
14-12-11	Villa Roda	Huevos	Colonia en juncal

Altura de los nidos desde el suelo : de 0,30 a 1,10 m.

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	1								2	6	5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, pero se pueden encontrar nidos solitarios. En juncales o en pajas bravas en esteros.

Ubicación.

Sostenido en Juncos o en Pajas bravas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato. Emplea palitos con y sin espinas o juncos en la base. Internamente pajas, gramillas, hojas de Eucaliptus.

Medidas :

Diámetro total : de 22 a 35 cm.
Diámetro interno : de 15 a 18 cm.
Profundidad : de 1 a 8 cm.
Alto : de 12 a 20 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos anchos, algunos ovoidales. De color blanco con manchas y pintas castaño oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 39,6 a 49,3 x 32 a 36,7
X= 42,3 x 34,6 (N= 19)

Peso lleno : de 24,4 a 28,2
X=26,2 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 1,726 a 2,930
X= 2,08 (N= 19)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
109	30-11-71	Aguará Grande	39,6 x 32,8		1,726
			42,0 x 35,4		2,111
			43,0 x 35,5		2,196
110	30-11-71	Aguará Grande	41,7 x 34,0		1,833
			41,8 x 35,0		1,888
			42,3 x 34,5		1,950
111	19-12-72	Aguará Grande	44,0 x 34,7		2,098
			44,6 x 36,7		2,304
			47,0 x 35,5		2,930
112	02-01-82	Morteros	41,2 x 34,7		1,942
			41,7 x 35,3		1,955
113	02-01-82	Morteros	48,6 x 35,5		2,391
			49,3 x 36,3		2,671
683	08-11-89	Los Amores	41,5 x 35,5	27,5	2,0
			42,0 x 34,8	28,0	2,1
			42,7 x 35,4	28,2	2,1
724	08-11-89	Los Amores	39,8 x 33,2	24,4	1,9
			40,3 x 34,3	24,5	1,9
			40,5 x 33,3	24,6	2,0

PICHONES

Descripción.
Pico negro. Cuerpo cubierto de plumón pardo grisáceo. Franja ocular oscura.

OBSERVACIONES


En la colonia de Morteros (2-1-82) un nido tenía 2 huevos y 1 de *Heteronetta atricapilla***.**

El 3-5-88 en Quitilipi se observó un ejemplar con albinismo total.
En la colonia de Los Amores (8-11-89) había un nido sostenido en una Paja brava, a 50 cm. del suelo.
En la colonia de Cacique Ariacaiquín (17-11-90) algunos ejemplares sacaban palitos de los nidos de Cotorras (*Myiopsitta monachus*) construídos en Eucaliptus, a 150 m. del estero.

MILANO PLOMIZO *Ictinia plumbea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-02-73	Puerto Rico	1 pichón	Árbol	10,00
13-12-91	Malabrigo	1 pichón	Quebracho colorado	8,50
21-09-93	Cataratas del Iguazú	En construcción	Árbol	15,00
10-11-96	Itá-Ibaté	1 huevo	Árbol	7,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos sin espinas. Internamente hojas, pastos y líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 30 cm.
Diámetro interno : 15 a 16 cm.
Profundidad : 4 a 10 cm.
Alto : 5,5 a 14 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Ovoidales. De color tiza.

Medida :

47 x 36,8 (N= 1)

PICHONES

Descripción.

Pico negro. Cera, comisura y patas amarillos. Plumón blanco. Pardusco en las alas.

Alimentación.

Los padres les traen insectos.

OBSERVACIONES

Los adultos atacan a los intrusos cuando se aproximan al nido.

GAVILÁN CENICIENTO *Circus cinereus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
02-12-84	Maquinchao	3 huevos	Suelo
02-12-84	Maquinchao	5 huevos	Suelo



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo en esteros o mallines.

Características.

Expuesto o semioculto. Elaborado. Plataforma con depresión central (algunos con forma de palangana). Forra la base con pastos. Reborde de tallos de yuyos o juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 35 a 40 cm.
Diámetro interno : 20 cm.
Profundidad : 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco, con tono celeste.

Medidas y peso: De 44,5 a 46,3 x 32,5 a 34,2

X= 46,5 x 33,7 (N= 8)

NIDADAS

Fecha	Localidad	Medidas
02-12-84	Maquinchao	45,5 x 34,0
		45,7 x 34,5
		46,0 x 33,5

		46,0 x 34,0
		46,3 x 34,0
02-12-84	Maquinchao	44,5 x 32,5
		45.0 x 34,0
		46,0 x 34,0

AGUILUCHO COLORADO *Buteogallus meridionalis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	1 huevo	Ombú	10,00
15-11-71	La Gallareta	1 pichón	Ombú	13,00
26-09-74	Cayastacito	1 huevo	Paraíso	10,00
13-10-83	La Brava	No observado	Ombú	12,00
23-11-93	Empedrado	No observado	Urunday	20,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajitas.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 45 cm.

Profundidad : 5 a 10 cm.

Alto : 15 a 20 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :


De 55 a 58,4 x 46 a 48,2 - X= 56,7 x 47,1 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 5,35 (N= 1)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	15-11-71	La Gallareta	55,0 x 46,0	
105	26-09-74	Cayastacito	58,4 x 48,2	5,355

ÁGUILA NEGRA *Buteogallus urubitinga*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-10-90	Los Amores	1 huevo	Algarrobo	10,00
10-11-97	La Camila	1 huevo	Eucaliptus	15,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Voluminoso, con forma de olla, profundo. Emplea palitos sin espinas. Internamente puede colocar hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 55 a 60 cm.

Diámetro interno : 30 a 35 cm.

Profundidad : 25 cm.

Alto : 60 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Elípticos. De color blanco mate con tenues rayitas grises, pintas y manchitas castaño claro y oscuro, espaciadas en toda la superficie.

Medidas y pesos :

65,7 x 51,4 (N= 1)

Peso lleno : 90,5 (N= 1)

Peso de las cáscaras : 8,4 (N= 1)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso lleno	Peso cáscara
745	02-10-90	Los Amores	65,7 x 51,4	90,5	8,4

ÁGUILA CORONADA *Buteogallus coronatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
28-10-79	Constanza	1 huevo	Eucaliptus	15,00
05-12-82	Constanza	1 pichón	Eucaliptus	15,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma honda, de palos y ramitas. Internamente hojas y pastos.

El nido localizado contenía además dos alambres de púas, de más de un metro de largo y estaba sobre uno en actividad de Cotorra (*Myiopsitta monachus*).

Medidas :

Diámetro total : 120 cm.

Profundidad : 15 cm.

Alto : 30 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Elípticos. De color blanco con pintas y manchitas grises y en menor cantidad amarillentas (casi ocres) distribuidas en forma espaciada en toda la superficie.

Medidas y peso :

72,8 x 56,7 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 11 (N= 1)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
108	28-10-79	Constanza	72,8 x 56,7	11,063

TAGUATÓ COMÚN *Rupornis magnirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N





Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-11-74	Esperanza	3 huevos	Pino	12,00
16-11-74	Colmena	2 pichones	Árbol	6,00
05-12-91	Grutly	1 pichón	Curupí	6,00
13-12-91	Malabrigo	1 huevo	Canelón	8,00
13-12-91	Malabrigo	1 pichón	Coronillo	7,50
11-11-99	Rincón Potrero	2 pichones	Seibo	4,00
28-09-01	Esperanza	Sin postura	Chañar	4,00
15-12-11	Esperanza	3 pichones	Pino	10,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos. Internamente palitos finos, hojas, líquenes, helechos, pastos.

Las hojas frescas en el interior de algunos nidos eran de Sauce, Quebracho blanco, Acacia negra y Paraíso.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 40 cm.

Diámetro interno : 15 a 22 cm.

Profundidad : 3 a 12 cm.

Alto : 12 a 22 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos. De color blanco crema con pintas y manchas lilas y castañas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 46,4 a 48,4 x 38 a 39,4

X= 47,2 x 38,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 2,54 a 3,07

X= 2,81 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
106	07-11-74	Esperanza	46,4 x 38	2,542
			46,8 x 38	2,840
			47,5 x 39	3,027
817	13-12-91	Malabrigo	48,4 x 39,4	

PICHONES

Descripción. Pico gris con punta negra. Cera y patas amarillos. Plumón blanquecino salpicado de negro.

A los pocos días las plumas de la parte anterior de la cabeza, pardo oscuro.

OBSERVACIONES

En el período de reproducción vuelan alto, hasta 4 ejemplares, emitiendo un grito fuerte

Reparan el nido agregando hojas frescas en el interior.

El 29-07-00 en Esperanza, se observó a un ejemplar comiendo Cascarudo (*Hoplosternum sp*) . Lo capturó y lo llevó con las garras a un poste, donde lo deglutió.

GAVILÁN MIXTO *Parabuteo unicinctus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	



Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-09-71	Esperanza	1 pichón	Pino	10,00
15-10-86	Esperanza	2 pichón	Pino	18,00
17-09-87	Esperanza	1 huevo	Pino	25,00
25-09-88	Esperanza (*)	Sacó un pichón	Pino	25,00
06-09-89	Esperanza	2 huevos	Pino	20,00
26-12-90	Esperanza	2 pichones	Curupí	8,00

(*) Ocupó el mismo nido del año anterior. Luego de abandonar el nido los pichones, el 05-10-88 había un nido de *Zenaida auriculata* con 2 huevos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
Construye el nido en árboles altos.
Características.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas. Internamente pajitas y hojas.
Medidas :Diámetro total : de 45 a 60 cm.
Profundidad : 3 a 8 cm.
Alto : 20 a 50 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Ovoidales. De color celeste claro.
Medidas y pesos :.
De 52,9 a 53,3 x 41 a 41,4 X= 53,1 x 41,2 (N= 2)
Peso lleno : de 47 a 48 X= 47,5 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 4 a 4,3 X= 4,152 (N= 2)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
669	06-09-89	Esperanza	52,9 x 41,4	47,0	4,0
			53,3 x 41,0	48,0	4,3

PICHONES

Descripción.
Nacen cubiertos de plumón pardo claro.

Alimentación
Son alimentados por los padres con Inambú común (*Nothura maculosa*) y Cuises (*Cavia aperea*)

AGUILUCHO COMÚN *Geranoaetus polyosoma*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-12-81	Pampa de Achala	No observado	Saliente rocosa	20,00
27-11-82	Pampa de Achala	2 pichones	Saliente rocosa	17,00
07-09-03	Paraje Collón Curá	2 huevos	Arbusto	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En salientes rocosas, barrancas, arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palos, palitos y pastos.

Medidas :

Diámetro total : de 80 a 120 cm.

Diámetro interno : 40 cm.

Profundidad : 3 cm.

Alto : 30 a 40 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas rojizas distribuidas en toda la superficie.

Medida :

57 x 46 X= 57 x 46 (N= 2)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
07-09-03	Paraje Collón Curá	57,0 x 46,0
		57,0 x 46,0

ÁGUILA MORA *Geranoaetus melanoleucus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-09-74	Cayastacito	2 huevos	Ñandubay	4,00
04-10-74	Cayastacito	3 pichones	Ñandubay	4,50
24-12-79	Miguel Escalada	Sacó 2 pichones	Ñandubay	4,00
13-08-87	Portugalete (*)	No observado	Algarrobo	6,00
26-09-97	Estancia La Salamandra	No observado	Chañar	5,00

(*). Nido construido sobre uno de Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en actividad.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles o en repisas rocosas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Gran plataforma de palos con y sin espinas. Internamente pajas, hojas y plumas.

Los palos son de hasta 2,5 cm. de diámetro y 30 a 50 cm. de largos. Los Espartillos de 20-25 cm. de largos, algunos con raiz y hojas de Cardo.

Medidas :

Diámetro total : de 80 a 100 cm.

Profundidad : 10 cm.

Alto : 35 a 40 cm.

HUEVOS

Pone 2, a veces 3 huevos.

Elípticos. De color blanco con tono celeste, sin manchas o con pintas y manchas ocres, distribuidas en forma irregular en toda la supoerficie

Medidas y pesos :

De 65,5 a 66 x 52 a 52,4 X= 65,7 x 52,3 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 8 a 8,6 X= 8,3 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
107	26-09-74	Cayastacito	65,5 x 52,0	8.090
			66,0 x 52,4	8,665

PICHONES

Descripción.

Cuerpo cubierto de plumón blanquecino.

Alimentación

Son alimentados por los padres con Cuis (*Cavia aperea*), Inambú común (*Nothura maculosa*) y Liebre (*Lepus europaeus*)


OBSERVACIONES

El 27-09-97 Río Salado y ruta 13 se observó a un adulto comiendo las vísceras de un Zorro pampa (*Lycalopex gymnocercus*)

FAMILIA: ARAMIDAE

CARAU *Aramus guarauna*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
03-11-72	La Loca	3 huevos	Juncal
16-11-76	Cayastacito	7 huevos	Juncal
19-12-72	Aguará Grande	5 huevos y 8 de *H. atricapilla*	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	2 huevos	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	3 huevos	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	Pichones naciendo	Juncal
09-01-79	Miguel Escalada	5 huevos	Juncal
24-01-79	Miguel Escalada	4 huevos y 3 de *H. atricapilla*	Juncal
24-12-79	Miguel Escalada	3 huevos	Juncal
24-12-79	Miguel Escalada	3 pichones	Juncal
03-01-87	Esperanza	5 huevos	Cina-cina a 2,70 m. del suelo
09-11-89	Los Amores	Sin postura	Árbol a 4,50 m. del suelo
02-01-91	El Laurel	5 huevos	Espadañal
02-12-92	Wildermuth	7 huevos	Juncal
25-12-93	Esperanza	7 huevos	Espadañal
12-01-03	Villa Roda	5 huevos	Juncal

12-11-91. Cayastá. Una pareja con 2 juveniles.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5										3	8

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En espadañales, juncales, arbustos o en árboles. Desde ras del agua, o sobre plataformas de juncos o espadañas, hasta 4,50 m.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos o de hojas de espadañas, con forma de plato hondo.

Si lo ubica en arbustos o en árboles, base de palitos e internamente pajas o tallos de enredaderas.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 50 cm.

Profundidad : 5 a 6,5 cm.

Alto : 10 a 25 cm.

HUEVOS

Pone de 5 a 7 huevos.

Ovoidades o elípticos. De color crema con manchas y líneas castañas y manchitas grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medida y pesos :

De 55,8 a 63,3 x 41,8 a 46,1 X= 60,6 x 43,7 (N= 24)

Peso lleno : de 58 a 62,5 X= 60,6 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 4,835 a 5,587X= 5,20 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
133	03-11-72	La Loca	55,8 x 43,0		4,912
			57,3 x 43,5		4,933
			57,9 x 43,6		5,026
134	16-11-76	Cayastacito	58,9 x 41,8		5,300
			64,0 x 42,2		5,130
			60,4 x 42,7		5,565
			60,8 x 43,4		5,587
			61,2 x 41,8		5,526
			62,8 x 44,0		5,619
			62,8 x 43,2		5,017
135	09-01-79	Miguel Escalada	60,3 x 44,4		4,835
			60,8 x 44,5		4,991
			61,4 x 45,7		5,556
			61,4 x 44,4		5,001
			63,1 x 46,1		4,919
136	24-01-79	Miguel Escalada	58,0 x 43,7		5,321
			58,9 x 42,8		5,561
			60,3 x 43,2		5,120
			60,7 x 44,3		5,246
792	02-01-91	El Laurel	60,0 x 44,0	61,9	5,2
			61,0 x 43,5	60,9	5,1
			61,0 x 44,4	62,5	5,3
			63,0 x 44,3	58,0	5,0
			63,3 x 44,5	60,0	5,3

PICHONES

Descripción.


Pico y patas negros. Plumón pardo oscuro. Garganta, cuello anterior y abdomen blanquecino.

FAMILIA: RALLIDAE

IPACAÁ *Aramides ypecaha*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-11-74	La Gallareta	5 huevos	Matorral	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En arbusto o en matorrales, cerca de bañados, esteros, ríos o en montes.

Características.

Semioculto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Construido con tallos de enredaderas y pajas.

Medidas:

Diámetro total : 32 cm.
Diámetro interno : 16 cm.
Profundidad : 5 cm.
Alto : 16 cm.

HUEVOS

Pone 5 ó 6 huevos.

Elípticos o ligeramente ovoidales. De color ocre claro con pintas lilas y castañas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 50 a 52,4 x 37,2 a 40,4 X= 50,9 x 39 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 3,00 a 3,70 X= 3,38 (N= 5)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
141	17-11-74	La Gallareta	50,0 x 39,2	3,539
			50,2 x 39,2	3,009
			50,9 x 39,0	3,493
			51,2 x 37,2	3,701
			52,4 x 40,4	3,180

OBSERVACIONES

El 07-01-90, en Esperanza, una pareja con 2 juveniles.
El 18-12-91, en Ombúes, una pareja con 2 juveniles.

CHIRICOTE *Aramides cajaneus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-92	Tigre	3 huevos	Matorral	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En arbusto o en matorrales.

Características.

Semioculto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Construido con pajas.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 27 cm.

Diámetro interno : 14 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 12 cm.

HUEVOS

Pone 5 huevos.

Elípticos. De color crema con pintas grises, castaño claro y oscuro, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 47,9 a 48 x 35,5 a 35,7 X= 47,9 x 35,6 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 2 a 2,1 X= 2,06 (N= 3)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
837	15-11-92	Tigre	47,9 x 35,7	2,1
			48,0 x 35,5	2,0
			48,0 x 35,6	2,1

BURRITO COMÚN *Laterallus melanophaius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-12-97	Rosario de la Frontera	2 huevos	Enredadera	0,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en una enredadera, en la orilla de un bañado

Características.

Oculto. Elaborado. Redondeado. Boca lateral. Construido con fibras de *Cyperus*, finas en el interior.

Medidas :

Diámetro total : de 18 a 20 cm.

Diámetro de la boca : 7 cm.

HUEVOS

Pone hasta 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco crema con pintas y manchitas pardo rojizas y algunas violáceas, por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 30 a 30,1 x 24 a 24,4 X= 30,05 x 24,2 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,4 a 0,5 X= 0,45 (N= 2)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
873	15-12-97	Rosario de la Frontera	30,0 x 24,4	0,400
			30,1 x 24,0	0,500

GALLINETA OVERA *Pardirallus maculatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
05-01-79	Candioti	2 huevos	Campo inundado

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, en esteros o en campos inundados.

Características.

Oculto. Poco elaborado. Plataforma de gramillas.

Medida :

Diámetro total : 13 x 15 cm.

HUEVOS

Pone hasta 6 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color crema con finas pintas rojizas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 34,2 a 36 x 27,2 a 27,8 X= 35,1 x 27,5 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,86 a 0,99 X= 0,92 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
140	05-01-79	Candioti	34,2 x 27,2	0,864
			36,0 x 27,8	0,991

OBSERVACIONES

El 24-03-93, al oeste de Cayastá, un adulto con 2 juveniles.


El 06-09-99, en Esperanza, aparecieron 19 ejemplares, luego de una noche de niebla, 7 estaban muertas y 12 fueron soltadas en los bañados del río Salado y del Aº Cululú.

El 03-04-00, en Cayastá, dos ejemplares comían caracoles.

GALLINETA COMÚN *Pardirallus sanguinolentus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
25-10-70	Cayastacito	3 huevos	Espartillo
15-10-77	Campo Andino	4 huevos	Juncal
29-10-77	Aguará Grande	2 huevos	Juncal

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En juncales, espartillares o proximidades de humedales. Desde el suelo hasta un metro de altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Plataforma de tallos, hojas, trozos de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 15 cm.

HUEVOS

Pone hasta 6 huevos.

Elípticos o ligeramente ovoidales. De color crema o crema rosado con pintas y manchitas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 38,7 a 40,9 x 28,9 a 31 X= 39,6 x 29,7 (N= 9)

Peso de las cáscaras : de 1,20 a 1,444 X= 1,352 (N= 9)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
137	25-10-70	Cayastacito	38,7 x 29,7	1,336
			39,8 x 31,0	1,443
			40,0 x 30,4	1,408
138	15-10-77	Campo Andino	38,7 x 29,5	1,203
			39,2 x 28,9	1,266
			39,2 x 29,5	1,269
			39,7 x 29,5	1,245
139	29-10-77	Aguará Grande	40,2 x 29,2	1,433
			40,9 x 29,6	1,382

POLLONA NEGRA *Gallinula galeata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 15

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-02-71	Esperanza	8 huevos	Estero
15-02-72	Esperanza	9 huevos	Juncal
13-01-73	Esperanza	8 huevos	Juncal
21-01-73	Esperanza	7 huevos	Estero
05-01-74	Esperanza	8 huevos	Estero
04-01-78	Cayastacito	9 huevos	Estero
03-01-87	Esperanza	8 huevos	Juncal
23-12-93	Esperanza	5 huevos	Espadañal
24-12-93	Esperanza	4 huevos	Espadañal
30-12-93	Esperanza	7 huevos	Espadañal
02-02-98	Esperanza	En construcción	Bañado
07-12-01	Villa Roda	4 huevos	Bañado
13-12-01	Villa Roda	4 huevos	Juncal
09-02-02	Villa Roda	4 huevos	Juncal
09-02-02	Villa Roda	2 huevos	Juncal

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	5										5

Fecha	Lugar	Adultos con pichones
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	Adulto con 1 pichón
10-12-90	Cayastá	Pareja con 5 pichones
15-12-90	Cayastá	Pareja con 5 pichones
15-12-90	Cayastá	Adulto con 1 pichón
15-12-90	Cayastá	Adulto con 2 pichones
27-11-91	Gobernador Echagüe	Pareja con 2 pichones
28-11-91	Villa Roda	Pareja con 3 pichones
08-02-92	Esperanza	Adulto con 1 pichón
21-01-94	Río Salado y ruta 4	Pareja con 1 pichón
21-01-94	Río Salado y ruta 4	Pareja con 4 pichones
21-01-94	Río Salado y ruta 4	Pareja con 6 pichones
13-12-01	Villa Roda	Pareja con 5 pichones
09-02-02	Villa Roda	Adulto con 2 pichones
21-12-12	Villa Roda	Pareja con 6 pichones

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-8 días	Pone en días corridos	19-22 días	1-2 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sobre el agua, en esteros, bañados, juncales, cavas.

Características.

Expuesto o semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de juncos, hojas de espadañas, tallos de Duraznillos del agua u otras plantas acuáticas. En un nido había una pequeña rampa.

En el interior puede colocar hojas de otras plantas (Eucaliptus)

Medidas:

Diámetro total : de 20 a 30 cm.

Profundidad : 4 a 8 cm.
Alto : 8 a 25 cm.

HUEVOS

Pone hasta 9 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas castaño claro y oscuro, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 43,5 a 49,7 x 30,9 a 32,9
X= 46,2 x 32,4 (N= 16)
Peso de las cáscaras : de 1,89 a 2,68
X= 2,30 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
145	26-02-71	Esperanza	43,5 x 31,8	1,980
			44,5 x 32,8	2,174
			44,7 x 32,8	2,150
			45,0 x 30,9	2,175
			45,4 x 32,9	1,893
			45,8 x 32,0	2,170
			46,0 x 31,7	2,022
			46,3 x 32,8	2,152
146	05-01-74	Esperanza	46,5 x 31,9	2,685
			46,9 x 32,7	2,657
			47,3 x 32,8	2,628
			47,7 x 32,7	2,525
			47,7 x 32,7	2,469
			47,8 x 32,8	2,569
			48,2 x 32,6	2,279
			49,7 x 32,8	2,549


PICHONES

Descripción. Escudete frontal rojo. Pico rojo con punta amarillenta. Patas negras. Cuerpo cubierto de plumón negro, con tinte verdoso en la parte dorsal. Frente y región periocular con piel azulada.

POLLONA PINTADA *Gallinula melanops*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
04-01-78	Cayastacito	1 pichón	Espadañal
04-01-78	Cayastacito	2 huevos	Juncal
04-01-78	Cayastacito	4 huevos	Juncal
04-01-78	Cayastacito	3 huevos	Juncal
04-12-91	Arias	3 huevos	Juncal

20-04-12. Villa Roda. Pareja con 4 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En juncales o espadañales.

Características.

Oculto o semioculto. Elaborado. Plataforma, con forma de plato hondo. Es construido con juncos, espadañas, canutillos, gramillón.

Medidas :

Diámetro total : de 17 a 20 cm.

Profundidad : 3 cm.

Alto : 8 a 10 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color pardo amarillento con pintas y manchitas castañas y algunas grises, distribuidas por toda la superficie. A veces líneas oscuras. Cáscara brillante.

Medidas y pesos :

De 34,5 a 41,5 x 26,6 a 28

X= 38,7 x 27,2 (N= 9)

Peso de las cáscaras : de 0,95 a 1,4 X= 1,23 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
142	04-01-78	Cayastacito	38,9 x 27,9	1,487
			40,0 x 27,7	1,451
143	04-01-78	Cayastacito	34,5 x 26,6	1,090
			37,5 x 26,7	1,321
			40,3 x 27,9	1,314
			41,5 x 28,0	1,190
144	04-01-78	Cayastacito	37,8 x 26,9	0,980
			38,9 x 26,9	0,958
			39,6 x 26,9	1,058

PICHONES

Descripción.

Pico negro con franjas transversales grisáceas. Patas negras. Cuerpo cubierto de plumón negro.

OBSERVACIONES

El nido localizado en Arias, estaba debajo de uno de Cuervillo de cañada (*Plegadis chihi*)


POLLONA AZUL *Porphyrio martinicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
05-01-79	Candioti	6 huevos	Campo inundado
23-12-93	Esperanza	4 huevos y 3 pichones	Lagunita



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En campos inundados, esteros, bañados, lagunas con vegetación flotante, cavas.

Características.

Oculto. Poco elaborado. Tiene forma de plato. Es construido con tallos y hojas de plantas acuáticas.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 13 cm.

Profundidad : 3 cm.

HUEVOS

Pone hasta 7 huevos.

elípticos o ligeramente ovoidales. De color ocre claro con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie

Medidas y pesos :

De 21,6 a 26,6 x 16,6 a 19,0 X= 23,0 x 17,8 (N= 30)

Peso lleno: 3,3 a 4,7 X= 3,87 (N= 21)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
147	05-01-79	Candioti	36,1 x 27,0	1,116
			36,8 x 26,9	1,055
			37,7 x 27,5	1,098
			38,0 x 27,3	1,074
			38,3 x 27,2	1,198
			38,9 x 27,2	1,081
	23-12-93	Esperanza	40,4 x 28,6	
			41,5 x 28,0	
			41,7 x 28,5	
			41,8 x 27,8	

PICHONES

Descripción.

Pico amarillento, rojo en la base y oscuro en la punta. Cuerpo cubierto de plumón negro. Plumas filamentosas blanquecinas en la cabeza.

OBSERVACIONES

Cortejo.

El 28-12-01, en río Salado y ruta 4, una hembra entreabre las alas, se para casi derecha y engrosa y curva el cuello hacia abajo. Levanta alternativamente las patas. Luego se agacha y el macho subió al dorso y con el pico le tomó las plumas de la nuca. Se produce la cópula. Luego se pusieron de frente, se agachaban y estiraban el cuello, como para que los picos se tocaran.

En otra oportunidad uno quedaba inmóvil, con las alas entreabiertas, luego de frente se agarraban con las patas y posteriormente se dispersaron.

El 01-02-91, en Villa Roda, un ejemplar comía semillas de Talia.


El 03-11-02, en río Salado y ruta 4, un ejemplar comía un Caracol (*Ampulia sp.*)

GALLARETA LIGAS ROJAS *Fulica armillata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 32



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-11-71	Aguará Grande	5 huevos	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	4 pichones naciendo	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	5 pichones naciendo	Juncal
27-10-77	Campo Andino	4 huevos	Laguna con juncal
11-11-86	Teodelina	2 huevos	Juncal
11-11-86	Teodelina	4 huevos y 1 pichón	Juncal

12-11-91	Campo Andino	4 huevos y 1 pichón	Juncal
04-12-91	Arias	4 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal
09-01-92	Campo Andino	3 huevos	Juncal
09-01-92	Campo Andino	1 pichón	Juncal
09-01-92	Campo Andino	3 huevos	Juncal
10-01-92	Isla Verde	5 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
05-02-92	Isla Verde	4 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
05-02-92	Isla Verde	2 huevos	Laguna con juncal
05-02-92	Isla Verde	4 huevos	Laguna con juncal
05-02-92	Isla Verde	5 huevos	Laguna con juncal
05-02-92	Isla Verde	1 pichón	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	2 huevos	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	3 huevos	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	3 huevos	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	6 huevos	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	6 huevos	Laguna con juncal
02-12-92	Wildermuth	7 huevos	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	2 huevos	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	5 huevos	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	6 huevos	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	2 huevos y 2 pichones	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	3 huevos y 2 pichones	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	4 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	4 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	5 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal
31-10-00	Wildermuth	2 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Laguna con juncal

09-01-92. Campo Andino. Varios nidos con y sin rampa.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	5								10	4	9

15-10-2004, Llancanello, nido en construcción

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En esteros y lagunas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos, con forma de plato hondo. Pueden o no tener una rampa de acceso.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 35 cm.

Diámetro interno : 14 a 18 cm.

Profundidad : 4 a 8 cm.

Alto : 14 a 16 cm.

La rampa de 45-50 cm. de largo y 20-25 cm. de ancho.

HUEVOS

Pone hasta 7 huevos.

Ovoidales. De color crema o pardo oliváceo con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 57,2 a 63,7 x 37,8 a 40,9

X= 60,2 x 39,5 (N= 18)

Peso lleno : de 43,4 a 51,3 X= 48,7 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 3,73 a 5,08 X= 4,44 (N= 18)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
150	30-11-71	Aguará Grande	57,2 x 40,0		4,589
			57,3 x 39,9		4,144
			58,2 x 40,9		4,414
			58,2 x 40,5		3,900
			58,8 x 40,8		3,733
151	16-12-73	Aguará Grande	62,3 x 39,8		4,635
			62,4 x 39,7		5,086
			63,0 x 40,4		4,495
			63,7 x 40,2		4,900
824	10-01-92	Isla Verde	59,0 x 38,0		4,8
			60,3 x 38,8		4,8
			60,5 x 37,8		4,5
			61,0 x 38,7		4,2
			62,5 x 39,5		4,3
653	05-02-92	Isla Verde	59,5 x 40,2	51,3	4,7
			59,6 x 38,7	43,4	4,6
			60,0 x 40,0	51,3	4,9
			61,8 x 38,7	49,0	4,5


PICHONES

Descripción. Pico negro con mancha blanca. Escudete rojo, con el extremo posterior puntiagudo. Naranja debajo del pico y en la garganta. Plumón negro. Lados de la corona, piel azul.

GALLARETA ESCUDETE ROJO *Fulica rufifrons*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-11-71	Aguará Grande	7 huevos	Juncal
27-10-77	Campo Andino	5 huevos	Laguna con juncal
27-10-77	Campo Andino	6 huevos	Laguna con juncal
11-11-86	Teodelina	4 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal
11-11-86	Teodelina	2 huevos	Juncal
04-12-91	Arias	5 huevos	Juncal
09-01-92	Campo Andino	1 pichón	Juncal
02-12-92	Wildermuth	6 huevos	Laguna con juncal

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

En lagunas con juncos. Asentados o semiflotantes.

Características.

Ubicación.

Expuesto. Elaborado. Plataforma, con forma de plato hondo. Construido con juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 25 a 30 cm.
Diámetro interno : 13 a 18 cm.
Profundidad : 3 a 4 cm.
Alto : 10 a 12 cm.

HUEVOS

Pone hasta 8 huevos.

Ovoidales. De color ocre o verdosos o pardo oliváceos, con puntos y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 52,2 a 58,5 x 35 a 3,9 X= 54,9 x 38,1 (N= 18)
Peso lleno : de 48 a 50 X= 48,6 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 2,99 a 4,00 X= 3,82 (N= 18)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
155	30-11-71	Aguará Grande	52,2 x 36,8		3,885
			53,2 x 37,4		3,649
			53,7 x 37,3		3,726
			54,7 x 36,9		3,913
			54,8 x 35,0		3,866
			55,2 x 37,5		2,993
			57,9 x 37,0		3,602
156	27-10-77	Campo Andino	54,8 x 38,5		3,797
			56,0 x 39,3		3,994
			57,4 x 38,7		3,896
			57,8 x 39,0		3,972
			58,5 x 38,9		4,007
157	27-10-77	Campo Andino	53,0 x 37,8		3,797
			53,7 x 38,5		3,687
			54,0 x 39,9	48,0	3,940
			54,0 x 39,5	48,5	3,970
			54,5 x 39,6		3,948
			55,2 x 38,6	50,0	3,980


PICHONES

Descripción.
Pico amarillento. Escudete rojizo. Plumón negro.

GALLARETA ANDINA *Fulica ardesiaca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
22-02-79	Abra Pampa	7 huevos	Laguna con juncos
22-02-79	Abra Pampa	2 huevos	Laguna con juncos
22-02-79	Abra Pampa	2 huevos	Laguna con juncos

22-02-79. Abra Pampa. La profundidad de la laguna era de 1 m. en la parte más honda. Varios nidos más, en agua libre y en el juncal ralo.
Los nidos estaban cerca de la costa, con 30 cm. de profundidad, hasta el interior del juncal.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el agua, en lagunas, juncales.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma sólida, de juncos y gramillas. Base ancha con depresión central.

Medidas :

Diámetro total : de 36 a 70 cm.
Diámetro interno : 16 a 20 cm.
Profundidad : 4 a 5,5 cm.
Alto : 17 a 20 cm.

HUEVOS

Pone hasta 7 huevos.

Ovoidales. De color ocre con pintas finas pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 58,2 a 60,8 x 39,4 a 40,4
X= 59,8 x 39,8 (N= 4)
Peso de las cáscaras : de 3,98 a 4,56
X= 4,24 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
148	22-02-79	Abra Pampa	60,3 x 39,4	3,988
			58,2 x 39,4	3,908
149	22-02-79	Abra Pampa	60,8 x 40,4	4,566
			60,0 x 40,3	4,532

GALLARETA CHICA *Fulica leucoptera*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
11-12-72	Aguará Grande	3 huevos y 2 de *H. atricapilla*	Juncal
16-12-73	Aguará Grande	6 huevos	Juncal
09-01-79	Miguel Escalada	3 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal
04-12-91	Arias	5 huevos y 1 de *H. atricapilla* y 1 de *C. maculipennis*	Juncal
03-01-97	Ruta 13 y 98	2 huevos	Juncal
21-10-98	Isla Verde	5 huevos y 1 de *H. atricapilla*	Juncal
31-10-00	Wildermuth	1 huevo	Juncal
31-10-00	Wildermuth	6 huevo	Juncal

24-12-79. Miguel Escalada varios nidos con huevos.
26-11-98. Lago Huechulafquen, en un riacho, un adulto con 2 pichones.
28-11-98. Puelches, varias parejas con pichones.
01-12-00. Garré varios nidos con huevos y con pichones, en lagunas en la orilla de las rutas.
01-12-00. Quemú Quemú, algunos nidos con huevos.
02-12-00. General Villegas, varios nidos con huevos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Esteros, lagunas, ambientes acuáticos en orillas de caminos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Emplea juncos y otras plantas acuáticas.

Medidas :

Diámetro total : de 16 a 30 cm.

Profundidad : 2,5 a 4 cm.

Alto : 12 a 15 cm.

HUEVOS

Pone hasta 8 huevos.

Ovoidales. De color ocre con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 44 a 52,8 x 31 a 34 X= 48,3 x 32,7 (N= 12)

Peso de las cáscaras : de 1,97 a 2,90 X= 2,56 (N= 12)

15-10-2004, Llancanello, nido en construcción

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
152	11-12-72	Aguará Grande	50,2 x 32,9	2,091
			51,9 x 33,0	2,021
			52,8 x 33,2	2,050
153	16-12-73	Aguará Grande	47,2 x 34,0	2,900
			47,7 x 33,2	2,565
			48,3 x 33,2	2,546
			48,4 x 32,8	2,686
			48,9 x 33,6	2,542
			49,0 x 33,5	2,585
154	09-01-79	Miguel Escalada	44,0 x 31,0	2,049
			45,8 x 31,4	1,998
			46,0 x 31,0	1,977

PICHONES

Descripción. Pico amarillento, con el tercio distal rojo. Plumón negro. Cabeza con plumón ralo.

FAMILIA: CHARADRIIDAE


CHORLO CABEZÓN *Oreopholus ruficollis*

07-11-79. Puerto Deseado. Pareja con un pichón.

TERO COMÚN *Vanellus chilensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N				N	N	N	N	N	N	N





Total de nidos : 91

Fecha	Lugar	Contenido	Fecha	Lugar	Contenido
07-10-70	Esperanza	3 huevos	13-08-03	Esperanza	4 huevos
13-10-72	Cayastacito	3 huevos	13-08-03	Esperanza	3 huevos
03-08-73	Cayastacito	3 huevos	13-08-03	Esperanza	3 huevos
03-08-73	Cayastacito	3 huevos	15-08-03	Esperanza	4 huevos
03-01-79	Cayastacito	4 huevos	15-08-03	Esperanza	4 huevos
05-01-79	Candioti	4 huevos	15-08-03	Esperanza	4 huevos
27-10-83	Cayastacito	3 huevos	15-08-03	Esperanza	3 huevos
18-10-86	Llambi Campbell	3 huevos	17-08-03	Esperanza	4 huevos
18-10-86	Llambi Campbell	4 huevos	17-08-03	Esperanza	3 huevos
15-06-89	Esperanza	4 huevos	18-08-03	Esperanza	4 huevos
20-09-89	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	19-08-03	Esperanza	1 huevo
07-10-89	Río Ñirihuau	2 huevos	06-09-03	Esperanza	3 huevos
08-11-89	Los Amores	2 huevos	06-09-03	Esperanza	3 huevos
18-11-89	Laguna del Palmar	4 huevos	15-09-03	Esperanza	2 huevos
18-11-89	Laguna del Palmar	3 huevos	16-09-03	Esperanza	3 huevos
02-10-91	Malabrigo	4 huevos	16-09-03	Esperanza	3 huevos
10-10-91	Colón	4 huevos	16-09-03	Esperanza	3 huevos
12-11-91	Franck	1 huevo	16-09-03	Esperanza	3 huevos
09-12-94	Rincón de Ávila	3 huevos	16-09-03	Esperanza	4 huevos
16-09-95	Rincón de Ávila	2 huevos	16-09-03	Esperanza	4 huevos
14-11-96	Ruta 13 y 36	2 huevos	16-09-03	Esperanza	4 huevos
15-08-98	Empalme San Carlos	3 huevos	16-09-03	Esperanza	4 huevos
17-08-98	Empalme San Carlos	En construcción	20-10-03	Esperanza	4 huevos
17-08-98	Empalme San Carlos	4 huevos	20-08-04	Esperanza	4 huevos
25-08-98	Esperanza	4 huevos	24-08-04	Esperanza	3 huevos
25-08-98	Esperanza	3 huevos	24-08-04	Esperanza	3 huevos
02-09-98	Esperanza	2 huevos	06-09-04	Esperanza	3 huevos
22-09-98	Esperanza	2 huevos	11-09-04	Esperanza	4 huevos
22-09-98	Esperanza	4 huevos	27-09-04	Esperanza	3 huevos

22-09-98	Esperanza	4 huevos	30-10-04	Esperanza	2 huevos
22-09-98	Esperanza	3 huevos	30-10-04	Esperanza	3 huevos
17-10-98	Esperanza	3 huevos	31-10-04	Esperanza	3 huevos
17-10-98	Esperanza	3 huevos	31-10-04	Esperanza	4 huevos
20-01-99	La Camila	1 huevo	31-10-04	Esperanza	3 huevos
05-02-99	Esperanza	3 huevos	15-08-05	Esperanza	2 huevos
15-07-99	Esperanza	2 huevos	15-08-05	Esperanza	3 huevos
17-10-00	Esperanza	1 huevo	20-01-07	Esperanza	2 huevos
12-07-03	San Carlos Centro	2 huevos	03-09-07	Esperanza	3 huevos
13-07-03	Esperanza	4 huevos	03-09-07	Esperanza	3 huevos
30-07-03	Esperanza	2 huevos	20-09-07	Esperanza	4 huevos
01-08-03	Esperanza	3 huevos	20-09-07	Esperanza	4 huevos
09-08-03	Esperanza	4 huevos	09-12-07	Miramar	3 huevos
09-08-03	Esperanza	4 huevos	09-01-09	Esperanza	3 huevos
10-08-03	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	03-09-12	Esperanza	5 huevos
10-08-03	Esperanza	4 huevos	06-11-12	Cayastá	2 huevos
10-08-03	Esperanza	4 huevos			

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	1				1	4	28	24	17	6	2

Contenido

Números de nidos	Contenido
4	1 huevo
1	2 huevos y 1 pichón
1	1 huevo y 1 pichón
13	2 huevos
37	3 huevos
34	4 huevos
1	5 huevos

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
4-6 días, pero es variable	Pone en días corridos generalmente o alternos	25-26 días	Nidífugos

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. En praderas, áreas rurales, parques, orillas de humedales.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación,bordeada de palitos, pastos, tallos de yuyos, materias fecales de bovinos o de equinos. A veces sin materiales, o pueden estar sobre o entre materias fecales de bovinos o de equinos.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 14 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos. Raro 5.

Cónicos o piriformes. De color verdoso, pardo, pardo verdoso o verde oliva, con manchas, pintas y rayitas negras y grises.

Medidas y pesos :

Para *V.ch.lampronotus*

De 41,2 a 51,5 x 31,3 a 35,5 X= 46,2 x 33,2 (N= 42)

Peso lleno : de 20 a 28,0 X= 24,4 (N= 32)
Peso de las cáscaras : 1,625 a 1,980 X= 1,730 (N= 15)

Para *V. ch.chilensis*
De 49,2 a 53,8 x 34,4 a 35,4 X= 51,5 x 34,8 (N= 2)
Peso lleno: 29,7 X= 29,7 (N= 2)
Peso de las cáscaras : 2,3 X= 2,3 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
173	07-10-70	Esperanza	47,2 x 33,1		1,769
			47,8 x 33,4		1,750
			49,1 x 33,0		1,797
174	13-10-72	Cayastacito	47,7 x 33,4		1,700
			48,0 x 33,2		1,625
			48,4 x 33,2		1,677
175	05-01-79	Cayastacito	44,9 x 33,7		1,887
			45,1 x 33,7		1,823
			46,9 x 34,1		1,796
			47,0 x 33,7		1,836
622	27-10-83	Cayastacito	48,0 x 33,9	26,720	1,910
			48,4 x 32,7	24,050	1,950
			48,4 x 34,0	27,154	1,980
503	07-10-89	Río Ñirihuau	49,2 x 34,4	29,7	2,3
			53,8 x 35,4	29,7	2,3
731	18-11-89	Laguna del Palmar	45,9 x 31,8	23,5	1,6
			47,3 x 31,9	24,7	1,6
			49,9 x 32,3	22,6	1,6
	20-08-04	Esperanza	42,0 x 34,0	24,3	
			43,0 x 34,0	24,1	
			43,5 x 34,9	23,0	
			44,5 x 34,0	24,0	
	20-08-04	Esperanza	47,5 x 33,2	24,6	
			49,4 x 34,0	25,5	
			51,5 x 33,0	26,8	
	24-08-04	Esperanza	42,3 x 34,2	23,5	
			47,2 x 33,0	23,2	
			46,3 x 33,2	23,0	
	06-09-04	Esperanza	44,5 x 34,4	25,6	
			45,2 x 34,2	24,1	
			47,4 x 33,2	25,1	
	11-09-04	Esperanza	41,2 x 35,5	28,0	
			44,3 x 32,2	26,3	
			45,2 x 31,3	27,0	
			45,4 x 32,2	27,0	
	27-09-04	Esperanza	45,0 x 34,0	25,7	
			48,8 x 34,0	27,2	
			49,0 x 33,5	25,8	
	31-10-04	Esperanza	47,0 x 33,3	25,7	
			47,0 x 33,5	24,9	
			47,0 x 34,0	26,0	

PICHONES

Los pichones nacen en 24-36 horas.

Descripción
3 días. Ojos marrones. Pico negro. Interior de la cavidad bucal, gris-rosado. Patas grises.

Plumón gris moteado de negro en la parte dorsal y alas (excepto la punta, que es blanca). Plumón de las primarias blanco. Franja oscura donde comienzan las secundarias.

Ventralmente blanco. Franja negra debajo de la nuca. Cuello blanco. Collar pectoral negro más ancho y más notable en los costados.

A los **5** días se nota el espolón naciente.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso	Tibia	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1	-	-	-	-	-	2,4-3,1	3,6-4,1	1,0-1,3
3	-	-	-	-	-	3,4	4,3	1,2
5	-	-	-	-	1,5	3,4	4,3	1,4
11	-	-	-	-	1,5	3,9	4,7	1,5
28	1,2	0,9	1,4	2,3	4	5,9	7,2	2,2

PESOS

Días de vida	Peso (en gramos)
1	18,4-21,5

Pichones pesados : 4

OBSERVACIONES

En Wildermuth Johannes Jenny (Com.pers.) , localizó un nido con 3 huevos propios y l de Pirincho (*Guira guira*).

El 19-12-76 en Esperanza se contaron 90 ejemplares reunidos en un esterito.

El 17-08-98 en Empalme San Carlos se observó una cópula y la construcción del nido y a los 6 días puso el primer huevo. La pareja traía unos tallos de yuyos.

Realizan “paradas” desde tres a varios ejemplares juntos. Estas consisten en marchar con el cuerpo erguido, con pasos rápidos, corren y emiten voces fuertes. Se paran y agachan la cabeza, el pico casi rozando el suelo. Abren y elevan la cola y las alas están entreabiertas.

Corren juntos, a veces algunos levantan vuelo y a los pocos minutos regresan para reiniciar la ceremonia.

Cuando está en el nido y nota un extraño, puede levantarse rápidamente o se levanta y caminando despacio se agacha en distintas lugares para simular que se echa en otros nidos.

Los pichones duermen protegidos bajo el cuerpo de un adulto.

En algunos casos, sobre todo cuando están roturando la tierra, los huevos son corridos de lugar, pero no los afecta, continúan con la incubación.

Algunos ejemplares cuando incuban permiten que el observador se aproxime a pocos centímetros del nido.

Ataca a perros y otros animales cuando está con huevos o con pichones.

Se los ha visto hacer frente a las vacas y ovejas que se aproximan al nido cuendo comen. En estos casos se paran sobre el nido, entreabren las alas y llegan a picotear el morro del animal.

En Esperanza, en un lote de 10 hectáreas se contaron en forma simultánea 8 nidos. Dos nidos estaban separados por 30 m.

Los pichones son depredados por los Caranchos y los Chimangos. Los huevos suelen ser destruidos por las personas y los pichones llevados como mascotas.

TERO SERRANO *Vanellus resplendens*


Fecha	Lugar	
28-12-02	Las Estancias	Pareja con un juvenil

Descripción. Pico negro. Paladar rosado. Patas grisáceas. Uñas negras. Piel oscura.
Cara con puntillado pardo. Cejas crema. Corona marrón claro jaspeada de gris y ocre. Garganta blanquecina. Pecho gris. Abdomen blanco.
Espalda blanca con plumón pardo en la nuca. Dorsalmente plumas marrones con los bordes ocres. Cubiertas alares oscuras (tornasoladas) orilladas de ocre, formando un barrado.
Primarias negras de 7 cm. Secundarias blancas, de 5 cm. Rabadilla con plumón pardo y ocre.
Ventral de la cola blanco, le sigue una barra negra y termina en ocráceo. Las tres plumas externas blancas.

CHORLITO DE COLLAR *Charadrius collaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
01-11-75	Reconquista	3 huevos	Arenal. En isla
01-11-75	Reconquista	2 huevos	Arenal. En isla
31-11-77	Río Paraná (Boca del Yacaré)	2 huevos	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná (Paraná)	2 huevos	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná (Paraná)	3 huevos	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná (Paraná)	3 huevos	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná (Paraná)	3 huevos	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná (Paraná)	3 huevos	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná (Paraná)	2 huevos	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná (Paraná)	2 huevos	Banco de arena
14-12-89	Laguna Setubal	2 huevos	Playa arenosa
09-09-95	Monte Vera	3 huevos	Playa arenosa
18-10-98	Esperanza	3 huevos	En tierra, orilla de río
24-10-98	Esperanza	1 huevos	En tierra, orilla de río
11-11-00	Monte Vera	2 huevos	Banco de arena
11-11-00	Monte Vera	2 huevos	Banco de arena

22-11-77. Río Paraná (Paraná). Pareja con 2 pichones en banco de arena.
01-11-94. Villa Roda. Pareja con un pichón chico, cruzando un camino de tierra.
14-11-96. Río Salado y Ruta 13. Pareja con 2 pichones chicos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. En bancos de arena, playas o islas arenosas, orillas de ríos y de lagunas.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Excavación en el suelo arenoso o salitroso. Sin aporte de materiales.

Medidas :

Diámetro total : de 5 a 8 cm.

Profundidad : de 1 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales o cónicos. De color pardo, ocre u ocre oscuro, con pintas y manchitas pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 26,5 a 30,4 x 20,8 a 22,4 X= 28,1 x 21,4 (N= 16)

Peso lleno : 7 a 7,1 X= 7,05 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,343 a 0,431 X= 0,384 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
176	01-11-75	Reconquista	27,4 x 22,3		0,390
			27,8 x 21,9		0,375
			28,1 x 22,3		0,382
177	01-11-75	Reconquista	26,5 x 21,2		0,347
			26,7 x 20,8		0,343
178	31-11-77	Río Paraná (Boca del Yacaré)	29,9 x 21,9		0,432
			30,4 x 20,9		0,424
179	04-11-78	Río Paraná (Paraná)	27,7 x 21,1		0,393
			27,8 x 22,4		0,331
			28,0 x 21,4		0,431
736	14-12-89	Laguna Setubal	28,7 x 21,9	7,0	0,390
			28,8 x 21,9	7,1	0,390
857	09-09-95	Monte Vera	27,3 x 21,2		0,380
			27,4 x 21,2		0,385
			27,8 x 21,0		0,390
883	24-10-98	Esperanza	29,5 x 21,4		0,385


PICHONES

Descripción

1 día. Plumón crema amarillento con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.

FAMILIA: HAEMATOPODIDAE

OSTRERO COMÚN *Haematopus palliatus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-11-73	Punta Logaritmo	2 huevos	Playa arenosa
26-11-73	Punta Logaritmo	2 huevos	Entre y sobre piedritas
04-11-79	Punta Logaritmo	2 huevos	Playa arenosa
04-11-79	Punta Logaritmo	2 huevos	Entre piedritas

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo arenoso o entre piedras.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Depresión con caparazones de ostras, huesos o piedritas, en la base o en el reborde.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 18 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre o pardo verdoso, con pintas y manchas pardas, grises y negras, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 52 a 58,6 x 37,7 a 40,9

X= 54,3 x 38,9 (N= 12)


Peso de las cáscaras : de 3,143 a 3,490

X= 3,358 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
163	26-11-73	Punta Logaritmo	52,0 x 38,8	3,463
			54,3 x 39,0	3,490
164	04-11-79	Punta Logaritmo	54,5 x 40,4	3,472
			55,8 x 40,8	3,364
165	04-11-79	Punta Logaritmo	52,5 x 38,8	3,143
			52,5 x 38,5	3,193

OSTRERO NEGRO *Haematopus ater*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
27-11-73	Punta Tombo	1 huevo	Suelo arenoso
27-11-73	Punta Tombo	1 huevo	Suelo arenoso
05-11-79	Punta Tombo	2 huevos	Suelo arenoso
07-11-79	Puerto Deseado	2 huevos	Entre piedras en una isla
07-11-79	Puerto Deseado	1 huevos	Entre piedras en una isla

26-11-73. Punta Logaritmo. Pareja con un pichón.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo arenoso o entre piedras. En costas marinas o en islas.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Sin elementos o con alguna piedrita en el borde.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 16 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre, ocre grisáceo o pardo verdoso, con pintas y manchitas grises y pardo oscuro, distribuidas por toda la superficie. Algunos con líneas pardo claro.

Medidas y pesos :

De 54,5 a 60,5 x 40 a 41,3 X= 57,9 x 40,6 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 3,212 a 4,116 X= 3,828 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
168	27-11-73	Punta Tombo	56,5 x 41,2	3,212
169	27-11-73	Punta Tombo	57,3 x 40,4	3,850
170	05-11-79	Punta Tombo	54,5 x 40,7	4,180
			58,3 x 40,7	4,161
171	07-11-79	Puerto Deseado	59,8 x 40,5	3,653
			60,5 x 40,0	3,935
172	07-11-79	Puerto Deseado	58,7 x 41,3	4,114

OSTRERO AUSTRAL *Haematopus leucopodus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
08-11-79	Cancha Carrera	2 huevos	Suelo, en laguna seca, a 50 m. de una ruta
08-11-79	La Esperanza	2 huevos	Suelo, en laguna seca, a 20 m. de una ruta

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En el suelo arenoso o entre piedras. En playas marinas o en lagunas del interior.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Depresión, con o sin algunas piedrita u otro elemento.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre oscuro o verde oliváceo con pintas y manchas pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 51,4 a 57,1 x 39,8 a 40,5

X= 54,7 x 40,1 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 3,028 a 3,528

X= 3,259 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
166	08-11-79	Cancha Carrera	55,9 x 40,5	3,528
			57,l x 40,0	3,439
167	08-11-79	La Esperanza	51,4 x 39,8	3,043
			54,7 x 40,2	3,028

FAMILIA: RECURVIROSTRIDAE

TERO REAL *Himantopus mexicanus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 15

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	2 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	4 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	3 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	3 huevos	Albardón en el medio de una laguna
16-11-72	Cayastacito	2 huevos	Albardón en el medio de una laguna
05-02-92	Isla Verde	2 huevos	Orilla de laguna
05-02-92	Isla Verde	3 huevos	Orilla de laguna
21-10-98	Isla Verde	1 huevo	Orilla de laguna
21-10-98	Isla Verde	3 huevo	Orilla de laguna

21-10-98. Isla Verde. Pareja con 2 pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo. En albardones o en orillas de lagunas, cerca del agua.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de tallos de yuyos o pastos, en la base o en el reborde.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 14 cm.

Alto : 3 a 4 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Cónicos. De color pardo u ocre oscuro, con pintas y manchas pardo oscuro, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 44,6 a 48,9 x 31 a 34 X= 45,3 x 32,5 (N= 11)

Peso lleno : de 22,8 a 23,9 X= 22,9 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 1,4 a 1,7 X= 1,6 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
182	16-11-72	Cayastacito	43,5 x 33,5		1,444
			43,8 x 33,3		1,468
			44,0 x 33,1		1,565
			44,4 x 34,0		1,609

183	16-11-72	Cayastacito	45,6 x 31,0		1,449
			46,8 x 31,0		1,416
829	05-02-92	Isla Verde	48,8 x 31,5		1,7
			48,9 x 33,0		1,7
830	05-02-92	Isla Verde	43,9 x 32,7	22,8	1,5
			44,2 x 33,0	23,2	1,5
			44,6 x 32,4	23,9	1,6

PICHONES

Descripción
Pichón de 5-6 días.
Pico oscuro. Corona y dorso pardo oliváceo con puntos y líneas negras. Ventral blanquecino.

OBSERVACIONES


El 17-09-03 en Esperanza, se observó una cópula.
Cuando tienen pichones y notan un extraño, se apartan simulando tener un ala quebrada y se agachan aleteando. Emiten voces chillonas y fuertes. En el interín los pichones se esconden en huecos, pisadas de animales o entre los pastos, quedando inmóviles.
Los pichones pían antes de salir del huevo.

FAMILIA: SCOLOPACIDAE

BECASINA COMÚN *Gallinago paraguaiae*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N					N	N	N				



Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-07-72	Villa San José	3 huevos	Campo
03-08-73	Cayastacito	3 huevos	Campo
28-07-78	Emilia	3 huevos	Elevación del suelo, en campo inundado
28-07-78	Emilia	2 huevos	Elevación del suelo, en campo inundado
06-08-91	Alejandra	2 huevos	Elevación del suelo, en arrocera
20-01-01	Merlo	2 huevos	Orilla de un arroyo
15-06-02	Matilde	2 huevos	Orilla de bañado

28-07-73. Cayastacito. Adulto con un pichón.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En el suelo. Cerca de ambientes acuáticos (campos inundados, bañados, arroceras)
Características.

Semioculto. Poco elaborado. Depresión forrada con pastos, a veces con reborde.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 12 cm.

Profundidad : 1 a 2,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos. Ovoidales ó cónicos. De color pardo amarillento o crema con pintas y manchitas pardo claro, pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concetradas en el polo mayor. Algunos con manchas y líneas negras.

Medidas y pesos :

De 38,7 a 42,5 x 27,7 a 32,5 X= 40,1 x 29,5 (N= 10)

Peso lleno : 15,7 a 16 X= 15,85 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,841 a 0,907 X= 0,888 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	15-07-72	Villa San José	41,0 x 30,0		
			42,5 x 32,5		
			42,5 x 31,0		
180	03-08-73	Cayastacito	39,2 x 27,7		0,898
			39,8 x 28,9		0,841
			40,3 x 29,3		0,907
181	28-07-78	Emilia	38,7 x 29,3		0,875
			39,7 x 29,0		0,906
807	06-08-91	Alejandra	39,0 x 29,3	15,7	0,900
			39,5 x 28,9	16,0	0,900

PICHONES

Descripción. **1** día. Pico y patas negros. Cuerpo cubierto de plumón negro.

FAMILIA: THINOCORIDAE

AGACHONA CHICA *Thinocorus rumicivorus*

25-01-72. Puerto Deseado. Pareja con 2 pichones.
30-01-74. Río Gallegos. Varias parejas con pichones.
08-11-79. Puerto Deseado. Pareja con 4 pichones.
28-11-00. Península Valdés. Adulto con 1 pichón chico.

Descripción.


3-4 días.
Dorsal gris ocráceo punteado de negro. Ventral blanquecino.

FAMILIA: JACANIDAE

JACANA *Jacana jacana*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 37

Fecha	Lugar	Contenido
24-11-71	Esperanza	4 huevos
01-11-73	Aguará Grande	3 huevos
15-11-75	Aguará Grande	4 huevos
22-11-75	Aguará Grande	4 huevos
11-01-79	Candioti	2 huevos
05-12-83	Cayastacito	3 huevos
26-01-87	Esperanza	4 huevos
27-01-87	Campo Andino	4 huevos
27-01-87	Campo Andino	4 huevos
28-10-89	Esperanza	2 huevos y 2 pichones
08-11-89	Cañada Ombú	3 huevos
09-11-89	Villa Guillermina	2 huevos
22-12-89	Esperanza	3 huevos
03-01-90	Esperanza	4 huevos
12-01-90	Esperanza	4 huevos
08-10-92	Cacique Ariacaiquín	4 huevos
02-12-91	El Laurel	4 huevos
11-12-92	Esperanza	3 huevos
31-01-93	Río Salado y Ruta 4	4 huevos
25-11-94	Esperanza	4 huevos
21-12-94	Esperanza	2 huevos
21-12-94	Esperanza	3 huevos
23-10-95	Cayastá	4 huevos
23-10-95	Cayastá	4 huevos
27-11-95	Villa Ocampo	4 huevos
07-12-96	Esperanza	1 huevos
03-01-97	Aguará Grande	3 huevos
20-01-98	Esperanza	4 huevos
13-01-01	Villa Roda	4 huevos
07-12-01	Esperanza	3 huevos
28-12-01	Villa Roda	4 huevos
21-10-02	Esperanza	4 huevos
21-10-02	Esperanza	4 huevos
14-12-11	Villa Roda	4 huevos
14-12-11	Villa Roda	3 huevos
12-12-12	Villa Roda	4 huevos
20-01-13	Villa Roda	4 huevos

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11									6	8	12

REPRODUCCIÓN

Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
Pone en días alternos	23-25 días	Nidífugos

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En esteros, bañados. Deposita los huevos sobre plantas acuáticas flotantes

Características.

Expuesto. Rudimentario o poco elaborado. En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose un engrosamiento del lugar donde deposita los huevos.

HUEVOS

Pone 4 huevos, raro 5.

Ovoidales. De color pardo amarillento u ocre con líneas negras, distribuidas por toda la superficie. Cáscaras brillante.

Un huevo localizado el 11-01-79 en Candioti, era blanco con pocas manchas castañas y grises, en el polo mayor. La cáscaras pesó 0,284 grs. y no se la tiene en cuenta para los promedios.

Medidas y pesos :

De 28,8 a 31 x 21,8 a 23 X= 29,6 x 22,4 (N= 17)

Peso lleno : de 7,64 a 8,15 X= 7,90 (N= 3)

Peso de las cáscaras: de 0,435 a 0,550 X= 0,520 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	24-11-71	Esperanza	29,5 x 22,2		
			29,5 x 23,0		
			30,0 x 23,0		
			30,0 x 23,0		
158	15-11-75	Aguará Grande	29,8 x 23,0		0,489
			30,0 x 21,8		0,530
			30,7 x 22,8		0,525
			31,0 x 22,8		0,540
159	22-11-75	Aguará Grande	28,6 x 22,2		0,498
			28,8 x 22,2		0,510
			29,0 x 22,3		0,502
			29,6 x 22,8		0,519
160	11-01-79	Candioti	28,7 x 22,0		0,435
			30,3 x 22,3		0,284
630	05-12-83	Cayastacito	29,0 x 22,6	8,000	0,560
			29,6 x 22,5	7,640	0,550
			29,9 x 22,7	8,150	0,510

PICHONES

Fecha	Lugar	Observación
22-11-75	Aguará Grande	Pareja con 3 pichones y otra con 4
27-01-87	Campo Andino	Pareja con 3 pichones y otra con 4
27-01-87	Llambi Campbell	Pareja con 3 pichones
18-03-88	Calchaquí	Adulto con 3 pichones
11-01-89	Esperanza	Pareja con 3 pichones
28-01-89	Esperanza	Adulto con 3 pichones y otro con 4
23-04-89	Esperanza	Pareja con 3 pichones
02-12-89	Cayastá	Adulto con 4 pichones
07-01-90	Esperanza	Pareja con 3 pichones
15-12-90	Cayastá	Adulto con 2 pichones
18-12-90	Esperanza	Adulto con 4 pichones
18-12-90	Esperanza	Adulto con 4 pichones
02-12-91	El Laurel	Adulto con 3 pichones
26-11-91	Villa Roda	Pareja con 2 pichones
06-12-91	Yeso Oeste	Pareja con 1 pichón
08-02-92	Esperanza	Adulto con 1 pichón
08-02-92	Esperanza	Adulto con 2 pichones
08-02-92	Esperanza	Adulto con 4 pichones
08-02-92	Esperanza	Adulto con 5 pichones
11-12-92	Esperanza	Adulto con 2 pichones
07-12-96	Esperanza	Pareja con 3 pichones
20-11-01	Villa Roda	Adulto con 4 pichones
28-12-01	Río Salado y Ruta 4	Adulto con 3 pichones
28-12-01	Río Salado y Ruta 4	Adulto con 4 pichones
28-12-01	Río Salado y Ruta 4	Adulto con 4 pichones

Descripción.

Pichón de 1-2días. Pico claro. Dorsal franjas pardas y canelas. Corona canela. Línea ocular oscura. Ventralmente blanquecino.

OBSERVACIONES

Una cópula duró un minuto.


Cuando están con los pichones, ante la presencia de un extraño, realizan ceremonias de distracción. Estas consisten en simular estar heridos, abren las alas, se agachan y aletean, emitiendo fuertes y chillonas voces. En ese interín los pichones se ocultan entre la vegetación o se sumergen, dejando solamente el pico fuera del agua. Cuando desaparece el peligro, los padres con voces de llamado los reúnen nuevamente.

FAMILIA: ROSTRATULIDAE

AGUATERO *Nycticryphes semicollaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N





Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
29-10-75	Cayastacito	2 huevos	Entre pastos, lejos del agua
08-01-79	Candioti	2 huevos	Entre pastos, cerca de campo inundado

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Plataforma plana de pastos. A veces entremezclados con barro.

Expuesto. Poco elaborado.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.

Alto : 2 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, cubriendo toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 33,4 a 35,9 x 23,7 a 24

X= 34,6 x 23,8 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,650 a 0,733

X= 0,701 (N= 4)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
161	29-10-75	Cayastacito	33,4 x 23,8	0,733
			33,7 x 23,7	0,650
162	08-01-79	Candioti	35,5 x 23,9	0,725
			35,9 x 24,0	0,709

FAMILIA: STERCORARIIDAE

ESCÚA PARDA *Stercorarius antarcticus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N





Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
27-11-73	Punta Tombo	2 huevos	Suelo arenoso
27-11-73	Punta Tombo	2 huevos	Suelo arenoso
27-11-73	Punta Tombo	1 huevo	Suelo arenoso
27-11-73	Punta Tombo	1 huevo	Suelo arenoso
05-11-79	Punta Tombo	1 huevo	Suelo cerca de una piedra
05-11-79	Punta Tombo	1 huevo	Suelo

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

Profundidad : 1 a 3,5 cm.

NIDO

Nidifica solitariamente o en colonia con nidos dispersos

Ubicación.

En el suelo arenoso o entre piedras.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 25 cm.

HUEVOS

Pone 1 ó 2 huevos.

Ovoidales. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas y pesos :

De 70,6 a 77 x 48,3 a 51

X= 72,5 x 49,8 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 5,864 a 7,220

X= 6,953 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
184	27-11-73	Punta Tombo	70,8 x 49,9	7,197
			71,6 x 48,3	5,864
185	05-11-79	Punta Tombo	77,0 x 50,3	7,220
186	05-11-79	Punta Tombo	70,6 x 51,0	7,110

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ *Chroicocephalus maculipennis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de colonias : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
11-12-72	Azul	Huevos y pichones	Juncal
25-10-74	Melincué	Huevos	Islote
22-12-81	Morteros (1)	Huevos y pichones	Juncal
04-12-91	Arias (2)	Huevos y pichones	Juncal
07-11-94	Isla Verde	Huevos	Juncal

(1). Dos nidos estaban parasitados por *Heteronetta atricapilla*
(2). Colonia con unos 350-400 nidos. Un nido tenía 1 huevo de *Heteronetta atricapilla* y un huevo estaba depositado en un nido de *Fulica leucoptera.*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias en juncales o islotes.

Ubicación.

Apoyados en embalsados, en el suelo o sostenidos entre juncos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos o de palitos. Internamente tallos de yuyos o pajas.

Medidas :

Diámetro total : de 26 a 30 cm.
Diámetro interno : de 12 a 16 cm.
Profundidad : de 3 a 5,5 cm.
Alto : 14 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color pardo verdoso o verde oliváceos, con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos presentan líneas y otros tienen las manchas más concentradas hacia el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 47,8 a 54,6 x 34,5 a 38,8
X= 51,3 x 36,2 (N= 14)
Peso de las cáscaras : de 1,569 a 2,478
X= 1,988 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
193	11-12-72	Azul	47,8 x 35,4		1,898
			49,7 x 35,6		1,925
			52,0 x 35,2		1,969
194	25-10-74	Melincué	49,7 x 37,6		2,478
			50.0 x 34,5		2,002
			50,4 x 38,8		1,569
195	22-12-81	Morteros	51,8 x 37,3		2,160
			53,4 x 37,0		2,209

196	22-12-81	Morteros	51,1 x 36,5	2,180
			52,0 x 36,1	2,262
197	22-12-81	Morteros	54,1 x 36,3	2,337
			54,6 x 35,3	2,164
198	22-12-81	Morteros	51,0 x 35,0	1,925
			54,8 x 36,7	1,715

PICHONES


Descripción. Dorsalmente ocráceo amarillento con manchas y estrías oscuras. Ventral blanquecino.

GAVIOTA CAPUCHO GRIS *Chroicocephalus cirrocephalus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Total de colonias : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
25-10-74	Melincué	Huevos y pichones	Islote

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, en esteros o en islas.

Ubicación.

En el suelo, en islote.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos de yuyos, pajas.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 24 cm.

Profundidad : 1 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color ocre verdoso con pintas y manchitas grises y castañas, distribuidas por toda la superficie. Algunos presentan líneas.

No existe uniformidad en el color de base y algunos carecen de manchas.

Medidas y pesos :

De 51,8 a 55 x 39,5 a 40,5

X= 53,3 x 39,8 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 2,530 a 2,719

X= 2,531 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
191	25-10-74	Melincué	51,8 x 39,5		2,600
			52,8 x 39,7		2,537
			53,0 x 39,5		2,463
192	25-10-74	Melincué	55,0 x 40,3		2,589
			53,7 x 40,5		2,530
			53,9 x 39,6		2,719

PICHONES

Descripción. Dorsal crema amarillento con manchas pardas. Ventral blanquecino.

GAVIOTA COCINERA *Larus dominicanus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



Total de colonias : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-11-73	Isla de los Pájaros	2, 3 y 4 huevos	Isla
27-11-73	Punta Tombo	2 y 3 huevos	Playa marina
25-10-74	Melincué	Huevos y pichones	Islote
04-11-79	Isla de los Pájaros	1 a 3 huevos	Isla
07-11-79	Puerto Deseado	1 a 3 huevos	Isla

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias.

Ubicación.

En el suelo, en playas marinas, islotes en lagunas o isla marinas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Emplea algas, pastos, plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 18 a 25 cm.

Profundidad : 1 a 4 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color oliváceo u ocre oliváceo con pintas y manchas pardas, castañas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos con líneas oscuras.

Medidas y pesos :

De 69,2 a 75,8 x 47 a 50,2

X= 72,2 x 48,9 (N= 10)

Peso de las cáscaras : de 5,892 a 6,813

X= 6,249 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
187	27-11-73	Punta Tombo	71,7 x 47,5	6,432
			72,7 x 50,2	6,813
			75,8 x 49,2	5,748
188	04-11-79	Isla de los Pájaros	70,4 x 48,5	5,892
			70,5 x 48,0	6,200
			73,0 x 49,5	6,474
189	07-11-79	Puerto Deseado	69,2 x 47,0	6,170
			71,0 x 48,7	6,537
			72,0 x 50,2	6,251
190	07-11-79	Puerto Deseado	75,8 x 50,2	6,303

PICHONES

Descripción. Pico oscuro con punta clara. Plumón grisáceo amarillento. Cabeza ocrácea con manchas y puntos pardo oscuro. Ventral blanquecino.


OBSERVACIONES

07-11-79. Puerto Deseado. Pobladores locales sacaban huevos para consumo.

GAVIOTÍN CHICO COMÚN *Sternula superciliaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de colonias : 4

Total de nidos solitarios . 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-11-75	Reconquista	2 huevos	Banco de arena en isla
15-11-75	Reconquista	3 huevos	Banco de arena en isla
28-11-75	Reconquista	1 huevo	Banco de arena en isla
28-11-75	Reconquista	3 huevos	Banco de arena en isla
04-10-77	Río Paraná (Paraná)	Huevos (1)	Banco de arena
31-10-77	Río Paraná (Paraná)	Huevos (2)	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná (Paraná)	Huevos (3)	Banco de arena
23-10-81	El Cerro	2 huevos	Banco de arena
21-01-87	Colón	Pichones (4)	Banco de arena
10-11-94	Río Paraná. (La Paz)	Huevos	Banco de arena

(1). Colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger*
(2). Colonia junto a nidos de *Rynchops niger*. Un pescador recolectó casi todos los huevos de esta colonia.
(3). Colonia con 20 nidos.
(4). Colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger*. La creciente del río la destruyó.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces solitario. Forma colonias junto a otras especies.

Ubicación.

En el suelo. En arenales en islas o en bancos de arena en los ríos.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Escavación.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 13 cm.

Profundidad : 2 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 30,4 a 34 x 23,5 a 25

X= 31,6 x 24,1 (N= 13)

Peso de las cáscaras : de 0,520 a 0,614

X= 0,566 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	15-11-75	Reconquista	30,4 x 23,8	0,614
			31,0 x 24,8	0,578
			32,3 x 24,5	0,539
	28-11-75	Reconquista	32,0 x 24,0	
			32,0 x 24,0	
			34,0 x 24,0	
	31-10-77	Río Paraná (Paraná)	31,0 x 25,0	

			31,5 x 23,5	
			33,0 x 25,0	
206	31-10-77	Río Paraná (Paraná)	31 x 24,4	0,586
207	31-10-77	Río Paraná (Paraná)	30,8 x 24,1	0,536
			31,0 x 23,5	0,520
			31,5 x 23,6	0,537


PICHONES

Descripción. Plumón dorsalmente ocráceo o crema con escasas estrías y manchitas oscuras. Ventralmente blanquecino.

ATÍ *Phaetusa simplex*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N						N	N	N	N	N	N



Total de colonias : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
22-11-77	Río Paraná. (Paraná) (1)	1 huevo	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná) (1)	2 pichones	Banco de arena
21-01-87	Colón (1)	3 huevos	Banco de arena
21-01-87	Colón (1)	2 pichones	Banco de arena
21-01-87	Colón (1)	1 pichón	Banco de arena
10-11-94	Río Paraná (La Paz) (2)	Huevos y pichones	Banco de arena
26-08-95	Río Paraná (Goya) (3)	Huevos y pichones	Banco de arena

(1). Nidos en una colonia de *Sterna superciliaris y Rynchops niger*. (Próximo a la isla Chapetón)
(2). Isla Curuzú Chalí. La creciente destruyó muchos nidos.
(3). Isla Yaguareté. Colonia con unos 200 nidos, con 1 a 3 huevos, algunos con 4 y uno con 5. Había además unos pocos nidos de *Rynchops niger.*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.

Ubicación.

En el suelo, en bancos de arena.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Medidas :

Diámetro total : de 21 a 23 cm.

Profundidad : 3 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3, a veces 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color crema o verdoso con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 48 a 49,5 x 36 a 37

X= 48,5 x 36,3 (N= 4)

Peso de las cáscaras: de 1,80 a 1,90

X= 1,85 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
199	22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	48,3 x 36,0	1,881
660	21-01-87	Colón	48,0 x 36,3	1,9
			48,5 x 37,0	1,8
			49,5 x 36,4	1,9

PICHONES

Descripción. Pico claro. Cuerpo cubierto de plumón crema (color arena)

OBSERVACIONES


A las mojarritas que traían para alimentar a los pichones, les cortaban la cabeza, antes de dárselas.

GAVIOTÍN SUDAMERICANO *Sterna hirundinacea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de colonias : 2



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-01-72	Río Grande	Huevos	Costa marina
26-11-73	Isla de los Pájaros	Huevos y pichones	Islote

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias.

Ubicación.

En el suelo. En islotes o playas marinas.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, a veces aporta palitos, tallos de yuyos o fibras vegetales.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.

HUEVOS

Pone 1 ó 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.

No hay uniformidad en el color de base ni en la forma y distribución de las manchas.

Medidas y pesos :

De 47,5 a 50,3 x 32,7 a 35,7

X= 48,8 x 34,1 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 1,757 a 1,937

X= 1,847 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
200	30-01-72	Río Grande	48,3 x 32,7	1,757
			50,3 x 35,4	1,937
	30-01-72	Río Grande	48,5 x 33,3	
			49,4 x 33,6	
	30-01-72	Río Grande	47,5 x 35,7	

PICHONES

Descripción. Dorsalmente pardusco con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.


OBSERVACIONES

30-01-72. Río Grande. Colonia entre piedras, a 30 metros del mar, con unos 50 nidos. Nidos muy próximos unos de otros (aproximadamente a 1 m.). Algunos nidos no tenían materiales y los huevos estaban puestos sobre las piedritas.

GAVIOTÍN LAGUNERO *Sterna trudeaui*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de colonias: 1 - Total de nidos solitarios. 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
01-11-74	Aguará Grande (1)	Huevos	Embalsado en una laguna
22-12-81	Morteros (2)	2 huevos	Embalsado en una laguna

(1). Colonia con 10 nidos, seis con 3 huevos, tres con 2 y uno con 1.
(2). Nido solitario.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces solitariamente.

Ubicación.

Sobre embalsados, en lagunas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Emplea tallos y hojas de plantas acuáticas.

Medidas :

Diámetro total : de 22 a 30 cm.

Diámetro de la depresión central: 7 a 10 cm.

Profundidad : de 1,5 a 3 cm.

Alto : de 9 a 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color pardo castaño o pardo oliváceo, con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 39,4 a 43 x 29,5 a 32,2

X= 41,6 x 30,8 (N= 8)

Peso de las cáscaras : de 1,002 a 1,248

X= 1,145 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
203	01-11-74	Aguará Grande	40,9 x 31,5		1,209
			41,0 x 32,2		1,299
			42,8 x 31,8		1,248
	01-11-74	Aguará Grande	42,5 x 31,0		
			42,5 x 31,0		
			43,0 x 30,0		
204	22-12-81	Morteros	39,4 x 29,5		1,080
			41,1 x 30,0		1,002

GAVIOTÍN PICO AMARILLO *Thalasseus sandvicensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de colonias: 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-11-73	Isla de los Pájaros	Huevos y pichones	Islote

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Medidas :.

Diámetro total : de 11 a 15 cm.

Profundidad : de 1,5 a 2 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Ovoidales. De color blanco o crema blanquecino con pintas y manchas grises y pardo oscuro, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :.

De 52,8 x 35,5 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 2,242 (N= 1)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
210	26-11-73	Isla de los Pájaros	52,8 x 35,5	2,242

PICHONES

Descripción. Plumón blanquecino amarillento con puntos y estrías oscuras, dorsalmente. Ventralmente blanquecino.

GAVIOTÍN REAL *Thalasseus maximus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de colonias : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
26-11-73	Isla de los Pájaros	Huevos y pichones	Islote

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 15 cm.

Profundidad : 1,5 a 2 cm.

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Ovoidales. De color crema o verde pálido con pintas y manchitas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 60 a 65,1 x 43,6 a 45,8

X= 62,5 x 44,7 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 3,969 a 4,846

X= 4,407 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
208	26-11-73	Isla de los Pájaros	60,0 x 43,6	3,969
209	26-11-73	Isla de los Pájaros	65,1 x 45,8	4,846

PICHONES


Descripción . Dorsalmente blanquecino con manchas negras. Ventral blanco.

FAMILIA: RYNCHOPIDAE

RAYADOR *Rynchops niger*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N						N	N	N	N	N	N



Total de colonias : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
04-10-77	Río Paraná (Paraná) (1)	Huevos y pichones	Banco de arena
31-10-77	Río Paraná (Paraná)	1 huevo	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	4 huevos	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	2 pichones	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	4 huevos	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	3 huevos	Banco de arena
22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	1 pichones	Banco de arena
04-11-78	Río Paraná. (Paraná)	Huevos (10 nidos)	Banco de arena
23-10-81	Río Paraná. (Paraná)	Huevos (3 nidos)	Banco de arena
21-01-87	Colón (2)	Huevos y pichones	Banco de arena
10-11-94	Río Paraná. (La Paz)	Pichones	Banco de arena
26-08-95	Río Paraná. (Goya) (3)	Huevos y pichones	Banco de arena

(1). Nidos junto a *Sterna superciliaris* y *Phaetusa simplex.*
(2). Colonia junto a *Sterna superciliaris* y *Phaetusa simplex.*
(3). Colonia junto a *Phaetusa simplex.*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.
Ubicación. En el suelo. En bancos de arena, en ríos.
Características.
Expuesto. Poco elaborado. Excavación.
Medidas :
Diámetro total : de 15 a 25 cm.
Profundidad : 3 a 5 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.
Ovoidales. De color crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Uno de los huevos tiene base amarillenta.
Medidas y pesos :
De 42,5 a 45,7 x 30,8 a 34,5
X= 44,7 x 33,2 (N= 13)
Peso de las cáscaras : de 1,225 a 1,698
X= 1,528 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	31-10-77	Río Paraná (Paraná)	45,0 x 34,0		
211	22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	42,5 x 32,7		1,370
			44,0 x 32,5		1,393
			45,0 x 31,3		1,225
			45,5 x 30,8		1,346

212	22-11-77	Río Paraná. (Paraná)	43,3 x 34,5	1,668
			43,7 x 33,3	1,688
			45,3 x 33,6	1,510
			45,7 x 33,3	1,698
	04-11-78	Río Paraná. (Paraná)	45,2 x 33,0	
			45,5 x 33,5	
			45,7 x 34,5	
213	23-10-81	Río Paraná. (Paraná)	45,2 x 33,0	1,609
659	21-01-87	Colón	44,0 x 33,2	1,600
			44,4 x 31,4	1,500
			45,7 x 32,8	1,500

PICHONES

Descripción

Pico rojizo. Dorsalmente crema amarillento moteado de negruzco. Ventral blanquecino.

FAMILIA: COLUMBIDAE

TORCACITA COLORADA *Columbina talpacoti*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-02-73	Puerto Rico	2 huevos	Arbusto	2,00
14-10-81	Santo Pipó	2 huevos	Arbusto	2,30
14-10-81	Santo Pipó	2 huevos	Arbusto	2,50
27-11-95	Villa Ocampo	2 pichones	Tala	2,30

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, arbustos o enredaderas. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajitas y/o plumitas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 9 cm.

Alto : 2 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 21 a 23,6 x 16,7 a 17,8 X= 22 x17,1 (N= 6)

Peso lleno : 2,60 a 3 X= 2,84 (N= 4)

Peso de las cáscaras: de 0,190 a 0,235 X= 0,222 (N= 6)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
225	10-02-73	Puerto Rico	23,4 x 17,8		0,224
			23,6 x 17,6		0,224
611	14-10-81	Santo Pipó	21,2 x 16,7	2,851	0,198
			21,7 x 17,5	2,946	0,235
	14-10-81	Santo Pipó	21,0 x 16,7	2,602	0,190
			21,3 x 16,8	3,000	0,200

TORCACITA COMÚN *Columbina picui*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



Total de nidos : 242

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-10-70	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
28-04-74	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
04-04-77	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,00
31-08-79	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,50
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,60
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,50
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,80
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,00
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,40
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,70
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
19-01-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
11-12-82	Villa Elisa	2 huevos	Asiento de un arado	1,00
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,80
26-10-88	Esperanza	2 huevos	Tirantes de una galería	3,00
05-11-88	Llambi Campbell	2 huevos	Chañar	2,10
04-12-88	Cayastá	2 huevos	Ubajay	2,00
04-12-88	Cayastá	2 huevos	Timbó	5,00
17-01-89	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,80
11-02-89	Cululú	2 huevos	Curupí	3,00
17-02-89	Llambi Campbell	2 pichones	Chañar	2,40
18-02-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,60
22-02-89	Empalme San Carlos	2 huevos	Cina cina	2,50
27-07-89	Esperanza	2 huevos	Naranjo	2,00
14-08-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,40
14-08-89	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00
14-08-89	Esperanza	2 pichones	Tala	1,70
14-08-89	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00
14-08-89	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,50
26-08-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
06-09-89	Esperanza	2 huevos	Pino	3,00
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
15-09-89	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,30
15-09-89	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,90
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Chilca	1,10
23-09-89	Esperanza	En construcción	Paraíso	2,60
23-09-89	Esperanza	1 huevo	Tala	1,30
23-09-89	Esperanza	1 pichón	Tala	1,30
23-09-89	Esperanza	2 huevos	Enredaderas	0,80
23-09-89	Esperanza	2 pichones	Tala	1,00
26-09-89	Arroyo Ceibal	2 huevos	Ciruelo	2,40
06-10-89	Esperanza	2 huevos	Garabato	1,80
27-10-89	Esperanza	2 huevos	Tala	0,60
27-10-89	Esperanza	2 pichones	Tala	1,20
27-10-89	Esperanza	2 pichones	Curupí	1,80
31-10-89	Soledad	2 pichones	Primavera	2,00
31-10-89	Soledad	1 pichón	Tala	1,00
05-11-89	Esperanza	1 huevo	Ombú	2,20
28-11-89	Esperanza	2 huevos	Ombú	2,50

22-12-89	Esperanza	2 huevos	Paraíso	3,50
09-10-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
27-10-90	Esperanza	2 pichones	Aromo	3,50
02-11-90	Morteros	2 huevos	Cactus	4,50
06-11-90	Esperanza	2 pichones	Tuna	0,80
26-11-90	Villa Santa Isabel	2 pichones	Arbusto	2,00
30-11-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,30
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	2 pichones	Aromo	1,40
15-12-90	Campo Andino	1 huevo y 1 pichón	Ombú	1,80
02-12-91	Grutly	2 huevos	Arbusto	1,90
12-01-91	Grutly	2 huevos	Chañar	2,20
18-01-91	Laguna del Platero	2 huevos	Tala	1,60
12-11-91	Campo Andino	2 huevos	Seibo	2,00
16-01-92	Monte Vera	2 huevos	Aromo	1,20
16-10-92	Esperanza	2 pichones	Curupí	2,70
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,20
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,50
16-10-92	Esperanza	2 pichones	Tala salada	1,00
16-11-92	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,50
04-10-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,00
04-10-93	Esperanza	2 huevos	Tuna	0,90
05-12-93	Esperanza	2 huevos	Matorral	1,50
09-11-94	Esperanza	3 huevos	Matorral	1,40
01-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,00
08-09-98	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,40
08-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
08-09-98	Esperanza	2 pìchones	Tala salada	1,50
11-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,90
15-09-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,70
16-09-98	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	2,10
16-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar (caido)	0,60
19-09-98	Esperanza	1 pichón	Acacia negra	2,20
19-09-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,20
19-09-98	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,00
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
21-09-98	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	2,30
22-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
26-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
26-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala	2,10
26-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala salada	1,60
26-09-98	Esperanza	1 huevo	Curupí (rama quebrada)	0,40
26-09-98	Esperanza	2 pichones	Tala	1,70
26-09-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,20
29-09-98	Esperanza	Sin postura	Curupí	2,20
29-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00

29-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,00
29-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
30-09-98	Esperanza	2 pichones	Tala del indio	1,00
30-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,50
30-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,15
30-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,70
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,80
01-10-98	Esperanza	1 huevo	Tuna	0,30
01-10-98	Esperanza	1 pichón	Algarrobo	1,40
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,40
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,10
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,00
03-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,50
08-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,00
08-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,00
12-10-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,90
12-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,10
13-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,50
13-10-98	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	1,40
13-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
14-10-98	Esperanza	2 huevos	Espartillo	0,30
14-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala del indio	1,40
14-10-98	Esperanza	1 huevo	Aromo (caido)	0,50
15-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,00
15-10-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	0,70
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,10
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Semidestruido de *Furnarius rufus*	3,70
19-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
19-10-98	Esperanza	2 huevos	Molle	1,60
24-10-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,00
24-10-98	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,30
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,10
25-10-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,30
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,20
04-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
06-11-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,40
06-11-98	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	1,90
06-11-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,10
09-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,40
10-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
14-11-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	1,60
14-11-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	0,70
25-11-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,70
25-11-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	0,40
30-11-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,80
01-12-98	Esperanza	2 pichones	Tala del indio	1,50

01-12-98	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	1,80
01-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
01-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Cina cina	1,70
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
03-12-98	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	1,50
03-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar (caido)	0,40
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
07-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
07-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
09-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
12-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,30
17-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
17-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	2,60
17-12-98	Esperanza	2 pichones	Tala	1,90
17-12-98	Esperanza	2 pichones	Zazaparrilla colorada	2,60
17-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,50
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,80
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,10
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	0,70
28-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,90
28-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
28-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
28-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,20
30-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,40
04-01-99	Esperanza	2 pichones	Curupí	2,40
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,60
07-01-99	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,60
07-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	2,80
09-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
12-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
12-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
14-01-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,70
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,10
22-01-99	Esperanza	1 huevo	Aromo	1,60
26-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
26-01-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,80
26-01-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,10
02-02-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
02-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
02-02-99	Esperanza	En construcción	Tala	1,90
08-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,70
08-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,40
08-02-99	Esperanza	1 huevo	Tala salada	0,60
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
02-03-99	Esperanza	En construcción	Tala	1,70

04-03-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
04-03-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,45
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,40
13-03-99	Esperanza	2 pichones	Carne gorda	1,70
13-03-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,20
07-04-99	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,00
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
28-10-00	Esperanza	2 huevos	Mora blanca	2,60
28-10-00	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,60
13-12-01	Esperanza	2 huevos	Tuna	1,00
30-12-01	Esperanza	2 pichones	Curupí	2,40
26-10-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
18-11-02	Esperanza	Sin postura	Acacia negra	2,10
17-01-03	Esperanza	2 pichones	Poste de alambrado	1,50
20-01-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,40
17-02-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
03-03-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
10-04-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
17-05-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
03-06-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
03-07-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
10-08-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
10-08-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
04-09-03	Esperanza	En construcción	Tala	2,60
30-10-03	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,00
14-11-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,60
14-11-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
24-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
13-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
13-12-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
14-12-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,60
19-12-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,70
19-12-03	Esperanza	Sin postura	Algarrobo	1,40
21-12-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
22-12-03	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	6,00
22-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
22-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
05-01-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
05-01-04	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,70
07-01-04	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
34	11	14	5	1	1	2	8	35	58	25	48

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
4-6 días pero puede ser variable	Pone en días alternos	12 días	12-13 días

NIDO Y HUEVOS

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Chañar	84	Matorral	2	Mora blanca	1
Tala	33	Cina-cina	2	Seibo	1
Curupí	21	Paraíso	1	Zarzaparrilla	1
Aromo	18	Enredadera	1	Garabato	1
Quebracho blanco	15	Espartillo	1	Sombra de toro	1
Algarrobo	15	Pino	1	Ciruelo	1
Tala salada	8	Cactus	1	Naranjo	1
Tala del indio	6	Chilca	1	Primavera	1
Arbusto	6	Molle	1	Tirante	1
Acacia negra	4	Carne gorda	1	Asiento de arado	1
Tuna	4	Ubajay	1	Poste de alambrado	1
Ombú	3	Timbó	1		

NIDO

Ubicación.

A baja y mediana Altura (en m.). Sostenido en ramas de árboles, arbustos, matorrales, enredaderas, cactáceas, sobre plataformas de barro o de palitos de nidos abandonados por otras aves, tirantes o ladrillos en construcciones o sobre postes.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de tallos de yuyos, gramíneas, raicillas. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 10 cm.

Profundidad : 0,50 cm.

Alto : 2 a 2,5 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,30 m

Nido más alto : 4,70 m

HUEVOS

Pone 2, raro 3 huevos.

Ovoidales o elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos:

De 21,6 a 26,6 x 16,6 a 19, X= 23 x 17,8 (N= 30)

Peso lleno: 3,3 a 4,7 X= 3,87 (N= 21)

Peso de las cáscaras : de 0,200 a 0,249 X= 0,222 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	30-10-70	Esperanza	23,0 x 17,5		
			23,0 x 17,0		
222	04-04-77	Esperanza	21,8 x 17,7		0,200
			22,7 x 17,0		0,210
223	31-08-79	Esperanza	23,0 x 18,5		0,210
			23,4 x 17,8		0,229
224	19-01-82	Esperanza	22,6 x 17,7		0,238
			25,0 x 18,1		0,249
	11-09-04	Esperanza	22,2 x 18,3	3,7	
			23,0 x 18,5	3,6	
	21-09-04	Esperanza	24,5 x 17,5	3,7	
			25,0 x 18,0	4,0	
	22-09-04	Esperanza	23,0 x 18,0	4,1	
			23,0 x 18,0	4,3	
	24-09-04	Esperanza	22,5 x 18,7	3,6	
			23,5 x 18,0	3,9	

27-09-04	Esperanza	24,0 x 17,0	3,7
		25,0 x 18,0	4,0
30-09-04	Esperanza	23,5 x 18,0	3,9
		22,2 x 18,5	4,1
30-09-04	Esperanza	22,5 x 18,5	3,5
		22,2 x 18,0	3,7
07-10-04	Esperanza	22,2 x 16,6	3,4
		21,6 x 18,0	3,7
21-10-04	Esperanza	22,7 x 18,7	3,3
		23,3 x 18,7	3,6
21-10-04	Esperanza	23,7 x 17,0	3,4
		24,4 x 17,7	3,6
26-10-04	Esperanza	22,0 x 18,0	3,5
		26,6 x 19,0	4,7

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico claro con banda subapical negra y punta blanca. Cavidad bucal rosada. Abundante plumón crema. Patas grises.

3 días.
Ojos cerrados. Mandíbula gris. Maxilar claro. Anillo negro casi en la punta. Piel morada, ventralmente es amarillenta. Plumón crema.
6 días.
Abre los ojos. Aparecen las láminas en alas y cola. Ventralmernte plumas claras.
8 días.
Cañones alares grises. Láminas de las plumas secundarias orilladas de ocráceo. Láminas de las plumas primarias oscuras. Cubiertas alares orilladas de blanquecino. Ventralmente blanquecina. Cubiertas menores marrones. Vainas y láminas de las plumas externas de la cola blancas.
Se nota más la punta del pico blanquecina. En la cola cañones chicos, los externos blancos. Plumón cremoso.
9 días.
La base de la cola gris y la mitad terminal de las plumas externas, blanco.
11 días.
Plumas externas de la cola blancas. Alas : primarias oscuras con blanco.
Si se lo molesta vuela.


Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1	-	-	-	-	-	1,0	1,2	0,5
6	2	-	1,8	-	1	1,6	2,2	0,8
8	2,4	1,0-1,3	1,8	0,7	1,8	1,7	2,6	1

PALOMA DOMÉSTICA *Columba livia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N	N	N

Total de nidos observados : 6



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-79	Esperanza	2 huevos	Caja sobre un techo	5,00
04-10-79	Esperanza	2 huevos	Tarro	4,00
20-10-89	Esperanza	2 huevos	Sobre ladrillo de una pared	4,00
05-11-89	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Arriba de un techo	3,50
05-11-89	Esperanza	1 pichón	Arriba de un techo	3,50
01-08-03	Esperanza	2 huevos	Tarro grande	2,20

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8-10 días, pero es variable	Pone en días alternos	16-18 días	30-32 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En construcciones, casilleros, huecos en paredes o en árboles, recipientes colocados de exprofeso, sobre techos o en plataformas diversas. A veces nidos superpuestos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos, pajas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 20 cm.

Profundidad : de 1 a 2 cm.

Alto : de 2 a 7 cm.

Las medidas son muy variables.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 37,5 a 43,2 x 27,8 a 31,2 X= 39,5 x 30,3 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 1,000 a 1,305 X= 1,163 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
214	04-10-79	Esperanza	40,7 x 29,3	1,283
			43,2 x 30,4	1,305
215	04-10-79	Esperanza	37,5 x 27,8	1,116
			38,4 x 29,0	1,241
682	20-10-89	Esperanza	39,2 x 30,2	1,0
			39,0 x 31,2	1,2

PICHONES

Descripción

1 día. Ojos cerrados. Pico gris con banda negra cerca de la punta. Ápice claro. Plumón crema amarillento.

5 días. Abre los ojos. Pico oscuro con punta blanca.

7 días. En las vainas de las plumas primarias y secundarias, de 1 cm., aparecen las láminas. Apenas se ven las vainas de las plumas de la cola.

10 días. Vainas dorsales grises de 0,7 cm. Abriendo las láminas de todas las plumas.

14 días. Emplumado.

Dias de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso-metatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1	-	-	-	-	-	1,4	1,9	1
2	-	-	-	-	-	1,5	2,3	1,2
3	-	-	-	-	-	2,1	2,9	1,4
5	-	-	-	-	-	2,2	3,3	1,5
7	1,0	-	1,0	-	-	2,8	4,3	1,9
10	1,3	-	1,4	-	0,5	3,1	4,6	1,9
12	2,3	0,5	1,6	1,0	1,4	3,4	5,0	2,0
14	2,7	2,4	2,4	1,1	2,5	3,4	5,6	2,2
16	2,9	3,7	2,4	3,1	4,9	3,6	5,8	2,5
18	2,6	4,9	2,7	3,5	5,1	3,7	6,1	2,5
20	2,5	6,2	2,3	4,5	5,4	3,8	6,2	2,5

No se describen los colores de las plumas por la variación existente.

PALOMA PICAZURO *Patagioenas picazuro*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



Total de nidos : 45

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-02-76	Claromecó	1 huevo	Eucaliptus	3,50
07-02-76	Claromecó	1 huevo	Eucaliptus	3,20
16-12-89	Esperanza	1 pichón	Olmo	6,00
14-12-90	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,30
22-11-91	Esperanza	Sin postura	Aromo	3,40
03-09-93	Isla Verde	1 huevo	Ligustrina	8,00
22-10-93	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,30
15-09-98	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	3,10
30-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala	3,80
04-11-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,10
06-11-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	6,00
13-11-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,50
19-11-98	Santa Rosa (La Pampa)	En construcción	Eucaliptus	5,00
20-11-98	Picún Leufú	En construcción	Sauce	4,50
25-11-98	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	4,50
05-12-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	4,00
28-12-98	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	2,50
13-03-99	Esperanza (1)	1 huevo	Algarrobo	3,10
29-04-99	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	5,50
14-05-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,40
11-07-99	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,80
11-07-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,50
09-11-99	Esperanza	1 huevo	Eucaliptus	4,00
07-06-00	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,60
12-01-01	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,70

21-08-01	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	4,00
11-10-01	Esperanza	1 huevo	Tala	4,30
04-12-01	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,20
18-12-01	Ruta 4 y río Salado	1 huevo	Araucaria	4,50
03-10-02	Esperanza	1 huevo	Tala	4,40
11-07-03	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	4,50
06-09-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,30
18-10-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,50
01-11-03	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	6,00
03-11-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,00
24-11-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,00
13-12-03	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	6,00
24-02-04	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	3,20
02-12-04	Esperanza	1 huevo	Curupí	6,50
15-12-04	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	6,00
03-09-05	Esperanza	1 huevo	Sombra de toro	2,50
11-10-05	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,50
06-01-06	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	4,20
06-01-06	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,40
18-08-06	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,00

(1). Ocupó el mismo nido del 04-11-98

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	3	1	1	1	1	3	2	4	6	11	9

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-8 días	18-19 días	20-22 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. Altos y a mediana altura.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos, sostenido entre las ramas.

Medidas :

Diámetro total : de 17 a 30 cm.
Profundidad : 0,5 cm.
Alto : de 2 a 4 cm.

Altura :

Nido más bajo : 2,50 m
Nido más alto : 8,00 m

Árboles y número de nidos

Árbol	Nº de nidos	Árbol	Nº de nidos	Árbol	Nº de nidos
Algarrobo	13	Tala	3	Ligustrina	1
Chañar	10	Curupí	1	Aromo	1
Acacia negra	5	Araucaria	1	Sauce	1
Eucaliptus	4	Olmo	1		
Quebracho blanco	3	Sombra de toro	1		

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 40,8 a 43,7 x 28,7 a 30,7
X= 41,9 x 29,5 (N= 4)
Peso lleno : 18,6 X= 18,6 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 1,1 a 1,5
X= 1,29 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
216	07-02-76	Claromecó	43,7 x 29,8		1,344
686	07-02-76	Claromecó	40,8 x 30,7		1,243
777	14-12-90	Esperanza	41,4 x 28,7	18,6	1,1
836	22-11-91	Esperanza	42,0 x 29,0	18,6	1,5

PICHONES

Descripción

1 día.

Ojos cerrados. Piel gris pardusca. Pico grisáceo con banda oscura cerca de la punta. Ápice claro.

Cavidad bucal grisáceo oscuro. Patas grises. Plumón canela claro.


5 días.

Abre los ojos y apenas de ven las vainas de las plumas alares.

PALOMA MANCHADA *Patagioenas maculosa*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N



Total de nidos: 42

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-10-71	Aguará	1 huevo	Aromo	4,00
15-11-71	La Gallareta	1 huevo	Arbusto	1,60
16-11-74	La Loca	1 huevo	Árbol	3,50
25-10-86	San Javier	1 huevo	Ñandubay	3,50
13-04-89	Calchaquí	1 pichón	Enredadera	5,00
17-06-89	Calchaquí	1 huevo	Árbol	3,00
08-11-89	Los Amores	1 huevo	Ñandubay	3,70
08-11-89	Los Amores	No observado	Eucaliptus	8,00
26-11-90	Villa Santa Isabel	1 huevo	Arbusto	2,40
18-01-91	Laguna del Platero	1 pichón	Algarrobo	4,50
06-12-91	Yeso Oeste	1 pichón	Algarrobo	4,50
05-03-93	Puerto Campichuelo	1 huevo	Árbol	3,00
04-11-93	Concordia	1 huevo	Árbol	4,00
19-11-97	Merlo	No observado	Pino	6,00
06-11-99	Calchaquí	1 huevo	Algarrobo	4,70
09-09-00	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,60
16-09-00	Unquillo	1 huevo	Pino	6,00
16-09-00	Unquillo	1 huevo	Pino	7,00
26-05-01	Villa Carlos Paz	En construcción	Árbol	4,50
11-12-02	Paso de los Libres	1 huevo	Ñandubay	2,50
20-11-03	Ascochinga	En construcción	Pino	8,00
22-06-04	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,90
26-05-05	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,60

10-10-05	Esperanza	1 huevo	Tala del indio	3,50
22-12-05	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,70
16-06-06	Jesús María	1 huevo	Tala	2,50
15-09-06	Jesús María	1 huevo	Aromo	2,70
18-02-07	Jesús María	1 huevo	Tala	4,30
18-02-07	Jesús María	1 huevo	Tala	4,00
06-12-07	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	3,50
06-12-07	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	3,80
23-01-08	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,20
23-01-08	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,00
29-07-08	Jesús María	1 huevo	Tala	4,30
29-07-08	Jesús María	1 huevo	Tala	4,00
03-10-08	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	3,70
24-10-08	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	5,00
20-09-09	Jesús María	1 huevo	Aromo	2,80
28-11-09	Jesús María	1 huevo	Aromo	3,40
06-04-10	Esperanza	1 pichón	Algarrobo	3,20
23-07-10	Jesús María	1 huevo	Tala	3,50
23-07-10	Jesús María	Sin postura	Tala	3,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	2	1	2	2	3	4		5	5	10	5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles,arbustos o enredaderas.

Características.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 25 cm.

Alto : 3 a 3,5 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,60 m

Nido más alto : 8,00 m

Ubicación y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Algarrobo	8	Acacia negra	3
Tala	7	Chañar	2
Árbol no determinado	5	Arbusto no determinado	2
Aromo	5	Eucaliptus	1
Pino	4	Enredadera no determinada	1
Ñandubay	3	Tala del indio	1

HUEVOS

Pone 1 huevo.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 38,3 a 43 x 26,2 a 30 X= 39,2 x 27,5(N= 7)

Peso lleno : 13,6 a 15,2 X= 14,4 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,80 a 1,01 X= 0,93 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
217	30-10-71	Aguará	39,4 x 28,0		1,014
218	15-11-71	La Gallareta	38,8 x 28,4		0,977
	16-11-74	La Loca	43,0 x 30,0		
648	25-10-86	San Javier	37,2 x 26,2		0,80
668	17-06-89	Calchaquí	41,9 x 26,8		1,00
726	08-11-89	Los Amores	38,3 x 27,3	15,2	0,90
757	26-11-90	Villa Santa Isabel	37,3 x 26,0	13,6	0,90
	22-06-04	Esperanza	40,5 x 27,5	14,5	

TORCAZA *Zenaida auriculata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



Total de nidos observados: 534

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-70	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
29-10-70	Cayastacito	2 huevos	Espartillo	0,80
02-08-71	Esperanza	2 pichones	Arbusto	1,50
24-02-72	Jacinto Arauz	2 huevos	Aromo	2,00
02-09-73	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	1,30
30-03-74	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
30-03-74	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,50
28-04-74	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,20
07-02-76	Claromecó	2 huevos	Pino	2,20
07-02-76	Claromecó	2 pichones	Pino	1,90
15-12-77	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,60
20-02-79	Esperanza	2 huevos	Arbusto	2,00
15-06-79	Esperanza	2 huevos	Arbusto	2,10
29-08-79	Esperanza	2 huevos	Suelo	
05-09-79	Esperanza	2 huevos	Suelo	
24-10-81	Esperanza	1 huevo	Semidestruido de *Furnarius rufus*	3,40
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Semidestruido de *Furnarius rufus*	3,20
19-01-82	Esperanza	1 huevo	Semidestruido de *Turdus amaurochalinus*	3,20
15-03-82	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,50
15-11-83	Esperanza	2 huevos	Suelo	
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,80
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,80
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,90
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,90
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
17-10-86	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
05-10-88	Esperanza	2 huevos	En nido de *Parabuteo unicinctus*	25,00
15-10-88	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
15-10-88	Esperanza	2 huevos	Tala	3,00
15-10-88	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
15-10-88	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,20

15-10-88	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
15-10-88	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,00
08-12-88	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	1,70
08-12-88	Esperanza	1 pichón	Matorral	1,60
14-01-89	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,00
14-01-89	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,60
14-01-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
14-01-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,90
14-01-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
14-01-89	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,90
16-01-89	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,00
16-01-89	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	4,50
16-01-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,70
16-01-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,60
16-01-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,50
25-01-89	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	2,10
02-02-89	Esperanza	2 huevos	Enredaderas	2,50
03-02-89	Esperanza	2 huevos	Enredaderas	2,30
03-02-89	Esperanza	2 huevos	Enredaderas	4,00
06-02-89	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,10
06-02-89	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,00
07-02-89	San Jerónimo Norte	No observado	Paraíso	4,00
10-02-89	Esperanza	No observado	Enredaderas	3,00
10-02-89	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
10-02-89	Esperanza	1 pichón	Chañar	3,50
17-02-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,10
17-02-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
17-02-89	Esperanza	2 huevos	Enredaderas	2,50
17-02-89	Llambi Campbell	2 huevos	Curupí	4,00
18-02-89	Esperanza	1 pichón	Curupí	2,80
18-02-89	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,00
22-02-89	Empalme San Carlos	2 pichones	Algarrobo	4,00
08-03-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,50
08-03-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,80
09-03-89	Grutly	2 huevos	Chañar	2,10
01-03-89	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,00
01-03-89	Esperanza	2 huevos	Chilca	2,00
06-04-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,50
07-04-89	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	4,00
10-05-89	Grutly	2 pichones	Enredaderas	2,30
15-07-89	Esperanza	2 huevos	Aguaribay	4,50
15-07-89	Esperanza	2 huevos	Aguaribay	5,00
15-07-89	Esperanza	2 huevos	Aguaribay	5,20
15-07-89	Esperanza	1 pichón	Aguaribay	4,30
27-07-89	Esperanza	2 huevos	Sombra de Toro	2,80
08-09-89	Esperanza	1 huevo	Tala	1,50
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	1,20
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10

15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,20
15-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,50
15-09-89	Esperanza	1 pichón	Tala	1,75
16-09-89	Esperanza	2 huevos	Paraíso	5,00
16-09-89	Esperanza	2 huevos	Paraíso	3,00
16-09-89	Esperanza	2 huevos	Nido abandonado de palitos	5,00
16-09-89	Esperanza	2 huevos	Sobre nido de *Synallaxissp.*	2,10
18-09-89	Morteros	3 huevos	Palmera caranday	0,50
23-09-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
23-09-89	Esperanza	2 huevos	Zarzaparrilla	2,10
25-09-89	Esperanza	1 huevo	Enredadera	1,10
20-10-89	Esperanza	2 pichones	Tirante de un galpón	3,20
23-10-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,25
27-10-89	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,00
27-10-89	Esperanza	2 pichones	Acacia negra	3,10
29-10-89	Esperanza	2 huevos	Olivo	2,30
31-10-89	Soledad	2 huevos	Pino	4,50
31-10-89	Soledad	2 huevos	Chilca	2,30
31-10-89	Soledad	2 huevos	Eucaliptus	4,10
01-11-89	Esperanza	2 pichones	Espadañal seco	0,30
01-11-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
01-11-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
05-11-89	Esperanza	No observado	Acacia negra	7,00
05-11-89	Esperanza	No observado	Acacia negra	6,00
05-11-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,00
23-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,50
23-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,40
23-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	4,00
24-11-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
24-11-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,50
24-11-89	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,90
24-11-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,00
24-11-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,50
24-11-89	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,00
24-11-89	Esperanza	2 pichones	Ñandubay	2,60
28-11-89	Esperanza	No observado	Pino	3,80
28-11-89	Esperanza	No observado	Pino	4,50
28-11-89	Esperanza	No observado	Pino	5,00
28-11-89	Esperanza	2 huevos	Ombú	2,10
28-11-89	Esperanza	2 pichones	Pino	5,00
28-11-89	Esperanza	1 huevo	Ñandubay	1,90
22-12-89	Esperanza	2 huevos	Sombra de Toro	1,80
29-12-89	Esperanza	2 huevos	Cina cina	3,50
29-12-89	Esperanza	2 huevos	Cina cina	3,00
17-01-90	Esperanza	2 huevos	Fresno americano	3,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Pino	7,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Pino	7,30
26-01-90	Esperanza	No observado	Pino	7,50
26-01-90	Esperanza	No observado	Pino	7,50
26-01-90	Esperanza	No observado	Olivo	6,50
26-01-90	Esperanza	No observado	Olivo	6,50
26-01-90	Esperanza	2 huevos	Olivo	7,40
26-01-90	Esperanza	2 huevos	Olivo	4,20

26-01-90	Esperanza	No observado	Ciprés	5,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Ciprés	10,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Cedro deodara	5,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Eucaliptus de adorno	7,50
26-01-90	Esperanza	No observado	Eucaliptus de adorno	6,00
26-01-90	Esperanza	No observado	Eucaliptus de adorno	6,00
09-10-90	Esperanza	2 huevos	Matorral	0,50
09-10-90	Esperanza	2 huevos	Matorral	1,70
27-10-90	Esperanza	2 huevos	Eucaliptus	3,00
27-10-90	Esperanza	2 huevos	Eucaliptus	3,80
31-10-90	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,00
02-11-90	Morteros	2 huevos	Chañar	2,50
06-11-90	Esperanza	1 huevo	Semidestruido de *Furnarius rufus*	2,70
04-12-90	Río Salado y ruta 4	2 huevos	Enredaderas	3,00
05-01-91	Grutly	2 huevos	Semidestruido de *Furnarius rufus*	3,50
13-12-91	Malabrigo	2 huevos	Arbusto	3,00
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	3,00
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,20
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,70
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,50
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,40
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,80
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Tala	2,50
16-10-91	Esperanza	2 pichones	Tala	2,00
16-10-91	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,80
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Sombra de Toro	2,10
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Sombra de Toro	2,70
16-10-91	Esperanza	No observado	Semidestruido de *Furnarius rufus*	3,80
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
16-10-91	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,90
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,50
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,70
16-10-91	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,00
16-10-91	Esperanza	2 pichones	Tala salada	2,30
16-10-91	Esperanza	1 huevo	Tala salada	2,70
06-11-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,80
06-11-92	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,80
12-09-93	Esperanza	2 huevos	Matorral	1,00
12-09-93	Esperanza	2 pichones	Matorral	1,30
28-09-93	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
28-09-93	Esperanza	2 huevos	Tala	2,50
27-11-93	Esperanza	2 huevos	Matorral	1,20
04-12-93	Esperanza	Sin postura	Matorral	1,60
18-09-94	Esperanza	2 huevos	Suelo	
01-09-98	Esperanza	En construcción	Tala	3,00
01-09-98	Esperanza	1 huevo	Suelo	
01-09-98	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	2,10
01-09-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,20
01-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,70
01-09-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,00
05-09-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,50

05-09-98	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,00
05-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
05-09-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,70
08-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
08-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
08-09-98	Esperanza	1 pichón	Tala salada	1,70
11-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,60
11-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,90
11-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
11-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,80
11-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,60
12-09-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,30
12-09-98	Esperanza	1 huevo	Cola de zorro	0,70
15-09-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,10
15-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,90
15-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,65
15-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
15-09-98	Esperanza	No observado	Semidestruido de *Furnarius rufus*	4,00
16-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,40
16-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
19-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala salada	1,40
19-09-98	Esperanza	En construcción	Tala salada	1,90
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,90
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,90
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,40
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,60
21-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,20
21-09-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,00
21-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
22-09-98	Esperanza	No observado	Tala	3,10
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
26-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
26-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
29-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
29-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,90
29-09-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
29-09-98	Esperanza	1 huevo	Curupí	2,50
30-09-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
30-09-98	Esperanza	No observado	Tala	2,70
30-09-98	Esperanza	1 huevo	Tala	2,50
30-09-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,60
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,50
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del Indio	1,60
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del Indio	2,20
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,90
01-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Tuna	2,20

03-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,00
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	6,00
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	6,00
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
03-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del Indio	1,50
03-10-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Suelo	
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,00
08-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,50
08-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,80
08-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
12-10-98	Esperanza	No observado	Semidestruido de *Furnarius rufus*	2,80
13-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
13-10-98	Esperanza	2 huevos	Caja grande	3,50
14-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
14-10-98	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,50
15-10-98	Esperanza	2 huevos	Espartillo	0,20
15-10-98	Esperanza	2 huevos	Suelo	
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	0,80
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	4,00
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
16-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,00
16-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
16-10-98	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	3,40
17-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del Indio	1,80
17-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
17-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,10
17-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,00
17-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,40
19-10-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,10
19-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
19-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	3,00
19-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala	2,10
19-10-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,60
19-10-98	Esperanza	1 huevo.	Hueco (en un Curupí)	1,80
19-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,80
19-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,30
24-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,20
24-10-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	2,30
25-10-98	Esperanza	2 pichones	Tala	1,90
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
25-10-98	Esperanza	2 pichones	Carne gorda	2,30
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Cardo (caido)	0,30
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,10
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,50
29-10-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,60
29-10-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,20
29-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
29-10-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,30

30-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,40
30-10-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,20
30-10-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,60
04-11-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,30
04-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala	3,40
06-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
06-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,00
06-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,50
07-11-98	Esperanza	1 huevo	Tala	2,00
09-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,90
09-11-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,40
09-11-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,80
10-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
10-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,90
10-11-98	Esperanza	2 huevos	Cactus	1,00
11-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,10
11-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
11-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala	3,20
11-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2, 30
13-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
13-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
14-11-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,50
14-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
14-11-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,70
14-11-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,70
14-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,90
19-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,50
19-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,60
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
19-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
30-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,90
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,80
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,30
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,40
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,90
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,70
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,20
01-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,30
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
03-12-98	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,50
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,30

05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,80
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,80
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,90
09-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,60
09-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
09-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
09-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,20
09-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,30
09-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
12-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,70
12-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
12-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
12-12-98	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	2,10
12-12-98	Esperanza	Sin postura	Acacia negra	2,00
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Hueco (en un Curupí)	1,60
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,90
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	3,20
17-12-98	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	1,90
17-12-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	2,10
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,90
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
21-12-98	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,90
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,10
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,40
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,20
26-12-98	Esperanza	2 huevos	Ombú	2,90
26-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
26-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
28-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
28-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
28-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,00
28-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,80
28-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,10
28-12-98	Esperanza	2 pichones	Curupí	4,10
30-12-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,10
30-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,70
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Tala	1,40

30-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,20
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,60
03-01-99	Esperanza	2 huevos	Tala	2,60
03-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,30
03-01-99	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,60
04-01-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,30
04-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
04-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
04-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
04-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
04-01-99	Esperanza	1 pichón	Chañar	3,20
05-01-99	Esperanza	No observado	Curupí	4,20
05-01-99	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,80
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
05-01-99	Esperanza	2 huevos	Taladelindio	3,20
07-01-99	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,50
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Tala	3,80
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,70
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
07-01-99	Esperanza	1 pichón	Curupí	2,60
09-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,40
09-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
12-01-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,60
12-01-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,40
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,30
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,40
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	5,00
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,80
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Hueco (en un Curupí)	1,60
14-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,20
15-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
15-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	0,70
15-01-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,70
15-01-99	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,80
15-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
22-01-99	Esperanza	2 huevos	Nido en *Turdus amaurochalinus*	3,20
22-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
22-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
22-01-99	Esperanza	1 huevo	Curupí	3,40
25-01-99	Esperanza	No observado	Aromo	3,70
25-01-99	Esperanza	No observado	Tala	2,10
25-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
25-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	0,80
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,10
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,80
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
25-01-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,00

25-01-99	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,80
25-01-99	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,40
25-01-99	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,70
25-01-99	Esperanza	1 huevo	En nido de *Taraba major*	1,80
26-01-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,20
26-01-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,40
26-01-99	Esperanza	No observado	Semidestruido de *Furnarius rufus*	4,60
26-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
26-01-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
02-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
02-02-99	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,20
02-02-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,80
08-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
08-02-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,70
08-02-99	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,90
14-02-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
14-02-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
14-02-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
14-02-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,90
14-02-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,90
14-02-99	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	2,10
14-02-99	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	2,20
14-02-99	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,40
02-03-99	Esperanza	1 pichón	Aromo	1,90
02-03-99	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,80
02-03-99	Esperanza	No observado	Curupí	2,40
02-03-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,80
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	1,40
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
02-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
03-03-99	Esperanza	2 pichones	Plantera colgante en una galería	1,90
04-03-99	Esperanza	1 huevo	Curupí	1,90
04-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,40
04-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,30
04-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,40
04-03-99	Esperanza	No observado	En nido de *Phacellodomus sibilatrix*	4,30
04-03-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,20
04-03-99	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,65
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
04-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,40
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,50
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	3,00
13-03-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00
13-03-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
13-03-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00

13-03-99	Esperanza	No observado	Semidestruido de *Furnarius rufus*	4,20
13-03-99	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
13-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,30
13-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,30
13-03-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,00
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,00
07-04-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,90
07-04-99	Esperanza	No observado	Tala	4,00
07-04-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,50
05-06-99	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,70
11-07-99	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	3,20
31-07-99	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,70
27-11-00	Puerto Madryn	En construcción	Arbusto	2,00
13-12-01	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,10
02-01-02	Esperanza	2 pichones	Curupí	2,70
07-01-02	El Alamito	2 huevos	Arbusto	1,90
17-05-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
03-06-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,20
10-08-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
10-08-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
17-11-03	Esperanza	3 huevos	Curupí	1,70
24-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
13-12-03	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,80
13-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	3,30
13-12-03	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,30
13-12-03	Esperanza	1 huevo	Molle	2,00
19-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
19-12-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
19-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala	2,20
19-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
22-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
22-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,30
31-12-03	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,60
31-12-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100	34	43	12	2	3	9	4	74	96	62	94

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5-6 días pero puede ser variable	Pone en días alternos	14 días	12-14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Nidifica en forma solitaria generalmente. Pero puede formar colonias.

Ubicación.

Sostenido en árboles, arbustos, enredaderas, matorrales. También en el suelo, tirantes de techos o sobre plataformas de palitos de nidos abandonados o semidestruidos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos, gramillas, hojitas. A veces alguna pluma.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 15 cm.

Altura :

Nido más bajo : suelo

Nido más alto : 25 m

Se localizaron cinco nidos construidos sobre nidos semidestruidos de *Furnarius rufus*, uno en *Turdus amaurochalinus*, uno a 25 m. de Altura (en m.) en uno de *Parabuteo unicinctus*y uno en *Taraba major*.

El 18-09-89 en Morteros una colonia con cientos de nidos. Algunos con 3 huevos.

El 21-11-93 en Las Cuevas, colonia con muchos nidos. Ejemlares de *Turdus amauchalinus* les comían los huevos.

HUEVOS

Pone 2, a veces 3 huevos.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 28 a 30,8 x 21,4 a 23,5 X= 29,3 x 22,1 (N= 12)

Peso lleno : 8,60 a 8,90 X= 8,75 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,40 a 0,51 X= 0,499 (N= 10)

Ubicación y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	196	Arbusto	7	Ombú	1
Tala	76	Enredadera	6	Molle	1
Curupí	48	Sombra de toro	5	Espadaña	1
Algarrobo	44	Aguaribay	4	Palmera caranday	1
Quebracho blanco	33	Eucaliptus	3	Carne gorda	1
Acacia negra	24	Paraíso	3	Cola de zorro	1
Aromo	16	Chilca	2	Cardo	1
Tala salada	12	Espartillo	2	Zarzaparrilla	1
Tala del indio	10	Ñandubay	2	Olivo	1
Suelo	9	Cina-cina	2	Tirante	1
Pino	8	Cactus	1	Plantera	1
Matorral	8	Tuna	1		

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	04-10-70	Esperanza	29,0 x 22,0		
			30,0 x 21,5		
	29-10-70	Cayastacito	29,0 x 21,5		
			28,5 x 21,5		
219	15-12-77	Esperanza	30,0 x 23,5		0,510
			30,0 x 23,0		0,465
220	20-02-79	Esperanza	28,0 x 21,5		0,419
			28,8 x 21,4		0,449
221	15-06-79	Esperanza	28,5 x 21,5		0,436
			29,0 x 21,6		0,406

626	15-11-83	Esperanza	30,1 x 23,3	8,600	0,477
			30,8 x 23,5	8,900	0,486
674	18-09-89	Morteros	27,5 x 22,0		0,3
			30,0 x 21,8		0,4
			30,2 x 22,0		0,4
	11-09-04	Esperanza	29,4 x 22,2	7,5	
			31 x 23,3	8,0	
	16-09-04	Esperanza	28,5 x 22,5	5,8	
			30,2 x 23,3	6,3	
	22-09-04	Esperanza	27,4 x 22,2	6,7	
			29,2 x 22,0	7,0	
	24-09-04	Esperanza	28,2 x 22,0	7,0	
			30,2 x 22,0	7,5	
	29-09-04	Esperanza	27,2 x 21,2	5,7	
			28,0 x 21,2	5,7	
	01-10-04	Esperanza	28,5 x 21,0	6,6	
			30,0 x 21,7	7,0	
	11-10-04	Esperanza	27,0 x 22,4	6,7	
			27,5 x 22,0	7,0	
	25-10-04	Esperanza	27,0 x 21,0	5,5	
			28,0 x 21,0	5,8	
	27-10-04	Esperanza	28,0 x 22,0	6,0	
			30,5 x 21,6	6,2	
	11-11-04	Esperanza	26,2 x 21,8	6,4	
			28,5 x 21,2	6,5	

PICHONES

Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico color natural con punta negra. Cavidad bucal y paladar rosado claro. Plumón amarillento. Garganta desnuda.

1 día. Largo del cuerpo : 3,5 cm.

3 días. Largo del cuerpo : 4,8 cm.

5 días. Ojos abiertos. Apenas se ven las láminas en las alas. Largo del cuerpo : 5,3-6,0 cm.

8 días. Cañones de las plumas alares grises con punta ocráceo-canela. Plumas laterales de la cola blancas, centrales grises. Largo del cuerpo : 6,5-8,0 cm.

10 días. Largo del cuerpo : 8-9 cm. Se escapan del nido si son molestados.

El largo del cuerpo se tomó estando el pichón apoyado sobre el nido, desde el buche a la rabadilla.

Dias de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso-metatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1	-	-	-	-	-	1,0-1,1	1,4	0,6-0,7
2	-	-	-	-	-	1,4	1,8	0,9
3	-	-	-	-	-	1,0-1,5	1,7-2,0	0,8-0,9
5	0,7-1,2	-	0,6-1,0	-	-	1,6-1,9	2,3-2,6	1,0-1,1
6	1,8	0,3	1,3	-	0,7	2,0	3,0	1,1
8	2,5-3,6	1,0-1,2	2,0-2,1	0,9-1,2	1,1-1,8	2,3	3,1-3,2	1,2-1,4
10	2,7-2,8	1,4-2,2	1,7-2,0	1,3-1,7	1,4-2,2	2,3	3,5-4	1,3-1,4


OBSERVACIONES

El 03-02-99 en Esperanza, se observó un ejemplar Melánico. Tenía negro en la cabeza, el cuello, el pecho y parte del dorso.

YERUTÍ COMÚN *Leptotila verreauxi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N				N	N	N	N	N	N



Total de nidos : 30

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Cayastacito	1 huevo	Arbusto	2,00
25-10-70	Cayastacito	2 huevos	Enredadera	1,50
27-11-71	Villa San José	2 huevos	Arbusto	3,00
13-03-81	La Puerta	2 pichones	Arbusto	2,20
15-11-81	Cayastá	2 pichones	Tala	2,10
15-11-81	Cayastá	2 pichones	Tala	2,40
20-10-82	Cayastá	2 huevos	Tala	2,00
15-11-82	Cayastá	2 huevos	Tala	2,50
04-02-88	Laguna Paiva	2 huevos	Tala	2,00
09-11-89	Los Amores	2 huevos	Arbusto	2,20
21-10-92	Villa Ocampo	2 huevos	Aguaí	1,70
04-11-93	Concordia	1 huevo y 1 pichón	Arbusto	3,50
29-07-95	Villa Ocampo	2 huevos	Enredadera	2,10
27-11-95	Villa Ocampo	2 pichones	Enredadera	2,50
27-11-95	Villa Ocampo	2 pichones	Tala	2,60
30-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
15-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala del indio	2,50
15-10-98	Esperanza	2 huevos	Aromo	2,20
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,40
17-10-00	Esperanza	1 pichón	Tala salada	1,20
23-10-00	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,10
05-10-01	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,10
06-12-01	Esperanza	2 huevos	Tala salada	2,20
12-10-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
17-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,40
29-09-04	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,80

13-01-08	Esperanza	2 pichones	Tala del indio	2,80
26-08-09	Esperanza	2 pichones	Simbol	1,50
28-10-10	Esperanza	2 pichones	Cina	2,50
18-10-12	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	1	1				1	1	2	12	9	2

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5-6 días pero puede ser variable	Pone en días alternos	14 días	14-17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

A baja y mediana altura, en árboles, arbustos o enredaderas.

Características.

Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos o de enredaderas, hojas. Internamente fibras finas o plumitas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 20 cm.
Diámetro interno : 9 a 10 cm.
Profundidad : 2 a 3 cm.
Alto : 3,5 a 10 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,10 m
Nido más alto : 3,50 m

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Tala	6	Aromo	2
Arbusto	5	Aguaí	1
Chañar	5	Acacia negra	1
Enredadera	3	Simbol	1
Tala salada	2	Cina	1
Tala del indio	2		

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Elíptico. De color crema.

Medidas y pesos :

De 28,3 a 34,9 x 20,7 a 25,3
X= 31,4 x 22,9 (N= 9)
Peso lleno : 6,31 a 8,70 X= 7,63 (N= 4)
Peso de las cáscaras : de 0,547 a 0,675 X= 0,567 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
226	25-10-70	Cayastacito	31,3 x 21,9		0,505
227	25-10-70	Cayastacito	30,4 x 23,5		0,547
			32,5 x 23,3		0,563

228	27-11-71	Villa San José	33,0 x 23,6		0,550
			34,9 x 25,3		0,675
590	15-11-81	Cayastá	28,7 x 20,7	6,31	0,644
			31,2 x 21,7	7,52	0,652
727	09-11-89	Los Amores	30,0 x 23,0	8,0	0,50
			30,0 x 23,8	8,7	0,50
29-09-04	Esperanza		31,0 x 22,8	8,6	

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico oscuro con punta de color natural. Por detrás de la punta tiene una línea más oscura que el resto del pico. Cavidad bucal oscura (morada). Mandíbula ventralmente oscura.
Fino plumón crema en las zonas ptéridas.

4 días. Abre los ojos, marrones. Patas grises. Uñas largas.
5 días. Se nota más el contraste entre la punta del pico y el resto. Cañones alares largos, aparecen las láminas finas que parecen pelos. Más fuerte el color ventral crema.
10 días. Láminas de las plumas externas de la cola, blancas. Las dos que siguen, blanquecinas. Las centrales, no. Alas con láminas como plumas de adulto, también en el cuello y lados del pecho. Abdomen blanco. Quedan escaso plumón crema en el cuello.

OBSERVACIONES

Los adultos con los pichones continúan juntos durante 8 a 10 días, después de abandonar el nido.

YERUTÍ COLORADA *Leptotila rufaxilla*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	2 pichones	Enredadera	1,50
12-10-81	Cataratas del Iguazú	2 huevos	Matorral	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En árboles, arbustos, matorrales o enredaderas.
Características.
Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos.
Medida :
Diámetro total : de 13 a 15 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Elíptico. De color crema.

FAMILIA: CUCULIDAE

CUCLILLO CHICO *Coccycua cinerea*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Total de nidos : 19

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
16-12-72	Grutly	4 huevos	Chañar	2,10
25-03-73	Grutly	3 huevos	Chañar	2,00
01-11-73	Aguará	2 huevos	Arbusto	3,00
01-11-73	Aguará	2 huevos	Arbusto	3,00
06-12-79	Esperanza	2 pichones	Tala	2,50
16-11-81	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
03-11-94	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,50
20-12-94	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,10
16-11-95	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	2,00
07-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,20
04-11-99	Esperanza	4 huevos	Tala	1,50
01-12-01	Esperanza	1 huevo	Curupí	3,10
17-12-01	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,70
18-10-02	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,30
18-11-02	Esperanza	2 huevos	Tala	3,00
21-12-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,00
01-11-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,75
29-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,40

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1							2	9	7

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-8 días	Pone en días corridos	12-13 días	13-15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En arbustos o árboles, a veces cubiertos por enredaderas.

Características.

Expuesto o semioculto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas. Internamente pajitas, nervaduras y/u hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 15 cm.
Diámetro interno . 8 cm.
Alto : de 3 a 8,5 cm.
Profundidad : de 0,5 a 3,5 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,50 m.

Nido más alto : 5,00 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24,4 a 26,4 x 18,3 a 21,5 X= 25,4 x 19,4 (N= 10)

Peso de las cáscaras: 0,389 a 0,531X= 0,452 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
237	16-12-72	Grutly	24,4 x 21,5		0,452
			25,3 x 20,0		0,501
			26,3 x 19,9		0,530
			26,4 x 20,8		0,531
	25-03-73	Grutly	25,0 x 19,0		
			25,0 x 19,0		
			26,0 x 19,0		
238	16-11-81	Esperanza	25,1 x 19,0		0,389
			25,5 x 18,3		0,407
			25,9 x 18,3		0,412
	29-10-04	Esperanza	26,0 x 19,0	4,8	
			26,6 x 20,0	5,5	
			27,3 x 20,0	5,7	

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos semiabiertos. Piel oscura, verdosa. Plumón largo, gris claro. Comisura y pico color natural. Paladar rosado con seis puntos blancos, cuatro grandes y dos chicos y dos en la lengua. El resto de la cavidad bucal y la lengua rosados.

3 días. Ojos abiertos, marrones. Patas oscuras. Gritan. Pico gris oscuro. Comisura más clara. Escaso plumón gris claro. Piel oscura. Pliegues verdosos. Vainas de primarias grises. Apenas se notan las láminas.

6 días. Aparecen las láminas de las plumas ventrales, blancas. Flancos ocráceos-canelas. Las láminas de las plumas de la cabeza y dorso, cubiertas alares y cola, pardas.

7 días. Mancha negra en la punta de la lengua y una mancha redonda y otra transversal en la parte superior y posterior. Tiran la cabeza hacia atrás hasta tocar el dorso.

8 días. Emplumado. Pico negro. Dorsalmente gris pardusco. Garganta y pecho, gris claro. Abdomen blanquecino ocráceo. Alas pardas. Cola gris pardusca. Si se los molesta se van del nido.

9 días. Plumaje de adulto (sin blanco en la cola).


MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas									Peso
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0,5	0,8	1,2	-	-	-	-	-	-	3,6
2	0,6	1,0	1,8	-	-	-	-	-	-	7,5
3	0,6	1,3	2,0	0,2	-	-	-	-	-	11,7
4	0,7	1,5	2,1	0,4	-	-	-	-	-	13,0
5	0,8	1,7	2,3	0,7	-	0,5	-	0,4	-	14,0
6	1,0	1,7	2,4	0,8	-	-	-	0,7	-	16,0
8	1,0	1,7	2,4	1,0	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	18,7

OBSERVACIONES

Una larva blanquecina caminaba por el lomo de un pichón.
El nido muy sucio por las materias fecales, a los 9 días de edad.
Los padres les traen orugas, insectos y arañas.

CUCLILLO CANELA *Coccyzus melacoryphus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 28

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-12-76	Humboldt	1 huevo y 1 pichón	Enredadera	2,00
11-12-76	Esperanza	3 huevos	Tala	3,00
23-12-76	Esperanza	3 huevos	Tala	2,50
11-12-77	Esperanza	4 huevos	Tala	2,10
15-12-77	Esperanza	3 pichones	Tala	2,10
15-12-77	Esperanza	4 huevos	Arbusto	1,50
02-01-79	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	3,50
20-01-83	Esperanza	2 huevos	Ñandubay	3,50
27-01-90	Santa Fe	1 huevo	Arbusto	2,20
25-10-90	Esperanza	3 huevos	Enredadera	1,00
02-01-91	El laurel	2 huevos	Aromo	1,00
05-01-91	Grutly	6 huevos	Chañar	2,00
26-11-91	Villa Roda	3 huevos	Algarrobo	2,20
16-12-94	Esperanza	3 huevos	Tala	2,20
24-12-95	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,50
09-02-96	Colastiné	2 huevos	Sauce	1,70
29-01-97	Villa Roda	3 huevos	Eucaliptus	4,00
30-11-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	1,50
28-12-98	Esperanza	3 huevos	Zarzaparrilla	2,70
21-12-01	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,50
14-12-02	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,00
03-02-04	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,70
09-12-04	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,90
09-12-04	Esperanza	5 huevos	Aromo	3,60
25-12-04	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,70
05-01-05	Esperanza	3 huevos	Curupí	1,50
06-12-07	Esperanza	Sin postura	Aromo	3,20
08-11-12	Villa Roda	2 huevos	Algarrobo	2,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
7	2								1	3	15

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-8 días	Pone en días corridos	14 días *	13-15 días

(*). En un nido estudiado demoró 20-21 días, desconociéndose los motivos

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos o en árboles, enredaderas, matorrales. A baja y mediana Altura.

Características.

Oculto, expuesto o semiexpuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas o tallos de yuyos en la base. Internamente nervaduras de hojas, líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 15 cm.

Alto : de 4 a 8 cm.

Profundidad : de 0,5 a 1 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,00 m.

Nido más alto : 4,00 m.

HUEVOS

Pone 3, a veces hasta 4 ó 6 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. De color verde.

Medidas y pesos :

De 26,8 a 31,4 x 22 a 24,6 X= 29,8 x 23 (N= 18)

Peso lleno : de 7,2 a 8,9 X= 8,1 (N= 10)

Peso de las cáscaras: 0,467 a 0,661X= 0,561 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	01-12-76	Humboldt	28,0 x 23,0		
235	11-12-76	Esperanza	26,8 x 22,5		0,467
			29,5 x 23,0		0,630
			30,2 x 23,5		0,634
236	11-12-77	Esperanza	30,2 x 23,9		0,566
			30,7 x 22,8		0,595
			31,2 x 22,0		0,631
			31,4 x 22,2		0,661
603	20-01-83	Esperanza	27,0 x 21,7	7,205	0,550
			30,6 x 21,4	7,804	0,555
741	27-01-90	Santa Fe	30,0 x 22,0		0,60
	02-01-91	El Laurel	29,4 x 23,3	7,9	
			30,8 x 22,8	7,9	
793	05-01-91	Grutly	29,0 x 24,6	8,2	0,58
			29,1 x 23,7	8,6	0,60
			30,0 x 23,7	8,7	0,60
			31,0 x 23,0	8,7	0,61
			31,0 x 23,0	8,8	0,62
			30,5 x 23,5	8,9	0,63
09-12-04	Esperanza		28,9 x 22,0	8,0	
			30,2 x 23,0	8,7	
09-12-04	Esperanza		28,1 x 22,0	7,6	
			28,2 x 22,0	7,5	
			28,8 x 22,2	8,0	
			29,0 x 22,5	7,3	
			31,0 x 22,0	8,5	

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos semiabiertos. Pico y patas grises. Interior de la cavidad bucal rosado con tres puntos blancos en el paladar y uno en la lengua.

4 días. Ojos abiertos marrones. Lados del pecho y garganta, con vainas rígidas, blanquecinas. Dorsalmente blanquecinas. Vainas de las alas oscuras. Las materias fecales son líquidas, oscuras.

5 días. Pico gris. Comisura clara. Patas plomizas. Piel gris oscura, más clara ventralmente. Tres puntos blancos en el paladar, dos del lado interno de la fosa y dos grandes externos y dos medialunas grandes en la base. Uno en la parte superior de la base de la lengua. Esta con punta negra. Ventralmente y flancos, plumas blanquecinas. Cola con las plumas externas blanquecinas. Cañones grisáceo y láminas grises en la parte dorsal. El plumón que queda es blanco. Alas, cañones oscuros en la mitad basal y grises en el resto.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina		
1	0,6-0,9	1,2-1,3	1,6-2,1	-	-	-	-	-	5,5-12,0
2	0,6-0,9	1,3-1,4	2,0-2,3	-	-	-	-	-	9,0-15,0
3	0,7-1,0	1,5-1,6	2,2-2,5	0,7	0,2	0,4	0,2	-	14,7-19,7
4	0,8-1,0	1,6-1,7	2,4-2,6	0,8-2,0	0,3	0,6	0,2	1,5	16,0-19,4
5	0,9-1,0	1,7-1,9	2,6-2,7	1,0-2,5	0,5	0,8	0,3	1,8	19,6-22,0

OBSERVACIONES

Si los pichones son molestados se desplazan por las ramas.

ANÓ GRANDE *Crotophaga major*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-10-01	Capioví	Sin postura (*)	Árbol	6,00
16-12-09	Eva Perón	2 huevos (*)	Guayacán	4,00



(*) Localizados por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.
Sostenido en árboles. Alto.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tazón de ramitas, fibras vegetales y hojas.
Medidas :
Diámetro total : 30 cm.
Diámetro interno : 15 cm.
Alto : 16 cm.
Profundidad : 7 cm.

OBSERVACIONES

El 11-12-02 en Paso de los Libres, cuatro ejemplares en un cortejo. Enfrentaban los picos y emitían un canto muy prolongado, semejante a un murmullo de agua que corre entre piedras. Dura 3-4 minutos, paran bruscamente y continúan.
Por momentos parecían las voces que hacen las garzas en las colonias.
Se corrían entre las ramas de los árboles.

ANÓ CHICO *Crotophaga ani*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N



Total de nidos : 10

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-78	Empalme San Carlos	4 pichones	Arbusto	2,40
12-12-79	Pichanal	2 huevos	Arbusto	1,40
12-12-79	Pichanal	3 huevos	Arbusto	1,50
03-01-91	Esperanza	5 huevos	Chañar	2,20
09-02-96	Colastiné	2 pichones	Aromo	3,00
09-02-96	Colastiné	3 pichones	Sauce	4,00
11-03-96	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	2,60
20-03-96	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,90
20-01-97	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	3,50
20-01-03	Villa Roda	5 pichones	Cina-cina	3,10

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
		13 días	11 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas o por follaje denso, o en matorrales. A baja y mediana Altura.

Características.

Expuesto o semioculto. Elaborado. Tazón de tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas o pajitas.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 30 cm.
Diámetro interno : 9 a 15 cm.
Alto : de 6 a 15 cm.
Profundidad : de 3 a 7 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,40
Nido más alto : 4,00 m

HUEVOS

Pone hasta 13, generalmente 5 ó 6 huevos.

Elípticos. Color de base celeste, recubiertos de material calcáreo blanco.

Medidas y pesos :

De 30,7 a 33,3 x 23,4 a 25,8 X= 32,2 x 24,9 (N= 10)
Peso lleno : de 11 a 11,7 X= 11,3 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 0,872 a 1,100 X= 1,014 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
239	12-12-79	Pichanal	30,7 x 23,4		0,872
			33,3 x 25,0		1,047
240	12-12-79	Pichanal	32,0 x 25,8		1,040
			32,4 x 25,4		1,045
			32,7 x 24,6		1,068
794	03-01-91	Esperanza	31,9 x 25,2	11,0	1,0
			32,3 x 25,3	11,3	1,0
			32,5 x 25,2	11,3	1,0
			32,2 x 25,2	11,5	1,1
			32,7 x 24,9	11,7	1,1

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel negra. Cubierto de plumón negro.

3 días. Abre los ojos.

OBSERVACIONES

Si se los molesta se desplazan por las ramas.
Para pedir la comida, los pichones aletean y emiten un chillido. El adulto se va hasta 50 m. del lugar donde están los juveniles. Busca entre los yuyos, trae langostas y mamboretá. Se los da y el joven los traga enteros.

PIRINCHO *Guira guira*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



Total de nidos : 43

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-71	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	2,00
03-03-71	Esperanza	17 huevos	Tala salada	1,00
10-11-71	Campo Andino	10 huevos	Arbusto	2,00
30-11-71	Aguará	5 huevos	Juncal	1,10
16-01-73	Aguará	4 huevos	Espadañal	1,00
11-12-73	Esperanza	10 huevos	Cina-cina	1,00
03-11-74	Esperanza	12 huevos	Olmo	3,50
20-12-76	Esperanza	30 huevos	Olmo	4,00
12-12-79	Pichanal	3 huevos	Arbusto	2,50
18-12-79	Esperanza	5 pichones	Arbusto	3,50
08-11-89	Los Amores	4 huevos	Palmera	5,00
18-11-89	Calchaquí	3 huevos	Arbusto	2,80
05-01-91	Grutly	2 huevos	Chañar	3,50
06-02-92	Humboldt	5 huevos	Tinglado	3,00
12-12-93	Esperanza	4 huevos	Tala	2,30
31-12-93	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Ñandubay	3,40
28-10-95	Esperanza	8 huevos	Naranjo	3,40
18-11-95	Esperanza	7 huevos	Tarro	4,20
04-12-95	Esperanza	En construcción	Laurel comestible	7,00
30-12-95	Rincón de Ávila	En construcción	Curupí	3,50

12-11-96	Esperanza	3 huevos	Caña tacuara	6,50
12-11-96	Esperanza	4 huevos	Molino	4,00
29-01-97	Esperanza	4 pichones	Olmo	5,00
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
12-01-99	Esperanza	10 pichones	Chañar	3,60
21-01-99	Esperanza	No observado	Zarzaparrilla	3,30
22-01-00	Esperanza	8 huevos	Chañar	3,10
27-01-00	Esperanza	5 pichones	Chañar	3,90
27-12-00	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
26-01-01	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,60
28-01-01	Villa Roda	No observado	Eucaliptus	8,00
28-01-01	San José	No observado	Chañar	3,50
01-12-01	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,40
10-12-01	Esperanza	En construcción	Tinglado	4,50
23-12-01	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	2,00
15-02-01	Esperanza	No observado	Curupí	4,50
11-11-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,30
20-12-02	Esperanza	6 pichones	Chañar	3,50
23-12-04	Esperanza	3 huevos (y 3 huevos en el suelo)	Chañar	2,70
05-03-05	Esperanza	10 pichones	Saliente de un tanque	4,00
21-01-06	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
18-12-06	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,40
29-12-07	Esperanza	15 huevos	Saliente de un tanque	4,00

Total de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	3	2							1	9	16

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
	Pone en días alternos	15 días	12-13 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas, en matorrales, juncales, espadañales, recipientes, molinos, construcciones. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de palitos, tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas, pajitas, hilos, flores.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 40 cm.
Diámetro interno : 14 a 20 cm.
Alto : de 14 a 20 cm.
Profundidad : de 10 a 15 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,00 m
Nido más alto : 8,00 m

HUEVOS

Pone hasta 30, generalmente 10 ó 12 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. Color de base celeste, recubiertos por líneas y manchas blancas, de material calcáreo.

Medidas y pesos :

De 39,7 a 46 x 28,7 a 33 X= 41,5 x 31 (N= 28)
Peso lleno : de 19,7 a 22,4 X= 20,8 (N= 6)
Peso de las cáscaras : de 1,60 a 2,01 X= 1,85 (N=28)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
241	03-03-71	Esperanza	41,5 x 29,0		1,601
			41,7 x 31,0		1,643
			41,8 x 32,3		1,758
			42,0 x 31,4		1,774
			42,2 x 32,0		1,817
			42,3 x 32,4		1,903
			43,3 x 30,5		1,937
			42,5 x 32,7		1,951
			42,6 x 32,6		1,952
			42,8 x 32,0		1,970
			43,1 x 29,2		1,978
			43,5 x 30,4		1,990
			43,6 x 30,3		2,000
			43,7 x 28,7		2,000
			44,5 x 33,0		2,015
			44,7 x 30,2		2,082
			46,0 x 30,3		2,086
687	16-01-73	Aguará Grande	40,6 x 30,7		1,7
			41,9 x 31,2		1,8
242	12-12-79	Pichanal	39,7 x 31,7		1,983
			40,0 x 32,1		1,990
			42,2 x 31,0		1,996
828	06-02-92	Humboldt	41,0 x 30,3	20,9	1,7
			41,0 x 31,6	22,1	1,7
			41,5 x 31,2	22,4	1,8
			42,0 x 31,1	22,4	1,8
			42,9 x 31,3	22,4	1,8
849	31-12-93	Esperanza	41,2 x 31,2		1,9

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos abiertos. El pico es anaranjado con una línea negra longitudinal en el culmen.
Ventralmente las ramas de la mandíbula, son oscuras.
El paladar es rojo, con papilas blancas. La piel es oscura. Alrededor de los ojos es verdosa. Plumón blanco crema, alargado semejando pelos. Patas gris oscuro.

2 días. Ojos marrones. La cavidad bucal, lengua y paladar, rojizos. La lengua tiene en la base una medialuna blanca, lo mismo que la punta. Por detrás de ésta una banda transversal negra. A los costados, sobre la mucosa, dos manchas blancas. El paladar tiene una medialuna blanca con una línea del mismo color hacia la fosa palatina. A los lados de la fosa palatina, presenta dos círculos incompletos grandes (parecen signos de pregunta), blancos.
Plumón, tipo filoplumas, blanco, por todas las zonas pteridas. Emiten un grito fuerte y tiran picotazos.
5 días. Cola con cañones largos. Aparecen las láminas. En la cola las tres plumas externas blancas, las dos centrales oscuras. En el resto del cuerpo cañones oscuros con punta blanca. El nido tiene olor por las materias fecales.
7 días. Las plumas de las alas y de la cola son oscuros. A los lados del pecho las láminas son blanco

amarillentas. La cola mide 5 cm. Si son molestados se van del nido.
8 días de edad. Pueden estar fuera del nido.
10 días de edad. Pueden estar fuera del nido o esconderse en él al ver extraños.Trepan por las ramas ayudándose con el pico y las alas. Cola larga. Colores como en adulto.

OBSERVACIONES

Durante la incubación agregan materiales al nido, principalmente hojas o tallos frescos.
El nido del 06-02-92, en Humboldt, estaba asentado sobre un rollo de cables. Entre otros elementos ocupó tallos de Cardo y una raíz de 1,35 m. de larga.
El nido del 18-11-95, en Esperanza, fue construido dentro de un tarro, colocado en un Paraíso.
El 13-01-01, en Esperanza, se encontró un huevo sobre una plataforma de palitos y algunas pajas, semioculto por una enredadera, a 2,30 m. del suelo.
Se suelen encontrar huevos en el suelo, donde están los nidos.
El nido tiene olor fuerte por las materias fecales.
Los pichones emiten un grito fuerte y tiran picotazos.
Tienen ectoparásitos (piojos).
Los adultos emiten gritos de alarma y se acercan al observador.
Traen como alimentos a los pichones, ranitas, culebras, pichones de otras aves.
Los adultos en la época de cría, depredan sobre otras aves. Se los observó tomando pichones de Viudita blanca (*Fluvicola albiventer*), Tijereta (*Tyrannus savana*) y Gorrión (*Passer domesticus*)

CRESPÍN *Tapera naevia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos parasitados : 15

Total de especies parasitadas : 8

Fecha	Lugar	Huevos o pichones de *Tapera naevia*	Especie parasitada
29-11-76	Esperanza	1 huevo	*Synallaxis frontalis*
15-12-77	Esperanza	1 huevo	*Phacellodomus striaticollis*
13-01-78	Esperanza	1 huevo	*Synallaxis spixi*
13-01-78	Esperanza	1 huevo	*Synallaxis albescens*
24-11-79	Esperanza	2 huevos	*Schoeniophylax phryganophila*
24-12-79	Esperanza	1 huevo	*Synallaxis albescens*
25-10-81	Manucho	1 huevo	*Schoeniophylax phryganophila*
03-11-90	Esperanza	1 huevo	*Leptasthenura platensis*
15-12-90	Monte Vera	2 huevos	*Certhiaxis cinnamomea*
20-12-90	Monte Vera	1 huevo	*Certhiaxis cinnamomea*
15-12-90	Monte Vera	2 huevos	*Certhiaxis cinnamomea*
23-12-02	Esperanza	1 huevo	*Synallaxis frontalis*
26-12-02	Esperanza	1 huevo	*Schoeniophylax phryganophila*
31-12-03	Esperanza	1 huevo	*Asthenes baeri*
06-02-04	Esperanza	1 pichón	*Certhiaxis cinnamomea*

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
Especie parásita	15-16 días	16-17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Especie parásita.

HUEVOS

Pone 1 ó 2 huevos por nido parasitado.

Elípticos, algunos ovoidales o cilíndricos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,2 a 24,3 x 12,8 a 17,9 X= 21,4 x 15,6 (N= 14)

Peso lleno : de 1,8 a 2,8 X= 2,16 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 1,97 a 2,68 X= 0,205 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
320	29-11-76	Esperanza	21,7 x 16,7		0,221
356	15-12-77	Esperanza	24,3 x 15,8		0,197
324	13-01-78	Esperanza	23,0 x 17,9		0,268
328	13-01-78	Esperanza	21,9 x 16,4		0,220
318	24-11-79	Esperanza	22,5 x 16,0		0,203
			22,5 x 16,0		0,211
329	24-12-79	Esperanza	22,0 x 16,2		0,217
319	25-10-81	Manucho	23,4 x 15,5		0,197
644	03-11-90	Esperanza	18,2 x 12,8		0,190
330	15-12-90	Esperanza	21,3 x 15,1		0,190
782	15-12-90	Monte Vera	20,8 x 16,0		0,190
783	20-12-90	Monte Vera	21,5 x 15,8	2,8	0,200
784	20-12-90	Monte Vera	19,3 x 14,6	1,8	0,190
			21,0 x 16,0	1,9	0,190

PICHONES

Descripción.

Nacen implumes. Ojos cerrados. Piel rosada. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillentos.

1 día. Implume. Ojos cerrados. Tira la cabeza hacia atrás.

3 días. Materias fecales líquidas, de color marrón.

5 días. Escasas vainas (sin plumón). Apenas se notan las vainas de las plumas de la cola. Vivaracho. Eleva el cuello y la cabeza. Eriza las plumas de la cabeza y dorso. Materias fecales líquidas, marrones (como los pichones de *Coccyzus melacoryphus*)

6 días. Abre los ojos marrones. Tira picotazos.

8 días. Plumitas en la cabeza y dorsalmente canelas. Lados del pecho acanelado. Flancos blanquecinos. Aparecen las láminas en las plumas primarias. Las láminas de las secundarias son más grandes.

12 días. Grita fuerte. El plumaje se parece al del adulto.

13 días. Comisura amarillenta. Mandíbula clara. Maxilar oscuro. Plumas malares oscuras. Garganta acanelada.

15-16 días. Dejan el nido.

MEDIDAS


Días de vida	Medidas						
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Lámina	Total
1	0,3	0,7-1,1	1,1-1,6	-	-	-	-
3	0,5	1,1-1,4	1,5-2,0	-	-	-	-
5	-	-	-	0,3	-	-	0,2
6	0,6	1,7	2,0	0,5	-	-	0,3
8	-	-	-	1,0	0,1-0,2	0,3-0,4	0,7
10	-	-	-	1,2	0,5	-	2,0
12	-	-	-	1,4	1,1	-	2,0
13	-	-	-	-	-	-	3,0

OBSERVACIONES

En dos nidos estudiados, Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*) y Chotoy (*Schoeniophylax prhyganophila*) dejaron el nido por la boca de entrada. Esta media unos 4 cm. de diámetro.

FAMILIA: TYTONIDAE

LECHUZA DE CAMPANARIO *Tyto alba*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N				

Total de nidos : 17

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-07-70	Ataliva	4 pichones	Cumbrera de una casa	6,00
12-06-71	Esperanza	1 pichón	Cielorraso de una casa	4,00
10-09-71	Esperanza	4 pichones	Ropero abandonado en galpón	3,50
15-06-77	Cayastacito	5 huevos	Hueco en torre de agua	7,00
15-06-77	Cayastacito	1 huevos	Hueco en cielorraso	4,50
05-02-92	Isla Verde	4 huevos	Palomar abandonado	3,50
07-04-93	Esperanza	3 pichones	Torre de agua	20,00
07-07-93	Amenabar	2 pichones	Cielorraso de galpón	5,00
15-05-96	Santa Fe	4 pichones	Torre de iglesia	15,00
17-05-96	Los Cardos	5 pichones	Caño colgante en galpón	4,00
20-05-96	Naré	1 pichón	Balcón en una casa	7,00
23-05-97	Santa C. de Buena Vista	2 pichones	Hueco en Paraíso	3,20
04-06-00	Saladero Cabal	4 pichones	"Buche" de estufa (Hogar)	0,60
31-03-08	Esperanza	5 huevos	Sobre granos de Trigo en un silo	3,50
06-02-10	Humboldt	11 huevos	Sobre comida de gallinas en un silo	4,00
15-04-13	Esperanza	6 pichones	Tabla colgante en galpón	3,50
20-06-13	Rincón de Ávila	5 huevos	Hueco en Paraíso	3,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en edificios (cumbreras, cielorrasos) plataformas, oquedades, grietas, cajones, tarros, caños, muebles abandonados, huecos en árboles o sobre el piso de torres, balcones, galpones, en silos (sobre comida de animales o granos).

Características.

Oculto. Poco elaborado o rudimentario. Plataforma de palitos. También huevos puestos directamente sobre ladrillos y tierra.

Medidas :

Diámetro de 15 a 22 cm.

Altura :

Nido más bajo a 0,60 m.

Nido más alto a 20 m.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos. A veces más.

Ovoidales. De color blanquecino o grisáceo.

Medidas y pesos :

De 39,2 a 41,5 x 29 a 33,2 X= 40,2 x 31,3 (N= 10)

Peso lleno : de 22,2 a 23,2 X= 22,7 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 1,250 a 2,040 X= 1,300(N= 10)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
243	15-06-77	Cayastacito	39,4 x 31,5		1,803
			40,3 x 30,8		1,857
			40,5 x 31,7		1,872
			41,4 x 31,9		2,040
			41,5 x 31,8		2,040
244	15-06-77	Cayastacito	40,0 x 29,0		1,250
827	05-02-92	Isla Verde	39,2 x 32,3	22,2	1,700
			39,8 x 33,2	22,7	1,900
			40,3 x 32,2	22,9	1,900
			40,3 x 32,8	23,2	1,900

PICHONES

Descripción.
Cuerpo cubierto de plumón blanco.

ALILICUCU COMÚN *Megascops choliba*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	

Total de nidos : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	3 pichones	Hueco en árbol	2,50
31-10-77	Río Leyes	2 pichones	Hueco en árbol	3,00
04-09-90	Morteros	3 huevos	En nido de *Colaptes sp.*	3,50
10-10-90	Isla Verde	1 huevo	Hueco en árbol	3,60
19-11-95	Rincón de Ávila	No observado	En nido de *Colaptes campestris*	4,50
27-11-95	Villa Ocampo	2 pichones	En nido de *Colaptes melanochloros*	2,70
10-10-97	Roldán	3 huevos	Hueco en Eucaliptus	4,00
21-10-98	Isla Verde	4 huevos	En nido de *Colaptes sp.*	3,30
30-10-98	Santa C. de B. Vista	2 pichones	Hueco en Paraíso	3,30
27-10-99	Rincón Potrero	2 pichones	Nido de *Pitangus sulphuratus*	3,00
15-11-08	Elisa	2 pichones	Hueco en pared de un galpón	4,00
25-10-10	Cayastá	3 huevos	Hueco en un árbol	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos naturales en árboles o en nidos de *Colaptes melanochloros* y de *Colaptes campestris.* También nidos de otras aves.

Características.

Oculto. Rudimentario.

Altura :

Nido más bajo a 1,60 m.

Nido más alto a 4,50 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medida y peso :

33,3 x 27,4 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 0,9 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
712	10-10-90	Isla Verde	33,3 x 27,4	0,9

PICHONES

Descripción. Pico y patas grises. Cuerpo cubierto de plumón blanquecino. A los pocos días, dorsalmente rayado de pardo oscuro. Ventralmente gris con rayas transversales pardo oscuro.

OBSERVACIONES

05-11-89. Esperanza, se encontró un pichón chico en el suelo. Aparentemente caído de un nido después de una tormenta.

10-11-90. Esperanza. Una pareja estaba en un Ombú con 2 juveniles.

13-12-91. Malabrigo. Adulto con 3 juveniles.

13-12-91. Villa Ocampo. Adulto con 2 juveniles.

17-12-01. Esperanza. Pareja con 2 juveniles.
11-11-04. Esperanza. Pareja con 3 juveniles.
05-11-08. Esperanza. Pareja con 2 juveniles.
12-10-12. Esperanza. Pichón caído en el suelo. Un adulto en un árbol próximo.
05-12-12. Esperanza. Pichón caído en el suelo. Dos adultos en un árbol próximo.

En el nido del 27-10-99 en Rincón Potrero, la pareja alimentaba a los pichones con Mariposas nocturnas y grillos.
En el nido del 15-11-08 en Elisa, un adulto llevó a los pichones una Torcacita (*Columbina picui*)

ÑACURUTÚ *Bubo virginianus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N			

Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-07-78	Cayastacito	2 huevos	Eucaliptus (*)	15,00
20-10-86	Saladero Cabal	1 pichón	Eucaliptus (*)	10,00
29-09-89	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	14,00
15-07-91	Calchaquí	3 huevos	Algarrobo (1)	11,00
10-08-01	La Camila	2 pichones	Eucaliptus (*)	15,00

(*). Construido sobre nidos de *Myiopsitta monachus* en actividad.
(1). Construido en uno abandonado de *Caracara plancus*.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Construye el nido en grutas, huecos en árboles, en el suelo, sobre nidos abandonados de águilas o de Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra.

Características. Plataforma de palitos. Puede colocar alguna paja o plumas.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 54 a 59,8 x 45 a 46,6
X= 56,6 x 45,6 (N= 5)
Peso lleno : de 57,8 a 63,2
X= 60,2 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 4,8 a 5,8
X= 5,35 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
245	20-07-78	Cayastacito	57,0 x 45,9		5,144
			59,8 x 45,5		5,848
806	15-07-91	Calchaquí	54,0 x 45,0	57,8	4,8
			55,4 x 45,4	59,8	5,3
			57,0 x 46,6	63,2	5,7

OBSERVACIONES

27-10-72. Cayastacito. Adulto con 2 juveniles.

CABURÉ *Glaucidium brasilianum*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-10-89	La Camila	4 huevos	En nido de *Colaptes melanochloros*	2,00
21-10-99	Villa Georgina	4 pichones y 1 huevo	Hueco en un tronco	0,60
14-11-06	Providencia	4 pichones	Hueco en Paraíso	3,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Construye el nido en nidos abandonados de Carpinteros o en huecos naturales. También en nidos de Hornero (*Furnarius rufus*)

Características.

Oculto. Rudimentario.

HUEVOS

Pone 5 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 28,2 a 29 x 24,1 a 24,6 X= 28,4 x 24,3 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,80 X= 0,80 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
881	17-10-89	La Camila	28,2 x 24,6	0,80
			28,2 x 24,5	0,80
			28,5 x 24,4	0,80
			29,0 x 24,1	0,80

PICHONES

Descripción.

Cuerpo cubierto de plumón blanquecino, hasta los 9-10 días. Luego comienza a notarse un jaspeado pardo en ventral y pardo más uniforme dorsalmente.

A los 20 días las alas son pardas con manchas blanquecinas en las cubiertas.

OBSERVACIONES


Los pichones a los 28-30 días dejan el nido.

LECHUCITA VIZCACHERA *Athene cunicularia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 5



Fecha	Lugar	Contenido
18-10-70	Ataliva	1 huevo
18-10-70	Ataliva	4 huevos
20-10-79	Sarmiento	3 huevos
30-10-95	Esperanza (1)	1 huevo
04-02-97	Fortín Chilca (2)	No observado

(1) Nido en el suelo (no en cueva) en un campo. Completó 4 huevos, pero fue abandono luego de grandes lluvias.
(2) Nido en un hormiguero (tacurú). La boca de entrada estaba a 40 cm. del suelo.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas en el suelo. Raro posturas fuera de ellas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Las cuevas tienen un túnel que lleva a la cámara. Ésta es un poco más ancha. Los huevos son puestos sobre la tierra o sobre pocos pastos.

Alrededor de la boca de entrada puede colocar materias fecales de animales y otros elementos.

Medidas :

Largo del túnel : de 1,20 a 1,50 m.

Diámetro : de 18 a 20 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 6 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 33,5 a 35,5 x 27,4 a 28,8

X= 34,3 x 28 (N= 8)

Peso de las cáscaras : de 0,930 a 1,014

X= 0,947 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
246	18-10-70	Ataliva	33,7 x 27,7	0,918
247	18-10-70	Ataliva	33,5 x 28,8	0,930
			33,7 x 27,8	0,964
			35,4 x 27,4	1,011
			35,5 x 28,8	1,014
248	20-10-79	Sarmiento	34,9 x 28,9	0,943
			35,0 x 27,8	0,945
			35,0 x 27,4	0,950

PICHONES

Descripción.

Nacen cubiertos de plumón blanquecino.

OBSERVACIONES

28-11-03. Esperanza. Varias parejas con pichones : dos con 3 y otra con 4 pichones.

05-12-05. Esperanza. Varias parejas con pichones : cinco con 3 y otra con 4 pichones.

16-11-12. Rincón de Ávila. Pareja con 5 pichones.

18-12-08. Esperanza. Un ejemplar Albino.

LECHUZÓN OREJUDO *Pseudoscops clamator*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		N	N	N	N	N					

Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
18-07-83	Esperanza	1 huevo	Entre pastos en un monte de Paraísos
19-06-84	Esperanza	2 huevos	Entre pastos y ramas en una arboleda
20-04-98	Isla Verde	2 pichones	Entre pastos en una arboleda
21-04-98	Isla Verde	2 pichones	Entre pastos altos en una arboleda
01-08-98	Esperanza	1 pichón	Entre pastos altos en una arboleda
19-06-99	Esperanza	1 pichón	Entre ramas secas en cañas Tacuaras
16-06-02	Esperanza	2 huevos	En arboleda

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Rudimentario. Depresión con pastos en la base.

Medidas :

Diámetro total : de 19 a 22 cm.

Profundidad : de 3 a 10 cm.

HUEVOS

Pone hasta 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 43,9 a 47,8 x 38 a 38,7 X= 44,6 x 38,3 (N= 3)

Peso lleno : 41 (N= 1)

Peso de las cáscaras : de 2,6 a 3,5 X= 2,90 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
249	18-07-83	Esperanza	47,8 x 38,7	41,0	3,5
920	19-06-84	Esperanza	43,9 x 38,4		2,6
			44,3 x 38,0		2,6


PICHONES

Descripción.

Plumón ocráceo amarillento. Disco facial castaño-rojizo. Al lado del pico blanco.

A medida que se desarrollan las plumas son ocre amarillentas y las alas de ese color y barras pardas oscuras.

LECHUZÓN DEL CAMPO *Asio flammeus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	N	N						

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido
29-04-80	Galvez	1 huevo
02-05-80	López	1 huevo
05-05-93	Wildermuth	3 huevos
22-06-99	Logroño	3 pichones

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Rudimentario. Ligera depresión con pastos en la base.

Medidas :

Diámetro total : de 16 a 22 cm.

HUEVOS

Pone hasta 6 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 43,2 a 47 x 35,6 a 38,2

X= 45,1 x 36,9 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 2,053 a 3,157

X= 2,605 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
250	29-04-80	Galvez	43,2 x 35,6	2,053
268	02-05-80	López	47,0 x 38,2	3,157

FAMILIA: NYCTIBIIDAE

URUTAÚ COMÚN *Nyctibius griseus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-12-07	Jacinto Arauz (*)	1 huevo	Poste de alambrado	1,50
29-12-10	San Jerónimo del Sauce	1 huevo	Rama rota de Chañar	1,70
15-01-13	Jacinto Arauz (**)	1 Pichón	Poste de alambrado	1,50

(*) Nido localizado junto a Víctor Merlino y Francisco Junkers.
(**) Ocupó el mismo poste del nido del 05-12-07.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En postes, ramas, en montes.
Características.
Expuesto. Rudimentario.

HUEVOS

Pone 1 huevo.
Ovoidal. Blanquecino con manchitas y pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medida: 39 x 27,5 (N= 1)

PICHÓN

1 Día. Tenía todo el cuerpo cubierto de plumón blanquecino. Patas grisáceas. Pico negro. Ojos amarillentos.

14 días. Está con la misma postura del adulto. La cabeza hacia arriba, con el lomo adosado a la parte ventral del que lo cuidaba. Plumaje blanquecino, notándose el raquis oscuro de las plumas, lo que le daba un aspecto jaspeado. Se notan bastante largas las vainas de las plumas alares. Los ojos cerrados o entreabiertos.

20 días. Se notan las plumas de cobertura del ala, oscuras. De noche los ojos están abiertos.

25 días. Tiene las cubiertas alares oscuras. La cola de 3,4-4 cm. Dorsalmente más gris. Mástiles oscuros. Plumas de las cejas ligeramente elevadas. Primarias oscuras. El adulto más vivaracho. Ubicado al lado. Entreabre los ojos.

26 días. El pichón queda solo. Todas las noches a la misma hora (20,40) cuando comenzaba a oscurecer un adulto alimentaba al pichón. El pichón aletea cuando ve al adulto.

30 días. Mueve la cabeza levemente al aproximarse una persona. Ojos entreabiertos. Amarillos. Plumaje como adulto pero más claro. Cola de unos 7 cm.

39 días. Color claro. Cola de 10 cm.Dos líneas oscuras por debajo del pico. Algunas manchas en el pecho.


41 días. Deja el nido.

OBSERVACIONES

El poste tenía la superficie irregular, con un hueco de 1 a 2 cm. de diámetro x 5 cm. de largo y 5 cm. de profundidad.
El huevo estaba ubicado en forma transversal en la parte más angosta del hueco. Por lo tanto una parte quedaba sin tocar el poste.
El adulto que incubaba no cubría totalmente al huevo.
Se puede parar una persona al lado, a pocos centímetros sin que se inmuten.

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE

ÑACUNDA *Chordeiles nacunda*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Fecha	Lugar	Contenido
25-10-76	Villa San José	2 huevos
28-10-76	Progreso	2 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Huevos puestos sobre la tierra.

Medidas :

Diámetro total : de 16 a 22 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color ocre rosado, profusamente manchados e castaño claro. Cáscara brillante.

Medidas y pesos :


35,4 a 38,4 x 25,7 a 26,8 X= 36,7 x 26 (N= 4)

Peso de las cáscaras: de 0,881 a 1,152 X= 1,045 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
251	25-10-76	Villa San José	35,4 x 25,8	1,078
			36,0 x 25,7	1,152
252	28-10-76	Progreso	37,0 x 26,0	0,881
			38,4 x 26,8	1,072

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA *Systellura longirostris*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Fecha	Lugar	Contenido
25-10-70	Cayastacito	2 pichones
02-12-77	Esperanza	1 huevo

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color ocre con pintitas grises y pardo claro.

Medida y peso :


27 x 19,5 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 0,351 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscaras
254	02-12-77	Esperanza	27 x 19,5	0,351

CURIANGO *Nyctidromus albicollis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
15-10-01	Capioví	2 huevos	En plantación de Eucaliptus (*)

(*) Localizado por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Puede colocar hojas en la base.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color crema rosado con manchas grises y pardo rojizas. Cáscara brillante.

Medidas :

31 a 32 x 23,0 X= 31,5 x 23 (N= 2)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
15-10-01	Capioví	31,0 x 23,0
		32,0 x 23,0

ATAJACAMINOS CHICO *Setopagis parvulus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Fecha	Lugar	Contenido
25-11-78	Cayastá	2 huevos
14-12-90	Esperanza	2 huevos
28-11-95	Villa Guillermina	2 huevos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color ocre con pintas grises o sin ellas.

Medidas y pesos :

De 25,5 a 26,9 x 19,7 a 20,8

X= 26,1 x 20,3 (N= 4)

Peso lleno : 5,5 X= 5,5 (N= 2)


Peso de las cáscaras : de 0,400 a 0,474

X= 0,419 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
255	25-11-78	Cayastá	25,7 x 20,8		0,465
			26,9 x 20,8		0,474
778	14-12-90	Esperanza	25,5 x 19,9	5,5	0,400
			26,3 x 19,7	5,5	0,400

ATAJACAMINOS TIJERA COMÚN *Hydropsalis torquata*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos: 11

Fecha	Lugar	Contenido
24-11-77	Esperanza	1 huevo
02-12-77	Esperanza	1 huevo
04-10-79	Esperanza	2 huevos
14-10-86	Cayastá	2 pichones
04-12-88	Cayastá	2 huevos
04-10-89	Morteros	2 huevos
11-11-00	Santa Fe	2 huevos
11-12-00	Colastiné	2 huevos
12-10-01	Esperanza	2 huevos
18-09-03	Esperanza	2 huevos
22-11-03	Esperanza	2 huevos

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								1	4	3	3

REPRODUCCIÓN

Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
	18-19 días	12-13 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, en praderas o claros en montes.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la tierra o sobre hojas.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color ocre o crema con pintas y finas líneas grises y pardas.

Medidas y pesos :

De 29,2 a 30,4 x 20,8 a 21,4

X= 29,6 x 21 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,543 a 0,568

X= 0,552 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
253	24-11-77	Esperanza	30,4 x 20,8	0,554
	02-12-77	Esperanza	29,4 x 21,0	0,543
257	04-10-79	Esperanza	29,2 x 20,8	0,553
			29,4 x 21,4	0,568

PICHONES

Descripción.

Nace con los ojos abiertos.Pico negro. Cavidad bucal rosada. Plumón por todo el cuerpo pardo grisáceo, jaspeado de pardo oscuro.

Ventralmente pardo.

1 día. Largo de la cabeza, 2 cm. Largo del cuerpo, 4,9 cm. Dedos, 1 cm. Patas pardo oscuro. Pían.

4 días. Aparecen los cañones de las plumas primarias y secundarias.

6 días. Largo de la cabeza, 2,8 cm. Largo del cuerpo, 6,6 cm. Ojos marrones. Patas grises. Gritan. Se van del nido caminando con las alas hacia arriba.

8 días. Coloración de adulto.

12-13 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	
1	0,7	0,9						
6	1,4	1,8	2,5	1,7	0,3	1,5	0,15	0,4

OBSERVACIONES

Los pichones tienen un desarrollo rápido. Al segundo día si son molestados se corren por el suelo.


La hembra, como aptitud de agresividad, vuela cerca y abre las alas y la boca. Emite un grito ronco, áspero. Se puede posar en troncos o ramas bajas, mueve la cabeza hacia arriba y abajo y realiza movimientos acompasados de la cola.

FAMILIA: APODIDAE

VENCEJO NEGRUZCO *Cypseloides rothschildi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	**N**



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-12-02	Río Las Cañas	No observado	En pared rocosa	15,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En paredes rocosas. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma de cono. Construido con musgos y tierra

VENCEJO DE CASCADA *Cypseloides senex*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	**N**	



Fecha	Lugar	Contenido	Altura
12-10-81	Cataratas del Iguazú	1 huevo	2,30
12-10-81	Cataratas del Iguazú	Sin postura	2,30

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En repisas o salientes rocosas. Bajos, a mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de tierra en la base, fibras vegetales, musgos y líquenes en el resto.

Medidas :

Diámetro : de 8 a 12 cm.
Profundidad: 0,5 cm.
Alto : 3 cm.

HUEVOS


Pone 1 ó 2 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

VENCEJO DE COLLAR *Streptoprocne zonaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	**N**	

Fecha	Lugar	Contenido	Altura
28-11-82	Los Gigantes	2 huevos	4,00
28-11-82	Los Gigantes	2 huevos	4,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. Asentado en salientes rocosas o repisas, en grutas. Altos.
Características. Expuesto. Elaborado. Plataforma de musgos, helechos y tierra. Perfil triangular.
Medidas:

Ancho : 22 cm.
Alto externo : 8 a 9 cm.
Alto interno : 2 a 3 cm.
Profundidad : 2 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :
De 33,3 a 34 x 24,3 a 24,9
X= 33,6 x 24,6 (N= 2)
Peso lleno : de 9,812 a 9,992
X= 9,902(N= 2)
Peso de las cáscaras : de 0,701 a 0,775
X= 0,738(N= 2)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
595	08-11-82	Los Gigantes	33,3 x 24,9	9,812	0,701
			34,0 x 24,3	9,992	0,775

VENCEJO BLANCO *Aeronautes andecolus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Altura
05-12-81	Pampa de Achala	No observados	15,00 a 20,00
16-01-82	Huaco	No observados	25,00
27-11-89	Pampa de Achala	1 huevo	18,00
25-11-90	Pampa de Achala	No observados	18,00 a 20,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. En huecos o grietas, en laderas de montañas. Altos.
Características. Oculto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la piedra o sobre plumas.

HUEVOS


Pone 1 ó 2 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medida : 22,1 x 15 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida
594	27-11-82	Pampa de Achala	22,1 x 15,0

FAMILIA: TROCHILIDAE

COLIBRÍ GRANDE *Colibri coruscans*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	**N**

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-10-99	Cuesta del Clavillo	2 pichones	Arbusto	1,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Adherido y semiapoyado a ramitas de arbustos o de árboles. A baja Altura


Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita (semiesfera) de musgos y algunos líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 6 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 2 cm.
Alto : 4 cm.

PICAFLOR RUBÍ *Sephanoides sephaniodes*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	**N**	**N**

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
21-11-98	San Carlos de Bariloche	2 huevos	En Caña Colihue	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado y adherido a ramas. A baja altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción musgos.

Medidas :

Diámetro total : 8 cm.
Diámetro interno : 5 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas :

De 14 a 14,5 x 9 a 9,5 X= 14,2 x 9,2
(N= 2)


NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
21-11-98	San Carlos de Bariloche	14,0 x 9,3
		14,5 x 9,5

PICAFLOR COMETA *Sappho sparganura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Valle Encantado	2 huevos	Helechos colgantes	2,50
30-11-78	Valle Encantado	2 huevos	Helechos colgantes	2,30
14-11-80	Copina	En construcción	Helechos colgantes	5,00
17-12-81	Ascochinga (al oeste)	2 huevos	Raices en una barranca	1,60
17-12-81	Ascochinga (al oeste)	1 huevo	Raices en una barranca	1,60
17-12-81	Ascochinga (al oeste)	2 huevos	Raices en una barranca	1,65
25-11-90	Copina	En construcción	Helechos colgantes	2,40
09-01-99	Aconquija	2 huevos	Raices en una barranca	2,10

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas, helechos o raices, en barrancas, salientes rocosas o grietas, en grutas, rocas o barrancas de tierra. A mediana y baja Altura o altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita o cono invertido. Emplea en la construcción musgos, fibras vegetales, líquenes, lanas y materiales vegetales suaves interna y externamente, liados con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : de 3,5 a 5 cm.
Diámetro interno : de 2,5 a 3 cm.
Profundidad : de 2,5 a 3,5 cm.
Alto : de 4,5 a 5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 13,8 a 15,3 x 8,9 a 9,5 X= 14,4 x 9,1 (N= 9)
Peso de las cáscaras : de 0,028 a 0,036 X 0,030 (N= 9)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
263	06-12-77	Valle Encantado	13,8 x 9,5	0,028
			14,0 x 9,0	0,032
264	30-11-78	Valle Encantado	14,1 x 9,3	0,030
			14,5 x 9,3	0,030
265	17-12-81	Ascochinga (al oeste)	14,6 x 9,2	0,032
			14,8 x 8,9	0,036
266	17-12-81	Ascochinga (al oeste)	14,3 x 9,5	0,029
	17-12-81	Ascochinga (al oeste)	15,0 x 9,4	0,030
			15,3 x 9,4	0,033

PICAFLOR PUNEÑO *Oreotrochilus estella*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Valle Encantado	Sin postura	Techo de gruta	1,50
30-11-78	Valle Encantado	Sin postura	Techo de gruta	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.

Colgante del techo de grutas. A baja altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, musgos y líquenes, liados con telas de arañas. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 7 a 9,5 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 3 cm.
Alto : 7 cm.

PICAFLOR GIGANTE *Patagonas gigas*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-02-01	Azul Pampa	2 pichones	Tirante en construcción	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.

Asentado en tirante de construcción. A baja Altura .


Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 9 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 2 cm.
Alto : 2 cm.

PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 37

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-10-75	Aguará Grande	2 huevos	Chañar	3,00
10-11-76	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
20-10-78	Cayastá	1 huevo	Naranjo	2,50
04-10-89	Morteros	2 huevos	Chañar	4,50
04-10-89	Morteros	1 huevo	Chañar	4,60
02-11-90	Morteros	2 pichones	Chañar	5,50
15-11-90	Morteros	En construcción	Chañar	1,95
02-10-91	Malabrigo	En construcción	Quebracho colorado	4,50
11-11-96	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
01-10-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	3,80
15-10-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,50
17-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,80
23-11-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,50
12-10-99	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,70
17-10-99	Calchaquí	2 huevos	Algarrobo	5,00
25-10-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,00
14-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
28-09-01	Esperanza	En construcción	Acacia negra	5,50
04-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
14-12-01	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	7,00
16-09-02	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	5,50
11-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	6,50
17-10-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
14-11-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,30
07-12-02	Esperanza	En construcción	Chañar	8,00
06-12-03	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
21-10-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	6,50
01-11-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	6,00
05-11-04	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,70
07-10-05	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,50
07-10-05	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
05-12-05	Esperanza	No observado (*)	Quebracho blanco	3,50
14-10-06	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
11-10-12	Villa Roda	En construcción	Chañar	3,60
07-11-12	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	7,00
11-10-12	Villa Roda	En construcción	Chañar	3,60
13-12-12	Esperanza	No observado	Chañar	6,50

(*) Ocupó el mismo nido de 07-10-05

Total de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								2	21	9	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10-17 días	Pone en días alternos	17 días	26-27 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles. A mediana y baja Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita de fibras vegetales suaves, lana, barba de viejo. Liados con tela de arañas. Recubierto externamente con líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 4,5 a 5 cm.

Diámetro interno : de 3,5 a 4 cm.

Profundidad : de 1,5 a 2 cm.

Alto : de 3 a 3,5 cm.

Altura desde el suelo :

Nido más bajo a 1,80 m.

Nido más alto a 8,00 m.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 14,5 a 15,5 x 9 a 9,4

X= 14,8 x 9,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,037 a 0,047

X= 0,042 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
269	10-10-75	Aguará Grande	14,9 x 9,4		0,037
			15,5 x 9,4		0,047
	10-11-76	Esperanza	14,5 x 9,0		
			14,5 x 9,0		
	01-11-04	Esperanza	14,5 x 9,4	0,5	
			14,4 x 9,5	0,5	

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Plumón gris. Dos líneas en dorsal.

5 días. Ojos semiabiertos (por momentos). Dos líneas, en dorsal de plumón. Activo.

7 días. Ojos cerrados. Pico pardo oscuro. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillentos. Plumón gris. Flancos blanquecinos.

10 días. Plumas blanquecinas en los lados del cuerpo.

13 días. Plumas ventralmente. Dorsalmente pardo oscuras con punta ocrácea.

15 días. Plumas tornasoladas. Blanquecinas en la garganta. Láminas oscuras. Cañones alares claros.

18 días. Ventralmente blanquecino. Dorsalmente verdoso con la punta de las plumas ocráceas. Jaspeado.

Desde los 8 días se le notan dos abultamientos a los lados del cuello, que los inflan.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Pico	Tarso	Tibia	Medidas Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0,2	0,4	0,7	-	-	-	-	-	-	1,0-1,1
2	0,3	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,1-1,3
3	0,3	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,3-1,5
4	0,4	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,6-1,8
5	0,4	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,9-2,2
6	0,5	0,5	0,9	-	-	-	-	-	-	2,3-2,6
7	0,5	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	2,7-3,3
8	0,6	0,5	1,1	-	-	-	-	-	-	3,4-3,6
9	0,6	0,5	1,1	-	-	-	-	-	-	3,7
10	0,6	0,5	1,1	0,1	-	0,1	-	-	-	3,8
11	0,9	0,5	1,1	0,2	-	-	-	-	-	3,8
12	1,2	0,6	1,2	0,3	-	-	-	-	-	3,8
13	1,2	0,6	1,2	0,4	-	-	-	-	-	4,1-4,3
14	1,2	0,6	1,2	0,5	-	-	-	-	-	4,5-5,0
15	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	-	5,8-5,9
16	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,6	0,2	0,3	-	5,9
17	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,7	0,2	0,4	-	5,9
18	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,8	0,2	0,4	-	5,9
19	1,2	0,6	1,2	0,8	0,4	0,8	0,2	0,5	0,1	5,9

OBSERVACIONES

La hembra construye el nido. Busca telas y trocitos de corteza de chañar, desde 3 m. hasta 30 m. Aletea sobre los troncos y arranca los líquenes. Internamente puede colocar Barba de viejo (*Clematis sp*.). Moldea el nido con el cuerpo.

En el nido localizado el 15-10-98 en Esperanza, a los 11 días de volar los pichones, fue utilizado nuevamente, posiblemente por la misma hembra, criando dos pichones.

No es común la observación de los machos, pero están en las proximidades de los nidos.

Se levanta del nido y corre a todas las aves que pasan cerca. Corrió a un Benteveo hasta 30 m., también a otras aves.

Deja el nido durante mucho tiempo, cuando tiene pichones, pero anda en las proximidades.

Se observó a un macho comiendo arañitas y una hembra comía las arañitas de la tela que rodeaba un nido de *Camptostoma obsoletum*

Se observó a una hembra libar de las flores de Peine de mono.

Dos días después la madre los sigue alimentando y durante varios días permanecen juntos.

Una hembra con un juvenil buscaban insectos y arañitas debajo de la corteza en un tronco de Chañar.

Puede ocupar el mismo nido, durante la misma temporada o al año siguiente si está en condiciones.


Las hembras viejas tienen una mancha oscura en la garganta.

PICAFLOR ENANO *Microstilbon burmeisteri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-12-99	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Árbol	6,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de plantas. A mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 4,5 cm.
Diámetro interno : 2,3 cm.
Profundidad : 1,5 cm.
Alto : 3,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidas: 10 x 7,4 X= 2 (N= 2)


NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
15-12-99	Cuesta del Clavillo	10,0 x 7,4
		10,0 x 7,4

PICAFLOR COMÚN *Chlorostilbon lucidus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N



Total de nidos : 109

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-10-70	Cayastacito	2 huevos	Alambre en techo de galpón	3,00
11-12-72	Esperanza	2 pichones	Enredadera	2,50
23-10-79	Cayastá	2 huevos	Árbol	1,00
15-10-81	Esperanza	1 huevo	Enredadera	1,80
25-08-84	Esperanza	2 huevos	Enredadera	1,60
15-09-87	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,80
08-01-88	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,80
10-09-88	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,80
12-11-88	Esperanza	Sin postura	Hilos en techo de galpón	4,00
29-11-88	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,60
12-11-88	Esperanza	En construcción	Hilos en techo de galpón	4,00
03-12-88	Esperanza	Sin postura	Naranjo	1,60
03-08-89	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,60
22-09-89	Esperanza	1 huevo	Alambre en techo de galpón	2,80
23-09-89	Esperanza	En construcción	Alambre en techo de galpón	3,70
26-09-89	Las Claritas	2 pichones	Alambre en techo de galpón	5,00
26-09-89	Aº Ceibal	2 huevos	Mandarino	1,10
26-09-89	Las Claritas	En construcción	Gancho en techo de galpón	5,00
02-10-89	Sarmiento	1 huevo	Enredadera	1,50
03-10-89	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	3,80
04-10-89	Morteros	En construcción	Raiz en barranca	1,50
04-10-89	Morteros	2 huevos	Raiz en barranca	1,50
07-10-89	Esperanza	2 pichones	Enredadera	2,30

05-11-89	Esperanza	En construcción	Alambre en techo de galpón	2,70
23-11-89	Esperanza	1 huevo	Alambre en techo de galpón	3,00
25-11-89	Padre Iturralde	2 pichones	Alambre en techo de galpón	3,00
07-12-89	Esperanza	1 pichón	Enredadera	1,60
15-12-89	Esperanza	1 pichón	Enredadera	2,30
06-08-90	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,80
04-09-90	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	2,80
02-11-90	Morteros	2 pichones	Raiz en barranca	0,70
02-11-90	Morteros	2 huevos	Yuyo colgante en barranca	1,00
02-11-90	Morteros	1 huevo	Yuyo colgante en barranca	2,00
07-11-90	Morteros	Sin postura	Arbusto	0,30
17-12-91	Esperanza	2 pichones	Enredadera	1,50
21-10-92	Villa Ocampo	2 pichones	Alambre colgante en habitación	2,00
13-10-93	Esperanza	2 huevos	Ciruelo	1,50
27-10-93	Esperanza	2 pichones	Enredadera	4,30
21-11-93	Las Cuevas	En construcción	Raiz en barranca	1,70
15-11-94	Esperanza	2 huevos	Jazmín del cielo	0,40
15-11-94	Esperanza	2 pichones	Naranjo	3,40
15-11-94	Esperanza	2 pichones	Ligustro	2,30
15-11-94	Esperanza	2 huevos	Planta en plantera	1,70
15-11-94	Esperanza	2 huevos	Cable en tinglado	3,60
17-11-94	Villa Roda	2 pichones	Cable en techo de una casa	3,70
17-11-94	Villa Roda	2 pichones	Alambre en techo de galería	3,80
14-11-95	Esperanza	1 huevo	Naranjo	1,50
20-02-97	Esperanza	2 pichones	Araucaria	1,70
17-10-00	Esperanza	1 huevo	Tala	0,60
19-09-02	Esperanza	1 huevo	Arbusto	2,30
12-09-03	Esperanza	2 huevos	Palmera china en un garage	2,70
30-10-03	Esperanza	2 huevos	Palmera china en un garage	2,70
30-12-03	Esperanza	2 huevos	Planta colgante de una plantera	1,00
04-01-06	Esperanza	2 pichones	Ficus	2,20
04-01-06	Esperanza	2 pichones	Ficus	1,50
10-01-06	Esperanza	2 pichones	Juvenil	1,80
10-10-06	Esperanza	2 pichones	Alambre en techo de galpón	2,10
25-11-06	Esperanza	2 huevos	Ficus	3,70
16-09-07	Esperanza	2 huevos	Arbusto	2,80
22-10-07	Esperanza	2 huevos	Alambre en techo de galpón	3,50
22-10-07	Esperanza	2 huevos	Mandarino	2,10
11-01-08	Esperanza	1 pichón	Ficus	2,70
27-10-08	Esperanza	2 huevos	Planta en maceta	1,60
31-10-08	Esperanza	Sin postura	Ficus	4,30
31-10-08	Esperanza	2 huevos	Santa Rita	3,00
04-11-08	Esperanza	2 huevos	Ficus	2,80
04-11-08	Esperanza	1 huevo	Mandarino	1,60
04-11-08	Esperanza	2 pichones	Ficus	0,70
04-11-08	Esperanza	2 pichones	Botón azul	1,00
04-11-08	Esperanza	2 pichones	Santa Rita	1,80
04-11-08	Esperanza	2 pichones	Santa Rita	2,80
04-11-08	Esperanza	2 pichones	Bignonia rosada	3,00
05-11-08	Esperanza	2 huevos	Naranjo	2,40
05-11-08	Esperanza	2 pichones	Alambre en un galpón	3,20
05-11-08	Esperanza	2 pichones	Alambre en un galpón	2,80
05-11-08	Esperanza	2 huevos	Cable de la luz, en una galería	3,70

06-11-08	Esperanza	2 huevos	Alambre en un techo de paja	3,40
06-11-08	Esperanza	2 huevos	Ficus	2,10
06-11-08	Esperanza	2 huevos	Mora	4,30
07-11-08	Esperanza	2 pichones	Arbusto	1,50
08-11-08	Esperanza	2 pichones	Ficus	1,00
08-11-08	Esperanza	2 huevos	Cable de la luz en un garaje	3,20
10-11-08	Esperanza	2 huevos	Santa Rita	3,00
11-11-08	Esperanza	1 pichón	Mandarino	1,10
12-11-08	Esperanza	Sin postura	Hiedra	2,80
16-11-08	Esperanza	2 pichones	Limpiatubo	1,50
19-11-08	Esperanza	2 pichones	Alambre colgante en galpón	2,60
05-12-08	Esperanza	2 huevos	Ficus	2,50
12-12-08	Esperanza	2 huevos	Ficus (1)	4,30
12-12-08	Esperanza	2 huevos	Vid	1,20
14-12-08	Esperanza	2 huevos	Hiedra	2,80
16-12-08	Esperanza	2 huevos	Mandarino	0,80
17-12-08	Esperanza	2 huevos	Ficus	1,40
20-12-08	Esperanza	2 pichones	Porta maceta	3,20
20-12-08	Esperanza	2 pichones	Paja de techar en “quincho”	3,20
22-12-08	Esperanza	2 pichones	Fresno	3,60
22-12-08	Esperanza	2 pichones	Ficus (1)	1,20
22-12-08	Esperanza	2 pichones	Cascada	1,20
22-12-08	Esperanza	2 pichones	Tumbergia azul	3,00
19-01-09	Esperanza	2 pichones	Mandarino	2,20
19-01-09	Esperanza	2 huevos	Cable en un galponcito	2,80
20-01-09	Esperanza	2 pichones	Santa Rita	1,60
20-01-09	Esperanza	2 pichones	Hiedra	3,20
23-01-09	Esperanza	2 pichones	Hiedra, en galería	3,60
29-01-09	Esperanza	2 pichones	Santa Rita	2,60
29-01-09	Esperanza	2 pichones	Jazmín del cielo	1,00
19-10-09	Esperanza	2 huevos	Juvenil	1,00
20-02-12	Esperanza	2 pichones	Hiedra	2,70
27-09-12	Esperanza	2 huevos	Laurel de jardín	1,20

(*) Ocupó el mismo nido.

Número de nidos por meses

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	2						3	12	20	42	18

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
9-13 días	Pone en días alternos	15-16 días	21-23 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante o asentado en alambres, hierros, cables o hilos pendientes de techos. En ramas de plantas, tallos de enredaderas, yuyos o raíces, en barrancas, plantas en planteras. A mediana y baja altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, cerdas, lanas, ma-

teriales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente trocitos de hojas o de cortezas de árboles, musgos.

Medidas :

Diámetro total : de 3 a 4,5 cm.
Diámetro interno : de 2 a 3,5 cm.
Profundidad : de 1,5 a 3 cm.
Alto : de 3 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 11,4 a 13,4 x 7 a 8,5 X= 2,4 x 8,1 (N= 8)
Peso lleno : 0,200 X= 0,200 (N= 1)
Peso de las cáscaras : de 0,018 a 0,027 X= 0,022 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	13-10-70	Cayastacito	12,0 x 7,0		0,020
			12,5 x 7,4		0,020
259	23-10-79	Cayastá	12,8 x 8,5		0,027
			13,4 x 8,3		0,027
260	15-10-81	Esperanza	11,4 x 8,4		0,018
681	22-09-89	Esperanza	12.8 x 7,7		0,020
277	03-10-89	Esperanza	12,0 x 8,4	0,200	0,023
931	19-09-02	Esperanza	12,3 x 8,5		0,022

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico amarillento. Plumón ocráceo rojizo.

6 días. Abre los ojos. Aparecen las vainas de las plumas dorsales.

9 días. Interior de la cavidad bucal rojizo. Paladar naranja. Plumitas en el dorso.

11 días. Se notan las vainas de las secundarias, en la cabeza y dorsalmente. Plumas color canela.

15 días. Emplumado.

MEDIDAS

Días de vida	Pico	Medidas			
		Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
		Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Total
9	0,5	0,3	-	-	-
11	0,5	0,7	-	-	-
13	0,8	0,9	0,4	0,7	0,4
15	0,9	0,9	0,6	-	0,5

OBSERVACIONES

La hembra construye. Repara nidos viejos y los utiliza en la misma temporada. Pueden realizar tres posturas en una temporada.

Se localizaron hasta 4 nidos superpuestos.

Los nidos en general son colgantes, a veces asentados.

Los pichones elevan la cola y defecan fuera del nido y a los 15 días de edad se paran en el borde del nido.

Se lo ha visto libar flores de Peine de mono, Liga, Guarán, Tasi liso, Dama de noche, Seibo, Talia y Amor seco.

Desde fines de octubre de 2008 a fines de enero de 2009 se realizó un relevamiento de los nidos del Picaflor común, para determinar la cantidad de parejas que estaban nidificando en la ciudad de Esperanza (Santa Fe).


Se detectaron 44 nidos con huevos o con pichones

Ubicación		
Número de nidos	Elemento sostén	
9	Ficus	En jardín. Dos nidos en galería
6	Santa Rita	En jardín
4	Alambre colgante	En techo de galpón o garaje
4	Hiedra	En jardín. Tres nidos en galería
4	Mandarino	En jardín
3	Cable de la luz	En galería o en galpón
1	Arbusto	En jardín
1	Bignonia rosada	En galería
1	Botón azul	En jardín
1	Cascada	En galería
1	Fresno	En jardín
1	Jazmín del cielo	En jardín
1	Limpiatubo	En jardín
1	Mora	En jardín
1	Naranjo	En jardín
1	Paja de techar	En techo de un “quincho”
1	Planta en maceta	En galería
1	Porta maceta	En galería
1	Tumbergia azul	En jardín
1	Vid	En jardín

PICAFLOR CORONA VIOLÁCEA *Thalurania glaucopis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	1 huevo y 1 pichón	Rama de árbol	4,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante en ramas de plantas.Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 3 cm.
Diámetro interno : 2 cm.
Profundidad : 1,5 cm.
Alto : 3 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medida y peso :

12,2 x 7,8 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,020 (N= 1)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
261	12-10-81	Puerto Iguazú	12,2 x 7,8	0,020

PICAFLOR VIENTRE BLANCO *Amazilia chinogaster*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-99	Cuesta del Clavillo	1 huevo y 1 pichón	Arbusto	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de plantas. A mediana y baja Altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 5 cm.
Diámetro interno : 3 cm.
Profundidad : 2,5 cm.
Alto : 4 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medida :

13 x 8,5 (N= 1)


NIDADA

Fecha	Localidad	Medida
18-12-99	Cuesta del Clavillo	13 x 8,5

PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-11-78	Cayastá	2 huevos	Ombú	2,50
31-10-81	Cayastá	1 huevo	Enredadera	2,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de plantas, tallos de enredaderas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, fibras algodonosas del fruto del Palo borracho, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 3 a 4 cm.
Diámetro interno : de 2 a 3 cm.
Profundidad : de 1,5 a 2 cm.
Alto : de 3 a 4 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medidasy pesos :

De 13,4 a 14,4 x 8,8 a 9,3 X=13,6 x 9 (N= 3)

Peso lleno : 0,557 X= : 0,557 (N= 1)

Peso de las cáscaras : 0,029 a 0,032 X= 0,030 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
262	20-11-78	Cayastá	13,4 x 9,3		0,030
			14,1 x 8,9		0,032
	31-10-82	Cayastá	14,4 x 8,8	0,557	0,029


FAMILIA: TROGONIDAE


SURUCUÁ COMÚN *Trogon surrucura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	4 huevos	Árbol	5,50





REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos naturales en los árboles. A mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Sin materiales en la cámara de postura.

Medida de un hueco :

Diámetro interno : 10 cm.

Profundidad : 17 cm.

Diámetro de la boca : 7 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 28,9 a 30,4 x 21,9 a 23 X= 29,4 x 22,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras: 0,492 a 0,570 X= 0,526 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
270	12-10-81	Puerto Iguazú	28,9 x 22,6	0,492
			29,0 x 23,0	0,511
			29,5 x 23,0	0,531
			30,4 x 21,9	0,570


SURUCUÁ AMARILLO *Trogon rufus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-10-01	Capioví (*)	Sin postura	Árbol	6,00

(*) Nido localizado por Máximo Uranga.




FAMILIA: ALCEDINIDAE

MARTÍN PESCADOR GRANDE *Megaceryle torquata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura sobre el agua
22-11-77	Río Leyes	2 huevos	Barranca en río	2,00
19-10-80	Río Paraná (La Paz)	1 huevo	Barranca en río	1,90
13-11-80	Hernandarias	3 huevos	Barranca en río	1,00
24-10-83	Río Leyes	1 huevo	Barranca en río	1,85

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En cuevas en las barrancas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Sin materiales en la cámara de postura.

Medidas :

Largo del túnel : de 1,90 a 2,20 m.

Diámetro del túnel : de 10 a 12 cm.

Ancho de la cámara : de 25 a 30 cm.

Alto de la cámara : 23 a 25 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 41,2 a 43,5 x 32,3 a 34,5 X= 42,4 x 33,5 (N= 7)

Peso lleno : 27,571 X= 27,571 (N= 1)

Peso de las cáscaras: 1,210 a 1,715 X=1,547 (N= 7)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
271	22-11-77	Río Leyes	43,2 x 32,3		1,412
			43,4 x 32,7		1,445
272	19-10-80	Río Paraná (Guayquiraró)	43,3 x 34,5		1,723
273	13-11-80	Hernandarias	41,2 x 32,7		1,210
			41,9 x 33,9		1,392
			43,5 x 34,3		1,458
	24-10-83	Río Leyes	43,0 x 34,3	27,571	1,715

MARTÍN PESCADOR MEDIANO *Chloroceryle amazona*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura sobre el agua
16-02-78	Desvío Arijón	2 huevos	Barranca de río	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En cuevas en las barrancas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Sin materiales en la cámara de postura.

Medidas :

Largo del túnel : 1,10 m.

Diámetro del túnel : de 8 a 10 cm.

Ancho de la cámara : 15 cm.

Alto de la cámara : 15 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 31,39 a 31,7 x 25 a 26,4 X= 31,5 x 25,7 (N= 2)

Peso de las cáscaras: 0,580 a 0,598 X= 0,589 (N= 2)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
274	16-02-78	Desvío Arijón	31,7 x 25,0	0,580
			31,3 x 26,4	0,598

MARTÍN PESCADOR CHICO *Chloroceryle americana*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura sobre el agua
12-10-64	Videla	4 huevos	Barranca de río	1,50
30-10-75	Río Leyes	4 huevos	Barranca de río	0,90
30-10-75	Río Leyes	5 huevos	Barranca de río	1,20
06-11-80	Río Leyes	3 pichones	Barranca de río	1,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En cuevas en las barrancas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Sin materiales en la cámara de postura.

Medidas :

Largo del túnel : de 35 a 55 cm.

Diámetro del túnel : de 6 a 10 cm.

Ancho de la cámara : de 10 a 20 cm.

Alto de la cámara : 10 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 21,6 a 24 x 18 a 19,5 X= 22,7 x 18,8 (N= 11)

Peso de las cáscaras: 0,224 a 0,241 X= 0,232 (N= 5)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
661	12-10-64	Videla	23,7 x 18,4	
			24,0 x 18,7	
	30-10-75	Río Leyes	22,0 x 19,0	
			22,5 x 18,0	
			23,0 x 19,0	
			24,0 x 18,0	
275	30-10-75	Río Leyes	21,6 x 19,5	0,224
			22,0 x 18,8	0,226
			22,5 x 19,3	0,233
			22,5 x 19,3	0,239
			22,5 x 19,2	0,241

FAMILIA: BUCCONIDAE

CHACURÚ CARA NEGRA *Nystalus chacuru*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-10-01	Capioví	No observado	Barranca en un camino (*)	0,60

(*) Localizado por Maximo Uranga

REPRODUCCIÓN

NIDO
NIDO


Ubicación.
En cuevas en barrancas. A baja Altura .

Características.
Expuesto.
Medidas :
Largo del túnel : 1,00 m.
Diámetro del túnel : 7 cm.

DURMILÍ *Nystalus maculatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	**N**	



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-11-03	Estación Caroya	Pichones	Barranca en un camino	1,20

REPRODUCCIÓN


NIDO
NIDO

Ubicación.
En cuevas en barrancas. A baja Altura .

Características.
Expuesto.
Medidas :
Largo del túnel : 1,10 m.
Diámetro del túnel : 7 cm.

FAMILIA: PICIDAE

CARPINTERITO COMÚN *Picumnus cirratus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 22

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-09-74	Esperanza	Sin postura	Chañar (rama seca)	2,20
04-12-77	Salta	Pichones	Árbol (rama verde)	5,00
16-10-79	Gral. Alvear	En construcción	Árbol (rama seca)	2,70
29-10-81	San Javier	1 huevo y 2 pichones	Chañar (tronco seco)	2,30
02-11-88	Esperanza	Sin postura	Seibo (rama seca)	2,80
07-11-90	Morteros	3 pichones	Chañar (tronco seco)	1,00
19-10-93	Esperanza	3 huevos	Acacia negra (rama seca)	1,55
14-01-94	Esperanza	3 huevos	Chañar (tronco semiseco)	1,45
02-10-97	Esperanza	No observado	Chañar (tronco seco)	1,50
17-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar (rama seca)	1,40
02-11-98	Esperanza	No observado	Curupí (rama seca)	2,70
13-11-98	Esperanza	No observado	Algarrobo (tronco seco)	1,50
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar (rama seca)	3,70
12-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar (tronco verde)	2,80
15-01-99	Esperanza	No observado	Curupí (tronco seco	1,60
07-11-00	Esperanza	En construcción	Chañar (tronco seco)	1,70
05-11-01	Esperanza	Pichones	Chañar (tronco seco)	1,05
13-12-01	Esperanza	No observado	Chañar (tronco seco)	1,50
18-10-02	Esperanza	No observado	Chañar (tronco seco)	2,30
29-10-02	Esperanza	Pichones	Chañar (tronco seco)	2,30
24-11-03	Esperanza	No observado	Chañar (tronco seco)	1,60
30-11-04	Esperanza	En construcción	Chañar (tronco verde)	3,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3								1	7	7	3

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas o en troncos de árboles, generalmente secos o semisecos. Pocos en ramas verdes. Bajos y a mediana Altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. La base de la cámara puede contener aserrín.

Medidas :

Diámetro de la boca : 2 a 3,5 cm.

Diámetro interno : de 3 a 6 cm.

Profundidad : de 8 a 15 cm.

Altura :

Nido más bajo a 1,00 m.

Nido más alto a 5,00 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 14 a 15,5 x 11 a 12,4

X= 14,8 x 11,6 (N= 8)

Peso lleno : de 0,90 a 1,00

X= 0,99 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 0,145 a 0,150

X= 0,147(N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
276	29-10-81	San Javier	15,4 x 12,3		0,145
841	19-10-93	Esperanza	14,7 x 11,0	0,9	0,150
			14,7 x 11,5	1,0	0,150
			14,8 x 11,2	1,0	0,150
851	14-01-94	Esperanza	14,0 x 11,7	1,0	0,146
			14,5 x 11,7	1,0	0,148
			15,0 x 11,7	1,0	0,148
923	07-11-00	Esperanza	15,5 x 12,4		0,146

PICHONES

Crianza.

Los dos sexos alimentan a los pichones. La pareja trae huevos de hormigas y larvas (gusanitos), de dos atres por vez en el pico. Buscan comida hasta 40 m. del nido. Permanecen en el interior 10 segundos y salen a buscar nuevamente. Realizan viajes cada 4-5 hasta 10-15 minutos. Uno se quedó más tiempo y taponó la boca con la cabeza.

A los 12-13 dias de vida, los pichones sacan el pico y toda la cabeza fuera del nido. El macho, desde el lado externo picotea la boca y el interior del nido, sacando trocitos de madera. Luego pica adentro. Cuando no están los padres los pichones picotean el interior del nido, produciendo un ruido que se escucha hasta los 2 m. de distancia.

Los adultos cuando traen la comida y están alertas emiten un chillido suave, acompañado por movimientos leves de las alas.

Los padres sacan las materias fecales en un saco, que es llevado hasta unos 12 m. del nido.

El pichón tiene la mandíbula amarillenta.


OBSERVACIONES

La pareja construye. Demoran en la construcción 29-30 días. Por momentos ambos están en el interior del nido.

CARPINTERO BLANCO *Melanerpes candidus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-12-59	Aguará	5 huevos	Paraíso	1,50
03-12-91	Villa Ocampo	Pichones	Palmera	4,50
20-12-91	Ruta 4 y río Salado	No observado	Eucaliptus	7,00
23-11-95	Esperanza	Pichones	Eucaliptus	5,00
28-11-00	Esperanza (*)	No observado	Eucaliptus	2,40

(*). Este nido era de *Colaptes campestris* el (02-10-99), luego fue ocupado por *Drymornis brydgesii* el (06-10-00) y el (10-10-02) nuevamente por *Colaptes campestris.*

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en troncos de árboles. Bajos, a mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado.

Medida :

Diámetro de la boca : 8,5 cm.

Profundidad : 40 cm.

Altura :

Nido más bajo a 1,50 m.

Nido más alto a 7,00 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos. De color blanco.

Medida y peso :

De 28,9 x 25,5 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,650 (N= 1)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
283	01-12-59	Aguará Grande	28,9 x 25,5	0,650

CARPINTERO DEL CARDÓN *Melanerpes cactorum*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N



Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-70	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	4,00
25-01-78	Vera	Pichones	Cardón	3,50
08-12-79	Colmena	4 huevos	Quebracho colorado	5,00
02-10-90	Los Amores	No observado	Algarrobo	5,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	No observado	Algarrobo	2,00
06-12-91	Yeso Oeste	Pichones	Algarrobo	2,80
13-12-91	Malabrigo	Pichones	Cardón	4,50
12-12-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
04-12-94	Río Salado y Ruta 4	Pichones	Eucaliptus	12,00
09-12-94	Rincón de Ávila	No observado	Algarrobo	6,00
09-11-99	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
21-12-00	Esperanza	No observado	Curupí	2,40
06-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
14-01-02	Esperanza (*)	Pichones	Chañar	3,30
17-07-03	Esperanza (**)	En construcción	Algarrobo	2,00
27-10-04	Esperanza	En construcción	Algarrobo	4,50

(*) Ocupó el mismo nido del 06-10-01.

(**) Demoró 27 días en terminarlo.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2						1			2	2	8

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas, en troncos de árboles o en cardones. Bajos a mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 3,5 a 5 cm.

Diámetro interno : de 7 a 8 cm.

Profundidad : de 25 a 40 cm.

Altura :

Nido más bajo a 1,70 m.

Nido más alto a 12,00 m.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 20,5 a 22,5 x 16,7 a 18

X= 21 x 17,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,232 a 0,280

X= 0,241(N= 3)

Un huevo anormal mide 17,5 x 14,2 y la cáscaras pesa 0,184.

Otro mide 23,2 x 16,6 y la cáscaras pesa 0,277.

No se los tuvo en cuenta para los promedios.

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
284	15-11-70	Esperanza	17,5 x 14,2	0,184
			22,5 x 18,0	0,280
285	08-12-79	Colmena	20,5 x 17,7	0,232
			20,5 x 16,7	0,237
			20,7 x 18,0	0,256
			23,2 x 16,6	0,277

CARPINTERO OLIVA CHICO *Veniliornis passerinus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N




Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-12-91	Puerto Piracuacito	No observado	Maní guaycurú	10,00
21-10-92	Vila Ocampo	No observado	Timbó	12,00

CARPINTERO BATARAZ CHICO *Veniliornis mixtus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 9



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-11-75	Esperanza	3 huevos y 1 pichón	Chañar	3,50
30-09-81	San Javier	En construcción	Chañar	3,60
08-10-81	San Javier	4 huevos	Ñandubay	3,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
18-12-93	Esperanza	Pichones	Curupí	2,40
05-12-95	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
22-11-04	Esperanza	Pichones	Chañar	0,50
07-09-08	Esperanza	Pichones	Fresno	2,30
05-10-12	Villa Roda	En construcción	Cina	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								2	3	2	2

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas o en troncos de árboles.

Bajos y a mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 3 a 3,5 cm.

Diámetro interno : de 7 a 8 cm.

Profundidad : de 20 a 25 cm.

Altura :

Nido más bajo a 050 m.

Nido más alto a 4,00 m.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19 a 21,5 x 14,8 a 16,5 X=20x15,8 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 0,160 a 0,197 X= 0,179 (N= 7)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
286	06-11-75	Esperanza	19,0 x 14,8	0,160
			21,4 x 15,9	0,180
			21,5 x 15,9	0,197
287	08-10-81	San Javier		
			19,0 x 16,5	0,172
			19,2 x 16,3	0,178
			19,9 x 15,7	0,180
			20,3 x 15,9	0,191

OBSERVACIONES

El 20-12-93 en Esperanza un adulto alimentaba a un juvenil.

CARPINTERO REAL *Colaptes melanochloros*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 29

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-10-70	Ataliva	4 pichones	Paraíso	3,50
07-10-72	Jacinto Arauz	5 huevos	Algarrobo	2,50
12-10-72	Ataliva	5 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Paraíso	3,50
19-11-76	Los Amores	3 huevos	Palmera blanca	0,60
30-09-81	San Javier	Pichones	Algarrobo	2,50
22-10-81	San Javier	4 huevos	Poste de alambrado	2,50
26-10-81	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	3,30
09-09-89	Llambi Campbell	Sin postura	Algarrobo	1,70
04-10-89	Morteros	4 huevos	Chañar	2,30
14-10-89	Esperanza	No observado	Curupí	3,00
24-10-91	Villa Ocampo	No observado	Palmera blanca	2,50
31-10-91	Corrientes	No observado	Árbol	10,00
24-09-92	Gualeguaychú	No observado	Algarrobo	3,00
21-10-92	Villa Ocampo	No observado	Árbol	5,00
22-10-93	Esperanza	No observado	Curupí	2,40
22-10-93	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
27-10-93	Esperanza	Pichones	Algarrobo	0,80
14-12-93	Esperanza	Pichones	Curupí	1,60
16-09-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,00
03-10-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	0,50
08-10-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,00
17-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	1,60
17-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	1,60
23-10-02	Esperanza	3 pichones	Cina-cina	1,80
24-11-03	Esperanza	No observado	Curupí	2,40
13-10-06	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
20-10-06	Esperanza	No observado	Chañar	2,70
20-10-06	Esperanza	No observado	Curupí	3,60
18-11-06	Ascochinga	No observado	Coco	3,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								4	21	3	1

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20-22 días	Pone en días corridos	14-15 días	30 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas o en troncos de árboles y en postes. Bajos a mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Boca redonda u ovalada en sentido vertical. La base de la cámara puede contener aserrín.

Medidas :

Diámetro de la boca : 6,5 a 9 cm.

Diámetro interno : de 8 a 12 cm.

Profundidad : de 30 a 50 cm.

Altura :

Nido más bajo a 0,50 m.

Nido más alto a 10,00 m.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 27 a 32,3 x 20,5 a 23,5

X= 28,9 x 22,2 (N= 10)

Peso de las cáscaras : de 0,485 a 0,643

X= 0,558 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
280	12-10-72	Ataliva	28,0 x 20,5	0,481
			29,3 x 22,0	0,512
			29,3 x 22,4	0,552
			29,3 x 22,3	0,569
			29,4 x 22,0	0,570
281	19-11-76	Los Amores	29,4 x 23,5	0,603
			32,3 x 22,7	0,643
282	26-10-81	Esperanza	27,0 x 22,0	0,520
			27,4 x 22,4	0,555
			27,9 x 22,5	0,576

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Implumes.

11 días. Abren los ojos. Piel rosada. Pico y patas grises. Comisura blanquecina en la parte inferior (mandíbula). Cavidad bucal, lengua y paladar, rosados.

13 días. Cañones de las plumas de la cabeza, oscuros. Cañones alares grises. Rabadilla y ventral blanquecino. Alas abriendo las láminas, ocre y negro. Cola con láminas oscuras.


OBSERVACIONES

05-04-08. Esperanza. Un ejemplar con Leucismo.

CARPINTERO ANDINO *Colaptes rupicola*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N




Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Valle Encantado	No observado	Barranca terrosa	4,00
04-12-02	Las Estancias	No observado	Barranca terrosa	3,00

CARPINTERO CAMPESTRE *Colaptes campestris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-10-70	Ataliva	2 huevos y 1 pichón	Paraíso	2,00
25-10-70	Cayastacito	3 pichones	Paraíso	1,60
12-10-72	Ataliva	4 huevos	Paraíso	2,50
13-10-72	María Luisa	3 pichones	Barranca de tierra	1,70
27-10-72	María Luisa	3 pichones	Barranca de tierra	1,50
10-10-79	María Luisa	3 pichones	Barranca de tierra	1,60
10-10-81	Ituzaingó	5 huevos	Hormiguero	0,70
25-10-81	María Luisa	3 pichones	Barranca de tierra	1,70
02-11-90	Morteros	Pichones	Barranca de tierra	3,50
19-11-95	Esperanza	Pichones	Paraíso	1,80
22-09-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	1,00
15-10-99	Esperanza (1)	No observado	Eucaliptus	2,40
28-09-02	Esperanza (2)	No observado	Poste de luz	0,80
10-10-02	Esperanza	No observado	Eucaliptus	2,40
20-10-03	Esperanza	No observado	Paraíso	2,80
20-09-07	Esperanza	No observado	Paraíso	2,70

(1). Este nido fue ocupado al año siguiente (06-10-00) por *Drymornis bridgesii*, el (28-11-00) por *Melanerpes candidus* y el (10-10-02) por *Colaptes campestris*.
(2). Nido ocupado durante 3 años.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								3	11	2	

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20-22 días	Pone en días corridos	14-15 días	30 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas o en troncos de árboles, en postes, barrancas terrosas, hormigueros. Bajos y a mediana Altura .

Características.

Expuesto. Elaborado. Boca redonda u ovalada en sentido vertical.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 8 a 15 cm.
Diámetro interno : de 8 a 15 cm.
Profundidad : de 30 a 70 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,70 m.
Nido más alto : 3,50 m.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 29 a 32,8 x 22,6 a 24,3

X= 31,3 x 23,4 (N= 10)

Peso de las cáscaras : de 0,57 6 a 0,783

X= 0,693 (N= 10)

Un huevo anormal mide 24,1 x 19,3. No se lo tuvo en cuenta para los promedios.


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	18-10-70	Ataliva	24,1 x 19,3	
			31,5 x 23,0	0,710
278	12-10-72	Ataliva	29,0 x 22,7	0,576
			29,7 x 22,8	0,611
			30,5 x 22,6	0,697
			30,8 x 23,0	0,735
279	10-10-81	Ituzaingó	30,8 x 23,9	0,691
			31,9 x 23,8	0,692
			32,0 x 24,3	0,724
			32,3 x 24,2	0,740
			32,8 x 24,0	0,783

CARPINTERO LOMO BLANCO *Campephilus leucopogon*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	N	N	N	N	N



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	1 pichón	Ombú	4,00
03-11-72	La Loca	No observado	Ombú	6,00
21-10-92	Villa Ocampo	En construcción	Árbol	6,50
08-08-98	Vera y Pintado	2 pichones	Árbol	4,50
19-12-98	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	4,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.

En huecos en ramas o en troncos de árboles. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Boca redonda u ovalada en sentido vertical.

Medida :

Diámetro de la boca : 11 cm.

Profundidad : 38 cm.

FAMILIA: CARIAMIDAE


CHUÑA PATAS NEGRAS *Chunga burmeisteri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
11-11-98	Los Sunchos	2 huevos	Arbusto	3,00
11-12-00	Rosario de la Frontera	1 huevo	Árbol	4,30



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

Alto : 6 a 10 cm.

NIDO

Ubicación.

En árboles o en arbustos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajitas.

Medida :

Diámetro total : de 60 a 70 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema con pintas y manchas castañas y grises, espaciadas.

Medidas y pesos :

De 59,8 a 61 x 44,5 a 45 X= 60,5 x 44,7 (N= 3)

Peso de las cáscaras: de 5,00 a 5,70 X= 5,22 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
898	11-11-98	Los Sunchos	60,8 x 45,0	5,0
			61,0 x 44,5	5,0
899	11-12-00	Rosario de la Frontera	59,8 x 44,7	5,7


FAMILIA: FALCONIDAE

GUAICURÚ *Herpetotheres cachinnans*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N





Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-01-78	Tartagal (S. Fe)	2 huevos	Guayacán	3,00
31-01-78	Tartagal (S. Fe)	2 huevos	Guayacán	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en los árboles. Puede ocupar el mismo lugar varios años.

Características.

Oculto. Rudimentario. No pone materiales.

Medida del hueco.

El hueco natural, mide 30 cm. de diámetro y 35 cm. de profundidad.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Elípticos o ligeramente ovoidales. De color ocre oscuro con grandes manchas marrón rojizo o marrón rojizo con manchas más oscuras.

Medidas y pesos :

De 57,1 a 60 x 46,5 a 47,5 X= 58,8 x 46,9 (N= 4)

Peso de las cáscaras: de 5,01 a 5,78 X= 5,39 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
117	02-01-78	Tartagal (S. Fe)	58,7 x 47,5	5,616
			59,4 x 46,5	5,782
118	31-01-78	Tartagal (S. Fe)	57,1 x 46,8	5,015
			60,0 x 46,8	5,196

HALCONCITO GRIS *Spiziapteryx circumcincta*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-11-79	Anzoategui	1 huevo	En nido de *Pseudoseisura lophotes*	3,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en nidos abandonados por otras aves, principalmente Furnáridos.

Características.

Oculto. Rudimentario. En el nido localizado el huevo estaba puesto sobre los palitos. Sin materiales.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color ocre con pintas marrón rojizo, distribuidas por toda la superficie.

Medida y peso :

36,9 x 29,5 (N= 1)

Peso de la cáscaras : 1,33 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
119	12-11-79	Anzoategui	36,9 x 29,5	1,33


CARANCHO *Caracara plancus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N	N	N	N	N		

Total de nidos : 35





Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-70	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,50
06-09-72	Río Leyes	2 huevos	Curupí	6,50
16-10-72	Esperanza	3 huevos	Ciprés	5,00
10-12-72	San Vicente	2 pichones	Arbusto	1,50
28-07-78	Nelson	1 pichón	Paraíso	6,00
04-08-78	Cayastacito	3 pichones	Algarrobo	3,90
04-08-78	Cayastacito	En construcción	Algarrobo	4,20
09-07-98	Cayastacito	3 huevos	Algarrobo	4,00
26-10-81	Esperanza	1 huevo	Chañar	5,00
11-08-89	Esperanza	En construcción	Algarrobo	9,00
11-08-89	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	8,00
08-09-89	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
09-09-89	Llambi Campbell	En construcción	Chañar	4,00
29-09-89	Calchaquí	2 huevos	Chañar	9,00
29-09-89	Calchaquí	1 pichón	Chañar	7,00
29-09-89	Calchaquí	1 pichón	Algarrobo	6,00
04-09-91	Humberto Primo	No observado	Algarrobo	6,00
04-09-91	Ataliva	No observado	Algarrobo	5,00
18-11-91	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	6,00
27-11-91	Sauce Sud	No observado	Árbol	5,00
16-01-92	Esperanza	No observado	Chañar	7,50

02-08-93	Las Tunas (S.Fe)	2 huevos	Paraíso	6,00
27-10-93	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
23-07-95	Franck	2 huevos	Paraíso	3,50
30-07-95	Rincón de Ávila	No observado	Algarrobo	6,00
30-07-95	Rincón de Ávila	No observado	Paraíso	5,00
29-08-96	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	8,00
09-05-01	Esperanza	En construcción	Eucaliptus	7,00
09-05-01	Elisa	En construcción	Curupí	5,00
30-08-03	Esperanza	3 huevos	Ciprés	12,00
22-08-03	Colonia Pujol	En construcción	Eucaliptus	15,00
28-08-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	9,00
28-08-03	Esperanza	Sin postura	Algarrobo	8,50
31-08-04	Franck	3 huevos	Paraíso	8,00
11-09-08	Diamante (*)	No observado	Sauce	12,00

(*) Construido sobre uno de Cotorra.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1				2		5	11	9	4	2	1

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
30-40 días	Pone un huevo cada tres días	30 días	50 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Puede ocupar el mismo nido en más de una temporada de cría, en un caso lo hizo durante 5 años.

Si vuelve a ocupar un nido viejo, lo repara en pocos días.

Ubicación.

En árboles en montes, en orillas de caminos, en arbustos en esteros, forestaciones, árboles solitarios. Sostenido entre las ramas o sobre nidos de Cotorra (*Myiopsitta monachus*)

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de olla profunda. Emplea en la construcción palitos, tallos de yuyo, tallos de enredaderas, cueros, hilos, lanas, plásticos, trapos, huesos. Internamente pajas, pelos, cerdas, plumas, materias fecales de bovinos o de equinos. En un caso, trozos de "marlo" de maíz, con y sin granos.

Medidas :

Diámetro total : de 63 a 90 cm.
Diámetro interno : de 30 a 56 cm.
Profundidad : de 13 a 25 cm.
Alto : de 31 a 50 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos, raro 4.
Ovoidales. De color marrón rojizo.

Medidas y pesos :

De 57,0 a 65 x 46 a 49,6 X= 59,7 x 48,4 (N= 13)
Peso lleno : de 72 a 77 X= 73,5 (N= 5)
Peso de las cáscaras: de 5,8 a 7,5 X=6,6 (N=10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
122	06-09-72	Río Leyes	60,6 x 48,6		6,518
			60,9 x 48,6		6,683
123	16-10-72	Esperanza	61,0 x 48,8		6,440
			63,4 x 49,0		6,467
			65,0 x 47,2		6,789
124	04-08-78	Cayastacito	60,6 x 46,0		6,297
			61,7 x 46,2		6,685
			62,3 x 46,5		5,819
677	29-09-89	Calchaquí	59,5 x 49,6	73,0	7,0
			60,0 x 48,8	77,0	7,5
	31-08-04	Franck	57,0 x 48,0	69,0	
			58,1 x 48,2	72,0	
			59,5 x 49,0	75,4	

PICHONES

Nacen escalonados cada 72 horas.
Descripción.

2 días. Ojos abiertos, marrones. Gritan. Cavidad bucal, lengua y paladar, rosados. En la base de la lengua tiene una franja oscura. Cera rosada. Pico amarillo, con diente blanco. Plumón crema-amarillento. Corona parda. Dorsal de las alas pardo (marrón). Patas gris claro. Tarsos amarillentos.

10 días. Empiezan a abrir las láminas de las plumas alares y aparecen las vainas de las plumas de la cola.

14 días. La base del pico y alrededor de los ojos está más oscuro.

18 días. Aparecen las plumas en la región dorsal. Láminas marrón oscuro. Tiene plumón en el resto.
Grita y se defiende poniendo las patas para arriba (apoya el dorso contra el suelo).

19 días. Pico amarillo, diente blanco. Patas gris claro.

En un nido se comprobó que llevaban de comer a los pichones Moncholo (*Pimelodus albicans*)

MEDIDAS

Días de vida	Medidas								
	Pico	Cera	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso	Tibia
			Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina			
2	1,3	1	-	-	-	-	-	3	-
8	1,8	1,3	1	-	0,8	-	-	5	-
10	1,9	1,4	1,9	-	1	-	-	5,7	-
14	2,2	1,5	3,3	1,3	3	1,3	1,8	6,7	-
18	3,5	1,5	4,5	1,5	3,4	1,5	3,3	8,4	11,4

OBSERVACIONES

Durante el cortejo emiten una fuerte voz, se molestan en vuelo y se enfrentan tomándose con las patas. Suelen posarse en postes y gritar tirando la cabeza hacia atrás.

En el período de crianza los adultos son muy agresivos. Se los ha visto atacar a Cuervillos de cañada (*Plegadis chihi*), Garcita bueyera (*Bubulcus ibis*), Biguá (*Phalacrocorax olivaceus*) los persiguen hasta cansarlos y atraparlos.
También acorralan a otras aves o a animales domésticos como pavos, corderitos o terneritos.

CHIMANGO *Milvago chimango*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 38

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Cayastacito	No observado	Eucaliptus	7,00
21-10-72	San Agustín	1 huevo	Paraíso	4,00
10-12-72	Azul	2 huevos	Juncal	0,70
25-10-74	Melincué (*)	Huevos y pichones	Arbusto y suelo	0,10-0,20
11-11-86	Teodelina	3 huevos	Junquillo	0,50
21-11-93	Las Cuevas	2 pichones	Pino	5,00
03-01-94	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,10
07-11-94	Isla Verde	En construcción	Eucaliptus	3,20
07-11-94	Isla Verde	2 pichones	En el suelo	
07-11-94	Isla Verde	3 huevos	En el suelo	
01-12-00	Gral. Pico	En construcción	Árbol	5,00
05-10-03	Esperanza	En construcción	Pino	5,00
07-11-03	Empalme San Carlos	3 huevos	Hueco en Paraíso	2,50
19-11-03	Balnearia	Pichones	Pino	7,00
27-09-04	Esperanza	2 huevos	Ciprés	4,00
15-10-04	Llancanelo	No observado	Árbol	5,00
15-09-07	Balnearia	En construcción	Araucaria	3,00
27-11-12	Esperanza	En construcción	Pino piramidal	8,00
27-11-12	Esperanza	1 huevo	Pino	3,50

(*). Colonia en un islote con 20 nidos. En el suelo : 16. En arbustos : 4. Contenido : 5 nidos con 3 huevos ; 5 nidos con 3 pichones y 10 nidos con 2 pichones cada uno.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								2	24	9	2

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
9-12 días días	Pone en días alternos	28-29 días	32-33 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, arbustos, juncales o en el suelo.

Características.

Expuesto o semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos sin espinas, tallos de yuyos o pastos. Internamente pelos, cerdas, lanas, materias fecales de bovinos, trozos de cuero

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 25 cm.

Profundidad : de 1 a 15 cm.

Alto : de 1 a 11cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elípticos o ligeramente ovoidales. De color ocre, ocre oscuro o crema con pintas y manchitas castañas y rojizas, distribuidas por toda la superficie.
Medidas y pesos :

De 41 a 45,5 x 32,4 a 35,3 X= 43,1 x 34,1 (N= 9)
Peso lleno : de 24 a 28,5 X= 26,9 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 1,70 a 2,41 X= 2,09 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
120	21-10-72	San Agustín	44,4 x 34,7		2,411
121	25-10-74	Melincué	41,0 x 33,1		1,921
			41,0 x 32,4		1,863
			42,4 x 33,9		1,700
655	11-11-86	Teodelina	44,2 x 35,0	28,0	2,4
			45,0 x 35,0	28,5	2,3
			45,5 x 35,3	28,5	2,4
850	03-01-94	Esperanza	42,0 x 33,5	25,6	2,1
			42,4 x 34,5	24,0	1,8
944	27-09-04	Esperanza	44,0 x 34,5	28,8	2,8
			44,4 x 34,0	27,1	2,5

PICHONES

Descripción. A los 2 días tienen los ojos abiertos. Pico amarillento. Cera rosada. Región periocular y patas, gris celeste. El cuerpo cubierto de plumón amarillento.


OBSERVACIONES

Se observó una cópula en el suelo.
Cuando están con pichones atacan a otras aves o sacan los pichones.
Se los vió en Isla Verde, el 07-11-94 capturar a un Benteveo (*Pitangus sulphuratus*).
El 19-11-03, en Balnearia, sacar del nido los pichones de Tijereta (*Tyrannus savana*) y un pichón de Inambú común (*Nothura maculosa*) y llevárselos a sus pichones, que estaban en un nido a 50 m. Cuando volaban con la comida emitían un chillido.

HALCONCITO COLORADO *Falco sparverius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	4 huevos	Hueco en Ombú	3,00
16-01-82	Marayes	1 huevo	En nido de *Pseudoseisura lophotes*	2,00
03-11-00	Esperanza	No observado	En nido de *Myiopsitta monachus*	14,00
06-11-04	Rincón de Ávila	Pichones	Hueco en Eucaliptus	7,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos en los árboles o en nidos abandonados de aves.

Características.

Oculto. Rudimentario. Puede poner unos pastos en la base.

Medida de un hueco.

Tenía 15 cm. de diámetro y 40 cm. de profundidad.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Elípticos o ligeramente ovoidales. De color ocre o crema con puntos y manchitas marrones y castañas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 33,3 a 35 x 27 a 29 X= 34,3 x 28,4 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 1,10 a 1,22 X= 1,14 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
126	15-11-71	La Gallareta	34,1 x 28,6	1,198
			34,6 x 28,5	1,115
			34,8 x 29,0	1,226
			35,0 x 28,9	1,184
127	16-01-82	Marayes	33,3 x 27,0	1,105

OBSERVACIONES

A los adultos se los ha visto comiendo pichones de Inambú común (*Nothura maculosa*), Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*), Chingolo (*Zonotrichia capensis*) y lauchas.

En El Alamito, el 07-01-02, un adulto alimentaba a dos pichones, que estaban posados en una barranca sobre un río.

El 27-10-02, en Esperanza, un ejemplar se revolcaba (baño de tierra) en un camino rural.

HALCÓN PLOMIZO *Falco femoralis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	2 huevos	Ombú	4,50
20-10-97	Isla Verde (*)	3 huevos	Eucaliptus	6,00
15-11-97	Isla Verde	3 huevos	Eucaliptus	5,50
20-10-13	Esperanza	No observado	Eucalipto	14,00

(*). Nido construido sobre uno abandonado de Chimango (*Milvago chimango*)

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Construye el nido sobre plataformas de nidos abandonados de aves.

Características.

Expuesto. Suele colocar en la parte interna algunas pajas.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Elípticos. De color ocre, profusamente marcados con pintas y manchitas castañas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 41,8 a 42,4 x 34,8 a 35,2 X= 42,1 x 35 (N= 2)

Peso de las cáscaras: de 2,13 a 2,26 X= 2,19 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
125	15-11-71	La Gallareta	42,4 x 34,8	2,264
			41,8 x 35,2	2,135

OBSERVACIONES

El 25-09-99, en Calchaquí se observó a un ejemplar atacando a una Monjita blanca (*Xolmis irupero*) y el 21-10-01, en Esperanza, una pareja a un Chimango (*Milvago chimango*)

HALCÓN PEREGRINO *Falco peregrinus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-09-06	Dique San Roque	4 huevos	Repisa rocosa	35,00
15-09-06	La Calera	No observado	Repisa rocosa	40,00
15-09-06	La Calera	2 pichones	Repisa rocosa	40,00
16-09-07	Ascochinga	No observado	Barranca terrosa	35,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Construye el nido sobre repisas rocosas o terrosas.

HUEVOS


Pone 3 ó 4 huevos.

FAMILIA: PSITTACIDAE

CALANCATE COMÚN *Aratinga acuticaudata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	Sin postura	Ombú	5,00
15-11-71	La Gallareta	Sin postura	Ombú	7,00
22-11-75	Aguará	3 huevos	Paraíso	3,50
20-01-99	La Camila	4 huevos	Paraíso	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. Ocupa nidos abandonados de Carpinteros.

Características.

Expuesto.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 8 a 10 cm.

Profundidad : 35 cm

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 30,5 a 32,5 x 23,9 a 25,7

X= 31,7 x 25 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 0,687 a 782

X= 0,738 (N= 3)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
229	22-11-75	Aguará Grande	30,5 x 24,7	0,687
			30,5 x 25,7	0,745
			32,0 x 23,9	0,782
	20-01-99	La Camila	32,0 x 25,2	
			32,3 x 25,2	
			32,5 x 25,5	
			32,4 x 24,9	

OBSERVACIONES

Cuando está incubando, la pareja permanece en el nido. Al ser molestada vuela uno de los integrantes, permaneciendo el otro sobre los huevos. Permite que se toquen los mismo sin abandonarlos.

CALANCATE CARA ROJA *Aratinga mitrata*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-12-97	Rosario de la Frontera	No observado	Árbol	15,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO


Ubicación.

En huecos en árboles.

Características.

Expuesto.

LORO BARRANQUERO *Cyanoliseus patagonus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-12-77	La Viña	No observados	Barranca	20,00
12-11-78	Viedma	2 huevos	Barranca	3,50
03-11-79	San Antonio Oeste	3 huevos	Barranca	2,50
03-11-79	San Antonio Oeste	1 huevos	Barranca	3,00
03-11-79	San Antonio Oeste	1 pichón	Barranca	2,80
03-11-79	San Antonio Oeste	2 pichones	Barranca	3,00
12-03-91	Salado (*)	No observados	Barranca	5,00
27-11-98	Río Marucho	No observados	Barranca	4,00

(*) Habían volado los pichones.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en barrancas terrosas o en laderas de montañas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Túnel de entrada y cámara de postura.

Medidas :

Diámetro de túnel : de 10 a 20 cm.

Largo del túnel : de 1,20 a 2,50 o más metros.

Ancho de la cámara : 30 cm.

Alto de la cámara : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 33,5 a 35,5 x 26,2 a 29,7
X= 34,9 x 28,1 (N= 6)

Peso de las cáscaras : 1,044 a 1,245
X= 1,113 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
230	12-11-78	Viedma	34,9 x 26,2	1,044
			35,5 x 26,8	1,087
231	03-11-79	San Antonio Oeste	35,0 x 29,0	1,213
			35,0 x 29,7	1,230
			35,5 x 28,9	1,245
	03-11-79	San Antonio Oeste	33,5 x 28,4	1,050

COTORRA *Myiopsitta monachus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 4
Se detallan únicamente los nidos estudiados.

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
14-10-76	Cayastacito	7 huevos	Molino	7,00
14-10-76	Cayastacito	4 huevos	Algarrobo	5,00
05-11-89	Esperanza	4 huevos	Ñandubay	4,00
25-10-04	Esperanza	6 huevos	Chañar	5,50

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
Repara y agrega materiales en forma periódica	Pone en días alternos	24-25 días	32-35 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, torres metálicas o de madera, construcciones, molinos, atalayas, postes de líneas telefónicas o eléctricas. A mediana Altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma y tamaño variables. Construidos con palitos con y sin espinas. Boca de entrada, generalmente dirigida hacia abajo. Túnel que da a la cámara de postura.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 16 a 20 cm.
Largo del túnel : de 15 a 60 cm.
Alto de la cámara : de 18 a 20 cm.
Ancho de la cámara : de 20 a 25 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,90 m.
Nido más alto : a más de 20 m.

HUEVOS

Pone hasta 8, generalmente 6 huevos.

Elíptico. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 27 a 29,6 x 21,3 a 22,8 X= 28 x 21,8 (N= 15)

Peso lleno : 6,3 a 7,1X= 6,5 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,33 a 0,59 X= 0,439 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
233	14-10-76	Cayastacito	27,4 x 22,0		0,471
			28,1 x 22,5		0,555
			28,7 x 22,5		0,569
			28,8 x 22,5		0,574
			29,0 x 22,4		0,577
			29,2 x 22,5		0,581
			29,6 x 22,8		0,588
234	14-10-76	Cayastacito	27,7 x 22,5		0,461
			28,3 x 22,5		0,484
			28,7 x 21,7		0,502
			29,0 x 22,2		0,592
641	05-11-89	Esperanza	27,0 x 21,3	6,3	0,33
			27,4 x 21,6	6,3	0,34
			27,5 x 21,3	6,6	0,35
			28,2 x 21,5	7,1	0,36
	25-10-04	Esperanza	28,2 x 20,2	6,1	
			28,5 x 21,0	6,2	
			28,5 x 21,0	6,2	
			28,8 x 21,0	6,1	
			29,0 x 20,5	6,2	
			30,2 x 20,5	6,1	

PICHONES

Eclosionan escalonados, aproximadamente uno por día.

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Cavidad bucal y lengua, rosados. Paladar, pico y patas, córneos. Todo el cuerpo cubierto de plumón blanquecino.

9-10 días. Abren los ojos.

16 días. Se ven las láminas verdes de la cola. Abriendo las láminas de las alas. Son más largas en las secundarias que en las primarias.

27días. Se ven las láminas verdes de las plumas en la cabeza, alas y flancos. Empluman primero la cabeza, la rabadilla, garganta y pecho.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina	o cañón Lámina		
1	0,6-0,7	0,5-0,6	1,4-1,7	-	-	-	-	-	4,5-6,5
2	0,7-0,8	0,6-0,7	1,5-1,7	-	-	-	-	-	6,5-8,9
3	0,7-0,8	0,6-0,7	1,5-1,7	-	-	-	-	-	9,0-10,6
4	0,7-0,9	0,7-0,8	1,6-1,8	-	-	-	-	-	12,0-14,5
5	0,7-0,9	0,7-0,9	1,7-1,9	-	-	-	-	-	13,0-17,0
6	1,0	1,0	1,8-2,2	-	-	-	-	-	14,0-20,6
7	1,0	1,0	1,9-2,3	-	-	-	-	-	15,0-25,2
8	1,0	1,0	2,0-2,4	-	-	-	-	-	16,0-31,0
9	1,1	1,2	2,2-2,5	-	-	-	-	-	18,0-34,2
10	1,1	1,2-1,3	2,3-2,6	-	-	-	-	-	22,0-38,0
11	1,2	1,2-1,3	2,5-2,8	-	-	-	-	-	27,1-45,5
12	1,2	1,3	2,5-2,9	-	-	-	-	-	29,0-50,0
13	1,2	1,4	2,6-3,3	-	-	-	-	-	31,0-54,0
14	1,3-1,4	1,4	2,6-3,5	-	-	-	-	-	33,0-60,0
15	1,3	1,5	2,7-3,8	-	-	-	-	-	34,1-68,6
16	1,4-1,5	1,6	2,9-3,8	-	-	-	-	-	38,0-77,0
17	1,4-1,5	1,6	3,2-4,0	-	-	-	-	-	47,0-80,0
18	1,4-1,5	1,7	3,5-4,1	-	-	-	-	-	54,0-85,0
19	1,5	1,7	3,5-4,2	-	-	-	-	-	57,0-88,0
20	1,5	1,7	3,5-4,3	1,3	0,3	0,9	0,3	0,9	63,0-94,0
21	1,5-1,6	1,6-1,8	3,6-4,4	1,4	0,3	1,0	0,3	1,1	67,0-102,0
22	1,6-1,7	1,6-1,9	3,6-4,5	1,6	0,4	1,3	0,4	1,4	77,0-115,0
23	1,7-1,7	1,7-1,9	4,3-4,6	1,9	0,4	1,6	0,5	1,6	77,0-130,0
24	1,6-1,7	1,9	4,3-4,6	1,9	0,6	1,6	0,7	1,7	105,0-130,0
25	1,7	1,9	4,4-4,7	2,0	0,8	1,7	0,9	1,9	106,0-130,0
26	1,7	1,9	4,5-4,7	2,0	1,0	1,8	1,2	2,1	118,0-128,0
27	1,7	1,9	4,5-4,7	2,0	1,2	1,8	1,5	2,3	102,0-124,0
28	1,7	1,9	4,6-4,7	2,1	1,6	1,7	1,6	2,5	104,0-125,0
29	1,7	1,9	4,6-4,8	2,1	2,0	1,7	1,7	3,2	106,0-126,0
30	1,7	1,9	4,6-4,9	2,2	2,5	1,6	1,8	3,6	108,0-126,0
31	1,7	1,9	4,6-4,9	2,3	2,8	1,6	1,9	3,7	108,0-124,0
32	1,7	1,9	4,6-4,9	2,4	3,4	1,6	2,0	4,0	108,0-122,0

OBSERVACIONES

El 06-12-82 en Balnearia un nido ubicado en un molino tenía 48 bocas.
En el año 1997 se realizó un relevamiento de los nidos en el departamento Las Colonias (Santa Fe).
Se detectaron 11.988 nidos activos.

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº de nidos	Ubicación	Nº de nidos
Eucaliptus	1916	Molino	9
Algarrobo	225	Casuarina	8
Chañar	176	Quebracho blanco	2
Columna de luz (de cemento)	158	Paraíso	2
Columna de luz (metálica)	59	Poste de luz	1


CATITA SERRANA CHICA *Psilopsiagon aurifrons*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Azul Pampa	Pichones	Barranca	2,30
08-02-83	Azul Pampa (*)	1 pichón	Barranca	2,20



NIDO

Ubicación.

Cuevas o huecos en barrancas o entre piedras.

Características.

Oculto. Rudimentario.

(*) Cueva irregular de 8 cm. de diámetro y 1,10 m. de profundidad. Sin materiales en la cámara.

CATITA ENANA *Forpus xanthopterygius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-02-75	Puerto Iguazú	Pichones	Árbol	25,00
10-11-96	Itá-Ibaté	1 huevo	En nido de *Furnarius rufus*	4,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles o en nidos abandonados de *Furnarius rufus*

HUEVOS

Pone de 4 a 7 huevos.

Ovoidales. De color blanco.


Medidas : 19,3 x 15,7 (N= 1)

FAMILIA: THAMNOPHILIDAE

BATARÁ GIGANTE. *Batara cinerea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-12-97	Rosario de la Frontera	Pichones	Matorral	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.

En matorrales. Apoyado sobre plataformas de ramas y hojas. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tazón de tallos de yuyos y fibras más finas internamente.

Medidas :

Diámetro total : de 18 a 20 cm.


Diámetro interno : de 14 a 16 cm.

Profundidad : 8 cm.

CHORORÓ. *Taraba major*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 54

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-70	Esperanza	2 huevos	Tala	1,30
25-10-70	Esperanza	2 pichones	Enredadera	1,70
12-10-73	Esperanza	2 huevos	Tala	2,20
11-12-76	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	1,60
24-11-77	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Enredadera	2,20
15-11-77	Esperanza	1 huevo y 3 de *Molothrus bonariensis*	Enredadera	2,20
01-02-79	Colmena	3 huevos	Arbusto	2,20
15-12-79	Esperanza	3 huevos	Tala	3,50
06-11-80	Isla Garcerosa	2 huevos	Arbusto	1,10
06-11-81	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Naranjillo	1,00
18-09-86	Esperanza	3 huevos	Naranjillo	1,20
05-11-86	Esperanza	3 huevos	Arbusto	1,50
03-02-89	Esperanza	2 huevos	Chilca negra	1,70
27-10-90	Esperanza	2 huevos	Ombú	1,00
06-11-90	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	1,40
07-11-90	Morteros	1 huevo y 1 pichón	Arbusto	1,70
29-12-90	Esperanza	2 huevos y 4 de *Molothrus bonariensis*	Naranjillo	1,00

12-01-91	Grutly	1 huevo y 3 de *Molothrus bonariensis*	Mora blanca	1,70
26-11-91	Villa Roda	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	2,20
13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Molle	1,20
13-12-91	Villa Ocampo	2 huevos	Arbusto	1,50
21-10-92	Villa Ocampo	2 huevos	Garabato	1,00
18-10-93	Esperanza	3 huevos	Tala salada	0,80
21-10-93	Esperanza	1 huevo	Tala salada	1,50
18-11-93	Esperanza	2 huevos	Ligustro	1,10
19-11-93	Esperanza	1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Tala salada	1,60
25-11-93	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,70
10-12-93	Esperanza	3 huevos	Tala salada	1,50
24-10-94	Esperanza	2 pichones	Tala salada	1,50
18-10-95	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
19-10-95	Cayastá	2 huevos	Yuyo	0,80
19-10-95	Romang	2 huevos	Jazmín del cielo	3,50
28-11-95	Villa Guillermina	En construcción	Matorral	1,00
03-01-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,55
08-10-98	Esperanza	Sin postura	Tala	2,10
13-10-98	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala salada	1,60
14-10-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,60
25-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,60
15-10-98	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
30-10-98	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Sombra de toro	1,90
19-11-98	Esperanza	2 pichones	Tala	1,70
31-12-00	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	2,70
25-12-01	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	3,10
18-10-02	Esperanza	Sin postura	Tala	1,60
24-10-02	Esperanza	3 huevos	Tala	1,00
21-11-02	Esperanza	1 huevo	Tala	1,60
12-10-03	Esperanza	Sin postura	Tala del indio	1,70
01-12-03	Esperanza	Sin postura	Tala	1,50
24-12-03	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Quebracho blanco	2,30
25-10-04	Esperanza	1 huevo	Tala	1,60
27-10-04	Esperanza	2 pichones	Tala	1,50
11-12-04	Esperanza	3 huevos	Tala	1,80
20-12-05	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
21-01-06	Esperanza	2 pichones	Acacia negra	2,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	2							1	22	14	12

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 10 días	Pone en días alternos	16 a17 días	16 a 17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

En arbustos, árboles. Enredaderas, matorrales, yuyos altos. A baja y mediana altura.

Características.

Ubicación.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tiene forma de tazón o semiesfera, colgante, atado en su borde superior a horquetas o ramitas.
Emplea en la construcción fibras vegetales, tallos de yuyos.
Medidas :

Diámetro total : de 13 a 14 cm
Diámetro interno : de 7 a 13 cm.
Profundidad : de 5 a 7,5 cm.
Alto : de 7 a 11 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,80 m.
Nido más alto : 3,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Tala	15	Chañar	2	Ombú	1
Arbustos (no determinado)	7	Chilca	1	Algarrobo	1
Tala salada	7	Garabato	1	Ligustro	1
Tala del indio	2	Sombra de toro	1	Mora blanca	1
Naranjillo	3	Yuyo (no determinado)	1	Matorral	1
Quebracho blanco	3	Molle	1	Acacia negra	1
Enredadera	3	Jazmín del cielo	1		

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color de base blanco o blanquecino con pintas y rayitas gris claro y pardas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 26,1 a 30,5 x 19,2 a 22 X= 28,1 x 21,4 (N= 18)

Peso lleno : de 6,5 a 8,5 X= 7,1 (N= 59)
Peso de las cáscaras : de 0,385 a 0,503 X= 0,429 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
368	04-10-70	Esperanza	28,0 x 21,5		0,452
			30,0 x 21,0		0,500
369	12-10-73	Esperanza	29,7 x 21,7		0,474
			30,4 x 21,9		0,503
370	01-02-79	Colmena	28,7 x 22,0		0,385
			28,5 x 21,2		0,421
			28,9 x 20,5		0,439
371	06-11-80	Isla Garcerosa	26,1 x 19,2		0,394
			26,4 x 19,9		0,402
372	06-11-81	Esperanza	27,0 x 21,6		0,432
			27,0 x 21,6		0,433
799	12-01-91	Grutly	30,5 x 21,2	7,3	0,500
845	25-11-93	Esperanza	27,4 x 20,6		0,395
			28,2 x 20,8		0,405
	25-10-04	Esperanza	29,4 x 22,0	6,5	
	11-12-04	Esperanza	27,0 x 21,1	8,0	
			27,5 x 21,1	6,5	
			28,0 x 21,6	8,5	

PICHONES

Descripción. Nacen implume. Ojos cerrados. Piel oscura. Ventralmente verdosa. Pico claro. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas.

3 días. Implume. Aparecen las vainas en las alas. Patas grises.

5 días. Ojos abiertos, marrones. Vainas de las primarias de 1,3 cm. de largos. Aparecen (apenas se ven) los vainas en la cola y en la parte dorsal (aquí un poco más largos).

7 días. Ventralmente vainas grises y blanquecinos.
8 días. Vainas en línea dorsal : 0,5. Vainas en ventral claras.
9 días. Láminas en ventral ocráceo-canelas.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5-0,7	1,3	1,5	-	-	-	-	-	5,0-5,2
2	0,7	1,4	1,8	-	-	-	-	-	7,0-9,0
3	0,7-0,8	1,5-1,8	1,9-2,1	0,3	-	0,2	-	-	9,5-11,3
4	0,9	2,0	2,2	0,6-0,7	-	0,4-0,5	-	-	14,0-17,6
5	0,9-1,0	2,3	2,5	0,6	-	0,5	-	-	17,0-20,2
6	1,0-1,1	2,7-2,9	2,9	1,5-1,8	-	1,4-1,6	-	0,1	22,0-24,0
7	1,1	2,9-3,1	3,0-3,4	1,9-2,0	-	1,8-2,0	-	0,3	26,5-28,2
8	1,2	3,1-3,2	3,5-4,0	2,2-2,3	0,4	2,4-2,6	0,3	0,4	34,2-39,0
9	1,2	3,2	4,0	2,6	0,6	2,3	0,5	0,5	36,0-39,0

OBSERVACIONES

Los dos sexos incuban.
Cuando voló una *Zenaida auriculata* del nido, un macho rompió y comió los huevos.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*


CHOCA COMÚN. *Thamnophilus caerulescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
19-10-73	Aguará	En construcción	Arbusto	0,50
22-11-81	Cayastá	1 huevo	Planta	0,35
25-10-89	Morteros	1 huevo	Planta	0,60
21-12-90	Cayastá	Sin postura	Ubajay	2,50
13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Coronillo	1,20
19-01-01	Concordia	2 huevos	Canelón	2,20



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de arbustos, árboles, plantas bajas. En lugares sombríos. A baja y mediana altura.
Características.

Oculto. Elaborado. Tiene forma de taza, colgante de ramitas.

Emplea en la construcción fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Internamente fibras finas, hojas, algunas cerdas y externamente líquenes, ootecas.
Medidas :

Diámetro total : de 8 a 10,5 cm.
Diámetro interno : de 4 a 6 cm.
Profundidad : de 4,5 a 6 cm.
Alto : de 5,5 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.
Medidas y pesos :

De 21 a 22 x 15,3 a 17 X= 21,5 x 16,4 (N= 5)
Peso lleno : de 3 a 3,2 X= 3,1 (N= 4)
Peso de las cáscaras : de 0,144 a 0,150 X= 0,147 (N= 5)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
273	22-11-81	Cayastá	21,2 x 15,3		0,144
274	25-10-89	Morteros	22,0 x 17,0	3,2	0,150
815	13-12-91	Malabrigo	21,0 x 16,7	3,0	0,146
			21,5 x 16,4	3,0	0,148
			21,9 x 16,8	3,2	0,150

FAMILIA: MELANOPAREIIDAE

GALLITO DE COLLAR. *Melanopareia maximiliani*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
21-09-89	Morteros	2 huevos	Jume	0,30
14-11-90	Villa de María	2 huevos	Mata de pastos	0,25

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Entre matorrales, matas de pastos. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tiene forma de tazón. Emplea fibras vegetales o de hojas de palmera. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 13 a 15 cm.

Diámetro interno : de 8 a 9 cm.

Profundidad : 9 cm.

Alto : de 15 a 16 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchas negras, castaño oscuro y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 20 a 23 x 16 a 16,4 X= 21,5 x 16,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,102 a 0,108


X= 0,105 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	21-09-89	Morteros	20,0 x 16,2	
			20,5 x 16,2	
814	14-11-90	Villa de María	23,0 x 16,4	0,10
			22,5 x 16,0	0,10

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE

GALLITO COPETÓN. *Rhinocrypta lanceolata*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-01-04	Milagro	2 pichones	Arbusto	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos o en árboles. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma globular. Construido con pajas. Boca en la parte lateral-superior.

Medidas :

Alto : 18 cm.

Ancho : 14 cm.

Largo antero-posterior : 15 cm.


Diámetro de la boca : de 6 a 7 cm.

FAMILIA: FURNARIIDAE

CAMINERA COMÚN *Geositta cunicularia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
10-11-79	La Esperanza	3 huevos	Cueva en el suelo
06-12-81	Los Gigantes	Sin postura	Hueco en una barranca
06-12-81	Los Gigantes	2 huevos	Hueco en una barranca
21-11-82	Los Gigantes	3 pichones	Hueco en pared pedrosa

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o túneles, en barrancas o en el suelo y en grietas o huecos. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos.

Medidas :

Diámetro del túnel : de 8 a 10 cm.
Largo del túnel : de 38 a 70 cm.
Diámetro de la cámara : de 8 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 23,4 a 24 x 19 X= 23,7 x 19 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,193 a 0,206
X= 0,200 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
294	10-11-79	La Esperanza	23,4 x 19,0	0,193
			23,7 x 19,0	0,201
			24,0 x 19,0	0,206

CAMINERA PUNEÑA *Geositta punensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN


E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
04-02-77	Abra Pampa	Pichones	Cueva en el suelo

Un pichón estaba parado en la entrada de una cueva en el suelo.

CAMINERA COLORADA *Geositta rufipennis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Cachipampa	3 huevos	Cueva en una barranca	0,70
23-02-79	Humahuaca	3 huevos	Cueva en una barranca	1,80
07-02-83	Humahuaca	1 huevo	Cueva entre piedras	1,80
25-11-90	Pampa de Achala	En construcción	Grieta en la montaña	12,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o grietas, en barrancas terrosas o rocosas, o entre piedras. A baja altura o altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos, formando un platito. Internamente plumas, pelos y lana.

Medidas :

Diámetro del túnel : de 8 a 11 cm.

Largo del túnel : de 0,95 a 1,15 m.

Diámetro de la cámara : de 15 a 17 cm.

Diámetro total del nido : de 14 a 17 cm.

Diámetro interno : de 9 a 12 cm.

Profundidad : 1 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 25,2 a 27,8 x 18,7 a 19,2 X= 26 x 18,9 (N= 4)

Peso lleno : 4,752 X= 4,752 (N= 1)

Peso de las cáscaras : de 0,260 a 0,272 X= 0,267 (N= 4)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
293	06-12-77	Cachipampa	25,2 x 18,7		0,260
			25,4 x 18,9		0,268
			25,7 x 19,2		0,272
604	07-02-83	Humahuaca	27,8 x 18,9	4,752	0,267

CHINCHERO GRANDE *Drymornis bridgesii*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 13



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
14-10-72	Esperanza (1)	3 pichones	Paraíso	3,50
05-10-75	Esperanza	3 huevos	Paraíso	1,50
25-10-95	Esperanza	2 pichones	Paraíso	4,50
15-11-95	Rincón de Ávila	Pichones	Paraíso	6,00
03-10-98	Esperanza	Pichones	Curupí	1,70
06-11-99	Calchaquí	Pichones	Algarrobo	1,60
25-09-00	Cayastá (1)	Pichones	Paraíso	2,70
06-10-00	Esperanza (2)	Pichones	Eucaliptus	2,40
25-10-02	Las Tunas (E. Ríos)	Pichones	Paraíso	2,00
22-11-03	Esperanza	Pichones	Paraíso	3,40
24-10-04	Jesús María	Pichones	Paraíso	4,50
30-10-12	Esperanza (3)	En construcción	Poste de hormigón de luz	7,50
03-12-12	Esperanza (3)	No observado	Poste de hormigón de luz	7,50

(1). En huecos naturales, los demás en nidos abandonados de *Colaptes sp*.
(2). En nido de *Colaptes campestris* del (02-10-99). Luego fue ocupado por *Melanerpes candidus* (28-11-00) y el (10-10-02) por *Colaptes campestris.*
(3) Entraban por la parte superior al interior del poste.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos naturales en los árboles o en nidos abandonados de Carpinteros (generalmente de *Colaptes melanochloros* o *Colaptes campestris*). También postes de alumbrado. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Puede acolchar la base con hojas.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 31,5 a 32,4 x 24,9 a 25,5

X= 31,9 x 25,1 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,816 a 0,828

X= 0,819 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
288	05-10-75	Esperanza	31,5 x 24,9	0,816
			32,0 x 25,0	0,825
			32,4 x 25,5	0,828

OBSERVACIONES

Los pichones cuando son grandes emiten fuertes gritos de llamada, los que son contestados por los padres. Estos traen como alimento larvas blancas, cascarudos (coleópteros) y otros insectos. También se los observó llevar babosas y arañas negras, grandes, que extraían escarbando en el suelo, hasta 4-5 cm. de profundidad

Por momentos realizan viajes cada 2 a 5 minutos y se van hasta 40-50 m. del nido, en busca de alimentos.

La pareja construye.


TREPADOR GIGANTE *Xiphocolaptes major*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	Sin postura	Ombú	4,00
15-11-74	La Loca	2 huevos	Tronco seco	1,60



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos naturales en los árboles. A baja o mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Puede acolchar la base con hojas, estiercol, pajitas, cortezas.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 36,2 a 37 x 26,7 a 27,3 X= 36,6 x 27 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 1,084 a 1,133 X= 1,108 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
289	15-11-74	La Loca	36,2 x 27,3	1,084
			37,0 x 26,7	1,133

OBSERVACIONES


El nido de La Gallareta, tenía una profundidad de 1,60 m

CHINCHERO CHICO *Lepidocolaptes angustirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 12



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-76	Esperanza	Pichones	Hueco en columna (1)	3,80
07-11-81	Cacique Ariacaiquín	2 huevos y 2 pichones	Hueco en parente (2)	2,50
15-11-81	Cayastá	4 huevos	Laurel	1,40
30-11-81	Cayastá	3 huevos	Laurel	2,00
18-11-90	Esperanza	En construcción	Fresno	3,20

13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Quebracho colorado	2,20
05-12-95	Esperanza	2 huevos	Curupí (4)	2,00
12-01-99	Esperanza	Pichones	Curupí	1,40
04-11-99	Esperanza	Pichones	Fresno	2,90
03-12-01	Villa Roda	Pichones	Interior de un transformador (3)	5,00
05-11-04	Esperanza	Pichones	Curupí (4)	2,30
10-10-05	Esperanza	En construcción	Chañar	3,00
24-11-07	Esperanza	Pichones	Chañar (5)	3,00

(1). Nido ubicado entre un caño y la pared de una columna de cemento.
(2). Hueco en un parante de un puente. La altura es desde el nivel del agua.
(3). Transformador de luz.
(4). En nido abandonado de *Colaptes melanochloros*.
El resto de los nidos en huecos naturales en ramas o troncos.
(5) Ocupó el mismo lugar de la cita del 10-10-05.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos naturales en los árboles, parantes de puentes, columnas de cemento, interior de un transformador de luz o en nidos abandonados de carpinteros.

Características.

Expuesto. Rudimentario. Puede acolchar la base con hojas, cortezas o palitos.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :
De 24,2 a 25,9 x 18,6 a 19,8
X= 25,1 x 19 (N= 9)
Peso de las cáscaras : de 0,318 a 0,372
X= 0.340 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
290	07-11-81	Cacique Ariacaiquín	24,2 x 18,8	0,327
			25,4 x 18,6	0,364
291	15-11-81	Cayastá	24,6 x 19,2	0,318
			24,7 x 19,4	0,329
			25,0 x 19,2	0,343
			25,3 x 19,2	0,360
	30-11-81	Cayastá	25,0 x 18,7	0,318
			25,8 x 19,8	0,365
			25,9 x 19,7	0,372

OBSERVACIONES

La pareja construye. Alimentan a los pichones con insectos y arañas.

PICOLEZNA PATAGÓNICO *Pygarrhinchas albogularis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-11-98	Lago Huechulafquen	Pichones	Coihue	5,50


NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. A mediana altura y alto.

BANDURRITA PICO RECTO *Ochetorhynchus ruficaudus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Azul Pampa	2 pichones	Grieta en una montaña	3,00
23-02-79	Azul Pampa	2 huevos	Grieta en una nomtaña	2,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o túneles en barrancas o grietas en laderas de montañas. A baja altura.


Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pajitas y plumas.

Medidas :

Largo del túnel : 50 cm.

BANDURRITA COLA CASTAÑA *Ochetorhynchus andaecola*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-78	Valle Encantado	2 pichones	Cueva en ladera terrosa	1,20
29-11-78	Valle Encantado	1 huevo	Cueva en ladera terrosa	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o túneles en barrancas o laderas terrosas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos y plumas.

Medidas :

Diámetro del túnel : de 6 a 7 cm.

Largo del túnel : de 0,40 a 1,00 m.


Diámetro de la base de la cámara: 9 x 10 cm.

BANDURRITA CHAQUEÑA *Tarphonomus certhioides*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 6



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-10-72	Jacinto Arauz	3 huevos	Hueco en un tronco	3,00
22-10-76	Vaquerías	Pichones	Hueco entre piedras	0,50
04-10-89	Morteros	En construcción	Hueco en un tronco	0,70
02-11-90	Morteros	4 huevos	En nido de Hornero	4,80
02-11-90	Morteros	2 huevos	En nido de Hornero	3,50
03-12-10	Jesús María	4 huevos	Caja-nido	2,70

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos en ramas o troncos, grietas entre piedras o en nidos abandonados de Hornero (*Furnarius rufus*) o en Cajas-nidos. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pelusas vegetales suaves, pelos, exuvias, papeles, plásticos.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso.

Medidas y pesos :

De 22,4 a 24 x 17,5 a 18 X= 22,6 x 17,7 (N= 5)


Peso lleno : 3,4 X= 3,4 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,246 a 0,300 X= 0,273 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
295	07-10-72	Jacinto Arauz	22,4 x 17,8		0,246
			22,5 x 17,5		0,259
			23,0 x 18,0		0,261
746	02-11-90	Morteros	23,0 x 17,6	3,4	0,300
			24,0 x 17,8	3,4	0,300

HORNERO *Furnarius rufus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 196

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-09-70	Llambi Campbell	3 huevos	Curupí	2,30
28-09-70	Videla	2 huevos	Paraíso	3,00
28-09-70	Videla	4 huevos	Paraíso	3,50
02-10-74	Esperanza	Pichones (1)	Chañar	3,10
02-10-78	Rincón de Ávila	Sin postura (2)	Molino	4,50
10-10-78	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,50
14-10-78	Esperanza	2 huevos	Poste	1,60
10-09-79	Esperanza	Sin postura (3)	Chañar	3,50
10-09-79	Esperanza	Sin postura	Suelo	
24-10-79	Esperanza	Sin postura (4)	Poste	1,50
15-12-81	Laguna Paiva	Sin postura	En tarro	3,50
15-10-86	Esperanza	4 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Poste	1,50
15-10-86	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Poste	1,50
31-10-86	Esperanza	Sin postuta (5)	Poste	1,50
31-10-86	Esperanza	2 pichones	Poste	1,50
31-10-86	Esperanza	3 pichones	Poste	1,50
31-10-86	Esperanza	3 pichones	Poste	1,50
04-12-88	Cayastá	Pichones	Timbó colorado	5,50
03-10-90	Los Amores	Pichones	Algarrobo	6,00
02-11-90	Morteros	2 pichones y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	4,20
02-11-90	Morteros	2 pichones, 2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Chañar	5,60
02-11-90	Morteros	4 huevos y 1 pichón de *M. bonariensis*	Chañar	3,80
02-11-90	Morteros	1 huevo y 1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Chañar	5,02
02-11-90	Morteros	3 pichones y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	4,50
02-11-90	Morteros	3 pichones	Quebracho blanco	6,80
07-11-90	Sarmiento	Sin postura (6)	Poste de luz	4,50
27-11-90	Esperanza	Pichones	Poste	1,50
08-12-90	C. Ariacaiquín	No observado	Algarrobo	6,50
08-12-90	C. Ariacaiquín	No observado (7)	Algarrobo	3,50
14-12-90	Monte Vera	No observado	Poste de luz	5,00
14-12-90	Coronda	No observado	Poste telefónico	6,00
14-12-90	Matilde	No observado	Algarrobo	5,00
15-12-90	Campo Andino	3 pichones	Poste	1,50

15-02-90	Cayastá	No observado	Algarrobo	4,00
15-02-90	Cayastá	Sin postura	Poste	1,50
05-01-91	Grutly	No observado	Poste de luz	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Aromo	1,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Aromo	1,10
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	5,40
16-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	7,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,40
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,30
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	2,20
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
26-11-93	Esperanza	3 pichones y 1 huevo	Poste	1,50
11-11-95	Campo Crespo	Sin postura	Suelo	
28-04-96	Esperanza	Pichones	Columna de luz	11,00
12-12-96	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	2,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,30
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
05-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,10
05-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,20
01-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	5,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
08-09-98	Esperanza	No observado	Ombú	5,00
08-09-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,50
11-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
11-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
11-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
15-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,70
15-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80

15-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,80
15-09-98	Monte Vera	En construcción	Suelo	
16-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
16-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
19-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
21-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,70
15-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
22-09-98	Esperanza	No observado (8)	Algarrobo	0,70
22-09-98	Esperanza	No observado	Aromo	2,00
22-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,70
26-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
26-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
26-09-98	Esperanza	No observado	Aromo	2,00
26-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
29-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
29-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,50
30-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
30-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,50
13-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
13-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
25-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
12-12-98	Esperanza	Sin postura (9)	Poste	1,50
05-05-00	Santa Fe	En construcción	Suelo	
05-05-00	Santa Fe	No observado	Cajón	0,70
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,70
01-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	6,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,70
01-09-02	Esperanza	No observado	Ombú	3,80
01-09-02	Esperanza	No observado	Ombú	6,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Ombú	6,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Cina-cina	2,50
01-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	7,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	1,60
01-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	3,60
01-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	2,50
01-09-02	Esperanza	No observado	Mora blanca	6,00
01-09-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,50
01-09-02	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,30
01-09-02	Esperanza	No observado	Algarrobo	1,60
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,20
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,60

17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	6,50
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,70
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,60
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,90
17-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,60
17-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	6,80
17-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	7,00
17-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	8,00
17-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	7,00
17-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,60
17-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
17-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	6,20
17-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
17-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,30
21-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
21-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	7,60
21-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
21-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
21-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	3,90
21-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	5,30
21-09-02	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,30
21-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	1,80
21-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	2,30
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,90
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
22-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,10
22-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,10
22-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
22-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
22-09-02	Esperanza	No observado	Mora blanca	4,20
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,80
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
25-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,50
25-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,00
25-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,60
25-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,60
25-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	6,30
25-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
25-09-02	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,70
25-09-02	Esperanza	No observado	Aromo	3,30
11-10-02	Esperanza	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	1,60
17-10-02	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	3,70
23-10-03	Esperanza	1 huevo	Poste	1,50

24-09-04	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,70
24-09-04	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,50
29-09-04	Esperanza	3 huevos y 5 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,20
29-09-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
12-09-12	Cayastá	No observado (10)	Suelo	

(1). Nido con dos bocas. Una estaba clausurada.
(2). Cuatro nidos superpuestos.
(3). Nido con dos bocas.
(4). Nido con la boca hacia arriba.
(5). Dos nidos superpuestos.
(6). Dos nidos superpuestos.
(7). Boca redonda en la parte media del nido.
(8). Tronco cortado.
(9). Nido deforme, construido abierto en la parte media.
(10). Nido sobre un tacurú (hormiguero)

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	2		1	2				128	43	10	9

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
15-20 días	Pone en días alternos	16-17 días	20-23 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. Asentado en ramas de arbustos o de árboles, postes de alambrados, columnas de luz, edificios, molinos, tranqueras, recipientes o en el suelo. A baja y mediana altura y altos.

Características. Expuesto. Elaborado. Redondeado, con entrada ovalada, corto túnel separado de la cámara por un tabique. Construido con barro entremezclado con pajitas, a veces con estiercol. Tapiza la cámara con pajitas y cerdas.

Medidas :

Alto : de 15 a 22 cm.
Ancho : de 23 a 25 cm.
Largo : de 23 a 25 cm.
Alto de la boca : de 7 a 8 cm.
Ancho de la boca : de 3 a 4 cm.
Diámetro de la cámara : de 13 a 15 cm.
Alto del tabique : 5 cm.
Grosor de las paredes : de 3 a 5 cm.

Altura : Nido más bajo : suelo
Nido más alto : 11 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	81	Ombú	4
Curupí	28	Paraíso	2
Acacia negra	21	Mora blanca	2
Algarrobo	14	Tarro	2
Poste de alambrado	14	Poste telefónico	1
Aromo	10	Molino	1
Quebracho blanco	5	Timbó	1
Suelo	5	Cajón	1
Poste de luz	4	Cina-cina	1

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 26,9 a 31,5 x 20,4 a 23,9
X= 28,6 x 21,7 (N= 29)
Peso lleno : de 6,4 a 7,2 X = 6,8 (N= 9)
Peso de las cáscaras : de 0,400 a 0,600
X= 0,450 (N= 20)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	25-09-70	Llambi Campbell	28,2 x 21,8		0,464
			29,0 x 21,6		0,537
			29,7 x 21,3		0,548
	28-09-70	Videla	26,9 x 20,9		0,471
			27,1 x 20,4		0,473
303	28-09-70	Videla	27,0 x 21,0		0,419
			27,4 x 21,5		0,443
			28,0 x 22,0		0,473
			29,0 x 22,4		0,483
304	10-10-78	Esperanza	29,2 x 22,8		0,549
			29,5 x 23,0		0,566
			30,0 x 23,9		0,567
305	14-10-78	Esperanza	30,5 x 20,6		0,424
			31,5 x 21,0		0,484
637	15-10-86	Esperanza	28,0 x 22,3		0,400
			28,2 x 22,0		0,400
			28,5 x 22,3		0,500
			28,7 x 23,2		0,600
638	15-10-86	Esperanza	28,5 x 21,0		0,400
			28,0 x 21,0		0,400
942	24-09-04	Esperanza	27,5 x 21,0	6,4	
			28,5 x 21,0	6,4	
			30,0 x 21,0	6,5	
	24-09-04	Esperanza	28,0 x 22,0	7,1	
			28,0 x 22,2	7,2	
			29,2 x 22,0	7,2	
	29-09-04	Esperanza	29,5 x 21,5	7,2	
			30,2 x 21,2	6,7	
941	29-09-04	Esperanza	28,0 x 22,0	7,0	
			29,2 x 22,1	7,1	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Implumes. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. Pico y piel color natural. Punta del pico más oscura.

4 días. Ojos entreabiertos. Comisura amarilla. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillentos.

Aparecen las vainas en las zonas ptéridas. Alas y cola con vainas grises. Ventralmente vainas claras.

5 días. Ojos abiertos, pardos. Pico grisáceo. Piel rosada. Patas grises.

10 días. Las láminas de las plumas dorsales pardas con tono castaño. Ventralmente blanquecinas-grisáceas

con ocráceo en los flancos. Aparecen las láminas de las plumas alares, de la cola y en la cabeza.

16 días. Plumaje de adulto. Gritan fuerte.

OBSERVACIONES


El 13-02-97 en Esperanza un adulto tenía las **dos alas blancas**. Andaba con uno de coloración normal.

El 04-04-04 en Esperanza un adulto con **Leucismo**. Tenía blanco en la cabeza y dorso.

HORNERITO COPETÓN *Furnarius cristatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos: 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
14-11-80	Villa Carlos Paz	4 huevos	Arbusto	3,00
16-09-88	Gato Colorado	Sin postura	Algarrobo	3,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de arbustos o de árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeado, con entrada ovalada, corto túnel separado de la cámara por un tabique.

Construido con barro entremezclado con pajitas, a veces con estiercol. Tapiza la cámara con pajitas.

Medidas :

Alto : 16 cm.
Ancho : 20 cm.
Largo : 16 cm.
Alto de la boca : 5 cm.
Ancho de la boca : 3 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco


Medidas y pesos :

De 22,3 a 25 x 17,9 a 18 X= 25 x 17,7 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 0,249 a 0,255
X= 0,252 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
306	14-11-80	Villa Carlos Paz	25,0 x 17,9	0,249
			25,0 x 18,0	0,255

JUNQUERO *Phleocryptes melanops*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Total de nidos observados : 33

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-10-70	Esperanza	2 huevos	Junco	1,10
03-10-71	Aguará Grande	2 huevos	Junco	1,00
07-10-71	Campo Andino	2 huevos	Junco	0,90
10-10-75	Aguará	2 huevos	Junco	0,80
15-10-79	Isla El Rico	3 huevos	Paja brava	1,00
15-10-79	Isla El Rico	2 huevos	Junco	1,00
18-10-86	Llambi Campbell	1 huevo	Junco	1,20
18-10-86	Llambi Campbell	2 huevo	Junco	1,10
05-11-88	Llambi Campbell	2 huevo	Junco	1,00
05-11-88	Llambi Campbell	2 pichones	Junco	1,10
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	Sin postura	Junco	1,30
02-12-90	Cacique Ariacaiquín	1 huevo	Junco	1,10
02-12-90	Cacique Ariacaiquín	Sin postura	Junco	0,90
15-12-90	Campo Andino	2 huevos	Junco	1,10
09-01-92	Campo Andino	3 huevos	Junco	1,20
09-01-92	Campo Andino	2 pichones	Junco	1,10
09-01-92	Campo Andino	3 huevos	Junco	1,00
09-01-92	Campo Andino	2 pichones	Junco	1,20
09-01-92	Campo Andino	1 huevo	Junco	1,00
05-02-92	Isla Verde	2 huevos	Junco	0,90
05-02-92	Isla Verde	3 huevos	Junco	1,00
02-12-92	Wildermuth	2 huevos	Junco	1,10
07-11-94	Wildermuth	En construcción	Junco	1,10
21-10-98	Isla Verde	3 huevos	Junco	1,20
21-10-98	Isla Verde	1 huevos	Junco	1,10
21-10-98	Isla Verde	2 pichones	Junco	0,90
25-09-99	Calchaquí	En construcción	Junco	1,00
25-09-99	Calchaquí	2 huevos	Junco	1,10
25-09-99	Calchaquí	3 huevos	Junco	1,10
05-02-04	Calchaquí	En construcción	Junco	0,80
05-02-04	Calchaquí	1 huevo	Junco	0,90
05-02-04	Calchaquí	2 huevos	Junco	0,90
06-12-07	Villa Roda	En construcción	Junco	1,00

El 09-01-92 en Campo Andino había varios nidos con 1 a 3 huevos y otros con 2 pichones.
El 31-10-00 en Wildermuth había muchos nidos con 1, 2 y 3 huevos. Algunos con pichones.
El 06-12-07 en Villa Roda algunos nidos con pichones.

Número de nidos por mes

E	F	M	M	J	J	A	S	O	N	D
5	5						3	11	4	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8-10 días		16 días	15-16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a Juncos o a Pajas brava. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma redondeada, alargado en sentido vertical. La boca en la parte lateral superior, con pequeño alero. Emplea en la construcción fibras de juncos. Internamente plumas.

Puede estar atado a 4-7 juncos. A veces está superpuestos a restos de nidos viejos.

Medidas :

Alto : de 12 a 15 cm.

Ancho : de 9 a 11 cm.

Diámetro interno : de 4,5 a 6 cm.

Diámetro de la boca : de 3 a 4 cm.

De la boca al fondo de la cámara : de 8 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso o turquesa.

Medidas y pesos :

De 19,4 a 21,9 x 15 a 17,4 X= 20,2 x 15,7 (N= 14)

Peso lleno : 2,3 a 2,6 X= 2,4 (N= 3)

Peso cáscaras : 0,167 a 0,231 X= 0,195 (N= 14)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
307	30-10-70	Esperanza	20,0 x 15,2		0,167
			20,0 x 15,0		0,173
308	03-10-71	Aguará Grande	20,0 x 16,6		0,222
			20,5 x 16,3		0,231
309	07-10-71	Campo Andino	20,5 x 16,0		0,211
			20,5 x 15,7		0,226
310	10-10-75	Aguará	21,0 x 16,3		0,197
			21,9 x 17,4		0,207
311	15-10-79	Isla El Rico	21,0 x 16,2		0,200
			21,6 x 16,0		0,208
			21,9 x 16,3		0,214
819	09-01-92	Campo Andino	19,4 x 15,3	2,3	0,190
			19,5 x 15,1	2,4	0,191
			20,0 x 16,0	2,6	0,192

BANDURRITA ANDINA *Upucerthia validirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Azul Pampa	2 pichones	Hueco en una barranca	2,50
23-02-79	Azul Pampa	2 huevos	Hueco en una barranca	1,90
08-02-01	Azul Pampa	2 huevos	Hueco en una barranca	2,10

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o túneles, en barrancas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos y plumas.

Medidas :


Diámetro del túnel : de 6 a 7 cm.

Largo del túnel : 70 cm.

BANDURRITA COMÚN *Upucerthia dumetaria*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Valle Encantado	No observado	Hueco entre piedras	1,80
11-11-79	Comodoro Rivadavia	2 pichones	Hueco en una barranca	1,10
11-01-82	Puente del Inca	2 huevos	Hueco en una barranca	2,10
16-12-99	El Alamito	2 pichones	Hueco en una barranca	2,20

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en cuevas o túneles, en barrancas o en el suelo y en huecos entre piedras. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos.

Medidas :

Diámetro del túnel : 10 cm.

Largo del túnel : de 1,00 a 1,20 m.

REMOLINERA SERRANA *Cinclodes comechingonus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-12-81	Pampa de Achala	Pichones	Hueco entre piedras	3,00
05-12-81	Pampa de Achala	2 huevos (*)	En caño	2,20
28-11-82	Los Gigantes	2 pichones	Grieta entre piedras	2,20
25-11-90	Pampa de Achala	2 huevos	Grieta entre piedras	0,05
25-11-90	Pampa de Achala	2 huevos	Hueco entre tierra y piedras	2,00
25-11-90	Pampa de Achala	Pichones	Grieta entre piedras	1,80
25-11-90	Pampa de Achala	Pichones	Grieta entre piedras	1,60

(*). Los huevos de este nido miden 20,7 x 17,6 y 20,7 x 17,2 mm. No se los tiene en cuenta para los promedios.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos, grietas entre piedras, túneles, cuevas, caños. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pelusas vegetales suaves, pajitas, pelos, cerdas, lanas, plumas.

Medidas :

Diámetro del túnel : de 7 a 8 cm.
Largo del túnel : de 30 a 50 m.
Diámetro total de la taza : de 8 a 13 cm.
Diámetro interno : de 7 a 11 cm.
Profundidad : 0,5 a 3 cm.
Alto : 4 cm.

Las medidas del túnel son ilustrativas, ya que puede ocupar huecos naturales.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24,7 a 25,9 x 19 a 20,1
X= 25,3 x 19,5 (N= 4)
Peso lleno : 4,7 a 5,2 X= 4,95 (N= 4)
Peso de las cáscaras : de 0,240 a 0,300
X= 0,285 (N= 4)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	05-12-81	Pampa de Achala	20,7 x 17,6		0,193
			20,7 x 17,2		0,209
758	25-11-90	Pampa de Achala	24,7 x 19,1	4,7	0,240
			24,9 x 19,0	4,7	0,300
759	25-11-90	Pampa de Achala	25,8 x 20,1	5,2	0,300
			25,9 x 20,0	5,2	0,300

REMOLINERA ANDINA *Cinclodes albiventris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	**N**

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-78	Valle Encantado	2 huevos	Hueco en ladera terrosa	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos, grietas entre piedras, túneles, cuevas. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pelusas vegetales suaves, pajitas, pelos, cerdas, lanas, plumas.

Medidas :

Túnel curvo de 35 cm. de largo y 8 cm. de diámetro.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24,0 a 24,3 x 19,7 a 19,8

X= 24,1 x 19,8 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,267 a 0,280

X= 0,273 (N= 2)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
299	29-11-78	Valle Encantado	24,0 x 19,8		0,267
			24,3 x 19,7		0,280

REMOLINERA CHOCOLATE *Cinclodes olrogi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
14-11-80	Pampa de Achala	2 huevos	Hueco entre piedras y tierra	3,00
14-11-80	Pampa de Achala	Pichones	Hueco en un puente	6,00
14-11-80	Pampa de Achala	Pichones	Hueco en una barranca	2,50
25-11-90	Pampa de Achala	2 huevos	Hueco entre piedras y tierra	2,40

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. Nidifica en grietas o en cuevas en barrancas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. En la cámara, una taza de fibras vegetales finas, pelos.(de vacas, liebre)

Medidas:

Diámetro del túnel : de 8 a 10 cm.

Largo del túnel : de 30 a 45 cm.

Diámetro total de la taza : de 12 a 15 cm.

Diámetro interno : de 6 a 7 cm.

Profundidad : de 1,5 a 3 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos. Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24,3 a 26,2 x 18,7 a 19,1

X= 25,1 x 18,9 (N= 4)

Peso lleno : 4,5 X= 4,5 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,233 a 0,236

X= 0,235 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
297	14-11-80	Pampa de Achala	24,3 x 19,1		0,233
			26,2 x 18,7		0,236
761	25-11-90	Pampa de Achala	24,6 x 19,1	4,5	0,235
			25,3 x 19,0	4,5	0,235

REMOLINERA CASTAÑA *Cinclodes atacamensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Valle Encantado	2 pichones	Grieta en una barranca	3,00
06-12-77	Valle Encantado	2 pichones	Cueva en una barranca	2,70
30-11-78	Valle Encantado	2 huevos	Hueco en una barranca	4,00
05-12-81	Copina	Pichones	Grieta en piedra	3,30
25-11-90	Pampa de Achala	2 huevos	Hueco entre piedras	4,00
25-11-90	Pampa de Achala	Pichones	Grieta entre piedras	2,70
25-11-90	Pampa de Achala	1 huevo	Grieta entre piedras	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Nidifica en huecos, grietas entre piedras, cuevas. En barrancas o en piedras. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pastos, pelos, cerdas, lanas, plumas.

Medidas :

Diámetro del túnel : de 6 a 10 cm.

Largo del túnel : de 0,60 a 1,00 m.

Diámetro total de la taza : de 10 a 12 cm.

Profundidad : 1 cm.

Alto : 3,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24,2 a 27,5 x 18,6 a 19,6

X= 25,6 x 19 (N= 4)

Peso lleno : 3,7 a 3,8 X= 3,75 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,228 a 0,300

X= 0,263 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
300	30-11-78	Valle Encantado	26,4 x 19,6		0,228
			27,5 x 19,1		0,250
760	25-11-90	Pampa de Achala	24,2 x 18,6	3,7	0,300
			24,3 x 18,8	3,8	0,300

REMOLINERA ARAUCANA *Cinclodes patagonicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N	N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-11-98	Confluencia	Pichones (1)	Hueco entre piedras	4,00


(1) La pareja trae comida.

02-02-76. Lago Futalaufquen. Un ejemplar llevaba materiales vegetales y se internaba en el bosque.

TICOTICO COMÚN *Syndactyla rufosuperciliata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-12-02	Concordia	Pichones	Sauce	5,50

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación. En huecos en árboles. A mediana altura y alto.


OBSERVACIONES

La pareja traía larvas (gusanos) a los pichones.

RAYADITO *Aphrastura spinicauda*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-01-76	Lago Huechulafquen	4 pichones	Árbol cortado	0,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO
Ubicación. Nidifica en huecos o en grietas, en árboles o en construcciones.A baja y mediana altura.

Características.
Oculto. Elaborado. En la cámara construye una taza de raicillas, con cerdas y plumas en la parte interna.
Medidas :

Diámetro del túnel : 4 cm.
Largo del túnel : 35 cm.


Diámetro total de la taza : 4 cm.
Profundidad : 4 cm.

COLUDITO CANELA *Leptasthenura fuliginiceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-02-01	Azul Pampa	3 huevos	Hueco en pared	2,30

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, grietas o cavidades, en la piedra o en construcciones. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tiene forma de taza, es contruido con pajas e internamente plumas.

Medidas :

Diámetro de la taza : 7,5 cm.
Profundidad : 2 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas :

De 18,5 a 18,6 x 14,5 a 14,6
X= 18,5 x 14,5 (N= 3)

NIDADA


Fecha	Localidad	Medidas
08-02-01	Azul Pampa	18,5 x 14,5
		18,5 x 14,6
		18,6 x 14,5

COLUDITO COPETÓN *Leptasthenura platensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 27



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Esperanza	1 pichón	En *Furnarius rufus*	3,30
08-10-72	Jacinto Arauz	3 huevos	En *Phacellodomus striaticollis*	2,50
14-10-72	Esperanza	4 huevos	En *Furnarius rufus*	3,00
24-09-75	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	3,00
24-09-75	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	3,20
27-10-81	Esperanza	2 huevos	En *Furnarius rufus*	3,30
18-19-86	Llambi Campbell	3 huevos	En *Schoeniophylax phryganophila*	3,00
05-11-88	Llambi Campbell	2 pichones	En *Furnarius rufus*	2,00

09-09-89	Llambi Campbell	No observado	En *Furnarius rufus*	3,00
04-10-89	Morteros	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
27-10-89	Esperanza	3 pichones	En *Furnarius rufus*	2,00
24-11-81	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
02-11-90	Morteros	4 pichones	En *Furnarius rufus*	4,80
02-11-90	Morteros	3 huevos	En *Furnarius rufus*	4,00
03-11-90	Esperanza	2 huevos y 1 de *Tapera naevia*	En *Schoeniophylax phryganophila*	2,00
16-10-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
16-10-92	Esperanza	2 huevos	En *Furnarius rufus*	2,50
16-11-95	Rincón de Ávila	No observado	En *Melanerpes cactorum*	3,40
16-11-95	Esperanza	3 pichones	En Caja nido	2,20
12-10-98	Esperanza	Pichones	En *Furnarius rufus*	3,70
11-12-98	Esperanza	Pichones	En *Furnarius rufus*	5,70
20-10-99	Esperanza	2 pichones y 1 huevo	En *Furnarius rufus*	2,10
12-09-02	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	4,00
12-09-02	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	5,00
30-10-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,20
22-09-04	Esperanza	4 huevos	En *Furnarius rufus*	1,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								7	12	7	1

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
13-15 días	Pone en días alternos	14-15 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, grietas o cavidades, en árboles o en nidos abandonados por otras aves. También en cajas-nidos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Acolcha o forra la cámara con pajas e internamente coloca cerdas y plumas.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 16,1 a 19,2 x 13 a 14,4 X= 18,4 x 13,6 (N= 15)

Peso lleno : de 1,7 a 2,0 X= 1,8 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,08 a 0,10 X= 0,94 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
313	14-10-72	Esperanza	17,8 x 13,7		0,097
			18,0 x 13,6		0,096
			18,2 x 13,7		0,100
			18,4 x 14,0		0,103

314	27-10-81	Esperanza	16,1 x 13,7		0,084
			16,2 x 13,7		0,093
	18-19-86	Llambi Campbell	18,3 x 13,8		
			18,4 x 13,0		
			19,2 x 14,4		
644	03-11-90	Esperanza	18,3 x 13,6		0,095
			19,2 x 14,2		0,095
	22-09-04	Esperanza	18,5 x 14,0	1,8	
			18,7 x 14,0	1,7	
			18,8 x 14,0	1,7	
			19,0 x 14,0	2,0	

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Plumón en las zonas ptéridas, gris.
Pico claro.Piel color natural. Comisura amarillo claro. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja.

3 días. Ojos cerrados. Vainas de las plumas alares y de la cola, grises. Emite gritos.
4 días. Abre los ojos.
5 días. Ojos abiertos, marrones.
6 días. Pico amarillento con punta oscura. Plumón gris. Cañones de las alas y cola, apareciendo las láminas parduscas con punta ocrácea. Ventralmente grisáceo.
11 días. Muy vivaracho. Patas grises en la parte anterior, amarillenta en la posterior. Ala : primarias y secundarias pardas con las plumas orilladas de ocre-castaño. Cola : plumas externas rojizas. Centrales pardo oscuro. Dorsalmente pardo grisáceo. Ventralmente grisáceo. Garganta y pecho jaspeado de pardo grisáceo.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,6	0,9						1,3-1,9
2	0,4	0,7	1,0						1,7-2,8
3	0,5	1,0	1,1						2,3-3,5
4	0,5	1,2	1,2						3,3-4,5
5	0,5	1,4	1,5	0,2-0,3					4,8-6,6
6	0,6	1,6	1,8	0,5-0,7					5,8-7,6
7	0,6	1,7	2,0	0,8-0,9					7,2-9,0
8	0,7	1,8	2,2	1,1-1,3	0,1-0,3	1,0		0,6	8,3-10,4
9	0,8	1,8	2,3	1,3	0,4-0,5	1,2	0,5	0,8-1,0	9,0-9,6
10	0,8	1,9	2,4	1,4	0,6-0,7	1,4	0,7	1,0-1,4	9,3-10,3


OBSERVACIONES

Los dos padres alimentan a los pichones.
A los 11 días si son molestados se escapan del nido.
Un pichón tenía una larva de mosca (*Philornis sp*.).
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

COLUDITO COLA NEGRA *Leptasthenura aegithaloides*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-02-77	Humahuaca	En construcción	Cardón	2,80
22-02-79	Azul Pampa	2 pichones	Huecos entre piedras	1,20
23-02-79	Chorrillos	2 huevos	Cueva en barranca	1,80
04-11-79	Península Valdés	2 huevos	Nido de espinas	1,90
10-02-83	Azul Pampa	3 huevos	Hueco entre piedras	2,20
10-02-83	Azul Pampa	3 huevos	Hueco entre piedras	1,80
10-02-83	Azul Pampa	Pichones	Hueco entre piedras	1,60
08-02-01	Azul Pampa	3 huevos	Hueco en pared de casa	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, grietas o cavidades, en árboles, cactus, piedras, barrancas, construcciones o en nidos abandonados por otras aves. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. En la cámara elabora una taza de pajas e internamente coloca pelos, lanas, hilos y plumas.

Medidas :

Diámetro total de la taza : de 9 a 12 cm.

Diámetro interno de la taza : de 5 a 6 cm.

Profundidad : de 1,5 a 4 cm.

Alto : de 5 a 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 17 a 18,9 x 13,1 a 14,5 X= 17,6 x 13,6 (N= 10)

Peso lleno : 1,629 a 1,912 X= 1,765 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 0,08 a 0,10 X= 0,93 (N= 10)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	23-02-79	Chorrillos	17,3 x 13,7		0,093
			18,0 x 14,0		0,099
296	04-11-79	Península Valdés	17,0 x 13,1		0,092
			17,2 x 13,4		0,096
605	10-02-83	Azul Pampa	18,0 x 14,2	1,629	0,090
			18,2 x 14,2	1,677	0,090
			18,3 x 14,1	1,687	0,090
606	10-02-83	Azul Pampa	18,7 x 14,4	1,788	0,085
			18,9 x 14,5	1,902	0,095
			18,9 x 14,1	1,912	0,100

ESPINERO FRENTE ROJIZA *Phacellodomus rufifrons*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-02-81	San Salvador de Jujuy	Sin postura	Árbol	2,20
18-01-84	Rosario de la Frontera	1 huevo	Árbol	3,00
17-12-99	Cuesta de Singuil	No observado	Árbol	3,70

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas de árboles.

A baja altura y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado, con túnel de entrada. La boca en la parte inferior. Emplea palitos en la construcción. Acolcha la cámara con vegetales suaves.

Medidas :

Alto total : 50 cm.
Ancho : 22 cm.
Diámetro de la boca : 5,5 cm.
Largo del túnel : 12 cm.
Diámetro interno de la cámara : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medida y peso :

De 22,3 x 16,3 (N= 1)

Peso cáscara : 0,195 (N= 1)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
831	18-01-84	Rosario de la Frontera	22,3 x 16,3	0,195

ESPINERO CHICO *Phacellodomus sibilatrix*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N				N	N	N	N	N	N

Total de nidos : 127



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-10-72	Humboldt	3 huevos	Algarrobo	2,50
14-11-78	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,60
15-11-78	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,00
18-08-78	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
18-01-80	Esperanza	No observado	Paraíso	2,00
30-09-81	San Javier	4 huevos	Algarrobo	2,00
24-10-81	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	2,80
24-10-81	Esperanza	1 huevo	Paraíso	3,00
14-10-86	Manucho	3 huevos	Chañar	2,50

18-10-86	Llambi Campbell	No observado	Eucaliptus	5,00
21-10-86	Esperanza	No observado	Ñandubay	2,00
21-10-86	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
21-10-86	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
31-10-86	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	2,00
31-10-86	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,30
07-11-86	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,70
07-11-86	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
05-11-88	Llambi Campbell	3 huevos	Chañar	1,50
09-09-89	Llambi Campbell	En construcción	Chañar	4,20
15-09-89	Esperanza	En construcción	Paraíso	5,50
23-09-89	Esperanza	No observado	Chañar	2,80
20-10-89	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	1,90
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	No observado	Algarrobo	3,00
15-12-90	Saladillo Dulce	No observado	Algarrobo	3,50
15-12-90	Campo Andino	No observado	Algarrobo	3,20
15-12-90	Cayastá	No observado	Algarrobo	4,00
05-01-91	Grutly	En construcción	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	1,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	1,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,20
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	1,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	1,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	1,60
19-11-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,80
20-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,20
30-12-93	Esperanza	2 pichones	Acacia negra	2,50
11-01-94	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,60
05-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	5,00
05-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
11-09-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	3,50
12-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
15-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
16-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
21-09-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,30
26-09-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,80
03-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,20
03-10-98	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	3,60
08-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,60
13-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	2,00
17-10-98	Esperanza	3 pichones	Chañar	4,00
10-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,30
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
30-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,60
02-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,80
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
21-12-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00

26-12-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,00
03-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	2,90
07-01-99	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	3,80
12-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30
14-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
15-01-99	Esperanza	En construcción	Acacia negra	3,50
15-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
21-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	3,20
26-01-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,50
02-02-99	Esperanza	En construcción	Chañar	3,20
02-02-99	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
02-03-99	Esperanza	En construcción	Curupí	1,70
23-01-01	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,80
14-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
14-09-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,50
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
21-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
22-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	5,60
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
23-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
23-09-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,10
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,40
25-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
25-09-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,80
25-09-02	Esperanza	No observado	Curupí	3,90
25-09-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	5,00
03-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
04-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
17-10-02	Esperanza	4 pichones	Chañar	2,40
21-10-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,20
24-10-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,30
26-10-02	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	2,20
27-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
29-11-02	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,20
15-11-02	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
21-12-02	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,90
23-07-03	Esperanza	En construcción	Acacia negra	4,30
24-11-03	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	4,30
24-11-03	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
13-12-03	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30

13-12-03	Esperanza	No observado	Curupí	4,50
13-12-03	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,00
13-12-03	Esperanza	No observado	Algarrobo	5,40
13-12-03	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
19-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
19-12-03	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
22-12-03	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
07-10-04	Esperanza	4 huevos	Mora blanca	2,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	2	1				1	1	38	37	13	22

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
13-15 días	Pone en días alternos	17 días	14-15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas de árboles. A veces asentado o sostenido. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, algunos con forma más o menos triangular. Túnel curvo. En la parte superior suele presentar una cámara abierta, que puede o no estar tapizada con pajitas o alguna pluma.

Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Tapiza la cámara con gramillas, plumas, exuvias, estiercol, resaca y materiales vegetales suaves.

Medidas :

Alto : de 35 a 40 cm.
Ancho : de 22 a 40 cm.
Largo : de 35 a 40 cm.
Ancho de la boca : de 4 a 6 cm.
Largo del túnel : 20 cm.
Diámetro de la cámara : de 9 a 10 cm.

La falsa boca mide unos 8 cm. de diámetro y 5 cm. de profundidad.

Altura :

Nido más bajo : 1,50 m
Nido más alto : 6,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	70	Paraíso	3
Algarrobo	19	Mora blanca	1
Quebracho blanco	14	Ñandubay	1
Curupí	11	Eucaliptus	1
Acacia negra	6		

Densidad de nidos por hectáreas (en un predio de 70 hectáreas)

Año 1998 : 0,23 nidos
Año 2002 : 0,57 nidos

HUEVOS

Pone 3, raro 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19,3 a 21,2 x 14,8 a 15,8

X= 20,3 x 15,2 (N= 20)

Peso lleno : de 2,1 a 2,4

X= 2,25 (N= 4)

Peso cáscara : 0,125 a 0,180

X= 0,147 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	01-10-72	Humboldt	20,6 x 15,3		0,166
			20,8 x 14,8		0,162
			21,0 x 15,8		0,180
346	14-11-78	Esperanza	19,3 x 14,9		0,125
			20,5 x 15,3		0,145
			20,6 x 15,4		0,153
347	30-09-81	San Javier	20,0 x 15,8		0,140
			20,2 x 15,7		0,147
			20,5 x 15,8		0,152
			20,7 x 15,4		0,153
636	14-10-86	Manucho	19,3 x 15,0		0,140
			20,3 x 15,0		0,142
			20,9 x 15,0		0,144
651	07-11-86	Esperanza	20,0 x 15,4		0,148
			20,2 x 15,8		0,148
			20,5 x 15,5		0,150
	07-10-04	Esperanza	20,0 x 15,0	2,1	
			20,0 x 15,0	2,2	
			20,3 x 15,0	2,3	
			20,5 x 15,5	2,4	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel color natural. Pico amarillento. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillentos. Comisura blanquecina. Escaso plumón (filoplumas) gris, en la cabeza y dorsalmente. En las alas y superior de los flancos gris oscuro.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas			Peso
	Pico	Tarso	Tibia	
2	0,5	0,8	1,3	3,3

OBSERVACIONES

El 31-10-86 en Esperanza, una Culebra verde (*Philodryas patagoniensis*) estaba comiendo dos pichones, de un nido en un Chañar a 2,30 m. del suelo.

Los nidos superpuestos pueden ser de 2 a 4, en una misma rama.

En el año 1998 se estudió la densidad de nidos por hectárea, en un predio de 70 hectáreas y da 0,23 nidos y en el año 2002, 0,57

ESPINERO ANDINO *Phacellodomus striaticeps*


PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									N

Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-02-77	Humahuaca	4 pichones	Arbusto	1,90
23-02-79	Azul Pampa	1 huevo	Arbusto	2,00
23-02-79	Azul Pampa	4 huevos	Arbusto	1,80
10-02-83	Azul Pampa	3 huevo	Arbusto	1,60
16-12-99	El Alamito	5 huevos	Árbol	2,30
16-12-99	El Alamito	1 huevo	Arbusto	2,80
16-12-99	El Alamito	No observado (*)	Arbusto	18,00

(*). El arbusto colgaba en la barranca de un río seco.



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas en arbustos o árboles.

A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado, con túnel de entrada. La boca en la parte inferior.

Emplea palitos en la construcción. La cámara muy mullida con vegetales suaves, desmenuzados, pelos, "pelusas" de cardones, plumas, lanas.

Medidas :

Alto : de 50 a 75 cm.

Largo total : de 20 a 40 cm.

Ancho : de 20 a 40 cm.

Diámetro de la boca : de 5,5 a 7 cm.

Largo del túnel : de 12 a 25 cm.

Diámetro interno de la cámara : de 8 a 10 cm.

Profundidad de la taza : 8 cm.

HUEVOS

Pone 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 22,3 a 23,4 x 16,5 a 17,3

X= 22,9 x 17 (N= 8)

Peso lleno : de 3,078 a 3,278

X= 3,176 (N= 3)

Peso cáscaras : 0,218 a 0,234

X= 0,226 (N= 8)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
348	23-02-79	Azul Pampa	23,0 x 17,0		0,225
349	23-02-79	Azul Pampa	22,3 x 16,9		0,218
			22,9 x 16,9		0,225
			22,9 x 17,2		0,228
			23,0 x 16,5		0,234
607	10-02-83	Azul Pampa	23,0 x 17,3	3,078	0,220
			23,3 x 16,9	3,172	0,223
			23,4 x 17,3	3,278	0,225

ESPINERO PECHO MANCHADO. *Phacellodomus striaticollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N					N	N	N	N	N



Total de nidos : 69

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-10-70	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,50
01-10-72	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tuna	1,00
15-10-76	Esperanza	4 huevos	Tala	1,50
15-12-77	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,00
06-12-79	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,50
15-01-80	Esperanza	No observado	Chañar	1,30
28-08-81	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,00
20-10-81	San Cristóbal	3 huevos	Arbusto	1,50
20-10-81	San Cristóbal	3 huevos	Arbusto	1,40
20-10-81	San Cristóbal	3 huevos	Arbusto	1,30
20-10-81	San Cristóbal	En construcción	Arbusto	1,50
20-10-81	San Cristóbal	2 pichones	Arbusto	1,40
19-11-83	Esperanza	1 huevo	Tala	1,40
19-11-83	Esperanza	4 huevos	Tala	1,50
17-10-86	Esperanza	2 pichones	Enredadera	2,00
25-10-86	San Javier	4 huevos	Arbusto	2,10
25-10-86	San Javier	1 huevo	Paja brava	0,70
07-11-86	Esperanza	5 huevos	Arbusto	2,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
16-09-89	Esperanza	1 huevo	Tala	1,70
16-09-89	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	2,00
16-09-89	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
16-09-89	Esperanza	4 huevos	Algarrobo	2,00
20-10-89	Esperanza	3 huevos	Tala	2,10
31-10-89	Soledad	3 huevos	Chilca negra	1,60
28-10-89	Esperanza	No observado	Tala	3,00
31-10-90	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
06-11-90	Esperanza	4 huevos	Arbusto	2,10
06-11-90	Esperanza	4 huevos	Paraíso	1,50
15-12-90	Campo Andino	4 huevos	Seibo	2,50
18-12-90	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,30
20-12-90	Monte Vera	2 huevos	Aromo	1,20
02-01-91	El Laurel	2 huevos	Aromo	2,00
12-01-91	Grutly	2 huevos	Chañar	2,10
26-10-91	Esperanza	No observado	Aromo	2,00
20-11-91	Don Cristóbal	4 huevos	Aromo	2,20
16-10-92	Esperanza	No observado	Tala	1,50
16-10-92	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
03-10-93	Empalme San	3 huevos	Paraíso	2,10

	Carlos			
03-10-93	Esperanza	4 huevos	Tala	2,00
04-10-93	San Jerónimo Norte	4 huevos	Chilca negra	1,70
16-10-93	Esperanza	4 huevos	Tala	1,80
27-10-93	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,60
04-12-93	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,30
04-12-93	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
18-12-93	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
05-01-94	Esperanza	1 huevo	Tala	2,60
10-11-95	Diamante	4 huevos	Paja brava	0,50
22-01-96	Villa Roda	En construcción	Arbusto	2,50
12-12-97	Esperanza	En construcción	Carda	1,20
16-09-98	Esperanza	No observado	Tala	2,60
08-10-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	0,80
12-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,30
14-02-99	Esperanza	En construcción	Tala	2,10
04-03-99	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,50
12-11-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
07-12-01	Esperanza	4 huevos	Sombra de toro	1,70
10-12-01	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,70
10-12-01	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,60
10-12-01	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,00
10-12-01	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
10-12-01	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
10-12-01	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,80
30-12-01	Manucho	4 pichones	Aromo	1,80
18-10-02	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	Chañar	1,70
23-12-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,10

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	1	1					1	5	29	8	19

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10-12 días	Pone en días alternos	16 días	16-17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación. Sostenido en ramas de árboles, tunas, hojas de Paja brava o sobre nidos semidestruidos de Espineros. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado. Túnel curvo, corto, que da a la cámara. Boca hacia arriba.

Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Tapiza la cámara con gramillas, plumas, musgos, materiales vegetales suaves, pelos.

Medidas :

Alto a nivel de la cámara : de 15 a 24 cm.
Ancho : de 15 a 20 cm.
Largo externo : de 25 a 35 cm.
Ancho de la boca : de 4 a 5 cm.
Largo del túnel : de 11 a 20 cm.
Diámetro de la cámara : de 9 a 12 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,50 m.
Nido más alto : 3,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	25	Sombra de toro	1
Tala	13	Algarrobo	1
Arbustos (no determinado)	9	Seibo	1
Aromo	7	Quebracho blanco	1
Curupí	2	Carda	1
Paja brava	2	Tuna	1
Chilca	2	Enredadera	1
Paraíso	2		

HUEVOS

Pone 4, raro 5 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 21 a 23 x 15,5 a 17
X= 22,5 x 16,6 (N= 15)
Peso lleno : 3,5 X= 3,5 (N= 3)
Peso cáscara : 0,176 a 0,242
X= 0,202 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
354	09-10-70	Esperanza	21,0 x 16,4		0,196
355	01-10-72	Esperanza	21,7 x 16,5		0,190
			21,9 x 16,8		0,208
			22,0 x 16,9		0,233
			22,0 x 17,2		0,242
	15-10-76	Esperanza	21,0 x 15,5		
			21,5 x 16,0		
			22,0 x 16,0		
			22,0 x 16,0		
356	15-12-77	Esperanza	21,8 x 16,5		0,176
			21,9 x 16,5		0,188
			21,9 x 16,5		0,190
465	31-10-89	Soledad	23,0 x 17,0	3,5	0,198
			23,0 x 17,0	3,5	0,200
			23,0 x 17,0	3,5	0,202

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas. Escaso plumón gris.

5 días. Ojos abiertos, pardos. Pico claro con punta oscura. Piel y patas color natural. Comisura blanquecina. Plumón gris. Vainas alares chicas, grises.

8 días. Comisura blanca. Pico gris. Escaso plumón gris. Láminas de las plumas dorsales, alas y cola, marrón-rojizo. Ventralmente blanquecino-ocráceo.
13 días. Pico oscuro. Patas grises. Quedan algunas vainas en la frente. Ventralmente ocre amarillento con el pecho jaspeado de pardo. Plumaje de adulto.
16-17 días. Dejan el nido.


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molotrhus bonariensis*

ESPINERO GRANDE *Phacellodomus ruber*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de nidos : 74

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Río Leyes	4 huevos	Sauce	2,50
05-11-76	Río Leyes	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Curupí	2,50
23-10-81	Río Paraná (Boca del Yacaré)	En construcción	Sauce	2,90
07-11-81	Cayastá	3 huevos	Aromo	2,10
15-11-81	Cayastá	3 huevos y 2 pichones	Tala	1,60
15-11-81	Cayastá	3 pichones	Seibo	3,10
15-11-81	Cayastá	4 huevos	Seibo	3,40
22-11-81	Cayastá	4 huevos	Aromo	1,40
04-12-88	Cayastá	2 pichones	Aromo	2,00
25-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	2,10
08-11-89	Cañada Ombú	No observado	Poste (*)	4,00
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	3 huevos	Algarrobo	2,10
15-12-90	Laguna Paiva	No observado	Cina-cina	2,70
15-12-90	Cayastá	No observado	Seibo	4,00
15-12-90	Campo Anido	No observado	Ombú	3,20
20-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	2,80
28-12-90	Monte Vera	4 huevos	Aromo	2,80
01-01-91	Isla Berduc	No observado	Seibo	3,50
01-01-91	Isla Berduc	No observado	Seibo	3,80
02-01-91	Cayastá	3 pichones	Aromo	2,70
18-01-91	La Criolla	No observado	Ombú	4,50
18-01-91	Laguna del Platero	No observado	Curupí	4,00
24-10-91	Villa Ocampo	No observado	Árbol	4,50
31-10-91	Corrientes	No observado	Árbol	2,50
12-11-91	Cayastá	4 huevos	Curupí	1,70
26-11-91	Villa Roda	3 huevos	Algarrobo	1,80
06-12-91	Yeso Oeste	No observado	Árbol	2,70
21-10-92	Villa Ocampo	No observado	Timbó	4,60
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,90
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	2,30
19-11-93	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
28-11-93	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,80
18-12-93	Esperanza	En construcción	Ombú	5,00
30-12-93	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	3,20
11-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	2,50
12-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
26-09-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,00
03-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
14-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
15-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	1,60
15-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00

15-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
16-10-98	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,80
09-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	2,60
05-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,80
28-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
30-12-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	3,60
04-01-99	Esperanza	No observado	Curupí	2,60
07-01-99	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
09-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,10
15-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	5,60
05-12-01	Esperanza	Pichones	Chañar	3,40
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
14-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Mora blanca	3,70
22-09-02	Esperanza	No observado	Tala	4,60
22-09-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,20
22-09-02	Esperanza	No observado	Ombú	4,20
04-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,00
25-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
25-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
25-10-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,30
25-10-02	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
23-12-02	Esperanza	4 huevos	Mora blanca	2,60
20-10-03	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,00
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
13-12-03	Esperanza	No observado	Mora blanca	2,50
25-10-04	Esperanza	4 huevos	Chañar	3,60
27-10-04	Esperanza	4 huevos	Paeaíso	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10								10	21	12	18

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
15-20 días	Pone en días alternos	17 días	17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas de árboles. A veces asentado o sostenido. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, algunos con forma más o menos triangular. Túnel curvo.

Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Tapiza la cámara con gramillas, plumas, materiales

vegetales suaves. A veces en el túnel coloca pastos, trozos de plásticos o de género.

Medidas :

Alto en la parte posterior : de 26 a 55 cm.
Alto en la parte anterior : de 17 a 20 cm.
Ancho : de 22 a 35 cm.
Largo : de 40 a 52 cm.

Ancho de la boca : de 5 a 8 cm.
Largo del túnel : de 17 a 20 cm.
Diámetro de la cámara : de 10 a 13 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,40 m
Nido más alto : 5,60 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	26	Mora blanca	3
Curupí	10	Tala	2
Aromo	6	Sauce	2
Algarrobo	6	Paraíso	1
Seibo	5	Cina-cina	1
Ombú	4	Timbó	1
Árbol (no determinado)	3	Poste telegráfico	1
Quebracho blanco	3		

Densidad de nidos por hectáreas (en un predio de 70 hectáreas)

Año 1998 : 0,18 nidos
Año 2002 : 0,25 nidos

HUEVOS

Pone 4, raro 5 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 22,8 a 26,8 x 16,7 a 18,6
X= 24,7 x 17,5 (N= 26)
Peso lleno : de 3,5 a 4,5 X= 4,0 (N= 12)
Peso cáscara : 0,122 a 0,261
X= 0,243 (N= 18)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
350	25-10-70	Río Leyes	24,8 x 18,0		0,253
			25,0 x 18,1		0,255
			25,4 x 18,3		0,257
			25,5 x 18,6		0,257
351	05-11-76	Río Leyes	23,5 x 17,5		0,230
			23,9 x 18,3		0,240
			24,4 x 17,0		0,243
			24,4 x 17,6		0,254
	07-11-81	Cayastá	22,8 x 16,8		0,232
			24,2 x 16,9		0,233
			24,7 x 17,3		0,238
353	15-11-81	Cayastá	23,2 x 16,7		0,222
			24,8 x 17,8		0,250
			25,7 x 17,7		0,261
789	28-12-90	Monte Vera	25,3 x 17,6	4,3	0,242
			26,4 x 17,9	4,3	0,242
			26,5 x 17,8	4,4	0,246
			26,8 x 17,5	4,5	0,248

25-10-04	Esperanza.	25,0 x 17,5	3,7
		25,0 x 18,0	3,9
		24,0 x 18,0	3,7
		24,5 x 17,8	3,8
27-10-04	Esperanza.	26,0 x 17,5	3,8
		24,4 x 17,2	3,8
		24,4 x 18,0	3,8
		24,0 x 17,7	3,5

PICHONES

Descripción.

2 días. Ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Piel clara, verdosa. Pico claro. Escaso plumón gris (filoplumas)

4 días. Ojos cerrados. Escaso plumón.

5 días. Abre los ojos, pardo grisáceos.

6 días. Ojos abiertos. Plumón ralo, escasas filoplumas. Se notan apenas las plumas en las zonas pteridas.

9 dias. Gritan. Plumas ventrales blanquecinas y ocres. Dorsalmente marrón. Cubiertas alares con láminas marrones. Primarias oscuras. Cola con láminas marrones.

10 días. Pico gris. Aparecen las láminas. Abriendo las láminas de las plumas dorsales. Cañones de la cola muy chicos de 2-3 mm., abriendo las láminas. Aparecen las plumas ventrales blancas. Escaso plumón. Vainas chicas en las zonas ptéridas.

12 días. Comisura blanquecina. Pico gris oscuro, casi negro. Paladar y lados de la cavidad bucal, amarillentos. Lengua amarillenta con gris en los bordes y en la punta. Dorsalmente, cubiertas alares y cola, rojizos. Plumas dorsales de 3-4 mm. Lámina de las primarias pardo rojiza, de 3 mm. Lámina de la cola 5 mm. Ventralmente blanquecino. Lados del pecho marrón. Flancos ocráceos.

17 días. Plumaje de adulto. Dejan el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
6	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
10	0,9	2,2	3,0	0,9	-	0,6	-	0,3	-
11	0,9	2,3	3,1	1,0	0,2	0,8	0,5	0,8	-
12	1,0	2,4	3,3	1,2	0,3	1,0	0,7	1,2	-
13	1,1	2,6	3,6	1,9	1,0	1,6	1,0	1,6	33,2-35,2

OBSERVACIONES

Un nido en Cañada Ombú, localizado el 08-11-89, estaba asentado en un poste telegráfico a 4 m. del suelo.

Los nidos superpuestos pueden ser de 2 a 4, en una misma rama.

Los pichones son afectados por larvas de moscas. Se constató desde 1 a 16 larvas por pichón.

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*


Puede ocupar el mismo nido más de una vez.

LEÑATERO *Anumbius annumbi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Total de nidos : 41



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
28-09-70	Videla	2 huevos	Acacia negra	7,00
30-09-71	Esperanza	4 huevos	Aromo	1,50
01-10-81	Humboldt	2 pichones	Paraíso	2,50
24-10-81	Esperanza	4 huevos	Paraíso	3,50
13-10-86	Llambi Campbell	1 pichón	Chañar	2,40
18-09-89	Colonia Bossi	Sin postura	Arbusto	1,00
29-10-86	Esperanza	No observado	Olivo	4,30
15-12-90	Campo Andino	No observado	Cina-cina	3,00
18-12-90	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,00
02-01-91	El Laurel	2 pichones	Aromo	1,70
18-01-91	La Criolla	No observado	Poste telefónico	6,50
18-01-91	La Criolla	No observado	Arbusto	2,40
24-10-91	Villa Ocampo	No observado	Poste de la luz	7,00
13-11-91	El Ramblón	No observado	Poste de la luz	5,50
13-11-91	El Ramblón	No observado	Molino	6,00
13-11-91	Lucas Norte	No observado	Poste de la luz	5,50
20-11-91	Lucas Gonzales	2 pichones	Arbusto	3,50
16-10-92	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,00
16-10-92	Esperanza	4 huevos	Acacia negra	2,50
05-10-95	Esperanza	1 huevo	Paraíso	2,70
16-01-96	Esperanza	En construcción	Parante de antena	3,70
16-01-96	Esperanza	En construcción	Parante de tinglado	4,00
01-09-98	Esperanza	En construcción	Paraíso	3,20
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	1,70
17-10-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,50
14-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
14-01-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
11-10-02	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,80
22-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
26-10-02	Esperanza	5 huevos	Acacia negra	2,00
26-10-02	Esperanza	5 huevos	Acacia negra	2,70
26-10-02	Esperanza	En construcción	Acacia negra	2,30
26-10-02	Esperanza	5 huevos	Chañar	3,60
15-12-03	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,70
29-09-04	Esperanza	3 pichones y 1 huevo	Acacia negra	2,50
25-10-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,50
01-11-04	Esperanza	3 huevos	Paraíso	2,90

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6	1							8	18	5	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
15 a 17 días.	pone en días alternos.	16 a 17 días.	18 días.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles, arbustos, postes, molinos, parantes de estructuras metálicas.
A baja y mediana altura y alto.
Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado en sentido vertical. Túnel curvo en espiral, que da a la cámara. Boca en la parte superior.
Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Tapiza la cámara con gramillas, plumas, materiales vegetales suaves, pelos.
En la boca del túnel, coloca plumas, huesos, hilos o trozos de nylon o géneros.

Medidas :

Alto : de 40 a 65 cm.
Ancho : de 28 a 40 cm.
Ancho de la boca : de 8 a 10 cm.
Largo del túnel : de 40 a 50 cm.
Diámetro de la cámara : de 10 a 15 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,00 m.
Nido más alto : 7,00 m.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :

De 23,5 a 25 x 17,4 a 18,7 X= 24,0 x 17,8 (N= 16)
Peso lleno : de 3,1 a 3,8 X= 3,56 (N= 6)
Peso cáscara : 0,209 a 0,266 X= 0,239 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
361	28-09-70	Videla	24,7 x 17,8		0,232
			25,0 x 18,2		0,266
362	30-09-71	Esperanza	23,6 x 17,5		0,209
			23,9 x 17,6		0,232
			23,8 x 17,8		0,239
			24,0 x 17,5		0,240
363	24-10-81	Esperanza	23,5 x 17,4		0,226
			24,0 x 17,7		0,231
			24,1 x 18,7		0,233
			24,5 x 18,3		0,249
943	29-09-04	Esperanza	23,8 x 18,5	3,1	0,240
	25-10-04	Esperanza	25,0 x 18,0	3,7	
			25,2 x 18,0	3,8	
	01-11-04	Esperanza	23,0 x 17,7	3,5	
			23,3 x 18,0	3,6	
			23,8 x 17,7	3,7	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua amarillos.

Piel clara. Largo plumón gris.
4 día. Apenas se ven las vainas de alas y cola.
5 día. Abre los ojos.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,2	1,8	-	-	-	-	-	-
2	0,7-0,8	1,2-1,4	1,9	-	-	-	-	-	9,0-11,1
3	0,8	1,4-1,5	2,0	-	-	-	-	-	12,0-14,0
4	0,8-0,9	1,5-1,6	2,3	-	-	-	-	-	16,4-17,7


OBSERVACIONES

El nido del 11-10-02, en Esperanza, tenía entre los palitos dos costillas de Zorro.
A veces los nidos presentan dos bocas y dos túneles, que pueden o no desembocar en la cámara.
Un nido tenía dos bocas que se unían en un túnel para terminar en la cámara.
Es afectado por las larvas de moscas.
Los pichones son depredados por culebras.

CRESTUDO *Coryphistera alaudina*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 55

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Cayastacito	3 huevos	Algarrobo	5,40
19-11-76	Los Amores	3 huevos	Árbol	5,00
29-09-79	Esperanza	4 huevos	Chañar	4,00
26-10-81	Esperanza	4 huevos	Ñandubay	3,10
24-09-82	Esperanza	En construcción	Algarrobo	4,90
24-09-82	Esperanza	En construcción	Chañar	4,80
24-09-82	Esperanza	En construcción	Chañar	5,20
11-10-86	Llambi Campbell	1 pichón	Chañar	2,50
18-10-86	Llambi Campbell	3 huevos	Chañar	2,30
26-09-89	Aº Ceibal	En construcción	Molino	10,0
29-09-89	Calchaquí	En construcción	Chañar	4,00
04-10-89	Morteros	4 huevos	Arbusto	2,00
05-11-89	Esperanza	No observado	Árbol	10,0
15-11-90	Morteros	No observado	Chañar	5,00
15-11-90	Morteros	No observado	Chañar	8,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	No observado	Chañar	5,00
15-12-90	Campo Andino	No observado	Eucaliptus	11,0
13-12-90	Malabrigo	No observado	Quebracho colorado	9,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Acacia negra	8,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
12-12-92	Esperanza	No observado	Ombú	8,00
27-10-93	Esperanza	No observado	Chañar	5,00

06-12-93	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
16-12-93	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
16-12-93	Esperanza	En construcción	Chañar	7,50
02-01-94	Esperanza	1 huevo	Chañar	6,80
01-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30
01-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,40
05-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
05-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
11-09-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,80
26-09-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	6,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
08-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
17-10-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	6,30
19-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,70
12-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
14-02-99	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
04-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
10-12-01	Esperanza	Sin postura	Chañar	4,30
18-10-02	Esperanza	4 pichones	Acacia negra	4,20
25-10-02	Esperanza	No observado	Acacia negra	8,00
25-10-02	Esperanza	En construcción	Curupí	6,00
26-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	5,20
26-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70
01-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	5,20
01-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
01-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	6,50
08-11-02	Esperanza	No observado	Chañar	7,50
13-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	8,00
20-01-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,40
25-10-04	Esperanza	5 huevos	Chañar	5,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	1							14	19	8	10

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
14-15 días	pone en días alternos.	15 a 16 días.	18 días.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles, arbustos, molinos, postes telefónicos, columnas de alumbrado. A baja y mediana altura y alto.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeado, con la boca hacia arriba. Túnel curvo, que da a la cámara. Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Tapiza la mitad inferior de la cámara con gramillas, plumas, estiercol, materiales vegetales suaves, pelos, trozos de nylon, telas.

Medidas :

Alto externo : de 30 a 50 cm.

Ancho externo : de 30 a 35 cm.
Largo externo : de 30 a 35 cm.
Ancho de la boca : de 8 a 9 cm.
Largo del túnel : de 25 a 42 cm.

Diámetro de la cámara : de 10 a 11 cm.

Altura :

Nido más bajo : 2,00 m.
Nido más alto : 11,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	35	Quebracho colorado	1
Acacia negra	7	Eucaliptus	1
Curupí	3	Ñadubay	1
Algarrobo	2	Ombú	1
Árbol (no determinado)	2	Molino	1
Arbustos (no determinado)	1		

HUEVOS

Pone 4 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :

De 21 a 25,1 x 16 a 18,6 X= 23,2 x 17,2 (N= 25)
Peso lleno : de 3,5 a 3,7 X= 3,56 (N= 5)
Peso cáscara : 0,311 a 0,377 X= 0,358 (N= 20)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
357	25-10-70	Cayastacito	24,0 x 16,8		0,311
			24,3 x 17,0		0,351
			25,1 x 16,7		0,354
358	19-11-76	Los Amores	25,4 x 17,8		0,356
			24,5 x 17,4		0,358
			24,5 x 17,5		0,373
359	29-09-79	Esperanza	22,8 x 17,4		0,377
			23,4 x 16,9		0,348
			23,4 x 17,5		0,336
			23,7 x 17,8		0,365
360	26-10-81	Esperanza	23,9 x 17,3		0,342
			22,9 x 16,9		0,351
			23,4 x 16,9		0,368
			23,7 x 17,0		0,373
645	18-10-86	Llambi Campbell	23,5 x 17,6		0,353
			23,7 x 18,0		0,357
			25,0 x 18,6		0,360
680	04-10-89	Morteros	21,0 x 16,0		0,342
			21,9 x 17,0		0,344
			22,3 x 17,8		0,352
			22,6 x 17,5		0,358
	25-10-04	Esperanza	24,0 x 17,2	3,6	
			23,5 x 17,2	3,5	
			23,2 x 17,0	3,7	
			23,0 x 17,0	3,5	
			23,0 x 17,0	3,5	

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento. Piel rosada. Patas natural.Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Plumón gris.

3 días. Aparecen las vainas en las alas.
4 días. Apenas se ven los cañones alares y muy pequeños en la cola, grises.
5 días. Abren los ojos.
6 días. Ojos abiertos. Comisura amarilla. Pico amarillento. Plumón gris claro. Cañones en alas y cola, grises. Ventralmente aparecen plumas blanquecinas (crema).
9 días. Dorsalmente aparecen las láminas, pardas. Ventralmente crema jaspeado de pardo.
12 días. Pico claro.Ventralmente blanquecino estriado de castaño. Alas y cola con las láminas pardo oscuras orilladas de ocráceo. Dorsalmente láminas chicas, jaspeadas. Escaso plumón.
18 días. Dejan el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	
1	0,5	1,4	1,8	-	-	-	-	-
2	0,6	1,4	2,0	-	-	-	-	-
3	0,7	1,5	2,2	-	-	-	-	-
9	1,0	2,2	3,0	1,2	0,3	-	-	1,0

OBSERVACIONES


Ocupa un mismo nido una a más veces.
En un nido al comenzar la postura andaban ocho ejemplares. Durante la incubación quedó una pareja.
Luego del nacimiento de los pichones se reunían siete individuos.
Los pichones son afectados por larvas de moscas.

CANASTERO COLUDO *Asthenes pyrrholeuca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-11-79	San Antonio Oeste	2 pichones	Arbusto	0,40
26-11-98	Junín de los Andes	1 huevo	Arbusto	1,00
15-10-04	Llancanelo	3 pichones y 1 huevo	Arbusto	1,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
Sostenido en arbustos o matorrales.
A baja altura.

Características.
Expuesto. Elaborado. Globoso alargado, redondeado u ovoidal. La boca en la parte superior. Puede o no tener un túnel que da a la cámara.
Emplea palitos en la construcción. Acolcha la cámara con vegetales suaves.
Medidas :
Largo total : de 30 a 35 cm.

Ancho : de 15 a 17 cm.
Diámetro de la boca : de 3 a 4 cm.
Largo del túnel : 15 cm.
Diámetro interno de la cámara : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19 a 20,0 x 14,5 a 15,8 X= 19,5 x 15,1 (N= 2)
Peso lleno : 2,1 X= 2,1 (N= 2)
Peso cáscara : 0,085 X= 00,85 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	26-11-98	Junín de los Andes	19,0 x 14,5	2,1	0,085
945	15-10-04	Llancanelo	20,0 x 15,8	2,1	0,085

PICHONES

Descripción. Los pichones nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillos. Plumón gris, fino, en la cabeza y dosalmente.

MEDIDAS


Días de vida	Medidas		
	Pico	Tarso	Tibia
1	0,4-05	0,8-09	1,2-1,3

CANASTERO CHAQUEÑO *Asthenes baeri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 20



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
21-10-74	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
10-10-78	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Quebracho blanco	2,20
05-10-79	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,00
27-10-81	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,80
16-01-82	Marayes	1 huevo	Arbusto	2,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
19-12-93	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,30
20-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,50
11-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
01-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
29-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,20
11-09-00	Esperanza	En construcción	Chañar	2,60

23-09-00	Esperanza	En construcción	Aromo	1,20
28-09-02	Esperanza	En construcción	Aromo	4,00
11-10-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	3,50
17-10-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
18-10-02	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,60
13-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
31-12-03	Esperanza	2 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Chañar	1,60
04-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								4	11	1	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20-26 días	Pone en días alternos	15-16 días	14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles.

A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeado, alargado en sentido vertical. La boca hacia arriba. Corto túnel curvo. Emplea palitos con y sin espinas en la construcción. Tapiza la cámara con musgos, líquenes, materias vegetales desmenuzadas, "pelusas" vegetales, pelos, plumas.

Medidas :

Alto total : de 24 a 30 cm.

Ancho : de 16 a 20 cm.

Diámetro de la boca : de 4 a 6 cm.

Diámetro interno de la cámara: 7 a 10 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,20 m.

Nido más alto : 4,00 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19,5 a 23,3 x 14,6 a 16,0 X= 21,7 x 15,4 (N= 13)

Peso lleno : de 2,3 a 2,4 X= 2,33 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,145 a 0,160 X= 0,155 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
340	21-10-74	Esperanza	22,8 x 14,7		0,151
			23,0 x 15,0		0,156
			23,3 x 15,3		0,160
341	10-10-78	Esperanza	19,5 x 15,0		0,150
			20,5 x 14,6		0,159
			20,5 x 15,4		0,160
342	27-10-81	Esperanza	20,9 x 15,0		0,145
			20,9 x 15,5		0,155
			21,6 x 15,4		0,156
343	16-01-82	Marayes	22,0 x 15,4		0,160
	04-10-04	Esperanza	22,0 x 15,5	2,3	
			21,8 x 15,5	2,3	
			21,5 x 16,0	2,4	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Pico blanquecino. Piel color natural. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Escaso plumón gris (filoplumas) en las zonas pteridas.

4 días. Ojos abiertos, marrones. Desaparece el plumón y tiene pequeñas vainas en las zonas pteridas.
El resto de la piel desnuda. Aparecen las vainas de las plumas alares y de la cola.

7 días. Plumas de la cabeza, dorsales y cubiertas alares, parduscas. Primarias más oscuras. Plumas laterales de la cola, canelas, centrales pardo oscuro.
.


Plumas de los flancos y ventrales, canela claro, más oscuro en la garganta.

12 días. Grita. Comisura blanquecina. Pico gris con una bandita blanquecina cerca de la punta y extremo negro. Primarias oscuras. Secundarias y dorsal marrón. Cola : plumas externas rojizas, cuatro centrales pardo oscuro. Ventralmente gris claro. Garganta un poco más oscura. Patas grises.

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis* y *Tapera naevia*
Durante la incubación agrega materiales a la cámara y repara el nido

CANASTERO PÁLIDO *Asthenes modesta*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-11-78	Valle Encantado	2 huevos	Hueco en montaña	1,50
22-02-79	Abra Pampa	2 pichones	Hueco en barranca	0,50
03-11-79	San Antonio Oeste	2 pichones	En nido abandonado	0,50
04-11-79	Península Valdés	2 pichones	En nido abandonado	1,00
05-12-81	Pampa de Achala	2 pichones	Grieta entre piedras	1,60
18-12-82	Los Gigantes	2 huevos	Hueco entre rocas	1,80
25-11-90	Pampa de Achala	3 huevos	Grieta entre piedras	1,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Oquedades, cuevas, huecos, grietas, enrtre raices de arbustos o en nidos abandodados o
semidestruidos de otras aves (principalmente de furnáridos).

A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Cubre la cámara con pajitas, lanas, pelos y plumas.

Medidas :

Diámetro de la boca : de 3 a 7 cm.

Diámetro interno de la cámara : de 6 a 15 cm.

Las medidas varían de acuerdo al receptáculo que ocupa.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

Para :

Asthenes m. modesta

De 22 a 22,2 x 16,4 a 16,9 X= 22,1 x 16,6 (N= 2)

Peso cáscaras : de 0,167 a 0,181 X= 0,174 (N= 2)

Asthenes m. corcobae
De 20 a 23 x 15,3 a 15,9 X= 21,3 x 17,6
(N= 5)

Peso lleno : de 2,33 a 2,60 X= 2,47
(N= 5)
Peso cáscaras : de 0,142 a 0,153 X= 0,148
(N= 5)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
344	30-11-78	Valle Encantado	22,0 x 16,9		0,167
			22,2 x 16,4		0,181
601	18-12-82	Los Gigantes	22,5 x 15,5	2,330	0,142
			23,0 x 15,3	2,340	0,153
762	25-11-90	Pampa de Achala	20,0 x 15,7	2,5	0,148
			20,5 x 15,9	2,5	0,150
			20,7 x 15,7	2,6	0,150

CANASTERO ROJIZO *Asthenes dorbignyi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Azul Pampa	2 huevos	Arbusto	1,50
09-02-01	Tafí del Valle	3 huevos	Arbusto	2,10

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
Sostenido en arbustos. A baja altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Globular, alargado, con túnel de entrada. La boca arriba hacia un costado. Emplea palitos en la construcción. Acolcha la cámara con vegetales suaves, pelos, plumas.
Medidas :
Largo total : 35 cm.
Ancho : 17 cm.
Diámetro de la boca : 3,5 cm.
Largo del túnel : 20 cm.
Diámetro interno de la cámara : 6 cm.

HUEVOS
Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :
De 22 a 23,1 x 16 a 17,5 X= 22,5 x 16,5
(N= 5)
Peso cáscaras : 0,176 a 0,178 X= 0,177
(N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
338	23-02-79	Azul Pampa	22,9 x 16,0	0,176
			23,1 x 16,3	0,178
	09-02-01	Tafí del Valle	21,5 x 17,5	
			22,0 x 16,5	
			23,0 x 16,3	

ESPARTILLERO SERRANO *Asthenes sclateri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
28-11-82	Los Gigantes	1 huevo	Entre pastos	0,10



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, en la base o dentro de matas de yuyos.
A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeado. Emplea pastos en la construcción. La boca en la parte lateral superior. Puede emplear como elementos parte de los yuyos donde está ubicado y tener además una rampa de acceso.

Medidas :

Alto : 15 cm.
Ancho : 12 cm.
Diámetro de la boca : 3 cm.
Largo : 10 cm.
Desde la boca a la base : 10 cm.
Largo de la rampa : 35 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24 x 17,8 (N= 1)
Peso lleno : 4,025 (N= 1)
Peso cáscara : 0,261 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
597	28-11-82	Los Gigantes	24,0 x 17,8	4,025	0,261


CURUTIÉ OCRÁCEO *Cranioleuca sulphurifera*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-12-81	San Javier	3 huevos	Paja brava	0,40
02-12-81	San Javier	2 huevos	Paja brava	0,40



NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en plantas acuáticas o de bañado. También ocupa la base de nidos de *Phleocryptes melanops*. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma redondeada o alargada en sentido vertical, con la boca de entrada en la parte superior lateral. Emplea en la construcción fibras vegetales. Internamente plumas.

Medidas :

Alto : de 18 a 19 cm.
Ancho : de 11 a 12 cm.
Ancho antero-posterior : 14 cm.
Diámetro de la boca : 3,5 cm. :
Diámetro interno de la cámara : de 7 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19 a 19,9 x 14,9 a 15,5 X= 19,6 x 15,2 (N= 5)
Peso cáscaras : 0,127 a 0,129 X= 0,128 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	02-12-81	San Javier	19,6 x 14,9	
			19,8 x 15,1	
			19,9 x 15,5	
333	02-12-81	San Javier	19,2 x 15,3	0,127
			19,3 x 15,3	0,129


OBSERVACIONES

Si se observa y toca el nido puede tirar o romper los huevos.

CURUTIÉ BLANCO *Cranioleuca pyrrhophia*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N



Total de nidos : 21

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-10-70	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,00
04-10-70	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	4,00
26-10-70	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
29-10-76	Esperanza	3 huevos	Ombú	3,00
16-10-78	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
30-09-81	San Javier	En construcción	Chañar	1,80
20-10-81	San Cristóbal	2 huevos	Chañar	3,00
08-03-89	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
02-11-90	Morteros	3 pichones	Chañar	5,00
02-11-90	Morteros	3 huevos	Chañar	2,20
15-11-90	Morteros	1 huevo	Chañar	3,00
25-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
16-10-98	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,80
17-10-99	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	3,80
18-10-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,30
18-10-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
18-11-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
03-11-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	3,00

08-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,20
08-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,30
11-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1						1	11	8	

Dormideros

Fecha	Lugar	Ubicación	Altura
30-09-81	San Javier	Aromo	2,20
17-01-89	Esperanza	Chañar	3,20
13-04-89	Calchaquí	Chañar	4,00
01-05-89	Grutly	Chañar	2,00
09-09-89	Llambi Campbell	Chañar	2,00
09-09-89	Llambi Campbell	Chañar	4,00
22-09-89	Esperanza	Chañar	3,00
22-09-89	Esperanza	Chañar	3,50
02-11-90	Morteros	Chañar	2,00
12-01-91	Grutly	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	Chañar	2,80
16-10-92	Esperanza	Chañar	2,80
16-10-92	Esperanza	Chañar	2,80
16-10-92	Esperanza	Chañar	3,00
29-01-00	Esperanza	Chañar	3,70

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10-11 días	Pone en días alternos	15 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma redondeada, con la boca de entrada en la parte superior lateral. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. Internamente pajitas, plumas, lana y materiales vegetales suaves.

Medidas :

Alto : de 18 a 20 cm.

Ancho : de 20 a 25 cm.

Diámetro de la boca : de 3 a 4 cm. :

Diámetro interno de la cámara : de 6 a 7 cm.

Altura :

Nido más bajo : 1,70 m.

Nido más alto : 5,00 m.

Dormidero.

Es redondeado. Con un túnel y dos bocas de entrada, dirigidas hacia abajo.

Es construido con palitos, claveles del aire. Internamente lo forra con pajas, barba de viejo, vilanos de cardos.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,7 a 20,5 x 13,3 a 15,4 X= 19,9 x 14,4 (N= 15)

Peso lleno : de 2,5 a 2,6 X= 2,56 (N= 3)

Peso cáscaras : 0,114 a 0,140 X= 0,131 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
334	03-10-70	Esperanza	20,4 x 15,0		0,131
			20,5 x 14,8		0,131
			20,0 x 14,8		0,136
	04-10-70	Esperanza	20,4 x 14,8		
			20,7 x 14,5		
335	26-10-70	Esperanza	19,8 x 14,5		0,136
			20,0 x 15,0		0,140
336	29-10-76	Esperanza	18,9 x 14,6		0,114
			19,3 x 15,1		0,121
			19,8 x 14,3		0,131
337	16-10-78	Esperanza	19,5 x 15,4		0,133
			19,7 x 15,3		0,133
	20-10-81	Esperanza	18,7 x 13,3		
			19,8 x 14,1		
	11-10-04	Esperanza	20,5 x 15,0	2,6	
			20,4 x 15,0	2,6	
			20,3 x 14,8	2,5	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarillo claro. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. Escaso plumón gris.
1 día. Escaso plumón en la cabeza y dorsal de las alas.
3 días. Se notan vainas en la línea dorsal y ventral. Ojos cerrados.
4-5 días. Abren los ojos.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	1,1-1,2	1,3-1,4	-	-	-	-	-	3,7-4,1
2	0,5	1,2-1,3	1,4-1,5	-	-	-	-	-	3,8-5,2
3	0,6	1,3-1,4	1,5-1,7	-	-	-	-	-	5,7-6,1


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Tapera naevia.* Los pichones son afectados por larvas de moscas.

CANASTERO ESTRIADO *Pseudasthenes humicola*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-01-82	Villavivencio	4 huevos	Arbusto	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos.

A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado en sentido vertical. Túnel curvo. La boca arriba y a un costado del túnel. Construido con palitos con espinas. Cámara forrada con materiales vegetales suaves y plumas.

Medidas :

Largo total : 35 cm.

Ancho : 15 cm.

Alto : 17 cm.

Diámetro de la boca : 3,5 cm.

Largo del túnel : 25 cm.

Diámetro interno de la cámara : 8 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 24 a 24,2 x 16,8 a 17,2 X= 24 x 17,0 (N= 4)

Peso cáscaras : 0,189 a 0,200 X= 0,195 (N= 4)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
339	12-01-82	Villavivencio	24,0 x 16,8	0,189
			24,0 x 16,9	0,194
			24,1 x 17,1	0,196
			24,2 x 17,2	0,200

CACHOLOTE CASTAÑO *Pseudoseisura lophotes*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 29

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-70	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,00
08-10-72	Jacinto Arauz	4 huevos	Aromo	3,50
02-10-74	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
30-09-81	Cacique Ariacaiquín	4 huevos	Aromo	4,50
31-10-89	Soledad	En construcción	Pino	5,60
05-11-89	Esperanza	Sin postura	Ñandubay	4,50
08-11-89	Los Amores	1 pichón	Chañar	3,80
29-11-89	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	7,50
02-11-90	Morteros	3 huevos	Chañar	4,80
05-01-91	Grutly	No observado	Algarrobo	4,50
12-01-91	Grutly	No observado	Algarrobo	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	6,50

09-10-93	Esperanza	No observado	Curupí	6,00
28-11-94	Esperanza	Pichones	Columna tinglado	6,00
25-11-95	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	4,00
16-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
11-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,90
02-02-99	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
14-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
14-02-99	Esperanza	En construcción	Curupí	4,20
11-10-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
14-01-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
23-10-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,70
03-11-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
03-11-03	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
19-12-03	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	6,00
25-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	3							2	11	8	2

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20 a 30 días.	Pone en días alternos.	18 a 19 días.	20 días.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles o en estructuras metálicas.

A mediana altura y alto.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado en sentido horizontal. Túnel largo. Boca hacia abajo. Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con pocos pastos. Externamente puede agregar trozos de nylon o géneros y plumas.

Medidas :

Largo total : de 0,90 a 1,20 m.

Alto externo en la cámara : de 40 a 60 cm.

Ancho externo en la cámara : de 40 a 80 cm.

Ancho de la boca : de 6 a 9 cm.

Largo del túnel : de 30 a 80 cm.

Diámetro de la cámara : de 20 a 35 cm.

Altura :

Nido más bajo : 3,50 m.

Nido más alto : 7,50 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 27,1 a 30,0 x 20 a 22,0 X= 28,5 x 21,0 (N= 11)

Peso lleno : de 6,7 a 7,6 X= 7,0 (N= 3)

Peso cáscara : de 0,377 a 0,449 X= 0,427 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
364	04-10-70	Esperanza	28,0 x 20,0		0,445
			28,0 x 21,4		0,449

365	08-10-72	Jacinto Arauz	27,1 x 20,5	0,377
			27,5 x 20,4	0,414
			28,0 x 20,7	0,420
			28,8 x 21,0	0,442
366	30-09-81	Cacique Ariacaiquín	27,9 x 21,0	0,416
			28,7 x 20,4	0,428
	25-10-04	Esperanza	28,5 x 21,2	6,7
			29,0 x 21,2	6,9
			30,0 x 22,0	7,6

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel y pico grises. Comisura blanquecina amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillentos. Plumón gris.

2 días. Abundante plumón gris oscuro en la cabeza, dorsal y alas.

5 días. Ojos cerrados. Pico y patas grises. Piel grisácea. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Abundante plumón gris.
6 días. Ojos abiertos, marrones.
7-8 días. Vainas grises.
10 días. Parte dorsal del pico claro, costados oscuro. Aparecen las láminas en las plumas dorsales, alas y cola. Tienen plumón dorsal pardo, ventral grisáceo.
17 días. Plumaje de adulto.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	0,8-1,0	1,0-1,1	-	-	-	-	-	5,5-6,5
2	0,6	1,0-1,2	1,2-1,3	-	-	-	-	-	6,7-8,5
3	0,7	1,2-1,4	1,5-1,7	-	-	-	-	-	7,0-12,7
4	0,6-0,8	1,0-1,5	1,7-2,0	-	-	-	-	-	7,9-15,0
5	0,7-0,9	1,1-1,7	1,8-2,1	-	-	-	-	-	8,5-17,2
6	0,8-0,9	1,2-2,1	1,9-2,3	-	-	-	-	-	9,0-18,5
7	0,9	1,3-2,6	2,0-2,6	-	-	-	-	-	9,4-20,0
8	1,0	1,4-2,9	2,0-2,9	0,1-0,2	-	0,1	-	-	10,0-22,5

OBSERVACIONES

El 02-10-74, en Esperanza un nido tenía dos bocas, situadas una en cada extremo del nido. Estaba habitado. Los pichones son afectados por larvas de moscas.


CACHOLOTE PARDO *Pseudoseisura gutturalis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-02-77	Cafayate	4 huevos	Arbusto	2,50
07-02-77	Cafayate	Pichones	Arbusto	1,00
15-02-82	Talacasto	Sin postura	Arbusto	1,50



15-10-04	Malargüe	Pichones	Arbusto	0,20
15-10-04	Malargüe	Sin postura	Arbusto	0,30
15-10-04	Malargüe	Sin postura	Arbusto	0,30

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles o de arbustos.

A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, alargado en sentido horizontal. Túnel largo.

Emplea en la construcción palitos, con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con pocos pastos.

Medidas :

Largo total : de 0,70 a 1,50 m.

Alto externo en la cámara : de 0,38 a 1,0 m.

Ancho externo en la cámara : 35 cm.

Ancho de la boca : 8 cm.

Largo del túnel : de 35 a 40 cm.

Diámetro de la cámara : de 18 a 25 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 28,9 a 29,9 x 21,4 a 21,8 X= 29,2 x 21,6 (N= 4)

Peso cáscara : de 0,413 a 0,475 X= 0,444 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
367	07-02-77	Cafayate	28,9 x 21,4	0,413
			28,9 x 21,8	0,439
			29,0 x 21,6	0,447
			29,9 x 21,6	0,475

PICHONES

Los pichones tiene comisura amarilla. El interior de la cavidad bucal y la lengua, anaranjado-amarillento. Ojos marrones. Piel rosada. Patas grises.

Vainas y láminas en la cabeza, marrón-castaño. Garganta crema. Dorsal, vainas negras, láminas castañas. Ventralmente gris claro. Flancos castaños.

OBSERVACIONES


La cámara de postura es más redondeada (no aplanada) que en el de *Pseidoseisura lophotes*

CHOTOY *Schoeniophylax phryganophila*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Total de nidos : 86



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-10-71	Esperanza	3 huevos	Pino	1,50
08-10-72	Jacinto Arauz	3 huevos	Tala	1,00
29-10-79	Esperanza	5 huevos	Arbusto	1,80
24-11-79	Esperanza	4 huevos y 2 de *Tapera naevia*	Pino	1,50
20-10-81	San Cristóbal	1 huevo	Arbusto	1,00
25-10-81	Manucho	4 huevos y 2 de *Tapera naevia*	Ñandubay	2,50

25-10-81	Manucho	4 huevos	Paraíso	2,00
25-10-81	Manucho	2 huevos	Algarrobo	2,20
25-10-81	Manucho	3 huevos	Chañar	1,70
25-10-81	Manucho	4 huevos	Chañar	1,90
15-11-83	Esperanza	4 pichones	Algarrobo	2,00
15-11-83	Esperanza	3 pichones	Aromo	2,10
15-11-83	Esperanza	No observado	Pino	17,0
15-11-88	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
23-09-89	Esperanza	No observado	Tala	2,50
23-10-89	Esperanza	No observado	Aromo	3,80
27-10-89	Esperanza	No observado	Ñandubay	2,70
27-10-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
30-10-89	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
08-11-89	Los Amores	3 huevos	Arbusto	0,40
28-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	4,20
06-11-90	Esperanza	3 pichones	Chañar	5,50
06-11-90	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,00
30-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
02-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	5 huevos	Aromo	2,00
14-12-90	Coronda	No observado	Chañar	3,00
14-12-90	Matilde	No observado	Chañar	2,50
14-12-90	Monte Vera	No observado	Chañar	2,30
14-12-90	Monte Vera	2 huevos	Aromo	1,20
14-12-90	Monte Vera	No observado	Aromo	3,80
15-12-90	Laguna Paiva	No observado	Algarrobo	3,00
15-12-90	Campo Andino	No observado	Aromo	2,60
15-12-90	Saladillo dulce	No observado	Aromo	3,60
15-12-90	Cayastá	No observado	Aromo	2,70
20-12-90	Monte Vera	2 huevos	Aromo	1,50
28-12-90	Monte Vera	3 huevos	Aromo	1,00
01-01-91	Isla Berduc	3 huevos	Aromo	3,60
01-01-91	Isla Berduc	5huevos	Aromo	2,10
02-01-91	Cayastá	4 huevos	Aromo	3,20
02-01-91	El Laurel	4 huevos	Aromo	2,50
02-01-91	Las Cañas	3 huevos	Aromo	2,80
12-01-91	Grutly	No observado	Algarrobo	5,00
18-01-91	La Criolla	No observado	Arbusto	3,50
18-01-91	Laguna del Platero	No observado	Algarrobo	4,00
08-11-91	Esperanza	5 huevos	Enredadera	1,10
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,70
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
16-10-92	Esperanza	4 huevos	Algarrobo	1,60
08-01-94	Esperanza	5 huevos	Tala salada	1,90
10-01-94	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,40

16-01-94	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	2,10
16-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
01-10-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
01-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
03-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	2,70
14-10-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,30
17-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,40
24-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
24-10-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	2,70
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
12-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,70
26-12-98	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
15-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
14-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
14-02-99	Esperanza	3 pichones	Chañar	5,50
01-12-01	Esperanza	1 pichón	Chañar	1,80
10-12-01	Esperanza	4 huevos	Curupí	1,50
16-12-01	Esperanza	4 huevos	Tala	1,50
13-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
28-10-02	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,00
02-11-02	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,60
25-11-02	Esperanza	1 pichón y 1 de *Tapera naevia*	Chañar	2,20
26-12-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,50
18-10-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,80
28-10-04	Esperanza	3 huevos	Tuna	0,30
03-11-04	Esperanza	4 huevos	Tala	2,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	2							4	34	15	19

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20-27 días	Pone en días alternos	15-16 días	15-16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en troncos, ramas, enredaderas o sobre nidos viejos. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma globular, con túnel de entrada alargado. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con hojitas, líquenes, musgos y pajitas.

Medidas :

Diámetro interno de la cámara : de 10 a 15 cm.

Externamente : 30 a 35 cm. o más.

Largo del túnel : de 40 a 55 cm.

Diámetro del túnel : de 3,5 a 5 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,30 m.

Nido más alto : 17,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	33	Pino	3	Paraíso	1
Algarrobo	15	Ñandubay	2	Enredadera	1
Aromo	15	Curupí	2	Acacia negra	1
Tala	5	Quebracho blanco	1	Sombra de toro	1
Arbusto	4	Tala salada	1	Tuna	1

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,7 a 22,4 x 14,1 a 16,3 X= 20,3 x 15,3 (N= 33)
Peso lleno : 2,1 a 3 X= 2,4 (N= 14)
Peso cáscaras : 0,131 a 0,163 X= 0,148 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	18-10-71	Esperanza	18,7 x 15,0		0,131
			19,2 x 15,2		0,131
			20,0 x 14,9		0,133
316	08-10-72	Jacinto Arauz	20,7 x 14,4		0,140
			22,0 x 14,8		0,156
			22,4 x 14,9		0,163
317	29-10-79	Esperanza	20,0 x 14,9		0,142
			20,0 x 14,1		0,142
			20,0 x 14,6		0,143
			20,0 x 14,9		0,144
			20,7 x 15,0		0,144
318	24-11-79	Esperanza	19,8 x 15,5		0,150
			20,5 x 15,4		0,154
			20,8 x 15,0		0,155
			21,0 x 15,5		0,161
319	25-10-81	Manucho	20,3 x 14,7		0,138
			20,3 x 15,0		0,139
			20,3 x 14,8		0,140
			20,5 x 14,9		0,144
302	30-10-89	Esperanza	18,9 x 15,1	2,2	0,154
			19,5 x 15,1	2,3	0,156
			19,6 x 15,3	2,4	0,160
785	20-12-90	Monte Vera	21,0 x 16,0	2,9	0,162
			21,3 x 16,0	3,0	0,162
	28-10-04	Esperanza	20,0 x 15,5	2,4	
			20,0 x 15,0	2,2	
			20,0 x 15,5	2,5	
	03-11-04	Esperanza	20,0 x 15,5	2,2	
			20,0 x 15,0	2,2	
			19,8 x 15,5	2,1	
			19,8 x 15,1	2,1	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Comisura blanca. Cavidad bucal y paladar, amarillo-naranja. Piel clara.

1 día. Abundante plumón gris oscuro.
5 días. Abre los ojos.
7 días. Cavidad bucal y paladar, amarillos. Alas y cola con vainas gris oscuro.
8 días. Pico gris. Patas claras. Cañones de las plumas primarias grises. Abriendo las láminas en las plumas dorsales, alas y cola. Plumas ventrales crema.
11 días. Plumas de las alas pardas orilladas de ocráceo. Dorsalmente pardo. Ventralmente blanquecino.
14 días. Grita. Color de adulto.
16 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas				
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	
8	1,0		-	-	-
11	2,0	0,5-0,6	-	-	1,5
14	1,0	1,5-2,0	-	-	2,0

OBSERVACIONES


Tres nidos estaban parasitado por *Tapera naevia*
El 09-01-79 en Miguel Escalada, una pareja alimentaba a un juvenil de *Tapera naevia*

CURUTIÉ COLORADO *Certhiaxis cinnamomeus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 37



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-10-70	Esperanza	4 huevos	Juncos	1,20
22-12-78	Cayastá	3 huevos	Juncos y Duraznillo blanco	1,00
22-12-78	Cayastá	5 huevos	Juncos y Duraznillo blanco	1,00
07-11-81	Cayastá	3 huevos	Arbusto	1,10
07-11-81	Cayastá	3 huevos	Paja brava	0,80
07-11-81	Cayastá	1 huevo	Guaco	0,70
20-10-86	Saladero Cabal	4 huevos	Paja brava	0,40
25-10-86	San Javier	3 pichones	Paja brava	0,70
25-10-86	San Javier	5 huevos	Paja brava	0,80
23-01-88	Esperanza	3 pichones	Juncos	0,70
06-01-90	Esperanza	3 pichones	Arbusto	1,50
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	3 huevos	Aromo	1,00
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	4 huevos	Aromo	1,50
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	2 huevos	Yuyos	0,90
14-12-90	Monte Vera	Sin postura	Aromo	0,80
14-12-90	Monte Vera	2 huevos y 1 pichón	Aromo	1,70
15-12-90	Esperanza	3 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Curupí	1,00

15-12-90	Esperanza	4 huevos y 2 de *Tapera naevia*	Aromo	1,20
20-12-90	Monte Vera	5 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Aromo	1,30
20-12-90	Monte Vera	2 huevos y 2 de *Tapera naevia*	Aromo	1,10
20-12-90	Monte Vera	1 huevo y 1 pichón de *Tapera naevia*	Aromo	1,30
01-01-91	Isla Berduc	1 huevo	Aromo	2,20
26-11-91	Villa Roda	3 huevos	Aromo	3,50
16-01-92	Monte Vera	1 pichón	Aromo	2,20
17-01-94	Esperanza (1)	2 huevos	Cina-cina	2,80
21-01-94	Río Salado y ruta 4	3 pichones (2)	Juncos	1,00
25-10-94	Río Salado y ruta 4	3 huevos	Curupí	1,10
23-11-94	Río Salado y ruta 4	En construcción	Curupí	1,20
22-12-94	Río Salado y ruta 4	3 huevos	Eucaliptus	0,50
19-12-98	Calchaquí	3 huevos	Juncos	0,80
19-12-98	Calchaquí	3 huevos	Juncos	0,80
25-09-99	Calchaquí	En construcción	Juncos	1,20
12-10-99	Calchaquí	En construcción	Juncos	1,40
01-11-01	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,70
02-01-02	Esperanza	1 huevo	Juncos	0,70
18-10-03	Esperanza	En construcción	Cina-cina	3,00
02-01-04	Esperanza	En construcción	Cina-cina	2,80

(1). Este nido contenía además un huevo de Pirincho (*Guira guira*) posiblemente estaba desde antes de la construcción del nido.
(2). Tres nidos superpuestos. El superior estaba activo.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8								1	7	6	15

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
14-16 días	Pone en días corridos	15-16 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido entre juncos, enredaderas, arbustos, árboles, paja brava, matorrales.

En orillas de esteros, arroyos, islas, bañados.

A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, con túnel curvo hacia arriba. Emplea palitos con y sin espinas. A veces acolcha la base de la cámara con vegetales suaves.

Medidas :

Largo total : de 31 a 35 cm.
Alto en la cámara : de 20 a 30 cm.
Ancho : de 15 a 20 cm.
Diámetro de la boca : de 4 a 4,5 cm.
Largo del túnel : 20 cm.
Diámetro interno de la cámara : 9 a 10 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,40 m.
Nido más alto : 3,50 m.

HUEVOS

Pone 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco verdoso o verde pálido.

Medidas y pesos :

De 18,3 a 21,8 x 14,3 a 16,5 X= 19,6 x 15 (N= 28)
Peso lleno : 1,4 a 2,4 X= 2 (N= 10)
Peso cáscaras : 0,127 a 0,141 X= 0,137 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
331	22-12-78	Cayastá	20,0 x 15,4		0,134
			20,0 x 15,4		0,138
			20,5 x 14,6		0,139
332	07-11-81	Cayastá	19,0 x 14,3		0,127
			19,1 x 14,8		0,137
			19,4 x 15,2		0,141
	07-11-81	Cayastá	20,5 x 15,3		
			20,7 x 15,4		
			20,8 x 15,2		
	23-01-88	Esperanza	18,5 x 14,7		
			19,0 x 14,7		
			19,0 x 14,7		
			19,2 x 15,0		
775	11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	18,5 x 14,7	1,9	0,139
			18,9 x 14,4	2,0	0,138
			19,9 x 14,7	2,0	0,140
330	15-12-90	Esperanza	19,8 x 14,8		0,135
			19,8 x 14,9		0,137
			20,2 x 15,5		0,138
782	15-12-90	Esperanza	19,9 x 14,6		0,138
			20,0 x 14,8		0,138
783	20-12-90	Monte Vera	19,5 x 15,6	1,4	0,136
			20,0 x 16,5	2,0	0,136
			20,3 x 15,8	2,4	0,138
			20,6 x 15,8	2,4	0,139
			20,7 x 15,9	2,4	0,149
784	20-12-90	Monte Vera	18,3 x 14,3	1,9	0,139
			19,5 x 14,9	2,3	0,139

PICHONES

Descripción.

Los pichones nacen con los ojos cerrados. Pico oscuro. Comisura, cavidad bucal y paladar, naranja-amarillentos. Patas grises. Plumón gris.

4-5 días. Abren los ojos.

5 días. Tiene plumón gris oscuro. Ojos abiertos, marrones.

6 días. Cañones de las alas y de la cola, grises con punta castaña. Extremo de las plumas del dorso, canela. Garganta, lados del pecho y flancos, blanquecinos amarillentos.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	0,6	0,9	-	-	-	-	-	-
5	0,5	1,1	1,4	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	1,3	0,2	-	-	0,8	-

OBSERVACIONES

La pareja trae materiales (palitos) que buscan hasta 40 m. del nido. Demoran bastante en acomodar, 5 o más minutos. Cuando uno llega canta y el otro responde suave.


Es parasitado por *Tapera naevia.*
Un pichón tenía 11 larvas : 2 en la cabeza, 2 en el ala derecha, 3 en el ala izquierda, 1 en la zona axilar, 2 el dorsal y 1 en un muslo.
La pareja alimenta a los pichones.

PIJUÍ FRENTE GRIS *Synallaxis frontalis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Total de nidos : 41



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-76	Esperanza	2 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Tala	1,20
18-01-79	Sta. R. de Calamuchita	3 huevos	Matorral	2,00
04-03-79	Esperanza	3 huevos	Tala salada	2,00
29-10-81	San Javier	2 huevos	Matorral	1,80
26-09-89	Las Claritas	3 huevos	Arbusto	2,00
06-11-90	Esperanza	3 huevos	Arbusto	2,10
30-11-90	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,00
02-12-90	Esperanza	1 huevo	Tala	1,00
18-12-90	Esperanza	4 huevos	Arbusto	2,60
18-12-90	Esperanza	1 huevo	Duraznillo blanco	0,50
25-12-90	Esperanza	No observado	Pino	4,00
25-12-90	Esperanza	3 pichones	Matorral	1,30
12-01-91	Grutly	Sin postura	Chañar	2,80
16-10-92	Esperanza	No observado	Tala	2,50
18-11-93	Esperanza	4 huevos	Algarrobo	1,00
18-12-93	Esperanza	4 huevos	Tala salada	1,30
18-12-93	Esperanza	3 huevos	Tala salada	1,20
09-12-95	Esperanza	4 huevos	Tala	2,60
09-12-95	Esperanza	2 huevos	Tuna	1,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,70
29-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,10
01-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,10
15-10-98	Esperanza	No observado	Molle	1,10
06-11-98	Esperanza	3 huevos	Tala	1,80
14-11-98	Esperanza	No observado	Zarzaparrilla colorada	1,70

01-12-98	Esperanza	No observado	Tala	3,30
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,80
05-12-98	Esperanza	No observado	Tala	2,80
17-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,00
03-12-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,40
10-11-01	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
07-12-01	Esperanza	3 pichones	Tala	1,80
13-10-02	Esperanza	En construcción	Tuna	1,00
26-10-02	Esperanza	2 pichones (*)	Quebracho blanco	3,00
02-11-02	Esperanza	3 huevos	Poleo	1,60
26-10-02	Esperanza	3 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Chañar	3,20
22-11-03	Esperanza	En construcción	Tala del indio	2,20
19-12-03	Esperanza	En construcción	Molle	2,00
19-12-03	Esperanza	En construcción	Tala	3,50
27-10-04	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
03-11-04	Esperanza	4 huevos	Tala	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2		1						3	8	10	17

(*). Los pichones fueron comidos por una culebra verde (*Philodryas patagoniensis*)

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Tala	13	Molle	2	Poleo	1
Chañar	8	Tuna	2	Zarzaparrilla colorada	1
Tala salada	3	Duraznillo	1	Pino	1
Matorral	3	Quebracho blanco	1	Algarrobo	1
Arbusto	3	Tala del indio	1		

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12-16 días	Pone en días corridos	15-16 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos, árboles, enredaderas, matorrales, tunas. A baja y mediana alturas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma globular, con túnel de entrada alargado. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con hojitas, líquenes, musgos y materiales vegetales suaves.

Medidas :

Largo total : de 35 a 60 cm.
Largo del túnel : de 15 a 35 cm.
Diámetro interno del túnel : de 3 a 5 cm.
Diámetro externo del túnel : 12 cm.
Alto externo de la cámara : de 22 a 45 cm.
Ancho externo de la cámara : de 17 a 25 cm.
Alto interno de la cámara : de 10 a 15 cm.
Ancho interno de la cámara : de 12 a 17 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,50 m.
Nido más alto : 4,00 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verde claro o blanco verdoso.

Medidas y pesos :

De 18,0 a 20,5 x 14 a 15,7 X= 18,8 x 14,5 (N= 14)

Peso lleno : de 1,7 a 2,0 X= 1,88 (N= 6)

Peso cáscaras : 0,117 a 0,153 X= 0,148 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
320	29-11-76	Esperanza	20,0 x 16,0		0,141
			20,5 x 15,7		0,153
321	18-01-79	Sta. R. de Calamuchita	18,8 x 14,3		0,117
			19,3 x 14,3		0,119
			19,5 x 14,0		0,121
322	04-03-79	Esperanza	18,9 x 14,7		0,126
			19,2 x 15,1		0,129
			19,2 x 15,0		0,132
	27-10-04	Esperanza	18,0 x 14,4	2,0	
			18,1 x 14,4	2,0	
	03-11-04	Esperanza	18,2 x 14,0	1,8	
			18,5 x 14,0	1,8	
			18,5 x 14,0	1,7	
			19,0 x 14,2	1,8	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel clara (anaranjada). Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillo-naranja. Plumón gris, fino largo, en la cabeza, dorsalmente y dorsal de las alas.

5 días. Abren los ojos. Vainas alares y de la cola, grises. Aparecen las vainas en zonas pteridas.

6 días. Vainas blanquecinas ventralmente.

7 días. Línea dorsal, vainas oscuras.

8 días. Abriendo láminas de la cola.

9 días. Pecho oscuro. Ventralmente ocráceo-amarillento. Flancos gris ocráceos. Dorsalmente pardo. Cobijas alares castañas. Primarias pardas.

11 días. Escaso plumón. Color de adulto.

13 días. Color de adulto, sin mancha gular.

15 días. Deja el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,3	0,7	0,9	-	-	-	-	-	1,4
2	0,3	0,9	1,1	-	-	-	-	-	2,4
3	0,4	1,1	1,4	-	-	-	-	-	3,1-3,5
4	0,4	1,1	1,5	-	-	-	-	-	3,6-4,0
5	0,5	1,2	1,7	0,5	-	0,4	-	-	4,5-5,5
6	0,6-0,7	1,5	1,9	0,7-0,8	-	0,5-0,8	-	-	7,8-8,6
7	0,8	2,1	2,2	0,9	-	0,8	-	0,5	10,0
8	0,9	2,1	2,3	1,2	0,2	1,1	0,2	0,8	11,5
9	1,1-1,2	2,1	2,5	1,5	0,3	1,3	0,4	1,2	12,5-12,8
10	1,2	2,2	2,6	1,5	0,8	1,4	1,3	1,8	13,0
11	1,2	2,2	2,6	1,5	1,3	1,5	1,5	2,2	13,3

OBSERVACIONES


Un pichón tenía larvas de moscas (*Philornis sp*.)

PIJUÍ COLA PARDA *Synallaxis albescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Total de nidos : 10



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-11-76	Esperanza	4 huevos	Pino	2,80
10-02-77	Capilla del Monte	2 pichones	Arbusto	2,10
15-12-77	Esperanza	3 huevos	Arbusto	1,80
31-12-77	Esperanza	4 huevos	Tala	1,70
13-01-78	Esperanza	3 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Arbusto	2,00
24-12-79	Esperanza	2 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Tala	1,50
15-11-83	Esperanza	3 huevos	Tala	1,90
18-11-89	Calchaquí	4 huevos	Tala	0,60
06-11-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,10
31-12-02	Esperanza	3 pichones y 1 huevo	Chañar	2,30

El 20-12-79 en Esperanza, una pareja alimentaba a un juvenil de *Tapera naevia*

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	1									4	4

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12-14 días	Pone en días corridos	15-16 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos, árboles, enredaderas, matorrales. A baja y mediana alturas.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma globular, con túnel de entrada alargado. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con hojitas, líquenes, musgos y materiales vegetales suaves.

Medidas :

Largo total : de 30 a 40 cm.
Largo del túnel : de 15 a 30 cm.
Diámetro interno del túnel : de 3 a 5 cm.
Diámetro externo del túnel : de 10 a 12 cm.
Alto externo de la cámara : de 22 a 35 cm.
Ancho externo de la cámara : de 17 a 20 cm.
Alto interno de la cámara : de 10 a 12 cm.
Ancho interno de la cámara : de 10 a 12 cm.

Altura :

Nido más bajo : 0,60 m.
Nido más alto : 3,10 m.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco verdoso o verde pálido.

Medidas y pesos :

De 18,4 a 20,3 x 14,3 a 16 X= 19,3 x 14,9 (N= 17)

Peso lleno : de 2,00 a 2,10 X= 2,05 (N= 4)

Peso cáscaras : 0,101 a 0,147 X= 0,135 (N= 17)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
326	24-11-76	Esperanza	19,0 x 15,4		0,123
			19,0 x 15,0		0,125
			19,4 x 15,2		0,133
			19,5 x 16,0		0,136
327	31-12-77	Esperanza	19,8 x 15,8		0,142
			19,8 x 15,5		0,146
			20,0 x 16,0		0,147
			20,2 x 16,0		0,147
328	13-01-78	Esperanza	18,4 x 14,5		0,123
			18,8 x 15,0		0,130
			19,2 x 15,0		0,138
329	24-12-79	Esperanza	16,6 x 15,0		0,101
			16,7 x 15,0		0,107
732	18-11-89	Calchaquí	19,0 x 14,3	2,0	0,140
			19,4 x 14,9	2,0	0,142
			20,0 x 14,7	2,1	0,144
			20,3 x 14,7	2,1	0,146

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Piel clara. Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranja.

4-5 días.

Abren los ojos.

7 días.

Ventralmente, pecho gris, flancos crema.

Las vainas de las plumas primarias miden 1,5 cm. y la cola, 0,5 cm.

OBSERVACIONES


Es parasitado por *Tapera naevia.*

PIJUÍ PLOMIZO *Synallaxis spixi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-11-76	Esperanza	3 huevos	Tala	1,00
13-01-78	Esperanza	2 huevos y 1 de *Tapera naevia*	Tala	2,00
24-12-78	Esperanza	5 huevos	Tala	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos, matorrales. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma globular, con túnel de entrada alargado. Emplea en la construcción palitos. Acolcha la base de la cámara con hojitas, pelos, musgos y materiales vegetales suaves.

Medidas :

Largo total : de 30 a 40 cm.

Largo del túnel : de 20 a 25 cm.

Diámetro interno del túnel : de 3 a 5 cm.

Diámetro externo del túnel : de 10 a 12 cm.

Alto externo de la cámara : de 25 cm.

Ancho externo de la cámara : de 16 cm.

Diámetro interno de la cámara : 12 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido o blanco verdoso.

Medidas y pesos :

De 18 a 19,6 x 13,9 a 14,6 X= 18,7 x 14,3 (N= 10)

Peso cáscaras : 0,102 a 0,127 X= 0,119 (N= 10)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
323	24-11-76	Esperanza	18,2 x 14,4	0,102
			18,2 x 14,6	0,106
			18,5 x 14,4	0,106
324	13-01-78	Esperanza	19,5 x 14,6	0,120
			19,6 x 14,6	0,135
325	24-12-78	Esperanza	18,0 x 14,1	0,120
			18,6 x 13,9	0,120
			18,7 x 14,3	0,121
			18,9 x 14,3	0,126
			19,0 x 14,0	0,127

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Tapera naevia.*

FAMILIA: TYRANNIDAE

FIOFÍO CENICIENTO *Myiopagis caniceps*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido del nido	Ubicación	Altura
10-01-91	Rosario de la Frontera	1 huevo	Pino del cerro	7,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles. Alto.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras vegetales. Recubierto externamente con musgos y líquenes. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : 7,5 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 1,5 cm.
Alto : 4 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema con puntos y manchitas castañas espaciadas en el polo mayor.


Medida y peso :

18,5 x 13,2 (N= 1)
Peso de la cáscara : 0,142 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
842	10-01-91	Rosario de la Frontera	18,5 x 14,4	0,142

FIOFÍO GRANDE *Elaenia spectabilis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Total de nidos : 64

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-71	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Cina-cina	2,50
26-02-71	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
05-03-71	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
10-03-71	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
27-11-76	Esperanza	2 huevos	Chañar	6,00

04-11-88	Cayastá	No observado	Timbó	6,00
22-12-89	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	4,00
01-12-90	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	2,70
18-12-90	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,80
28-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	4,00
05-01-91	Grutly	2 huevos	Chañar	3,50
06-11-91	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
19-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
05-12-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,60
07-12-93	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,70
08-12-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	5,00
08-12-93	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	4,70
09-12-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,90
29-11-94	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
29-11-94	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
05-12-94	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
07-12-94	Esperanza	En construcción	Curupí	4,50
04-01-95	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
18-11-95	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
29-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,30
04-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,80
05-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,30
09-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,90
09-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	5,00
19-11-98	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,80
25-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,80
01-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
03-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
05-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,50
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
07-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
17-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,40
26-12-98	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	4,00
26-12-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,60
03-01-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,20
04-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	6,50
07-01-99	Esperanza	En construcción	Curupí	3,90
09-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
09-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
14-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
15-01-99	Esperanza	No observado	Curupí	3,90
26-01-99	Esperanza	No observado	Acacia negra	3,40
14-02-99	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	3,40
14-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
27-01-00	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
27-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	6,30
27-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	6,40
29-01-00	Esperanza	No observado	Curupí	4,60
31-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
05-02-00	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
02-01-01	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	6,50
16-12-01	Esperanza	No observado	Curupí	3,80

31-12-01	Esperanza	Sin postura	Curupí	4,30
14-12-02	Esperanza	2 pichones	Chañar	6,30
26-12-02	Santa Fe	2 pichones	Seibo	3,80
09-11-04	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,90
14-12-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,10
22-12-05	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
16	5	2							1	14	26

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
de 8 a 10 días	Pone en días alternos	15 días	17 a 19 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Construido con fibras vegetales, raicillas. Recubierto externamente con líquenes, musgos, cortezas, liados con telas de arañas. Internamente plumas.

Ubicación.

En ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, asentado en las ramas.

Medidas :

Diametro total : de 6,5 a 9 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 2,5 a 4 cm.
Alto : de 3 a 5,5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 2,50 m.
Nido más alto : 6,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	33	Aromo	1
Curupí	16	Acacia negra	1
Quebracho blanco	5	Seibo	1
Algarrobo	3	Timbó colorado	1
Cina-cina	3		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas y grises, en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21 a 24,3 x 16 a 17,3 X= 22,5 x 16,9 (N= 11)
Peso lleno : de 3,1 a 3,5 X= 3,3 (N= 7)
Peso de las cáscaras : de 0,174 a 0,180 X= 0,177 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	26-02-71	Esperanza	21,0 x 16,0		
			22,0 x 16,5		
432	27-11-76	Esperanza	23,0 x 16,7		0,174
			21,7 x 16,2		0,176

740	22-12-89	Esperanza	23,4 x 17,3	3,5	0,178
			23,0 x 17,2	3,4	0,178
795	05-01-91	Grutly	24,3 x 17,3	3,1	0,176
			23,7 x 17,0	3,5	0,180
	09-11-04	Esperanza	23,0 x 16,0	3,1	
	14-12-04	Esperanza	23,5 x 17,2	3,4	
			23,6 x 17,0	3,5	

PICHONES

Nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón blanquecino, corto, en cabeza, dorsal, dorsal de las alas y flancos.
Comisura amarillenta. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranja-amarillento.
5 días

Grita. Ojos abiertos, marrones. Pico gris oscuro con las comisuras amarillentas. Piel oscura. Patas gris claro.
Plumón pardo claro con castaño amarillento en las alas. Aquí se notan dos bandas crema-amarillentas.
Pecho inferior y flancos, amarillentos.
7 días
Ventral amarillento. Abriendo las láminas. Muslos emplumados.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas					Peso
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias Vaina o canón	Plumas secundarias Vaina o canón	
1	0,4	1,0	1,2	-	-	3,2
2	0,4	1,1	1,4	-	-	4,5
3	0,5	1,2	1,5	-	-	6,2
4	0,5	1,4	1,6	-	-	8,5
5	0,6	1,6	1,8	0,1	-	11,3
6	0,8	1,7	2,0	0,5	0,5	12,2
7	1,2	1,8	2,2	0,9	0,8	14,5


OBSERVACIONES

Los pichones son alimentados con insectos y frutos (Mora, curupí)

FIOFÍO SILBÓN *Elaenia albiceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-01-82	Villavicencio	2 huevos	Pino	3,00
20-01-83	San Carlos de Bariloche	1 huevo	Pino	2,50
01-01-85	Lago Mascardi	2 huevos	Coihue	0,40
05-12-87	Lago Guillelmo	2 huevos	Laura	1,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles o arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, sostenido en las ramas.

Construido con fibras vegetales, tallos de yuyos, líquenes. Internamente raicillas, hilos, vilanos, lanas.

Medidas :

Diametro total : de 8,5 a 11 cm.

Diámetro interno : de 5 a 6 cm.

Profundidad : de 2,5 a 3 cm.

Alto : de 5 a 6 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas castañas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,9 a 22,4 x 14,5 a 15 X= 20,7 x 14,6 (N= 7)

Peso de las cáscaras : de 0,130 a 0,142 X= 0,137 (N= 7)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
433	12-01-82	Villavicencio	22,0 x 14,9	0,130
			22,4 x 15,0	0,136
705	20-01-83	San Carlos de Bariloche	18,9 x 14,7	0,142
801	01-01-85	Lago Mascardi	20,2 x 14,6	0,140
			20,6 x 14,5	0,140
703	05-12-87	Lago Guillelmo (*)	20,2 x 14,6	0,134
			20,6 x 14,5	0,138

(*). Nido localiza por Aníbal E. Casas

FIOFÍO PICO CORTO *Elaenia parvirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 116

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-11-71	Campo Andino	2 huevos	Aromo	3,50
27-11-71	Villa San José	2 huevos	Curupí	2,00
27-11-71	Villa San José	1 huevo	Aromo	2,60
26-11-76	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
29-11-76	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,50
27-11-77	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
27-11-77	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
27-11-77	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
15-12-77	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,30
15-12-77	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,20
13-12-78	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,50
13-12-78	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,40
17-12-79	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,50
17-12-79	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	3,50
08-12-81	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,10

14-01-89	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,00
14-01-89	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,20
17-01-89	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	4,00
17-02-89	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,20
23-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	4,50
24-11-89	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
28-11-89	Esperanza	No observado	Curupí	4,50
28-11-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,00
29-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
31-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	6,00
31-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	6,50
15-11-90	Morteros	Sin postura	Chañar	5,50
15-11-90	Morteros	Sin postura	Sombra de toro	3,50
22-11-90	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,00
30-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
30-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
02-12-90	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
02-12-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,50
13-12-90	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	4,00
06-01-91	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,70
12-11-91	Cayastacito	No observado	Chañar	6,50
26-11-91	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
30-11-91	Esperanza	No observado	Aromo	3,70
13-12-91	Malabrigo	No observado	Quebracho colorado	8,50
12-12-92	Esperanza	No observado	Curupí	3,70
18-11-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,20
02-12-93	Esperanza	En construcción	Cina-cina	6,60
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	5,00
04-12-93	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,30
12-12-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
12-12-93	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,00
16-12-93	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,80
18-12-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,20
19-12-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,60
20-12-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
22-12-93	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,70
15-11-94	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,60
05-12-94	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	2,70
05-12-94	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
17-12-94	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,60
17-12-94	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	2,20
30-12-94	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
30-12-94	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
30-12-94	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,70
16-12-95	Esperanza	2 huevos	Chilca	1,50
25-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
04-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	2,90
05-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
07-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
09-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,10
14-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,60
19-11-98	Esperanza	3 pichones	Curupí	4,00
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,50

19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
25-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
30-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,60
11-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,30
11-12-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
12-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,80
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,90
17-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
17-12-98	Esperanza	1 huevo	Curupí	3,00
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
28-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,60
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
30-12-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
30-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
30-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
03-01-99	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,00
04-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,30
04-01-99	Esperanza	No observado	Algarrobo	4,30
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,60
12-01-99	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	3,20
15-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
26-01-99	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,70
27-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
27-01-00	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
05-02-00	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	3,00
27-12-00	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,40
31-12-00	Esperanza	1 huevo	Quebracho blanco	2,00
01-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
16-11-01	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Quebracho blanco	2,80
16-12-01	Esperanza	No observado	Curupí	4,20
15-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
24-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
24-10-02	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,60
31-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
31-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
07-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
01-11-03	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
01-11-03	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	5,00
22-11-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,00
06-12-03	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	2,90
17-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
24-12-03	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,40
19-11-04	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
19-11-07	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	4,70
15-12-07	Esperanza	No observado	Aromo	3,80
13-11-09	Esperanza	1 huevos	Algarrobo	2,90
01-11-12	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	5,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
13	2								9	42	50

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 9 días	Pone en días alternos	14 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, asentado en las ramas.

Construido con fibras vegetales finas y raicillas. Recubierto externamente con líquenes, liados con telas de arañas. Internamente plumitas, a veces algunas cerda.

Medidas :

Diametro total : de 6 a 6,5 cm.
Diámetro interno : de 4 a 4,5 cm.
Profundidad : de 2,5 a 3,5 cm.
Alto : de 4 a 7 cm.
Grosor de la pared : de 0,5 a 1,5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,50 m.
Nido más alto : 8,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	53	Quebracho colorado	1
Quebracho blanco	27	Chilca	1
Curupí	24	Sombra de toro	1
Algarrobo	4	Cina-cina	1
Aromo	4		

HUEVOS

Pone 2, a veces 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas, algunas grises, en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 19,2 a 20 x 13,5 a 15 X= 19,6 x 14,3 (N= 13)

Peso de las cáscaras : de 0,101 a 0,124 X= 0,114 (N= 13)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
434	07-11-71	Campo Andino	19,3 x 13,4		0,110
			19,4 x 13,5		0,118
435	27-11-71	Villa San José	19,9 x 14,1		0,118
			20,0 x 14,8		0,120
436	27-11-71	Villa San José	19,7 x 14,5		0,101
437	26-11-76	Esperanza	19,5 x 14,6		0,112
			19,6 x 15,0		0,114
			19,8 x 14,8		0,114
438	29-11-76	Esperanza	19,5 x 14,9		0,112
			19,8 x 15,0		0,114
			19,8 x 14,9		0,114
439	08-12-81	Esperanza	19,2 x 14,2		0,114
			19,7 x 14,0		0,112

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillo, excepto alrededor de las fosas nasales, que es oscuro. Comisura amarilla. Cavidad bucal naranja. Piel oscura. Escaso plumón gris.

5 días
Ojos abiertos. Piel oscura. Escaso plumón. Aparecen las vainas de las plumas alares.
10 días
Bastante emplumados. En las alas se notan las dos bandas ocráceas.

Alimentación.
Los padres les traen insectos y frutos de Tala y Tala salada.

OBSERVACIONES

La pareja construye el nido. Realizan viajes constantes, cada 3 a 5 minutos. Busca materiales hasta 50 m. del nido. Acomoda unos 30 segundos, lo va moldeando aplastando el cuerpo contra el interior y trabaja con las patas y el pico.
El 30-12-94, en Esperanza, una pareja sacaba los materiales de un nido en construcción de *Polioptila dumicola*


FIOFÍO PLOMIZO *Elaenia strepera*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-12-91	Rosario de la Frontera	1 huevo	Pino del cerro	5,00
13-12-97	Rosario de la Frontera	1 huevo	Pino del cerro	4,50



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
Sostenido en ramas de árboles. A mediana altura y altos.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de semiesfera.
Construido con tallos de yuyos gruesos por fuera y fibras finas u hojas, internamente.
Medidas :
Diametro total : de 11 a 15 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 1,5 a 2 cm.
Alto : de 3 a 3,5 cm.

HUEVOS

Pone 2, a veces 3 huevos.
Ovoidales. De color crema con pintas castañas, algunas ocres, en el polo mayor.
Medidas y pesos :
De 21 a 22 x 14,3 a 16 X= 21,5 x 15,1
(N= 2)
Peso de las cáscaras : 0,140 X= 0,140
(N= 1)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
843	13-12-91	Rosario de la Frontera	21,0 x 14,3	0,140
	13-12-97	Rosario de la Frontera	22,0 x 16,0	

FIOFÍO OSCURO *Elaenia obscura*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-12-99	Cuesta de Singuil	2 huevos	Árbol (no determinado)	3,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, sostenido en las ramas.

Construido con fibras vegetales finas. Recubierto externamente con líquenes y claveles del aire.

Medidas :

Diametro total : 9 cm.

Diámetro interno : 5,5 cm.

Profundidad : 2 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema con pintas castañas en el polo mayor, formando una corona.

Medidas y pesos :

De 22,7 a 22,8 x 13,7 a 14,7 X= 22,7 x 14,2 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,154 a 0,156 X= 0,155 (N= 5)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
912	17-12-99	Cuesta de Singuil	22,7 x 14,7	0,154
			22,8 x 13,7	0,156

PIOJITO SILBÓN *Camptostoma obsoletum*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 26

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-10-76	Resistencia	No observado	Árbol	12,00
29-11-89	Calchaquí	2 huevos	Algarrobo	1,80
07-11-90	Morteros	Sin postura	Quebracho blanco	3,80
15-11-90	Morteros	2 huevos	Arbusto	2,00
15-11-90	Morteros	Sin postura	Quebracho blanco	3,80
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	En construcción	Algarrobo	2,30
23-11-93	Empedrado	2 huevos	Quebracho blanco	1,90
29-12-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,20
22-01-00	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,00

17-10-00	Esperanza	En construcción	Aromo	3,40
03-11-00	Esperanza	1 huevo	Tala	1,60
17-11-00	Esperanza	En construcción	Chañar	1,90
31-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
13-12-01	Esperanza	2 pichones	Quebracho blanco	3,20
15-12-01	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,40
03-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,90
25-10-02	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	2,70
15-12-03	Esperanza	1 huevo	Aromo	0,60
22-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,00
23-12-04	Esperanza	En construcción	Aromo	1,60
27-10-05	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	2,50
04-10-06	Esperanza	En construcción	Aromo	3,70
18-10-06	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
20-11-07	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
25-11-07	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
26-10-12	Esperanza	En construcción	Chañar	6,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1									9	9	7

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 11 días	Pone en días alternos	15 días	17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a ramitas de arbustos o de árboles. A veces entre telas de arañas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Oculto, semiexpuesto o expuesto. Elaborado. Tiene forma redondeada o de saco. Boca redonda, a veces con alero, en la parte superior.

Construido con fibras vegetales, nervaduras, líquenes, semillas, claveles del aire, liados con telas de arañas. Internamente “papus” (vilanos), plumas.

Medidas :

Alto : de 9 a 13 cm.

Ancho : de 6 a 10 cm.

Profundidad (de la boca a la base de la cámara) : de 3,5 a 6 cm.

Largo antero-posterior : de 5 a 8 cm.

Diámetro interno de la cámara : de 5 a 6 cm.

Diámetro de la boca : de 2 a 4 cm.

De la boca a la cámara de 5 a 8 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,60 m.

Nido más alto : 12,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	11	Arbusto	1
Quebracho blanco	5	Árbol	1
Aromo	4	Tala	1
Algarrobo	3		

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema, con finas pintas castaño claro, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,2 a 17 x 11,5 a 12,7 X= 16,5 x 12 (N= 4)

Peso lleno : de 1,1 a 1,4 X= 1,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,076 a 0,078 X= 0,077 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
735	29-11-89	Calchaquí	16,8 x 12,3	1,4	0,078
			17,0 x 12,7	1,3	0,078
844	23-11-93	Empedrado	16,2 x 11,5	1,1	0,076
			16,2 x 11,5	1,1	0,076

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarilla. Cavidad bucal y paladar, naranja-amarillentos. Pico y patas color natural. Piel verdosa. Plumón gris claro.

3 días. Pico amarillo. Apenas se notan las vainas en las alas. Plumón gris.

4-5 días. Abre los ojos.

5 días. Vainas grises en dorsal., blanquecinas en ventral.

7 días. Vainas grises en dorsal., blanquecinas en ventral. Vainas dorsales : 0,5 cm.

10 días. Emplumado. Vainas dorsales : 0,5 cm. Dorsalmente gris pardusco. Ventralmente grisáceo. Ribetes ocráceos en el extremo de las plumas secundarias. Escaso plumón. Se notan bandas en las alas. Pecho y flancos jaspeados.

Alimentación. La pareja alimenta a los pichones con insectos, realiza viajes cada 7 a 10 minutos, la primer semana.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	
1	0,3	0,7	0,9	-	-	-	-	-
2	0,3	0,8	1,0	-	-	-	-	-
3	0,4	1,0	1,2	-	-	-	-	-
4	0,4	1,1	1,3	-	-	-	-	-
5	0,5	1,2	1,4	-	-	-	-	-
6	0,5	1,3	1,6	-	-	-	-	-
7	0,6	1,5	1,8	1,0	-	0,7	-	0,4
8	0,6	1,5	1,8	1,0	0,2	0,8	0,1	0,8
9	0,6	1,6	1,9	1,1	0,3	0,9	0,2	1,2
10	0,6	1,6	2,0	1,2	0,4	1,0	0,2	1,4

OBSERVACIONES


La pareja construye. Traen los materiales con intérvalos de 3 a 4 minutos. Demoró 2 minutos en el interior acomodando.

Cortejo : hacían movimientos acompasados con las alas, erguían el cuerpo, estaban a una distancia de 30-40 cm. uno de otro. Emitían un chillido, acompañado de un suave castañeteo, esporádicamente cuando se corrían de árbol. Un ejemplar emitía el canto característico. Permanecía unos minutos en una rama y luego se iban desplazando.

No defienden el nido frente a otros pájaros que están cerca de él. Una hembra de *Heliomaster furcifer* viene a comer las arañitas que están en la tela que rodea al nido.

Algunos nidos tienen muchos Claveles del aire chico y en el interior “papus” de Cardo negro.

SUIRIRÍ COMÚN *Suiriri suiriri*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 52

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-10-72	Humboldt	3 huevos	Algarrobo	3,50
01-11-73	Aguará Grande	En construcción	Algarrobo	4,20
01-11-73	Aguará Grande	En construcción	Algarrobo	4,50
01-11-73	Aguará Grande	En construcción	Algarrobo	5,00
12-11-91	Grutly	Sin postura	Algarrobo	5,50
15-11-91	Esperanza	1 huevo	Cina-cina	4,50
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
15-12-94	Rincón de Ávila	3 huevos	Cina-cina	4,50
21-10-95	Rincón de Ávila	3 huevos	Cina-cina	4,50
21-10-95	Rincón de Ávila	2 pichones	Algarrobo	6,00
16-11-95	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	4,20
17-12-95	Esperanza	3 huevos	Chañar	6,00
12-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,00
15-09-98	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	3,50
16-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	5,10
26-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	5,00
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
29-09-98	Esperanza	En construcción	Acacia negra	5,80
01-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,20
03-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	6,00
08-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
08-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
12-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	6,30
17-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,80
12-10-99	Esperanza	No observado	Curupí	6,50
25-10-99	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,60
09-01-00	Esperanza	En construcción	Curupí	5,00
27-09-00	Esperanza	En construcción	Curupí	5,80
27-09-00	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
18-10-00	Calchaquí	No observado	Quebracho blanco	6,50
20-09-01	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
20-09-01	Esperanza	En construcción	Curupí	4,30
13-10-01	Esperanza	En construcción	Curupí	6,50
13-10-01	Esperanza	En construcción	Curupí	5,00
19-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70
25-10-01	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,20
25-10-01	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	5,70
14-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
21-10-02	Esperanza	3 huevos	Acacia negra	4,20
22-11-03	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	6,00
22-11-03	Esperanza	No observado	Curupí	6,50
01-12-03	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
08-11-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	5,50

06-10-05	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
10-10-05	Esperanza	En construcción	Curupí	6,30
10-10-05	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	5,40
11-10-05	Esperanza	En construcción	Acacia negra	5,00
11-10-05	Esperanza	En construcción	Curupí	5,40
25-09-08	Esperanza	En construcción	Chañar	6,50
30-09-12	Esperanza	En construcción	Acacia negra	7,50
03-11-12	Villa Roda	No observado	Cina-cina	6,00
03-11-12	Villa Roda	No observado	Cina-cina	6,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								12	23	11	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
de 7 a 11 días	Pone en días alternos	15 a 16 días	15 a 16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características. Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, asentado en las ramas.

Construido con fibras vegetales, recubierto externamente con líquenes e internamente musgos, algodón, vilanos y "pelusas" vegetales suaves.

Medidas :

Diametro total : 6 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : de 2,5 a 3,5 cm.
Alto : de 6 a 6,5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 3,50 m.
Nido más alto : 6,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Curupí	15	Algarrobo	6
Chañar	14	Cina-cina	5
Quebracho blanco	8	Acacia negra	4

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 17,8 a 18,5 x 13,8 a 14,9 X= 18,0 x 14,3 (N= 5)
Peso lleno : de 1,6 a 1,7 X= 1,65 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 0,102 a 0,104 X= 0,103 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
440	10-10-72	Esperanza	18,0 x 14,8		0,102
			18,4 x 14,9		0,104
			18,5 x 14,9		0,104
	08-11-04	Esperanza	17,8 x 13,8	1,7	
			18,0 x 13,8	1,6	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Parte anterior del paladar, negro. Piel pardo oscura. Ventralmente más clara. Plumón blanquecino, fino, ralo.

3 días. Plumón gris-blanquecino.

4 días. Ojos abiertos. Pico claro más oscuro en la punta. Comisura amarilla. Dorsalmente piel oscura. Ventralmente clara. Plumón dorsal y de la cabeza, gris claro.

8 dias. Pico negro. Lengua e interior de la cavidad bucal naranja. Comisura amarilla. Plumón gris pardusco. Cabeza jaspeada de blanquecino. Las plumas de las alas y de la cola grisáceas con el extremo ocráceo. Lados del pecho y abdomen amarillentos. Emiten un piido.

9 días. Láminas de las cubiertas alares ocráceas.

11 días. Jaspeado de blanquecino en dorsal. Ventral amarillento.

Juvenil. Tiene la corona y la nuca moteadas de gris y blanco. El dorso superior y el pecho levemente jaspeado.

Alimentación. Alimenta a los pichones con frutos de Mora blanca, de Tala e insectos (de caparazón duro). Se retiran hasta 30 m. a buscar.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	0,5	0,8	-	-	-	-	-	1,8
2	0,4	0,5	0,9	-	-	-	-	-	1,9
3	0,4	0,6	0,9	-	-	-	-	-	2,2
4	0,4	0,7	1,0	-	-	-	-	-	2,9
5	0,5	0,8	1,1	-	-	-	-	-	3,6
6	0,5	0,9	1,2-1,3	-	-	-	-	-	4,5-4,6
7	0,5	1,0	1,4	-	-	-	-	-	6,3
8	0,6	1,2	1,6	-	-	-	-	-	7,8
9	0,6	1,4	1,8	0,7	-	0,5-0,6	-	-	9,0-9,1
10	0,7	1,4	1,9	0,9	-	0,7-1,0	-	-	9,2-9,8
11	0,7	1,5	2,0	1,1	0,1	0,8-1,1	0,1	0,5	9,4-10,9

OBSERVACIONES

Puede andar solitario, pero generalmente en pareja. Recorredor, de ramas y follaje.

Recorre, recolecta, salta y caza al vuelo, entre los 3,50 y 10 metros de altura.

Voz corta y nasal. Otra parece una risa.

Emite una voz parecida a la de *Thamnophilus caerulescens* (similar al maullido de un gato)

La pareja construye. Buscan elementos hasta 40-70 m. del lugar elejido. Por momentos realizan viajes cada 2 a 5 minutos y permanecen arreglando de 10 a 15 segundos. Moldean el nido con el cuerpo.

A veces, luego de terminada la construcción demoran unos días en poner el primer huevo.

Corren a otras aves que se acercan.


En Esperanza en los meses de diciembre y enero, se ven parejas alimentando a juveniles

CACHUDITO PICO AMARILLO *Anairetes flavirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 9



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-01-99	Aconquija	2 pichones	Carqueja	1,00
05-01-99	Aconquija	Sin postura	Brusquilla	0,90
05-01-99	Aconquija	2 huevos	Brusquilla	0,70
16-12-99	El Alamito	2 pichones	Brusquilla	0,70
16-12-99	El Alamito	En construcción	Brusquilla	0,80
16-12-99	El Alamito	3 pichones	Brusquilla	0,70
18-12-99	El Alamito	2 huevos	Brusquilla	0,75
18-12-99	El Alamito	1 huevo	Arbusto	0,75
08-01-02	El Alamito	3 pichones	Brusquilla	1,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4											5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado o sostenido a ramitas de arbustos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras vegetales finas, vilanos. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 6,5 a 7 cm.
Diámetro interno : de 3 a 4 cm.
Profundidad : de 3 a 4 cm
Alto : de 5,5 a 8 cm.
Grosor de la pared : de 1 a 1,5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,70 m.
Nido más alto : 1,00 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 16 a 16,5 x 11,8 a 12,5 X= 16,3 x 12,2 (N= 5)
Peso de las cáscaras: 0,070 a 0,072 X= 0,071 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
903	05-01-99	Aconquija	16,0 x 12,5	0,072
			16,3 x 12,5	0,072
913	18-12-99	El Alamito	16,3 x 12,2	0,070
			16,5 x 12,2	0,070
918	18-12-99	El Alamito	16,4 x 11,8	0,072


PICHONES

Los pichones tienen plumón grisáceo. Son alimentados por los padres con insectos.

CACHUDITO PICO NEGRO *Anairetes parulus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-12-77	Cachipampa	Sin postura	Arbusto	1,30
28-11-88	Arroyo La Fragua (*)	3 huevos	Arbusto	1,70
21-11-98	Arroyo La Fragua	Sin postura	Arbusto	1,20
23-11-98	San Carlos de Bariloche	Sin postura	Arbusto	1,60
23-11-98	San Carlos de Bariloche	1 huevo	Arbusto	1,55

(*). Localizado por Aníbal E. Casas
El 21-11-98 en Bariloche una pareja alimentaba a 3 juveniles.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										4	1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
Atado a ramitas de arbustos. A baja altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, profunda, de paredes gruesas.
Construido con fibras vegetales finas, lanas. Internamente plumas.
Medidas :
Diámetro total : de 8 a 10 cm.
Diámetro interno : de 4 a 5 cm.
Profundidad : de 3 a 5 cm
Alto : de 7 a 8 cm.
Grosor de la pared : de 2 a 2,5 cm.
Altura.
Nido más bajo : 1,20 m.
Nido más alto : 1,70 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :
De 15 a 15,4 x 11,7 a 12,3 X= 15,2 x 11,9 (N= 4)
Peso de las cáscaras : 0,065 a 0,067
X= 0,065 (N= 4)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
672	28-11-88	Arroyo La Fragua	15,2 x 12,0	0,065
			15,2 x 12,3	0,066
			15,4 x 11,9	0,067
916	23-11-98	San Carlos de Bariloche	15 x 11,7	0,065

PIOJITO GRIS *Serpophaga nigricans*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 17



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-01-73	Pujato	3 huevos	Raíces de enredadera	0,80 del agua
22-11-77	Río Leyes	Sin postura	Raíces de enredadera	1,50 del agua
11-11-78	Cayastá	1 huevo	Aromo	1,70 del suelo
22-10-81	San Javier	2 huevos	Arbusto	0,30 del agua
13-10-83	La Brava	2 huevos	Cactus trepador	2,50 del suelo
03-01-87	Esperanza	3 huevos	Enredadera	1,20 del agua
17-10-95	Esperanza	2 huevos	Raíces de Tala salada	2,00 del agua
10-11-95	Esperanza	En construcción	Raíces de Tala salada	1,60 del suelo
28-11-95	Esperanza	2 huevos	Raíces de Tala salada	2,00 del agua
22-10-99	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Ramas de Tala salada	1,70 del suelo
23-10-99	Arroyo Potrero	3 pichones	Raíces de yuyos	2,50 del agua
01-11-01	Esperanza	3 huevos	Rama de Aromo	1,70 del suelo
14-12-01	Esperanza	3 pichones	Rama de Chilca	1,80 del suelo
30-12-01	Esperanza	No observado	Tallo de Campanilla	1,80 del suelo
20-09-02	Santa Rosa (S.Fe)	En construcción	Raíces de yuyos	1,30 del suelo
21-10-02	Esperanza	3 huevos	Tallo de enredadera	1,70 del suelo
18-10-03	Esperanza	En construcción	Tallo de enredadera	1,70 del suelo

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2								1	6	5	2

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
15 a 16 días	Pone en días alternos	15 días	14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a raíces, tallos de plantas, enredaderas y ramas que caen sobre el agua. En barrancas, debajo de puentes, o en cercanías de ambientes acuáticos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto o semiexpuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, colgante.

Construido con fibras vegetales, raicillas, Cabello de ángel y raíces de plantas acuáticas. Internamente materiales vegetales suaves y plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 5,5 a 8 cm.

Diámetro interno : de 3,5 a 4 cm.

Profundidad : de 3,5 a 5 cm

Alto : de 7 a 10 cm.

Grosor de la pared : de 0,5 a 2 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,30 m. sobre el agua.

Nido más alto : 2,50 m. del suelo.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema o blanco crema.

Medidas y pesos :

De 16,6 a 17,5 x 11,9 a 12,8 X= 17 x 12,4 (N= 8)

Peso lleno : de 1,63 a 1,71 X= 1,67 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,065 a 0,084 X= 0,071 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
429	03-01-73	Pujato	17,2 x 12,3		0,069
			17,3 x 11,9		0,073

			17,3 x 12,1		0,084
	11-11-78	Cayastá	17,5 x 12,4		0,075
431	22-10-81	San Javier	16,6 x 12,8		0,065
			16,7 x 12,4		0,065
613	13-10-83	La Brava	16,6 x 12,6	1,630	0,072
			17,4 x 12,8	1,714	0,074

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarilla. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranja. Plumón gris.

2 días. Cañones alares grises.
4 días. Ojos semiabiertos. Aparecen las vainas de las plumas ventrales, dorsales y alas.
5 días. Abren los ojos. Pico y patas, grises. Piel oscura.
7 días. Abriendo las láminas de las primarias y de la cola, pardas.
Ventralmente gris-blanquecino. Dorsalmente gris pardusco.
12 días. Pico negro. Cejas y ribetes de las plumas alares, ocráceas. Plumas pardas grisáceas.

Alimentación. Los dos padres los alimentan, traen de 1 a 3 insectos en el pico. Buscan hasta 40 m. del nido. Recorren sobre los Repollitos del agua (*Pistia stratiotes*) y otras plantas acuáticas. A veces suben por las ramas de las plantas hasta 2,50 m. Los viajes son discontinuos.
Las materias fecales no quedan en el nido, defecan fuera del mismo, los adultos toman el saco y la llevan lejos.
Los juveniles durante unos días andan por las cercanías del nido y son alimentados y cuidados por los padres.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina	o canón Lámina		
4	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	1,5	-	-	-	0,6	-

OBSERVACIONES


Los dos sexos construyen.
Es recorredor, revoloteador y caza al vuelo. Hace pequeñas carreritas para capturar mosquitos en la orilla del agua.

PIOJITO COMÚN *Serpophaga subcristata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 39



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-10-70	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,00
15-11-71	La Gallareta	2 huevos	Algarrobo	3,50
12-10-73	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	2,00
25-11-73	San Antonio Oeste	2 huevos	Arbusto	0,60
13-11-77	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,50

03-10-79	Esperanza	En construcción	Chañar	3,00
20-10-79	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,50
20-10-79	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,00
04-10-89	Morteros	3 huevos	Chañar	1,90
04-10-89	Morteros	3 huevos	Tala	2,20
04-10-89	Morteros	En construcción	Chañar	2,50
04-10-89	Morteros	2 pichones	Chañar	3,50
07-11-90	Morteros	2 pichones	Chañar	4,00
15-11-90	Morteros	En construcción	Chañar	2,70
30-11-91	Morteros	En construcción	Chañar	4,30
16-10-92	Morteros	1 huevo	Tala	3,00
25-10-93	Morteros	2 huevos	Chañar	2,30
28-10-93	Jacinto Arauz	2 huevos y 1 pichón	Chañar	2,20
26-11-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,70
01-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,00
10-11-95	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
15-11-95	Esperanza	2 pichones	Tala	2,10
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
29-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,20
03-10-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,90
14-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,40
17-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
26-10-98	Esperanza	No observado	Tala	2,80
16-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	6,10
24-10-00	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,70
05-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
30-10-01	Esperanza	2 pichones	Chañar	0,80
07-11-01	Esperanza	1 huevo	Tala del indio	2,10
07-11-01	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,50
29-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	1,90
26-10-02	Esperanza	En construcción	Curupí	4,00
12-10-03	Esperanza	En construcción	Chañar	2,00
18-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
11-11-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								3	21	13	2

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 14 días	Pone en días alternos *	15 días	15 días

(*) En un nido se observó postura en días corridos.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de arbustos o de árboles. A veces semioculto por hojas de enredaderas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras vegetales. Recubierto externamente con líquenes. Puede tener además cortezas y hojas. Algunos solamente ootecas de arañas. Internamente materiales suaves, pelos y plumas.

Medidas :

Diámetro total : 5,5 a 6 cm.
Diámetro interno : de 2,5 a 4 cm.
Profundidad : de 2,5 a 3 cm
Alto : de 4 a 6 cm.

Altura.
Nido más bajo : 0,60 m.
Nido más alto : 6,10 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	26	Arbusto	1
Tala	5	Tala del indio	1
Curupí	3	Quebracho blanco	1
Algarrobo	2		

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 14 a 16,4 x 11,5 a 12,3
X= 15,4 x 11,9 (N= 9)
Peso lleno : 1,0 X= 1,0 (N= 2)
Peso de las cáscaras : 0,053 a 0,070
X= 0,059 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
426	08-10-70	Esperanza	14,5 x 12,0		0.061
			16,0 x 11,0		0,070
428	15-11-71	La Gallareta	14,0 x 11,8		0,053
			14,2 x 11,5		0,062
427	12-10-73	Esperanza	16,0 x 12,0		0,055
			16,3 x 12,3		0,055
			16,4 x 12,3		0,057
	11-11-04	Esperanza	15,6 x 12,1	1,0	
			15,5 x 12,0	1,0	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarillenta. Cavidad bucal y paladar, naranjas.
12 días. Pico negro.Cejas y ribetes de las plumas alares, ocráceas. Plumas pardas grisáceas.
Plumaje de adulto.
Los dos padres alimentan. Buscan comida hasta 30 m. del nido, insectos, larvas, gusanitos.

Defecan fuera del nido, los adultos toman el saco y lo llevan lejos.

OBSERVACIONES


La pareja construye el nido. Traen elementos desde un radio de 30-40 m., demoran entre 35 segundos a 7 minutos por viaje. Permanecen de 5 a 15 segundos arreglando. Buscan telas de arañas, a unos 3 m. del nido. Dan saltitos entre las ramas para agarrarlas.

PIOJITO DE CABEZA GRIS *Serpophaga griseicapilla*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 2



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-96	Andalgalá	3 huevos	Arbusto	1,50
29-10-97	Ñancuñan (*)	3 huevos	Chañar	1,70

(*). Nido localizado por Eduardo Mezquida.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de arbustos o de árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras vegetales. Recubierto externamente con líquenes. Internamente materiales suaves y plumas.

Medidas :

Diámetro total : 6 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 3 cm
Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema.

Medidas y pesos :

De 13,2 a 15,8 x 11,7 a 12,3 X= 14,3 x 11,9 (N= 6)

Peso de las cáscaras : 0,056 a 0,60 X= 0,058 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
905	15-11-96	Andalgalá	13,2 x 11,8	0,056
			13,8 x 12,0	0,058
			13,6 x 12,0	0,058
906	29-10-97	Ñancuñan	14,4 x 11,7	0,060
			15,0 x 12,3	0,060
			15,8 x 11,8	0,060


DORADITO COPETÓN *Pseudocolopteryx sclateri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-12-81	San Javier	Sin postura	Yuyo	0,35
25-10-86	San Javier	En construcción	Paja brava	0,50



Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									1		1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a tallos de yuyos, ramitas u hojas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita.

Construido con fibras vegetales. Internamente raicillas o algunas cerdas. Liado con telas de arañas.


Medidas :

Diámetro total : de 6 a 7 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 5 cm
Alto : 7 cm.
Grosor de la pared : de 1 a 1,5 cm.

DORADITO COMÚN *Pseudocolopteryx flaviventris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-12-72	San Vicente	En construcción	Espadaña	1,60
11-12-90	Isla Verde	3 huevos	Cardo	0,70
27-12-91	Isla Verde	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cardo	0,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											3

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a tallos de yuyos, Espadañas, Juncos o Cardos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita.

Construido con fibras vegetales, pajitas. Internamente "vilanos" y/o plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 7 a 9 cm.
Diámetro interno : de 4 a 5 cm.
Profundidad : de 3 a 4,5 cm
Alto : 8 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,70 m.
Nido más alto : 1,60 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color crema.

Medidas y pesos :

De 15,9 a 16,7 x 12 a 12,9 X= 16,2 x 12,5 (N= 6)
Peso de las cáscaras : 0,064 a 0,070 X= 0,067 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
813	11-12-90	Isla Verde	16,4 x 12,3		0,069
			16,5 x 12,0		0,070
			16,7 x 12,3		0,070
832	27-12-91	Isla Verde	15,9 x 12,7		0,064
			16,0 x 12,9		0,065
			16,2 x 12,8		0,065


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molotrhus bonariensis*

BARULLERO *Euscarthmus meloryphus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-01-79	Santa R. de Calamuchita	1 pichón y 1 huevo	Arbusto	0,50
27-10-90	Esperanza	En construcción	Yuyo	0,30
20-11-91	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,35
21-10-93	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,30
19-12-93	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,25
27-10-94	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,30
04-12-94	Esperanza	En construcción	Yuyo	0,30
24-12-97	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,25
18-10-98	Esperanza	En construcción	Yuyo	0,30
24-10-00	Esperanza	En construcción	Yuyo	0,50
18-10-01	Esperanza	En construcción	Yuyo	0,60
10-11-04	Esperanza	2 huevos	Molle	0,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1									6	2	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
7 a 9 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	13 a 14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a tallos de yuyos o de arbustos. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras vegetales o nervaduras de hojas. Internamente raicillas. Liado con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : 5 a 7 cm.

Diámetro interno : de 4 a 5 cm.

Profundidad : de 2 a 3,5 cm

Alto : de 3 a 4 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,25 m.

Nido más alto : 0,60 m.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema con tenues pintas grises, ocres o castaño claro, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 15,4 a 16,6 x 12,3 a 13,8 X= 16,0 x 13,0 (N= 7)

Peso lleno : de 1 a 1,3 X= 1,1 (N= 5)

Peso de las cáscaras : 0,069 a 0,110 X= 0,090 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
422	18-01-79	Santa R. de Calamuchita	16,4 x 12,3		0,069
749	27-10-90	Esperanza	16,0 x 12,7	1,3	0,090
			16,6 x 12,7	1,3	0,110
884	18-10-98	Esperanza	15,4 x 13,8	1,0	0,090
			15,6 x 13,7	1,0	0,092
	10-11-04	Esperanza	15,4 x 13,7	1,0	
			15,4 x 13,8	1,0	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Implumes. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Piel oscura, casi desnuda.

2 día. Plumón pardo oscuro.

4 días. Abre los ojos.

5 días. Vainas de las plumas grises. Ventralmente blanquecinos.

7 días. Comienzan a abrie las láminas de las alas. Láminas de cubiertas alares, ocre canela. Ventralmente amarillento.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	1,1	1,2	-	-	-	-	-	2,0
2	0,4	1,1	1,2	-	-	-	-	-	2,5
3	0,4	1,2	1,3	-	-	-	-	-	3,0
4	0,5	1,3	1,4	-	-	-	-	-	3,5
5	0,5	1,3	1,4-1,5	0,9	-	0,7	-	-	3,9-4,1
6	0,6	1,5	1,6-1,7	1,0	-	0,9	-	-	4,4-4,5
7	0,7	1,6	1,8-1,9	1,2	-	1,1	-	-	5,0

OBSERVACIONES

Es una especie que sufre una gran destrucción de los nidos. Estos son muy frágiles, ubicados a baja altura. Se aleja hasta 20 m. para traer materiales para el nido.

CALANDRITA *Stigmatura budytoides*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-11-79	San Antonio Oeste	2 huevos	Arbusto	0,40
04-10-89	Morteros	2 pichones	Enredadera	1,50

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o de enredaderas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Es construido con fibras vegetales y raicillas.

Medidas :

Diámetro total : 6 cm.

Diámetro interno : de 4 a 5,5 cm.

Profundidad : de 1 a 1,5 cm

Alto : de 1,5 a 2 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color crema, con pintitas grises y castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,2 a 18,6 x 13,1 a 13,2 X= 18,4 x 13,1 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,097 a 0,098 X= 0,097 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
425	03-11-79	San Antonio Oeste	18,2 x 13,2	0,097
			18,6 x 13,1	0,098

MOSQUETA COMÚN *Phylloscartes ventralis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-03	Colón	3 huevos	Arbusto	2,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Colgante de ramas de árboles o arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma redondeada o de bolsita alargada. Boca en la parte lateral superior con pequeño alero.

Construido con fibras vegetales, pajitas, detritos y musgos. Internamente plumas. Liado con telas de arañas.

Medidas :

Alto : 12 cm.
Ancho : 7,5 cm.
Largo : 9 cm.
Profundidad de la cámara : 3,5 cm.
Diámetro de la boca : 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.


Medidas :

De 18,7 a 19,2 x 13 a 13,6 X= 18,9 x 13,3 (N= 3)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
15-11-03	Colón	18,7 x 13,0
		19,0 x 13,5
		19,2 x 13,6

SUIRIRÍ PICO CORTO *Sublegatus modestus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 51

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-10-74	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,30
20-10-74	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,10
10-12-76	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,50
24-12-77	Esperanza	2 pichones	Naranjo	2,20
17-12-78	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,20
22-11-79	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
06-12-79	Esperanza	2 huevos	Arbusto	0,70
25-11-81	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,20
08-12-81	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
02-11-90	Morteros	2 pichones	Arbusto	1,80
15-11-90	Morteros	1 huevo	Arbusto	0,60
15-12-90	Saladillo dulce	1 huevo y 1 pichón	Aromo	0,80
20-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
27-11-93	Esperanza	2 huevos	Tala	1,30
04-12-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	0,80
17-12-93	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,50
23-12-93	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,60
16-12-94	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	1,00
12-11-95	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
28-11-95	Esperanza	Sin postura	Aromo	0,80
24-12-95	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	1,40
23-12-97	La Camila	2 huevos	Chañar	1,40
15-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala	1,00
16-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,10
06-11-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	1,90

14-11-98	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	1,50
14-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
16-12-98	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,70
30-12-98	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	1,30
25-10-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,30
08-11-00	Esperanza	En construcción	Chañar	1,10
14-11-00	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,60
21-12-00	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
10-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,10
19-10-01	Esperanza	1 huevo	Tala	1,20
25-10-01	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,60
30-10-01	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	1,10
11-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,20
01-12-01	Esperanza	2 huevos	Quebracho blanco	1,80
15-12-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,00
02-01-02	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,60
01-11-02	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,00
04-11-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,20
20-12-02	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,20
23-12-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
01-11-03	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,70
24-11-03	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,20
13-11-04	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,60
22-11-04	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	1,70
16-01-06	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,60
20-11-07	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	1,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2									9	21	19

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 10 días	Pone en días corridos	15 a 17 días	14 a 17 días.

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas horizontales o en trifurcaciones de ramas verticales. A baja altura.

Características.

Expuesto, pero difícil de ver. Elaborado. Tiene forma de semiesfera, poco profunda.

Construido con fibras vegetales cortas o raicillas. Recubierto externamente con musgos y líquenes. A veces trozos de cortezas. Internamente líquenes y alguna plumita. Liado con telas de arañas.

Medidas :

Diametro total : de 5 a 7 cm.
Diámetro interno : de 3,5 a 4 cm.
Profundidad : de 1 a 2 cm.
Alto : de 2 a 3 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,60 m.
Nido más alto : 2,70 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	21	Arbusto	3
Quebracho blanco	8	Naranjo	1
Aromo	7	Sombra de toro	1
Algarrobo	5	Cina-cina	1
Tala	4		

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema claro u oscuro o blanquecino, con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, en algunos más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16 a 19 x 12,6 a 13,5 X= 17,2 x 13,2 (N= 10)

Peso lleno : de 1,3 a 1,4 X= 1,35 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,091 a 0,105 X= 0,099 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
441	20-10-74	Esperanza	17,0 x 13,0		0,098
			19,0 x 13,5		0,105
	20-10-74	Esperanza	18,4 x 12,6		
			19,0 x 13,3		
442	22-11-79	Esperanza	18,4 x 13,2		0,091
			18,4 x 13,2		0,095
853	16-12-94	Esperanza	19,0 x 13,5		0,100
922	14-11-00	Esperanza	l8,4 x l3,2		0,100
	13-11-04	Esperanza	16,0 x 13,3	1,3	
			16,0 x 13,0	1,4	

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Pico gris. Comisura blanquecina amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua de color naranja. Piel oscura con plumón crema-blanquecino.

2 días. Plumón compacto, corto, en las zonas ptéridas, color crema o gris blanquecino.

4 días. Ojos cerrados.

5 días. Ojos abiertos. Ventralmente plumas de color crema. Apenas se ven las vainas de la cola.

8 días. Punta de las plumas blanquecinas.

10 días. Comisura blanquecina. Garganta y pecho blanquecinos. Dorsal pardusco con plumón grisáceo. Cañones alares grisáceos con láminas blanquecinas.

12 días. Bien emplumado. Dorsal jaspeado de pardo y gris. Bandas en las plumas de cubierta. Ventral gris blanquecino.

14-17 días. Dejan el nido.

OBSERVACIONES

Los dos sexos construyen.

Demora de 2 a 3 minutos en traer materiales, se alejan hasta 25-30 m.

Amoldan el nido con movimientos de las patas, apoyando el pecho y moviéndose. También con el pico acomodan.

En una oportunidad un nido fue ocupado dos veces.

Los pichones son afectados por larvas de moscas.

Los adultos silban en las proximidades del nido.

A veces los pichones chicos realizan movimientos acompasados de las alas.

Los huevos y los pichones son muy miméticos con el nido.


MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,5
2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,9
3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,3
4	0,5	-	-	0,3	-	0,2	-	-	2,9
5	0,6	-	-	0,5	-	0,4	-	-	3,6
6	0,6	-	-	1,0	-	0,9	-	-	4,2
7	0,7	-	-	1,3	-	1,2	-	-	5,8
8	0,7	-	-	1,6	-	1,3	-	-	6,4
9	0,7	1,7	2,0	1,9	0,7	1,4	0,7	0,9	8,9
10	0,8	1,8	2,0	2,0	0,8	1,5	0,9	1,0	9,5

TACHURÍ SIETECOLORES *Tachuris rubrigastra*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura sobre el agua
16-11-72	Cayastacito	3 huevos	Junco	0,40
01-12-72	Cayastacito	4 huevos	Junco	0,40
10-10-75	Aguará Grande	2 huevos	Junco	0,40
02-01-82	Morteros	3 huevos	Junco	0,40
11-11-86	Teodelina	2 huevos	Junco	0,35
11-11-86	Teodelina	2 huevos	Junco	0,30
21-11-86	Cacique Ariacaiquín	Sin postura	Espadaña	0,30
05-09-87	Llambi Campbell	2 huevos	Junco	0,50
05-09-87	Llambi Campbell	1 huevo	Duraznillo blanco	0,50
29-09-89	Calchaquí	Sin postura	Junco	0,70
02-12-92	Wildermuth	En construcción	Junco	0,50
07-11-94	Isla Verde	En construcción	Junco	0,80
07-11-94	Isla Verde	En construcción	Junco	0,90
25-09-99	Calchaquí	2 huevos	Junco	0,40
25-09-99	Calchaquí	3 pichones	Junco	0,40
31-10-00	Wildermuth	En construcción	Junco	0,40

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								5	2	6	2

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a tallos de Juncos, Espadaña o Duraznillo blanco. En estros y lagunas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Construido con fibras de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 3 a 5 cm.

Diámetro interno : de 3,5 a 5 cm.

Profundidad : de 2,5 a 4,5 cm

Alto : de 7 a 11 cm.

Grosor de la pared : de 2 a 4 mm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color crema o blanquecino.

Medidas y pesos :

De 16,3 a 16,8 x 12 a 12,8 X= 16,5 x 12,4 (N= 6)

Peso de las cáscaras : 0,068 a 0,078 X= 0,072 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
423	16-11-72	Cayastacito	16,3 x 12,4	0,068
			16,4 x 12,4	0,074
			16,8 x 12,8	0,078
424	02-01-82	Morteros	16,3 x 12,4	0,068
			16,5 x 12,5	0,072
			16,7 x 12,7	0,073

PICHONES


La pareja los alimentaba con insectos que capturan sobre los repollitos.

MOSQUETA OJO DORADO *Hemitriccus margaritaceiventer*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 18



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-11-71	Río Leyes	2 huevos	Arbusto	1,30
06-11-80	Isla Garcerosa	1 huevo	Yuyo	1,00
03-12-80	Cayastá	1 huevo	Arbusto	1,20
15-11-82	Cayastá	1 pichón	Arbusto	1,00
11-10-85	Colonia Teresa	1 huevo	Arbusto	2,00
08-11-89	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,00
02-11-90	Morteros	1 huevo	Yuyo	0,50
02-11-90	Morteros	3 huevos	Chilca negra	0,70
02-11-90	Morteros	2 huevos	Yuyo	1,00

18-12-90	Esperanza	2 pichones	Aromo	1,00
23-11-93	Empedrado	En construcción	Arbusto	0,70
06-11-95	Villa Ocampo	2 huevos	Ubajay	2,80
28-11-95	Villa Guillermina	En construcción	Tala	2,70
28-11-95	Villa Guillermina	2 huevos	Tala	2,00
12-10-98	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,10
27-10-99	Rincón Potrero	2 huevos	Aromo	1,50
26-12-01	Esperanza	2 huevos	Sombra de toro	1,60
11-09-02	Esperanza	En construcción	Tala salada	1,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								1	3	11	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
22 a 25 dias	Pone en días alternos	15 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado de tallos de yuyos, enredaderas o de arbustos. A baja altura y mediana altura.

Características.

Expuesto o semiexpuesto. A veces oculto. Elaborado. Tiene forma de saco o bolsita, colgante.

Construido con fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Externamente hojitas y cortezas de árboles. Fibras largas cuelgan por debajo. Internamente vilanos, cerdas y algunas plumitas.

Medidas :

Alto : de 16 a 21 cm.

Ancho : de 6,5 a 7 cm.

Diámetro de la boca : de 2 a 4 cm.

Ubicación de la boca : de 8,5 a 15 cm. de la parte superior.

Largo del alero : 3 cm.

Diámetro de la cámara : de 5 a 10 cm.

Profundidad : de 5 a 7 cm.

Largo total (nido y fibras colgantes : de 21 a 45 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,50 m.

Nido más alto : 2,80 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Arbusto	5	Chilca	1
Yuyo	3	Ubajay	1
Tala salada	2	Sombra de toro	1
Tala	2	Chañar	1
Aromo	2		

HUEVOS

Pone 2, raro 3 huevos.

Ovoidales. De color crema o blanquecinos con pintas castañas, más concentradas hacia el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 17,4 a 18,4 x 12,3 a 13 X= 17,8 x 12,6 (N= 7)

Peso lleno : 1,2 X= 1,2 (N= 1)

Peso de las cáscaras : 0,069 a 0,090 X= 0,074 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
419	24-11-71	Río Leyes	17,4 x 12,5		0,070
			18,4 x 12,8		0,071
	06-11-80	Isla Garcerosa	17,4 x 12,3		0,069
421	03-12-80	Cayastá	17,8 x 12,6		0,071
	11-10-85	Colonia Teresa	17,6 x 12,8		
747	02-11-90	Morteros	17,9 x 12,8	1,2	0,090
	28-11-95	Villa Guillermina	18,4 x 13,0		
			18,0 x 13,0		

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Pico claro. Comisura blanquecina. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Piel rosada. Escaso plumón gris.

2 días. Ojos cerrados. Plumón gris.
5 días. Ojos cerrados. Piel oscura. Plumón en la cabeza y dorsalmente, gris. Aparecen las vainas dorsalmente. Vainas alares grises. Apenas se ven las de la cola. Ventralmente ocráceo-amarillento.
6 días. Abre los ojos, pardos.
13 días. Patas claras. Pico oscuro.
Garganta y pecho blanquecino con estrías grises. La garganta más oscura. Dorsalmente verdoso.
Las láminas de las plumas de las cubiertas alares, orilladas de ocráceo. Plumas de las alas y de la cola, pardas.
Escaso plumón. Grita. Si se lo suelta se escapa.

OBSERVACIONES

Los dos traen materiales que buscan hasta 20 m. del nido. Hacen viajes cada 1 a 3 minutos. Trabajan de 30' a 1 minuto.
Coloca materiales muy chicos en la parte interna y superior de la camara. Acomodando con el pico, patas y cuerpo. Muy confiado.


MOSQUETA DE CABEZA CANELA *Poecilotriccus plumbeiceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	**N**

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-12-03	Rosario de la Frontera	2 huevos	Arbusto	2,10



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
Atado a ramas de arbustos. A baja altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de bolsita colgante. Cerrado con entrada en la parte lateral.
Construido con pajas y tiras de hojas, más anchas externamente. La cámara con fibras más finas.

Medidas :
Alto : 24 cm.
Ancho en la base : 10 cm.
Ancho en la parte superior : 7 cm.
Largo (antero-posterior) : 8 cm.
Profundidad de la cámara : 3 cm
Diámetro de la boca : 3 cm.

HUEVOS
Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas :
De 18,5 a 19 x 12,5 X= 18,7 x 12,5 (N= 2)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
10-12-03	Rosario de la Frontera	18,5 x 12,5
		19,0 x 12,5

PICOCHATO GRANDE *Tolmomyias sulphurescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-01-03	Rosario de la Frontera	2 huevos	Arbusto	3,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a tallos de arbustos o de árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma globular o cónica. Boca en la parte inferior con un túnel de entrada, dirigido hacia abajo.

Es construido con fibras vegetales, más finas y oscuras en el túnel.

Medidas :

Alto : 35 cm.
Diámetro de la boca : 4 cm.
Largo del túnel : 13 cm.
Largo del túnel y la cámara : 18 cm.
Ancho en la base : 10 cm.
Diámetro de la cámara : 5 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color canela con pintas castaño-rojizas y algunas grises.

Medidas :

De 22 a 23,4 x 14 a 14,4 X= 22,7 x 14,2 (N= 2)

NIDADA


Fecha	Localidad	Medidas
10-01-03	Rosario de la Frontera	22,0 x 14,0
		23,4 x 14,4

MOSQUETA ESTRIADA *Myiophobus fasciatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N	N	N

Total de nidos : 70



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-11-71	Villa San José	2 huevos	Árbol	3,50
27-11-71	Villa San José	1 huevo y 1 pichón	Árbol	2,00
27-11-75	Esperanza	2 huevos	Paraíso	1,05
05-11-76	Río Leyes	2 huevos	Árbol	1,70
05-11-76	Río Leyes	En construcción	Árbol	1,70
16-11-76	Esperanza	2 huevos	Tala	1,20
23-10-79	Cayastá	2 huevos	Picanilla	1,00
06-11-81	Esperanza	2 huevos	Tala	1,60
30-11-81	Cayastá	2 huevos	Canelón	1,50
30-11-81	Cayastá	2 huevos	Canelón	2,90
30-11-81	Cayastá	2 huevos	Canelón	1,40
30-11-81	Cayastá	En construcción	Canelón	1,45
30-11-82	Esperanza (*)	2 huevos	Ligustro	1,50
05-11-86	Esperanza	2 huevos	Tala	1,40
06-02-89	Esperanza	2 pichones	Mora blanca	0,80
10-02-89	Esperanza	2 pichones	Tala	0,80
07-11-90	Morteros	En construcción	Chañar	2,00
10-11-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,40
10-11-90	Esperanza	1 huevo	Curupí	1,20
10-11-90	Esperanza	2 huevos	Curupí	1,00
01-12-90	Esperanza	En construcción	Chañar	1,00
29-12-90	Esperanza	2 huevos	Mora blanca	0,80
12-01-91	Grutly	2 huevos	Tala	1,50
12-01-91	Grutly	2 huevos	Tala	1,50
11-11-91	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
23-10-93	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
18-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,20
20-11-93	Esperanza	1 huevo	Tala	1,50
25-11-93	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00
26-11-93	Esperanza	2 huevos	Mora blanca	1,00
04-12-93	Esperanza	2 huevos	Tala	1,40
04-12-93	Esperanza	En construcción	Tala	0,90
10-12-93	Esperanza	En construcción	Naranjillo	1,00
18-12-93	Esperanza	En construcción	Ombú	1,40
25-01-94	Esperanza	2 huevos	Tala	1,10
10-11-94	Esperanza	2 huevos	Tala	1,10
01-12-94	Esperanza	2 huevos	Tala	1,20
27-12-94	Esperanza	3 huevos	Tala	1,55
05-01-95	Esperanza	1 huevo	Tala	1,80
12-11-95	Esperanza	2 huevos	Aromo	0,50
12-11-95	Esperanza	Sin postura	Tala	0,50
27-11-95	Villa Ocampo	Sin postura	Ubajay	1,30
27-11-95	Villa Ocampo (*)	2 huevos	Timbó blanco	2,30
09-02-96	Colastiné	2 pichones	Naranjillo	1,60
08-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	2,00
15-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,20
25-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,60
26-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,50
25-11-98	Esperanza	1 huevo	Duraznillo	0,50
01-12-98	Esperanza	2 pichones	Tala	1,20
05-12-98	Esperanza	Sin postura	Tala del indio	1,60
05-12-98	Esperanza	Sin postura	Tala	1,50

05-12-98	Esperanza	Sin postura	Tala	1,00
03-01-99	Esperanza	Sin postura	Tala	1,00
07-01-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,40
09-01-99	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
01-11-01	Esperanza	En construcción	Tala del indio	1,00
16-12-01	Esperanza	Sin postura	Mora blanca	1,20
16-12-01	Esperanza	Sin postura	Huaco	1,00
19-12-01	Esperanza	2 huevos	Tala	1,20
31-12-01	Esperanza	2 huevos	Mora blanca	1,00
07-12-02	Esperanza	Sin postura	Tala	0,80
07-01-03	Esperanza	1 huevo	Tala	1,40
03-11-03	Esperanza	2 huevos	Tala	1,30
03-11-03	Esperanza	2 huevos	Tala	1,50
13-12-03	Esperanza	En construcción	Tala	1,50
17-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala	0,80
02-02-04	Esperanza	2 huevos	Tala	1,30
05-01-07	Esperanza	2 huevos	Tala	1,00
19-01-10	Ascochinga	2 huevos	Tala	1,20

(*). Nidos asentados.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10	4								6	31	19

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
9 a 10 días	Pone en días alternos	15 a 16 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado ramas de árboles o de arbustos. En lugares sombríos, a veces semioculto por hojas. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita, generalmente colgante. A veces asentada.

Construido con fibras vegetales, raicillas o fibras finas en la parte interna. Liadas con telas de arañas.

Externamnte pueden quedar colgando fibras largas u hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 7 cm.
Diámetro interno : de 3 a 5 cm.
Profundidad : de 3 a 4 cm
Alto : de 5 a 7 cm.
Grosor de la pared : de 0,5 a 1 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,50 m.
Nido más alto : 3,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Tala	37	Huaco	1
Chañar	5	Ombú	1
Mora blanca	5	Ligustro	1

Canelón	4	Picanilla	1
Árbol (no determinado)	4	Paraíso	1
Curupí	2	Timbó blanco	1
Naranjillo	2	Aromo	1
Tala del indio	2	Ubajay	1
Duraznillo	1		

HUEVOS

Pone 2, raro 3 huevos.

Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas y algunas grises, formando una corona en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,3 a 18,7 x 11,8 a 13,9 X= 17,6 x 12,9 (N= 10)

Peso de las cáscaras : 0,070 a 0,095 X= 0,085 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
415	27-11-71	Villa San José	18,4 x 13,5		0,093
			18,7 x 13,9		0,095
	27-11-75	Esperanza	17,0 x 12,5		
			17,5 x 13,0		
416	16-11-76	Esperanza	16,3 x 11,8		0,070
			17,0 x 12,3		0,072
417	23-10-79	Cayastá	17,0 x 13,0		0,083
			17,8 x 13,9		0,087
418	06-11-81	Esperanza	18,1 x 12,8		0,080
			18,2 x 13,2		0,085

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel clara. Pico y comisura, amarillos. Cavidad bucal amarillenta-naranja. Plumón fino gris.

3 días. Apenas se ven las vainas en las alas.

5 días. Ojos entreabiertos. Cañones alares, grises.

6 días. Ojos abiertos. Apenas se ven las láminas. Aparecen las vainas de la cola. Vainas del cuerpo de 3-4 mm. Vainas ventrales blanquecinas.

8 días. Lados del pecho blanquecino. Vainas de las plumas de la cola muy chicos, con punta ocrácea. Rabadilla con plumas canelas. Alas con láminas chicas, ocráceas.

9 días. Largo total de la cola : 0,7 cm. Emplumado. Grita.

11 días. Se notan las bandas ocráceas en las plumas de cubierta y en las secundarias. Bien emplumado.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas						
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias	
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	0,4	1,0	1,3	-	-	-	-
4	0,4	1,2	1,5	-	-	-	-
5	0,5	1,3	1,6	-	-	-	-
6	0,5	1,4	1,8	1,0	-	0,7	-
7	0,6	1,5	2,0	1,2	-	0,9	-
8	0,6	1,7	2,2	1,3	-	1,1	-
9	0,7	1,8	2,4	1,4	0,5	1,2	0,5


OBSERVACIONES

La pareja alimenta a los pichones.
Puede ocupa el mismo nido más de una vez en la misma temporada.

BIRRO COMÚN *Hirundinea ferruginea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-11-78	Cachi	2 pichones	Tirante	3,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS


NIDO

Ubicación.
Asentado en huecos o en construcciones. A baja y mediana altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de semi-esfera.
Construido con pajitas y lanas. Internamente pelos.
Medidas :
Diámetro total : 9 cm.
Diámetro interno : 7 cm.
Profundidad : 2 cm
Alto : 3 cm.

MOSQUETA PARDA *Lathrotriccus euleri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-12-74	El Rey	1 huevo	Árbol (*)	1,00
15-11-03	Colón	3 huevos	Árbol	0,60

(*). Localizado por Gunnar Höy

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En huecos en árboles o en barrancas. A baja altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita.
Construido con fibras vegetales, raicillas. Recubierto de musgos verdes.
Medidas :
Diámetro total : 7 cm.
Diámetro interno : 4,5 cm.
Profundidad : 2,5 cm
Alto : 3,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color crema amarillento con pintas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :


De 17,5 a 19,5 x 13,4 a 13,5 X= 17,9 x 13,5 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,094 X= 0,094 (N= 1)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
701	08-12-74	El Rey	19,5 x 13,5	0,094
	15-11-03	Colón	17,4 x 13,5	
			17,5 x 13,4	
			17,5 x 13,5	

VIUDITA DE RÍO *Sayornis nigricans*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-78	Quebrada de Escoipe	2 pichones	Piedra en gruta	3,50
14-12-97	Rosario de la Frontera	2 huevos	Hueco en roca	2,30
14-12-97	Rosario de la Frontera	3 huevos	Hueco en roca	1,70
04-12-97	El Alamito	Sin postura	Repisa rocosa	2,20

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Apoyado en repisas, piedras o sobre la base rocosa de huecos. Sobre arroyos o ríos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de semiesfera.

Construido con barro y pajitas. Internamente pelos o plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 12 cm.

Diámetro interno : de 6 a 7 cm.

Profundidad : 2 cm

Alto : de 3,5 a 9 cm.

Grosor de la pared : 3 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19,7 a 20,1 x 15,1 a 15,3 X= 19,9 x 15,2 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,140 X= 0,140 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
874	14-12-97	Rosario de la Frontera	19,7 x 15,1	0,140
			20,1 x 15,3	0,140

CHURRINCHE *Pyrocephalus rubinus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos : 38

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-10-72	Miguel Escalada	3 huevos	Chañar	1,55
08-11-76	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,50
24-10-78	Cayastacito	3 huevos	Algarrobo	3,00
23-10-79	Cayastá	3 huevos	Seibo	2,50
05-11-88	Llambi Campbell	En construcción	Chañar	2,10
04-10-89	Morteros	3 huevos	Paraíso	3,80
02-11-90	Morteros	3 huevos	Paraíso	4,00
19-12-90	Esperanza	1 huevo	Cina-cina	2,50
19-12-90	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	3,80
28-12-90	Monte Vera	3 huevos	Aromo	2,20
28-12-90	Candioti	2 pichones	Chañar	3,10
29-12-91	Puerto Piracuacito	1 huevo	Árbol	5,00
12-12-92	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	1,40
22-10-93	Esperanza	2 pichones	Chañar	5,00
01-11-94	Esperanza	3 pichones	Chañar	3,50
01-11-94	Esperanza	2 pichones	Algarrobo	2,40
01-12-94	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
16-12-94	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
09-11-95	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	2,50
12-11-95	Rincón de Ávila	2 huevos	Cina-cina	2,40
12-11-95	Rincón de Ávila	2 pichones	Algarrobo	2,30
02-01-96	Esperanza	2 pichones	Curupí	3,30
03-01-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
22-09-98	Esperanza	En construcción	Aromo	1,90
26-09-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	3,00
01-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,90
25-10-98	Esperanza	2 pichones	Acacia negra	2,10
09-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,20
09-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,10
09-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	2,20
01-12-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,80
17-10-99	Esperanza	En construcción	Seibo	3,70
14-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	2,40
14-10-00	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,30
08-11-01	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	2,30
06-11-02	Esperanza	En construcción	Aromo	1,50
21-10-04	Esperanza	3 huevos	Curupí	4,80
15-11-12	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,30

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2								2	11	14	9

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 7 días	Pone día por medio	12 a 13 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Construido con fibras vegetales, palitos, líquenes, musgos, ootecas y telas de arañas. Internamente plumas, cerdas, pelos.

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estrucura abierta, semiesférica.

Medidas :

Diámetro total : de 3,5 a 6 cm.
Diámetro interno : de 4 a 5 cm.
Profundidad : de 1,5 a 2,5 cm
Alto : de 3 a 5 cm.
Grosor de la pared : de 0,5 a 1 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,50 m.
Nido más alto : 5,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	16	Seibo	2
Cina-cina	5	Paraíso	2
Algarrobo	5	Acacia negra	1
Aromo	3	Árbol	1
Curupí	3		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema o blanquecino, con pintas y manchitas castañas, rojizas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16 a 18,6 x 12,2 a 13,2 X= 17,2 x 12,9 (N= 13)

Peso de las cáscaras : 0,070 a 0,100 X= 0,085 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	24-10-72	Miguel Escalada	16,0 x 13,0	
			16,5 x 13,0	
			17,0 x 13,0	
390	08-11-76	Esperanza	18,5 x 13,2	0,094
			18,6 x 12,9	0,100
			18,6 x 12,8	0,100
391	24-10-78	Cayastacito	16,5 x 13,2	0,070
			17,4 x 13,0	0,078
			17,5 x 13,2	0,084
392	23-10-79	Cayastá	16,4 x 12,7	0,078
			16,7 x 13,2	0,080
			16,9 x 12,4	0,082
840	29-12-91	Puerto Piracuacito	16,0 x 12,2	0,085

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarillenta. Cavidad bucal y paladar, naranja. Plumón gris amarillento o crema.

2 días. Piel negra. Ventralmente verdosa.

5 días. Ojos abiertos. Plumón crema en las zonas ptéridas.
6 días. Se notan las vainas de las plumas alares.
7 días. Se notan las vainas de la cola.
8 días. Plumas del dorso con las láminas ocráceas. Ventralmente blanquecino.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,3	0,3	0,6	-	-	-	-	-	1,0-1,2
2	0,3-0,4	0,4	0,7	-	-	-	-	-	1,7-1,8
3	0,4	0,5	0,7	-	-	-	-	-	2,5-2,8
4	0,5	0,7	0,8	-	-	-	-	-	3,3-4,0
5	0,4-0,5	0,9	0,9	-	-	-	-	-	3,7-5,1
6	0,5	1,0	1,2	0,3	-	0,2	-	-	5,7-6,5
7	0,6	1,1	1,4	0,6	-	0,4	-	-	6,2-7,3
8	0,5-0,6	1,3	1,7	0,7-1,0	-	0,6-0,9	-	0,2	8,1-9,0
9	0,7	1,4	1,8	1,3-1,5	0,3	1,2-1,3	0,3	0,4	9,1-9,6
10	0,7	1,5	2,0	1,7-1,8	0,4-0,5	1,4	0,4-0,5	0,6-0,9	10,2-10,6

OBSERVACIONES

La hembra construye e incuba.

SOBREPUESTO COMÚN *Lessonia rufa*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
08-11-79	Paso Gregores	2 huevos	Suelo
09-11-79	La Esperanza	3 huevos	Suelo
21-11-98	Perito Moreno	3 pichones	Suelo



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre o en la base de pastos o yuyos grandes.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de fibras vegetales. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 12 cm.
Diámetro interno : de 4,5 a 6 cm.
Profundidad : de 3 a 3,5 cm.
Alto : de 5 a 6 cm.
Grosor de la pared : 3 a 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema con pintas castaño-rojizas, en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18 a 19,7 x 13,9 a 14,5 X= 18,8 x 14,2 (N= 5)

Peso de las cáscaras : 0,102 a 0,123 X= 0,109 (N= 5)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
383	08-11-79	Paso Gregores	18,0 x 13,9	0,102
			18,6 x 14,0	0,105
	09-11-79	La Esperanza	18,9 x 14,5	0,105
			19,2 x 14,4	0,119
			19,7 x 14,3	0,123


VIUDITA PLOMIZA *Knipolegus signatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-12-99	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Arbusto	1,50
18-12-99	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Arbusto	1,70
18-12-99	Cuesta del Clavillo	1 pichón	Arbusto	2,30
18-12-99	Cuesta del Clavillo	2 pichones	Arbusto	1,60



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado y adherido a ramas de árboles o arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera hueca o taza, de base amplia.

Es construido con musgos y líquenes. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 13 a 14 cm.

Diámetro interno : de 4 a 6 cm.

Profundidad : de 3 a 4 cm.

Alto : de 7,5 a 12 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos. Ovoidales. De color blanco con manchitas castañas en el polo mayor y algunas en el resto de la superficie.

Medidas y pesos :

De 20 a 21,6 x 16 a 16,4 X= 21,2 x 16,2 (N= 4)

Peso de la cáscara : 0,186 a 0,196 X= 0,190 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
910	15-12-99	Cuesta del Clavillo	21,6 x 16,4	0,190
			22,0 x 16,4	0,190
911	18-12-99	Cuesta del Clavillo	20,0 x 16,2	0,186
			20,4 x 16,0	0,196

VIUDITA COMÚN *Knipolegus aterrimus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
11-12-03	Rosario de la Frontera	3 huevos	Mata de yuyos	0,70

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Entre matas de yuyos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera hueca o taza.

Es construido con fibras vegetales, raicillas y unas hojas. Internamente fibras finas y unas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 12 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas castaño-pardusco.

Medidas :

De 22,7 a 23,5 x 17 X= 23 x 17 (N= 3)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
11-12-03	Rosario de la Frontera	22,7 x 17,0
		23,0 x 17,0
		23,5 x 17,0

PICO DE PLATA *Hymenops perspicillata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-10-71	Cayastacito	3 huevos	Paja brava	0,10
11-11-78	Cayastá	2 huevos	Paja brava	0,07
20-10-83	Miguel Escalada	2 huevos	Mata de yuyos	0,10
18-10-86	Llambi Campbell	2 pichones	Mata de yuyos	0,10
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	2 huevos	Paja brava	0,35

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En la base o entre matas de yuyos o plantas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas, fibras vegetales, raicillas. Internamente cerdas, pelos y/o plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 15 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 2,5 a 5 cm.
Alto : de 5 a 10 cm.
Grosor de la pared : 1,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con puntos castaños y grisáceos en el polo mayor. Algunos con puntos negros.

Medidas y pesos :

De 19,8 a 23,7 x 15,5 a 16,7 X= 21,4 x 16, (N= 10)
Peso lleno : de 2,394 a 2,800 X= 2,617 (N= 4)
Peso de las cáscaras : 0,151 a 0,199 X= 0,182 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
385	09-10-71	Cayastacito	21,0 x 16,7		0,178
			21,4 x 16,7		0,195
			23,7 x 16,4		0,199
386	11-11-78	Cayastá	22,4 x 16,4		0,190
			22,7 x 16,3		0,190
618	20-10-83	Miguel Escalada	19,8 x 15,8	2,394	0,151
			20,8 x 16,1	2,763	0,156
643	18-10-86	Llambi Campbell	20,0 x 15,5		0,190
772	11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	21,0 x 15,8	2,500	0,190
			22,0 x 16,0	2,800	0,190

OBSERVACIONES

Algunos nidos tienen mucho material vegetal oscuro, son raices de Jazmín de Córdoba**.**
El 12-02-97, en Fortín Chicas, se observó un ejemplar con las alas blancas y parte de la cola (blanca y negra)

SUIRIRÍ AMARILLO *Satrapa icterophrys*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N



Total de nidos : 105

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-70	Río Leyes	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,50
30-09-72	Marcelino Escalada	3 huevos	Chañar	2,00
26-08-79	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,50
26-08-79	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,20
29-08-79	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70

29-08-79	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
29-08-79	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
29-08-79	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
04-10-79	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
15-12-79	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
15-12-79	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,30
24-09-82	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
17-10-86	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,70
18-10-86	Llambi Campbell	3 huevos	Chañar	2,30
28-10-86	Manucho	2 pichones	Chañar	2,00
03-10-86	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
17-09-87	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,80
08-09-89	Esperanza	En construcción	Paraíso	3,00
14-09-89	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,80
29-09-89	Calchaquí	3 huevos	Tala	2,20
29-09-89	Calchaquí	3 huevos	Chañar	3,10
27-10-89	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,10
23-11-89	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
28-11-89	Esperanza	No observado	Tala	2,40
09-10-90	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
27-10-90	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
29-10-90	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,90
02-11-90	Morteros	1 huevo	Chañar	4,50
06-11-90	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,00
06-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
01-12-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
01-12-90	Esperanza	2 pichones	Cina-cina	1,90
02-12-90	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
07-12-90	Esperanza	No observado	Curupí	3,20
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	No observado	Aromo	4,00
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	2 huevos	Seibo	4,20
25-12-90	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
28-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	2,00
28-12-90	Candioti	2 huevos	Chañar	4,00
28-12-90	Candioti	2 huevos	Chañar	4,20
26-10-91	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
08-11-91	Esperanza	1 pichón	Chañar	1,80
11-11-91	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Curupí	1,80
18-11-91	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,10
26-11-91	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
16-10-92	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
16-10-93	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,00
25-10-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
27-10-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
10-11-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,00
19-11-93	Esperanza	1 huevo	Chañar	4,50
19-11-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	6,50
04-12-93	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,40
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,50
18-09-94	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
14-11-95	Esperanza	3 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tuna	1,50

01-09-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,40
04-09-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,90
11-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,50
22-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,40
22-09-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
29-09-98	Esperanza	En construcción	Curupí	2,70
03-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,70
03-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
08-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
12-10-98	Esperanza	3 huevos	Tala	1,60
13-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,80
15-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,50
19-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
27-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
07-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,50
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
10-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
14-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
25-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
01-12-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
05-12-99	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
16-12-99	Esperanza	2 huevos	Arbusto	1,80
28-09-00	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
16-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	1,30
28-10-00	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
28-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
03-11-01	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,10
08-11-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
03-12-01	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
03-12-01	Esperanza	1 huevo	Curupí	2,90
30-12-01	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Chañar	2,20
07-01-02	El Alamito	2 huevos	Arbusto	1,70
13-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
26-10-02	Santa Fe	3 huevos	Seibo	3,30
26-10-02	Santa Fe	3 huevos	Seibo	3,60
12-10-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,10
12-10-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,50
22-11-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,90
22-09-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,50
06-10-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
25-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,50
17-12-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
11-10-05	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
20-10-06	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,70
05-10-12	Villa Roda	Construcción	Curupí	3,50
10-11-12	Villa Roda	Construcción	Curupí	3,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1							6	16	37	22	23

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 12 días	Pone en días corridos	16 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera hueca. Construido con tallos de yuyos, pajas. Algunos palitos finos en la base. Internamente raicillas, nervaduras de hojas y plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 13 cm.
Diámetro interno : de 6 a 8 cm.
Profundidad : de 3 a 4 cm.
Alto : de 6 a 8 cm.

Altura.

Nido más bajo a 1,00 m.
Nido más alto a 5,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	81	Arbusto	2
Curupí	8	Paraíso	1
Tala	4	Algarrobo	1
Seibo	3	Tuna	1
Aromo	3	Cina-cina	1

HUEVOS

Pone 3, raro 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,5 a 22,8 x 13,5 a 15,9 X= 20,2 x 14,7 (N= 23)
Peso lleno : de 1,7 a 2,2 X= 2,02 (N= 11)
Peso de la cáscara : 0,120 a 0,141 X= 0,128 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
393	12-10-70	Río Leyes	20,7 x 14,8		0,127
			21,4 x 14,6		0,132
			22,8 x 15,0		0,141
394	30-09-72	Marcelino Escalada	18,5 x 15,0		0,120
			20,5 x 15,3		0,129
			21,0 x 15,4		0,131
395	29-08-79	Esperanza	19,5 x 15,2		0,124
			19,6 x 15,3		0,124
			20,3 x 15,0		0,130
678	29-09-89	Calchaquí	20,0 x 15,5		0,130
			20,5 x 15,9		0,132
			21,0 x 15,4		0,135
	22-09-04	Esperanza	21,0 x 14,2	2,1	
			21,2 x 15,0	2,2	
			20,3 x 13,5	2,2	
	06-10-04	Esperanza	19,5 x 14,5	2,2	
			20,0 x 14,5	2,2	

25-10-04	Esperanza	20,0 x 14,0	1,7
		20,0 x 14,0	1,7
		20,2 x 14,2	1,9
17-12-04	Esperanza	20,1 x 14,3	2,2
		20,4 x 14,3	2,2
		21,0 x 15,0	2,1

PICHONES

Descripción. Nace con los ojos cerrados. Pico color natural. Piel dorsal ligaremente oscura. Ventralmente verdosa. Comisura amarilla. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas. Patas y cloaca, verdosas. Plumón gris-amarillento.

1 día. Piel dorsal ligaremente oscura. Ventralmente verdosa.
4 días. Ojos abiertos. Láminas finas de las plumas de cubierta (alares), amarillas. Comisura y lados del pecho, amarillos. Plumón gris. Plumas de alrededor de la cloaca y subcaudales, amarillas. Corona y dorso con plumitas gris oscuro.
8 días. Pico y patas, grises. Comisura amarillenta. Cejas amarillas. Ventral amarillo. Alas pardas con dos bandas amarillentas. Cola corta con punta ocrácea. El resto del plumaje es del color del adulto.
l4 días. Pico negro. Comisura amarilla. Cavidad bucal y paladar, naranjas. Cejas y ventralmente amarillos. Dorsalmente verdoso. Alas y cola pardas. Cubiertas y remeras internas marginadas de blanquecino.

OBSERVACIONES

Amolda el interior del nido con el cuerpo y con movimientos de las patas.
Algunos pichones tienen ectoparásitos (piojillos)

DORMILONA GRIS *Muscisaxicola rufivertex*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-11-90	Pampa de Achala	2 pichones	En repisa rocosa	12,00


REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En grutas o repisas rocosas. A mediana altura y altos.
Características.
Expuesto. Elaborado. Semiesfera de pajas, raicillas y líquenes. Internamente pelos y plumas.
Medidas :
Diámetro total : 12 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 3 cm
Alto : 7 cm.

GAUCHO SERRANO *Agriornis montanus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-12-77	Valle Encantado	No observado	Saliente rocosa	4,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO


Ubicación.

En salientes rocosas, grietas o entre piedras. A mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Taza grande de palitos finos en la base. Pajitas y lanas en la interna.

DIUCÓN *Xolmis pyrope*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-11-89	Aº Gutierrez	1 huevo	Machaí (1)	0,90
05-11-90	San Carlos de Bariloche	2 huevos	Retama	2,10

(1). Nido localizado por Anibal E. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura abierta, semiesférica, grande.

Base de palitos con espinas, musgos y líquenes. Internamente pelos y lanas.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 18 cm.

Diámetro interno : de 8 a 9 cm.

Profundidad : de 3 a 5 cm

Alto : de 7,5 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con espaciadas pintas castañas.

Medidas y pesos :

De 25,9 a 26,3 x 19 a 19,4 X= 26,1 x 19,2 (N= 3)


Peso lleno : 4,4 a 4,6 X= 4,5 (N= 2)

Peso de la cáscara : 0,350 a 0,366 X= 0,360 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
742	26-11-89	Aº Gutierrez	26,3 x 19,3		0,350
753	05-11-90	San Carlos de Bariloche	25,9 x 19,0	4,4	0,364
			26,0 x 19,4	4,6	0,366

MONJITA GRIS *Xolmis cinereus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
11-12-79	Villa Elisa	2 huevos	Paraíso (en hueco grande)	2,50
15-10-03	Roldán	1 huevo	Pino (*Pinus elliottii*)	2,00
24-11-03	Roldán	3 huevos	Álamo plateado (*Populus alba*)	2,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles o en huecos grandes en árboles. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura abierta, semiesférica, grande, con forma de taza.

Construido con tallos de yuyos, raices y pajas, en la base, bien acolchado. Internamente raicillas, plumas y algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 13 a 22 cm.

Diámetro interno : de 8 a 9 cm.

Profundidad : de 4 a 5 cm

Alto : de 8 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas marrón rojizas, en mayor cantidad hacia el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 26 a 27,8 x 20 a 20,7 X= 26,6 x 20,1 (N= 8)

Peso lleno : 4,830 a 5,160 X= 4,995 (N= 2)

Peso de la cáscara : 0,278 a 0,365 X= 0,326 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
696	11-11-69	Pronunciamiento	27,1 x 20,2		0,363
			27,8 x 20,1		0,365
598	11-12-79	Villa Elisa	26,0 x 20,7	4,830	0,278
			26,1 x 20,5	5,160	0,300
	15-10-03	Roldán	26,2 x 20,2		
	24-11-03	Roldán	26,0 x 20,0		
			26,3 x 20,1		
			26,5 x 20,0		

MONJITA BLANCA *Xolmis irupero*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N



Total de nidos : 27

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-70	Río Leyes	2 huevos y 1 pichón	En nido de *Furmarius rufus*	3,00
31-10-71	Aguará Grande	2 huevos y 2 de *M. bonariensis*	En nido de *Furmarius rufus*	3,40
07-12-71	Campo Andino	4 huevos y 1 de *M. bonariensis*	En nido de *Furmarius rufus*	4,50
05-11-72	La Camila	4 huevos y 1 de *M. bonariensis*	En nido de *Furmarius rufus*	3,30
14-10-78	Esperanza	3 pichones	En nido de *Furmarius rufus*	1,50
15-10-81	San Javier	3 pichones	Hueco en poste	1,00
22-10-81	San Javier	3 huevos	En nido de *Furmarius rufus*	3,20
24-10-81	Esperanza	3 huevos	En nido de *Anumbius annumbi*	2,70
29-10-81	San Javier	5 huevos	Hueco en poste	1,00
13-10-83	La Brava	2 huevos	En nido de *Furmarius rufus*	3,10
26-09-89	Las Claritas	3 pichones	Hueco en tronco	0,60
20-09-94	Monigotes	3 huevos	En nido de *Furmarius rufus*	1,40
10-10-95	Rincón de Ávila	3 huevos	Hueco en Algarrobo	3,50
25-10-95	Rincón de Ávila	2 pichones	En nido de *Pseidoseisura lophotes*	3,50
27-11-95	Villa Ocampo	3 pichones	En nido de *Coryphistera alaudina*	3,90
29-08-96	Calchaquí	2 huevos	Hueco en Algarrobo	1,10
22-08-98	Calchaquí	En construcción	En nido de *Colaptes sp*.	1,60
26-09-98	Esperanza	No observado	En nido de *Furmarius rufus*	4,40
11-11-98	Esperanza	3 huevos	En nido de *Colaptes sp*.	1,00
20-10-99	Rincón de Ávila	3 huevos	En nido de *Colaptes sp*.	3,70
20-10-99	Rincón de Ávila	3 huevos	En nido de *Colaptes sp*.	2,80
26-08-00	Esperanza	En construcción	En caja-nido	1,70
19-10-00	Esperanza	3 huevos	En caja-nido	1,50
06-09-01	Esperanza	No observado	En nido de *Colaptes melanochloros*	2,80
26-11-01	Esperanza	3 pichones	En nido de *Colaptes melanochloros*	2,80
12-09-02	Esperanza	3 huevos	En caja-nido	1,60
23-09-03	Esperanza	1 huevo	En caja-nido	1,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							3	6	13	4	1

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
13 a 25 días	Pone en días corridos	16 días	17 a 18 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en troncos, ramas, postes y en nidos semidestruídos o abandonados de *Furnarius rufus, Anumbius annumbi, Pseiduseisura lophotes, Coryphistera alaudina*, *Colaptes campestris*, *Colaptes melanochloros*. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera de palitos en la base, cerdas, lanas ,pelos y muchas plumas en la interna.

Medidas :

Diámetro total : 6,5 cm.
Diámetro interno : de 3 a 6 cm.
Profundidad : de 3 a 6 cm
Alto : de 4 a 7 cm.

Altura.

Nido más bajo a 0,60 m.
Nido más alto a 4,50 m.

Ubicación y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
En nido de *Furmarius rufus*	9	En hueco en poste de alambrado	2
En caja-nido	4	En nido de *Pseidoseisura lophotes*	1
En nido de *Colaptes sp.*	4	En nido de *Anumbius annumbi*	1
En nido de *Colaptes melanochloros*	2	En nido de *Coryphistera alaudina*	1
Hueco en Algarrobo	2	En hueco en tronco	1

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color crema con escasas pintas castañas.

Medidas y pesos :

De 21,6 a 24,9 x 16 a 18 X= 23,3 x 16,9 (N= 18)
Peso lleno : 3,600 a 3,620 X= 3,61(N= 2)
Peso de la cáscara : 0,167 a 0,262 X= 0,195 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
380	31-10-71	Aguará	25,7 x 17,0		0,232
			26,1 x 17,4		0,262
	22-10-81	San Javier	21,6 x 18,0		
			21,8 x 16,8		
			21,9 x 17,6		
381	24-10-81	Esperanza	23,6 x 15,9		0,167
			24,2 x 16,0		0,178
			24,9 x 16,5		0,184
382	29-10-81	San Javier	22,8 x 16,8		0,184
			22,8 x 16,9		0,185
			23,4 x 16,8		0,186
			23,6 x 16,7		0,187
			23,6 x 17,0		0,193
	13-10-83	La Brava	23,9 x 16,5	3,620	
			24,8 x 16,9	3,600	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Pico color natural. Comisura blanco-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas. Plumón sedoso, pardo en la cabeza, gris en el resto del cuerpo.

4 días. Ojos cerrados.

6 días. Ojos abiertos, marrones. Vainas de las plumas ventrales, dorsales y secundarias, blancos. Vainas de las primarias grises.

9 días. Dorsal y ventralmente, blanco. Láminas de las primarias y punta de la cola, negro.

11 días. Pico gris. Plumas grises (tipo filoplumas) que sobresalen sobre las otras plumas. Dorsal y ventralmente, blancas. Alas y cola con plumas negras.
13 días. Plumaje de adulto. Escaso plumón gris en la cabeza.
Alimentación. Los dos padres alimentan a los pichones, con insectos.

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Luego de abandonar el nido el grupo familiar continúa unido unos 10 días. Les llevan mariposas.
Capturan en vuelo **Mosquitos**.

BIRRO GRANDE *Myiotheretes striaticollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
16-12-99	Río Potrero y ruta 48	En construcción	Entre rocas	25


MONJITA CHOCOLATE *Neoxolmis rufiventris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
07-11-79	Puerto Deseado	2 huevos y 1 pichón	Suelo



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
En el suelo, al reparo de yuyos altos.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita.
Construido con fibras vegetales finas, tallos de yuyos.
Internmente plumas.
Medidas :
Diámetro total : 10 cm.
Profundidad : 5 cm.

HUEVOS
Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color crema con pocas manchas marrones y grises en el polo mayor.
Medidas y pesos :
De 30,8 a 31 x 22,8 a 23 X= 30,9 x 22,9
(N= 2)
Peso de la cáscara : 0,441 a 0,448 X= 0,445
(N= 2)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
379	07-11-79	Puerto Deseado	30,8 x 23,0	0,441
			31,0 x 22,8	0,448

VIUDITA BLANCA *Fluvicola albiventer*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N	N	N

Total de nidos : 172



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-71	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	2,00
15-12-71	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina- cina	1,50
15-12-71	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,70
15-12-71	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,80
15-12-71	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,70
13-12-77.	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	2,20
07-11-81	San Javier	3 huevos	Aromo	2,00
07-11-81	San Javier	3 huevos	Aromo	2,30
18-10-86	Llambi Campbell	2 huevos	Chañar	2,20
18-10-86	Llambi Campbell	1 huevo	Chañar	2,50
29-10-86	Manucho	3 huevos	Curupí	1,20
03-01-87	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,50 .
03-01-87	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,00 .
03-01-87	Esperanza	Sin postura	Curupí	1,30 .
03-01-87	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,30 .
23-01-88	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,70
23-01-88	Esperanza	2 huevos	Cina-cina	1,60
04-12-88	Cayastá	3 huevos.	Aromo	2,50
11-01-89	Esperanza	No observado	Aromo	2,50
11-01-89	Esperanza	No observado	Aromo	2,50
08-11-89	Golondrina	En construcción	Arbusto	2,20
08-11-89	Golondrina	En construcción	Arbusto	2,40
08-11-89	Golondrina	En construcción	Arbusto	2,00
22-12-89	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,50
22-12-89	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chilca negra	1,20
22-12-89	Esperanza	No observado	Chilca negra	2,10
22-12-89	Esperanza	1 de *Molothrus bonariensis*	Chilca negra	1,30
22-12-89	Esperanza	En construcción	Chilca negra	2,30
22-12-89	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	1,00
22-12-89	Esperanza	3 huevos	Aromo	0,80
22-12-89	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,30
22-12-89	Esperanza	En construcción	Carda	0,60
22-12-89	Esperanza	3 huevos	Tala	0,55
22-12-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,50
29-12-89	Esperanza	En construcción	Cardo	1,00
29-12-89	Esperanza	En construcción	Cardo	1,20
03-01-90	Esperanza	En construcción	Cina-cina	2,30
03-01-90	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Duraznillo blanco	2,10
30-11-90	Esperanza.	En construcción	Tala	2,80

01-12-90	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	2,20
01-12-90	Esperanza	3 huevos	Curupí	3,10
01-12-90	Esperanza	No observado	Duraznillo blanco	1,30
01-12-90	Esperanza	No observado	Aromo	1,30
01-12-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
01-12-90	Esperanza	En construcción	Chilca	2,30
04-12-90	Río Salado y ruta 4	No observado	Eucaliptus	4,00
04-12-90	Río Salado y ruta 4	En construcción	Eucaliptus	1,50
04-12-90.	Emilia	1 huevo	Chilca negra	1,50
04-12-90.	Emilia	1 huevo	Chilca negra	1,50
05-12-90	Esperanza	En construcción	Chilca negra	1,70
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	2 huevos	Algarrobo	2,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	En construcción	Tala	1,50
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	3 huevos	Tala	2,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	1 pichón	Tala	2,50
11-12-90	Río Leyes	3 huevos	Aromo	2,10
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	En construcción	Aromo	1,20
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,50
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	3 huevos	Aromo	1,70
13-12-90	Empalme San Carlos	1 huevo	Chilca negra	1,30
13-12-90	Empalme San Carlos	1 huevo	Chilca negra	1,60
13-12-90	Empalme San Carlos	No observado	Chilca negra	1,60
13-12-90	Empalme San Carlos	1 huevo	Duraznillo blanco	1,20
14-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	2,10
14-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	1,80
14-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	1,90
14-12-90	Monte Vera	2 pichones	Aromo	1,80
15-12-90	Laguna Paiva	En construcción	Aromo	2,00
15-12-90	Saladillo Dulce	En construcción	Aromo	0,40
15-12-90	Saladillo Dulce	En construcción	Aromo	0,90
15-12-90	Saladillo Dulce	1 huevo	Carda	1,00
18-12-90	Esperanza	En construcción	Duraznillo blanco	1,10
18-12-90	Esperanza	2 huevos	Aromo	0,90
28-12-90	Santa Fe	2 huevos	Arbusto	1,80
28-12-90	Santa Fe	3 huevos	Aromo	3,50
28-12-90	Candioti	3 huevos	Chañar	2,70
02-01-91	Cayastá	2 pichones	Curupí	3,50
02-01-91	El Laurel	3 huevos	Aromo	1,00
05-01-91	Grutly	2 huevos	Carda	1,50
05-01-91	Grutly	2 huevos	Carda	1,80
15-11-91	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	1,70
15-11-91	Esperanza	No observado	Curupí	1,70
15-11-91	Esperanza	No observado	Curupí	1,80
26-11-93	Esperanza	En construcción	Aromo	2,50
04-12-93	Esperanza	3 huevo	Chilca negra	1,50
04-12-93	Esperanza	1 huevo	Chilca negra	1,60
16-12-93	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,50
16-12-93	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
26-12-93	Villa Roda	No observado	Chañar	5,10
02-12-94	Río Salado y ruta 4	En construcción	Arbusto	1,00
02-12-94	Río Salado y ruta 4	3 pichones	Chañar	2,30
30-12-94	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,00
09-02-98	Esperanza	En construcción	Carda	1,50

30-10-98	Isla Berduc	En construcción	Aromo	0,70
04-11-98	Esperanza	2 huevos	Tala	2,10
04-11-98	Esperanza	3 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Tala	2,20
18-10-00	Calchaquí	1 huevo	Arbusto	1,50
18-10-00	Calchaquí	1 huevo	Junco	1,50
13-01-01	Villa Roda	Sin postura	Duraznillo blanco	1,00
20-10-01	Villa Roda	En construcción	Arbusto	1,20
29-10-01	Villa Roda	No observado	Rama negra	1,70
29-10-01	Villa Roda	En construcción	Cina-cina	2,50
08-11-01	Esperanza	2 huevos	Rama negra	1,60
10-11-01	Villa Roda	En construcción	Duraznillo blanco	1,00
03-12-01	Villa Roda	En construcción	Chañar	3,50
03-12-01	Villa Roda	En construcción	Aromo	1,00
03-12-01	Villa Roda	4 huevos	Arbusto	0,80
07-12-01	Esperanza	2 huevos	Rama negra	0,80
07-12-01	Esperanza	1 huevo	Cina-cina	1,00
07-12-01	Esperanza	3 pichones	Cina-cina	1,20
07-12-01	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	1,10
07-12-01	Esperanza	Sin postura	Chilca negra	2,10
07-12-01	Esperanza	En construcción	Curupí	1,30
07-12-01	Esperanza	En construcción	Duraznillo blanco	0,80
18-12-01	Río Salado y ruta 4	2 pichones	Eucaliptus	1,50
18-12-01	Río Salado y ruta 4	2 huevos	Carda	1,40
18-12-01	Río Salado y ruta 4	En construcción	Carda	1,50
18-12-01	Río Salado y ruta 4	En construcción	Carda	1,40
18-12-01	Río Salado y ruta 4	No observado	Arbusto	1,50
25-12-01	Villa Roda	3 pichones	Tutía	0,80
28-12-01	Villa Roda	2 pichones	Duraznillo blanco	1,20
28-12-01	Villa Roda	3 huevos	Duraznillo blanco	1,30
28-12-01	Villa Roda	En construcción	Jazmín de Córdoba	1,10
28-12-01	Villa Roda	En construcción	Cina-cina	2,50
28-12-01	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,40
28-12-01	Villa Roda	3 huevos	Arbusto	2,20
30-12-01	Esperanza	3 huevos	Duraznillo blanco	1,10
30-12-01	Esperanza	En construcción	Tala salada	1,70
30-12-01	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,60
30-12-01	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,40
30-12-01	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,60
30-12-01	Esperanza	En construcción	Cina-cina	1,20
30-12-01	Esperanza	En construcción	Jazmín de Córdoba	1,50
08-10-02	Villa Roda	En construcción	Duraznillo blanco	1,40
21-10-02	Villa Roda	En construcción	Aromo	1,60
02-11-02	Esperanza.	Sin postura	Rama negra	1,70
03-10-02	Villa Roda	No observado	Aromo	2,00
03-10-02	Villa Roda	No observado	Cina-cina	1,70
03-10-02	Villa Roda	No observado	Duraznillo blanco	1,00
03-10-02	Villa Roda	No observado	Arbusto	1,50
05-01-03	Villa Roda	En construcción	Cina-cina	1,20
27-01-03	Colonia Pujol	3 huevos	Cina-cina	1,80
27-01-03	Colonia Pujol	3 huevos	Aromo	1,40
28-01-03	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,60
28-01-03	Villa Roda	1 huevo y 2 pichones	Cina-cina	1,50
09-02-03	Río Salado y ruta 4	En construcción	Cardo	1,30

17-12-03	Esperanza	No observado	Curupí	1,80
17-12-03	Esperanza	Sin postura	Chilca negra	1,80
15-01-04	Esperanza.	2 huevos	Cina-cina	2,70
08-11-04	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,40
08-11-04	Esperanza	1 huevo	Cina-cina	2,50
17-11-04	Villa Roda	1 huevo	Chañar	1,60
02-02-07	Villa Roda	No observado	Arbusto	1,30
02-02-07	Villa Roda	No observado	Arbusto	1,30
02-02-07	Villa Roda	No observado	Arbusto	1,20
02-02-07	Villa Roda	No observado	Arbusto	1,20
14-12-11	Villa Roda	No observado	Cina-cina	2,70
14-12-11	Villa Roda	3 pichones	Cina-cina	2,00
14-12-11	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,00
14-12-11	Villa Roda	En construcción	Cina-cina	1,20
30-10-12	Villa Roda	En construcción	Cina-cina	1,70
02-11-12	Villa Roda (*)	3 huevos	Chañar	1,50
02-11-12	Villa Roda (*)	No observado	Curupí	5,00
02-11-12	Villa Roda	No observado	Chañar	1,50
16-11-12	Villa Roda	Construcción	Curupí	3,60
16-11-12	Villa Roda	Construcción	Cina-cina	1,60
16-11-12	Villa Roda (*)	No observado	Chañar	4,00
21-11-12	Villa Roda	Construcción	Cina-cina	0,80
21-11-12	Villa Roda	Construcción	Cina-cina	0,80
23-11-12	Villa Roda	Construcción	Chañar	1,60
23-11-12	Villa Roda (*)	Construcción	Aromo	3,00
23-11-12	Villa Roda (*)	Construcción	Aromo	1,00
11-12-12	Villa Roda	Construcción	Chañar	1,60

(*) Nidos lejos del agua, en el interior o en la orilla de un monte.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21	7								16	28	100

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 11 días	Pone en días corridos	14 días	13 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a ramas de arbustos, árboles, cardas, cardos, juncos. Cerca del agua. A veces alejado de ambientes acuáticos y en el interior u orillas de montes. A baja y mediana altura. Raro alto.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de saco o bolsita, alargado en sentido perpendicular al suelo. Boca amplia, ubicada en la parte lateral superior. Con pequeño alero.

Emplea en la construcción fibras vegetales, gramillas, ootecas. Liados con telas de arañas. Internamente plumas. Algunos con nervaduras, vilanos o raices de plantas acuáticas.

Medidas: Ancho : de 6 a 8,5 cm. en la parte inferior y de 8 a 11 cm. en la superior.

Diámetro de la boca : de 4 a 6 cm.


Profundidad : de 5 a 8 cm.


Alto : de 12 a 15 cm.

Alero : de 2 a 3 cm.

Altura. Nido más bajo a 0,40 m.

Nido más alto a 5,10 m.


Cina-cina
2,5 m
En construcción
Duraznillo Blanco
1,1 m
3 huevos
Arbusto
0,8 m
4 pichones
Tu Tía
0,8 m
3 pichones
Cina-cina
1,4 m
3 huevos
Arbusto
2,2 m
3 huevos
Duraznillo Blanco
1,20 m
2 pichones
Jazmín de Córdoba
1,1 m
En construcción
30 m.
4m.
10m.
12 m.
5m.
1m.
10m.
3m.
0 m
100 m
400 m
450 m
500 m
600 m
1200 m
1400 m
Distancia del camino
Camino
Nido
100 m.
Fluvicola albiventer
Lugar: Villa Roda
(Depto. La Capital)
Pcia. Santa Fe
28 de diciembre 2001
5,6 has. (8 nidos simultáneos)


Fluvicola albiventer
Lugar: Arroyo Cululú
(Depto. Las Colonias)
Pcia. Santa Fe
30 de diciembre 2001
(11 nidos simultáneos)
Distancia del arroyo
Camino
Arroyo
Puente
Nido
Cina-cina
En construcción
Jazmín de Córdoba
En construcción
Cina-cina
En construcción
Rama Negra
En construcción
Cina-cina
3 huevos
Cina-cina
En construcción
Cina-cina
3 huevos
Curupí
3 huevos
Tala Salada
En construcción
Duraznillo Blanco
En construcción
Duraznillo Blanco
3 huevos
910 m
690 m
680 m
650 m
600 m
500 m
400 m
350 m
300 m
0 m
10 m.
15 m.
7 m.
10 m.
7 m.
35 m.
5 m.
3 m.
15m.
40 m.
100 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Cina-cina	39	Rama negra	4
Aromo	32	Eucaliptus	3
Chilca	15	Cardo	3
Arbusto	16	Jazmín de Córdoba	2
Chañar	14	Tutía	1
Curupí	13	Tala salada	1
Duraznillo blanco	12	Junco	1
Carda	8	Algarrobo	1
Tala	7		

HUEVOS

Pone 3, raro huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 17,9 a 20,3 x 13 a 15,1 X= 19,5 x 14 (N= 21)

Peso lleno : de 1,7 a 2 X= 1,9 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,096 a 0,100 X= 0,099 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	26-02-71	Esperanza	19,0 x 14,0		
			19,0 x 13,5		
			19,5 x 14,0		
387	13-12-77	Esperanza	18,9 x 13,3		0,098
			18,9 x 14,1		0,099
	07-11-81	San Javier	19,0 x 13,5		
			19,3 x 13,7		
			19,5 x 13,9		
	07-11-81	San Javier	18,5 x 13,9		
			18,7 x 13,3		
			19,4 x 14,1		
649	29-10-86	Manucho	17,9 x 13,1		0,098
			18,0 x 13,3		0,100
			18,2 x 13,0		0,100
738	22-12-89	Esperanza	20,0 x 14,8		0,096
			20,2 x 15,0		0,098
			20,3 x 15,1		0,100
739	22-12-89	Esperanza	19,0 x 14,0	1,7	0,098
			19,4 x 14,4	2,0	0,100
			19,8 x 13,7	2,0	0,100
765	01-12-90	Esperanza	20,5 x 14,0	2,0	0,100
	08-11-04	Esperanza	20,0 x 14,4	1,9	
			21,0 x 14,4	2,0	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarilla. Cavidad bucal, naranja. Plumón gris. Piel oscura. Pico claro.

2 días . Plumón gris. Vainas alares muy chicas.

3 días. Aparecen las vainas en ventral y en las alas.

4 días. Ojos cerrados. Pico grisáceo. Plumas de los lados del pecho, blancas. Plumón gris. Vainas de las alas, grises. En la cola recién aparecen.

5 días. Ojos abiertos marrones. Pico gris.

7 días. Abriendo las láminas de la cola. Ventral blanco. Rabadilla plumas negras y blancas. Frente y cejas superciliares, blancas.
9 días. Plumas ventrales, blancas. Plumón gris. Cañones de las plumas alares y de la cola, grises. Láminas de los cañones, abriendo, pardo oscuro. En la cabeza, garganta y cuello, plumitas blancas.
10 días. Color de adulto. Escaso plumón en la cabeza. Pico oscuro. Patas grises.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	0,9	1,1	-	-	-	-	-	-
3	0,5	1,1	1,5	-	-	-	-	-	-
5	0,7	1,7	2,1	1,3	-	0,8	-	0,3	-
7	0,7	2,0	2,6	1,8	0,3	1,6	0,2	0,7	-
10	0,7	2,5	3,0	1,1	2,0	1,2	2,1	1,5	-

OBSERVACIONES


Durante el cortejo, la hembra se posa en ramas cercanas a la entrada al nido, entreabriendo las alas, levanta y abre la cola y eleva la cloaca. Una cópula duró 7 segundos, sobre una rama de Duraznillo blanco.
Corre a las aves que se aproximan al nido.
Emite un grito corto, pía..pía..pía.
Revolotean casi vertical unos 20 m. de alto para capturar **mosquitos**.
Una pareja de adultos con dos juveniles se desplazan con cortas carreritas sobre los repollitos capturando insectos.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

LAVANDERA *Arundinicola leucocephala*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 4



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-01-71	Aguará	3 huevo	Junco	1,40
11-11-72	Aguará	2 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Junco	1,60
18-10-86	Llambi Campbell	3 huevos	Duraznillo blanco	1,20
25-09-99	Calchaquí	3 huevos	Junco	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
Atado a ramitas o a juncos, en bañados, esteros, orillas de lagunas. A baja altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de bolsita o saco. La boca en la parte superior, lateral, a veces con alero.
Es construido con fibras vegetales y plumas, liadas con telas de arañas y ootecas.
Medidas :
Alto : de 15 a 18 cm.

Ancho : de 8 a 10 cm.
Largo antero-posterior : de 8 a 10 cm.
Diámetro de la boca : 4 cm.
Diámetro de la cámara : de 6 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,9 a 21,4 x 14 a 14,7 X= 19,9 x 14,2 (N= 6)
Peso de las cáscaras : de 0,105 a 0,122 X= 0,111 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
388	04-01-71	Aguará	21,4 x 14,4	0,122
389	11-11-72	Aguará	19,8 x 14,1	0,105
			20,6 x 14,1	0,111
646	18-10-86	Llambi Campbell	18,9 x 14,7	0,110
			19,0 x 14,0	0,110
			19,8 x 14,2	0,112

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

PEUTRÉN *Colorhamphus parvirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-01-87	Esquel (*)	1 huevo	Caña coligüe	1,20

(*). Localizado por Alejandro Gutiérrez Márquez

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado y sostenido en ramas. A baja altura y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita o semiesfera.

Construido con pajitas y líquenes. Internamente raicillas y plumitas.

Medidas :

Diámetro total : 11 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 3 cm
Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con manchas y pintas castañas en el polo mayor, formndo una corona.

Medida y peso.

De 18,0 x 14,1 (N= 1)
Peso de la cáscara : 0,100 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
704	15-01-87	Esquel	18,0 x 14,1	0,100

PICABUEY *Machetornis rixosa*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 31

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-10-72	Cayastacito	3 huevos y 2 de *M. bonariensis*	En nido de palitos	3,00
08-10-76	Esperanza	3 huevos	En tarro	5,00
05-11-76	Río Leyes	1 huevo y 1 de *M. bonariensis*	En nido de palitos	3,50
04-11-78	Esperanza	2 huevos	En nido de *A. annumbi*	2,80
15-10-81	San Javier	1 pichón de *M.bonariensis*	En nido de *F. rufus*	3,50
24-10-81	Esperanza	2 huevos y 1 de *M.bonariensis*	En nido de palitos	2,20
20-10-86	Saladero Cabal	1 huevo	En nido de palitos	2,50
07-12-90	Esperanza	No observado	En nido de *F. rufus*	6,00
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	No observado	En nido de palitos	8,00
14-12-90	Monte Vera	No observado	En nido de palitos	11,0
19-12-90	Esperanza	No observado	En nido de *A. annumbi*	4,00
24-10-91	Villa Ocampo	No observado	En hueco en un techo	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de palitos	3,70
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de palitos	5,50
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de *F. rufus*	5,00
04-10-96	Esperanza	4 huevos	En nido de *A. annumbi*	2,20
01-09-98	Esperanza	No observado	En nido de *Phacellodomus sp.*	3,70
03-10-98	Esperanza	No observado	En nido de palitos	2,30
06-11-01	Esperanza	3 pichones	En nido de palitos.	1,70
19-11-01	Villa Roda	1 huevo y 2 pichones	En caja-nido	2,70
17-10-02	Esperanza	2 pichones 1 de *M.bonariensis*	En nido de *C. alaudina*	6,00
23-10-02	Esperanza	2 huevos y 2 de *M.bonariensis*	En nido de *C. alaudina*	3,60
23-10-02	Esperanza	No observado	En nido de *C. alaudina*	6,30
21-12-02	Esperanza	3 huevos	En nido de *A. annumbi*	3,40
21-12-02	Esperanza	2 huevos	En nido de *A. annumbi*	3,60
21-01-03	Esperanza	1 huevo	En nido de *C. alaudina*	4,20
13-12-03	Esperanza	No observado	En nido de *A. annumbi*	3,30
31-12-03	Esperanza	No observado	En nido de *C. alaudina*	5,70
25-10-04	Esperanza	2 huevos	En nido de *A. annumbi*	3,30
18-10-06	Esperanza	No observado	En nido de *A. annumbi*	2,70
02-11-09	Villa Roda	3 huevos y 1 de *M.bonariensis*	Caño-nido	2,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1								1	16	5	8

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 9 días	Pone en días corridos	17 días	17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, en cajas-nido, en recipientes diversos y en nidos semidestruídos o abandonados de *Furnarius rufus, Anumbius annumbi, Coryphistera alaudina*, *Phacellodomus*, *Colaptes melanochloros*.

A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas, hojas o a veces algunos palitos en la base. Internamente cerdas, lanas, pelos y/o plumas. Algunos únicamente con cerdas o pelos.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 11 cm.
Diámetro interno : de 6 a 7 cm.
Profundidad : de 4 a 5 cm
Alto : de 7 a 8 cm.

Altura.

Nido más bajo a 1,70 m.
Nido más alto a 11,00 m.

Ubicación y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
En nido de espinas	10	En caja-nido	2
En nido de *Anumbius annumbi*	8	En tarro	1
En nido de *Coryphistera alaudina*	5	En hueco en techo	1
En nido de *Furmarius rufus*	3	En nido de *Phacellodomus sp.*	1

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color crema cubierto de pintas y rayitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 22,8 a 25,0 x 16,5 a 18,7 X= 24,0 x 17,7 (N= 7)
Peso lleno : de 3,6 a 3,8 X= 3,7 (N= 2)
Peso de la cáscara : 0,229 a 0,248 X= 0,236 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
396	13-10-72	Cayastacito	23,7 x 18,7		0,230
			24,8 x 18,7		0,236
			25,0 x 17,9		0,237
397	24-10-81	Esperanza	22,8 x 16,5		0,229
			23,9 x 16,9		0,248
	25-10-04	Esperanza	24,5 x 17,0	3,8	
			23,5 x 17,0	3,6	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Comisura blanco-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Abundante plumón pardo. Flancos más claros.

4 días. Abriendo láminas, finas. Plumas amarillas en ventral.
5 días. Abre los ojos.

8 días. Pico y patas grises. Dorsalmente pardo. Garganta blanquecina. Pecho y muslos amarillos. Primarias grises. Láminas pardas.

15 días. Pico y patas, grises.Comisura amarilla. Cavidad bucal y paladar, naranjas. Dorsal pardo grisáceo. Ventral amarillo. (Plumaje de adulto)

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,0	1,3	-	-	-	-	-	4,1
2	0,6	1,2	1,5	-	-	-	-	-	6,0
3	0,7	1,4	1,8	-	-	-	-	-	10,0
4	0,7	1,6	2,2	0,3	-	0,3	-	-	14,3
5	0,8	1,8	2,3	0,7	-	0,5	-	-	16,5
6	0,8	1,9	2,4	1,3	-	0,9	-	-	19,0
7	0,9	2,0	2,6	1,8	-	1,2	-	-	22,0
8	0,9	2,2	2,8	2,1	0,1	1,4	2,0	0,9	24,2

OBSERVACIONES


Es afectado por larvas de mosca.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

TUQUITO CHICO *Legatus leucophaius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Cataratas del Iguazú	Sin postura	En nido de *Cacicus haemorrhous*	8,00

REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación. En nidos cerrados de otras aves. Principalmente de Boyeros. Altos.

Características. Oculto. Elaborado. Acolcha la base con hojas, corteza.

BENTEVEO COMÚN *Pitangus sulphuratus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						N	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**

Total de nidos : 185



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-10-70	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,50
04-10-70	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,50
27-11-71	Villa San José	3 huevos	Aromo	2,50
10-10-77	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,80
10-10-78	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
12-10-81	Cataratas del Iguazú	3 pichones	Hueco en pared	5,00
12-10-83	Llambi Campbell	5 huevos	Chañar	2,60
17-10-86	Esperanza	1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,00
25-10-86	San Javier	1 huevo	Aromo	2,60
31-10-86	Esperanza	2 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,00
07-11-86	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
15-01-88	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,00
15-01-88	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
15-10-88	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
15-10-88	Esperanza	No observado	Curupí	3,00
14-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
14-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
14-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
17-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
17-01-89	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
06-09-89	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
06-09-89	Esperanza	No observado	Ombú	6,00
06-09-89	Esperanza	No observado	Ombú	4,20
15-09-89	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
22-09-89	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
22-09-89	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
26-09-89	A° Ceibal	No observado	Seibo	6,00
29-09-89	Calchaquí	No observado	Chañar	4,50
14-10-89	Esperanza	En construcción	Chañar	4,20
27-10-89	Esperanza	3 pichones	Tala	2,20
29-10-89	Esperanza	En construcción (1)	Olivo	4,50
31-10-89	Soledad	No observado	Seibo	6,00
05-11-89	Esperanza	No observado	Ñandubay	5,00
24-11-89	Esperanza	No observado	Chañar	4,80
24-11-89	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
29-11-89	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	7,50
29-11-89	Calchaquí	No observado	Quebracho colorado	7,00
02-12-89	Cayastá	No observado	Paraíso	5,00
02-12-89	Cayastá	No observado	Seibo	4,50
19-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
19-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	5,00
27-10-90	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
29-10-90	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
02-11-90	Morteros	4 huevos	Chañar	4,50
30-11-90	Esperanza	Pichones	Chañar	3,50

04-12-90	Río Salado y ruta 4	No observado	Chañar	5,00
07-12-90	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	No observado	Algarrobo	5,50
11-12-90	Río Leyes	No observado	Aromo	3,00
14-12-90	Desvío Arijón	No observado	Seibo	3,80
14-12-90	Monte Vera	No observado	Aromo	3,50
15-12-90	Saladillo Dulce	No observado	Aromo	4,00
02-01-91	El Laurel	No observado	Aromo	3,50
02-01-91	Las Cañas	No observado	Aromo	4,00
05-01-91	Grutly	En construcción	Chañar	4,50
05-01-91	Grutly	No observados	Chañar	5,00
11-01-91	Sta. Clara de B. Vista	No observado	Aromo	4,50
18-01-91	La Criolla	No observado	Curupí	5,00
18-01-91	Laguna del Platero	No observado	Timbó colorado	6,50
24-10-91	Villa Ocampo	No observado	Timbó colorado	4,00
21-10-92	Villa Ocampo	No observado	Timbó colorado	6,00
22-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	4,80
22-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
22-10-92	Esperanza	No observado	Curupí	5,40
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,50
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,60
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
22-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
06-11-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
06-11-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
06-11-92	Esperanza	No observado	Curupí	3,50
06-11-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
12-12-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
12-12-92	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
12-12-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
21-09-93	Puerto Iguazú	No observado	Pino	4,50
16-10-93	Esperanza	En construcción	Curupí	6,00
16-10-93	Esperanza	No observado	Curupí	8,00
20-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	5,00
20-11-93	Esperanza	En construcción	Tala	2,20
21-12-93	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
24-12-93	Esperanza	4 huevos	Chañar	4,80
04-01-94	Esperanza	5 huevos	Chañar	4,70
06-01-94	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,90
01-09-98.	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
16-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
16-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
22-09-98	Esperanza	En construcción	Tala	4,40
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,20
03-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
03-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
12-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
12-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
13-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
13-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,40

14-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
14-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,80
15-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,30
15-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
15-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
17-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,50
17-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
19-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70
19-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
24-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
25-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
25-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
04-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
06-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
07-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
10-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,90
10-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
17-12-98	Esperanza	En construcción	Curupí	4,00
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
26-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
26-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
26-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
30-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
04-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,50
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
07-01-99	Esperanza	No observado	Curupí	5,10
20-01-99	La Camila	Pichones	Quebracho colorado	6,00
16-11-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,30
08-12-01	Esperanza	No observado	Sombra de toro	3,40
08-12-01	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,10
17-12-01	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina-cina	3,50
17-12-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,20
16-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
16-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
16-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	7,50
16-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
17-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
17-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
17-09-02	Esperanza	En construcción	Curupí	7,00
21-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
21-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	7,20
22-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	5,20
22-09-02	Esperanza	En construcción	Curupí	6,50
22-09-02	Esperanza	En construcción	Acacia negra	5,20
23-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	6,60
23-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,20
23-09-02	Esperanza	En construcción	Acacia negra	5,10
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,10
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	5,30

25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	5,20
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,10
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,40
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	8,00
25-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,10
25-09-02	Esperanza	En construcción	Curupí	7,00
04-10-02	Esperanza	No observado	Curupí	6,00
04-10-02	Esperanza	No observado	Curupí	8,00
11-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
25-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,40
25-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	7,00
23-12-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
18-10-03	Esperanza	No observado	Sombra de Toro	3,70
12-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
12-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,20
12-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,30
12-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,40
12-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
19-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
19-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
31-12-03	Esperanza	4 pichones	Chañar	5,00
27-07-04	Esperanza	En construcción	Fresno	4,30
20-10-04	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,70
20-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,30
11-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,20
15-11-04	Esperanza	4 huevos	Chañar	3,40
01-12-04	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,60

(1). En uno de *Anumbius annumbi* semidestruido.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20						1		38	66	24	36

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
18 a 22 días	Pone en días corridos	16 a 17 días	17 a 18 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles, huecos grandes o en nidos semidestruídos de otras aves (*Furnarius rufus*). A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma globular o redondeada. Boca amplia ubicada en la parte antero-superior.

Emplea en la construcción pajitas, gramillas. Puede entremezclarlas con lanas, hilos, plumas.

Medidas :

Ancho : de 20 a 25 cm.
Alto : de 20 a 30 cm.
Diámetro de la boca : de 6 a 12 cm.
Diámetro de la cámara : de 10 a 13 cm.

Altura.

Nido más bajo a 2,10 m.
Nido más alto a 8,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	129	Timbó	3	Ñandubay	1
Curupí	21	Acacia negra	2	Algarrobo	1
Aromo	8	Sombra de toro	2	Pino	1
Seibo	4	Ombú	2	Cina-cina	1
Quebracho colorado	3	Olivo	1	Fresno	1
Tala	3	Paraíso	1	Hueco	1

Densidad de nidos por hectárea (en un predio de 70 hectáreas)

Año 1998 : 0,41
Año 2002 : 0,52

HUEVOS

Pone 3, raro huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 26,5 a 30,5 x 19 a 22,1 X= 28,0 x 20,8 (N= 39)

Peso lleno : de 5,000 a 8,412 X= 6,800 (N= 23)

Peso de las cáscaras : de 0,823 a 0,440 X= 0,368 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
409	04-10-70	Esperanza	26,0 x 19,7		0,283
			26,8 x 19,0		0,316
			27,0 x 19,2		0,333
410	04-10-70	Esperanza	30,4 x 20,6		0,340
			30,5 x 20,7		0,379
411	27-11-71	Villa San José	29,5 x 22,1		0,368
			29,7 x 21,9		0,382
			28,0 x 21,9		0,416
412	10-10-78	Esperanza	26,9 x 19,8		0,309
			28,0 x 21,0		0,343
			28,9 x 20,8		0,374
614	12-10-83	Llambi Campbell	28,5 x 21,1	6,516	0,347
			28,7 x 20,1	7,350	0,373
			30,1 x 21,1	7,824	0,376
			30,4 x 21,5	8,217	0,435
			30,3 x 22,1	8,412	0,440
	18-10-86	Llambi Campbell	26,5 x 19,5		
			26,8 x 20,2		
			27,3 x 20,5		
			27,3 x 20,9		
			28,0 x 20,6		
	20-10-04	Esperanza	27,2 x 20,6	6,0	
			27,7 x 21,0	6,5	
			28,3 x 20,5	5,9	
			28,3 x 20,5	6,3	
	20-10-04	Esperanza	26,6 x 20,0	5,5	
			26,8 x 21,0	6,1	
			27,0 x 21,6	6,0	

11-11-04	Esperanza	29,0 x 21,0	6,1
		29,5 x 22,0	6,5
		30,5 x 21,0	6,6
15-11-04	Esperanza	27,0 x 21,0	6,1
		28,0 x 21,8	6,5
		28,0 x 21,2	6,4
		28,2 x 21,0	6,0
01-12-04	Esperanza	27,5 x 22,0	5,0
		28,0 x 21,2	5,4
		28,0 x 22,0	6,3
		29,3 x 22,0	6,4

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento. Comisura amarilla. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas. Piel naranja-amarillenta. Patas amarillentas. Plumón gris claro, largo en la cabeza, dorsalmente y dorsal de alas.

2 días. Piel clara.

5 días. Ojos cerrados. Aparecen las vainas de las plumas alares.

6 días. Ojos abiertos. Maxilar color natural igual que las patas. Plumón gris. Lados del pecho plumas amarillas.

8 días. Cañones alares y de la cola grises, con las láminas abriendo, pardo canelas. Pecho amarillo.

9 días. Dorsalmente láminas de 3-4 mm. Ventral amarillo. Grita.

10 días. Vivarachos, fuertes.

12 días. Aparecen las plumas blancas formando las cejas y el collar en la parte posterior de la corona. Dorsal, alas y cola como el adulto.

15 días. Gritan. Corona oscura. Plumaje de adulto. Escasos plumones en la cabeza.

17 días. Con el plumaje de adulto, a punto de abandonar el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,6	1,0	1,4						5,6-7,0
2	0,6	1,1	1,4-1,6						9,0-15,6
3	0,7	1,2	1,8						12,0-15,0
4	0,7-0,8	1,3	2,1						13,6-16,8
5	0,9-1,0	1,5	2,2						16,4-18,0
6	1,0	1,7	2,3	0,1				0,5	18,6-20,5
7	1,0	1,8	2,5	0,3		0,3		0,7	22,2-24,2
8	1,1	2,0	2,8	0,5		0,5		1,0	25,4-27,3
9	1,2	2,1	3,0	0,8	0,4	0,7		1,3	32,0-34,0
10	1,3	2,2	3,2	1,3	0,6	1,1	0,4	1,4	39,0-41,0
11	1,4	2,3	3,4	1,5	0,8	1,4	0,6	1,5	45,0-47,0
12	1,5	2,4	3,6	1,8	1,0	1,7	1,0	1,6	50,0-58,0
13	1,6-1,8	2,4	4,0	2,1-2,5	1,2-1,9	1,9-2,4	1,2-1,5	1,6-1,8	56,0-70,0
14	1,8	2,5	4,1	2,4	2,2	2,3	2,0	2,0	58,0-71,0
15	1,8	2,6	4,2	2,1	2,6	2,1	2,5	2,2	71,0
16	1,9	2,7	4,3	1,9	3,2	1,8	3,1	2,4	72,0
17	1,9	2,8	4,4	1,6	3,5	1,6	3,5	2,6	72,0
18	2,0	2,9	4,5	1,4	4,0	1,5	3,8	2,8	73,0
19	2,0	3,0	4,6	1,4	4,0	1,5	3,8	2,9	73,0

OBSERVACIONES

El 09-09-94 en Ambrosetti se observó un ejemplar albino.

Cuidado de los pichones y juveniles:

Los adultos los cuidan y dan de comer hasta 8-10 días después de dejar el nido. Los pichones llaman con gritos monótonos y lastimeros. Kiii...kiii.. kiii.

Después de los 10-12 días pueden comenzar a construir nuevamente otro nido.

Son atacados por ectoparásitos (piojillos, ácaros) y se llegó a contar hasta 45 larvas de moscas.


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

BENTEVEO RAYADO *Myiodynastes maculatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 7



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
16-12-89	Esperanza	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	En *Furnarius rufus*	10,00
02-01-91	Cayastá	No observado	En *Furnarius rufus*	7,00
14-01-95	Malabrigo	3 pichones	En *Colaptes sp*.	3,00
16-12-98	Esperanza	1 pichón	En hueco en rama	3,30
09-01-99	Esperanza	3 huevos	En *Furnarius rufus*	2,70
03-12-00	Esperanza	En construcción	En Caja-nido	7,00
23-12-00	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	5,00

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 7 días	Pone en días corridos	16 días	18 a 19 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles, en nidos abandonados o semidestruidos de Hornero (*Furnarius rufus*) y de Carpinteros (*Colaptes sp.*) y en Caja-nido. A mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Semielaborado. Puede o no tapiza la base con pajitas, hojas y nervaduras.

Altura.

Nido más bajo : 2,70 m.

Nido más alto : 10,00 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 27,8 a 29,5 x 19,6 a 19,7 X= 28,6 x 19,6 (N= 2)

Peso lleno : de 5,2 a 5,6 X= 5,4 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,197 a 0,204 X= 0,201 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
737	16-12-89	Esperanza	27,8 x 19,6	5,2	0,314
			29,5 x 19,7	5,6	0,327


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

PITANGUÁ *Megarhynchus pitangua*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-12-02	Gdor. Virasoro	No observado	Petiribí	12,00

REPRODUCCIÓN

NIDO

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas.


Ubicación.

En ramas de árboles. Altos.

TUQUITO RAYADO *Empidonomus varius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
19-11-76	Los Amores	2 huevos	Árbol	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos y claveles del aire. Internamente nervaduras de hojas.

Medidas :

Diámetro total : 15 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 2 cm.
Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco o crema con pintas y manchitas castañas y grises en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 23,3 a 24,5 x 15,6 a 16,3 X= 23,9 x 15,9 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,179 a 0,182 X= 0,181 (N= 2)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
404	19-11-76	Los Amores	23,3 x 15,6	0,179
			24,5 x 16,3	0,182

TUQUITO GRIS *Empidonomus aurantioatrocristatus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 52



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
16-12-73	Aguará Grande	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	2,50
27-11-74	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,40
19-11-76	Los Amores	2 huevos	Algarrobo	2,50
09-12-77	Malbrán	3 huevos	Chañar	2,50
12-12-77	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,50
13-12-78	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,70
13-12-78	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
10-12-79	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,50
07-11-90	Morteros	3 huevos	Chañar	3,80
15-11-90	Morteros	2 huevos	Chañar	3,00
15-11-90	Morteros	1 huevo	Chañar	4,00
07-12-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	1 huevo	Algarrobo	2,50
15-12-90	Campo Andino	No observado	Eucaliptus	12,0
19-12-90	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
18-01-91	Laguna del Platero	3 pichones	Tala	4,20
13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Quebracho colorado	2,90
27-10-93	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
04-12-93	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Curupí	4,00
16-12-93	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,60
05-12-94	Esperanza	No observado	Algarrobo	6,40
17-12-95	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,30
29-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	3,50
07-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
09-11-98	Esperanza	En construcción	Curupí	2,60
19-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,20
02-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
07-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
07-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	2,60
09-12-98.	Esperanza	No observado	Chañar	4,10

12-12-98	Esperanza	1 pichón	Chañar	3,50
16-12-98	Esperanza	En construcción	Curupí	5,40
17-12-98	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,70
21-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
26-12-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,30
04-01-99	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
05-01-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
27-12-00	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
30-12-00	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,60
17-11-01	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,00
04-12-01	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30
17-12-01	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,60
02-01-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,70
21-12-02	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,60
23-12-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
22-11-03	Esperanza	En construcción	Chañar	3,00
13-12-03	Esperanza	En construcción	Chañar	2,60
19-12-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,00
22-11-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,30
08-11-04	Esperanza	3 huevos	Acacia negra	3,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5									2	12	33

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 8 días	Pone en días corridos	15 a 16 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o asentado en ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, aveces claveles del aire. Internamente fibras finas, raicillas, nervaduras de hojas o líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 11 cm.
Diámetro interno : de 5,5 a 6 cm.
Profundidad : de 2,5 cm.
Alto : de 5 a 6 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,60 m.
Nido más alto : 12,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	39	Eucaliptus	1
Curupí	6	Tala	1
Algarrobo	4	Quebracho colorado	1

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco o crema con pintas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,0 a 21,8 x 14,2 a 16,4 X= 19,8 x 15,3 (N= 12)

Peso lleno : de 1,8 a 2,4 X= 2,16 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,142 a 0,165 X= 0,159 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
405	16-12-73	Aguará	20,2 x 15,8		0,159
			20,4 x 15,8		0,159
699	27-11-74	Esperanza	21,0 x 16,0		0,160
406	19-11-76	Los Amores	21,0 x 15,9		0,163
			21,5 x 15,7		0,165
407	09-12-77	Malbrán	21,0 x 15,8		0,142
			21,4 x 15,7		0,159
			21,8 x 15,9		0,174
408	10-12-79	Esperanza	20,9 x 16,4		0,157
	08-11-04	Esperanza	18,0 x 14,2	1,8	
			19,0 x 15,0	2,3	
			19,0 x 15,5	2,4	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento. Comisura, cavidad bucal y paladar, naranja-amarillentos. Plumón pardo.

1 día. Piel dorsal gris oscuro. Ventral verdosa. Patas color natural.

5 días. Abre los ojos, marrones. Vainas ventrales amarillentas.

6 días. Comisura amarilla. Pico gris oscuro. Patas grises. Plumón crema. Plumas del pecho y flancos crema amarillentos. Dorsalmente aparecen vainas gris oscuras. Lengua rosada. Orilla de la cavidad y anterior del paladar, naranjas.

9 días. Láminas pardo oscuro orilladas de canela. Flancos crema amarillentos. Pecho más oscuro.

10 días. Emplumado. Vivaracho. Primarias y secundarias pardas, orilladas de canela. Lados del pecho gris. Abdomen amarillento.

13 días. Pico negro. Comisura amarilla. Paladar amarillo. Frente y corona, pardo grisáceos. Plumas dorsales pardas con los bordes canelas. Se nota más el canela en las cubiertas y en las remeras. Pecho gris. Abdomen blanquecino. Cola parda con ribetes canelas. Rabadilla marrón. Patas grises.


MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	0,9	1,2	-	-	-	-	-	-
2	0.5	1,0	1,3	-	-	-	-	-	-
3	0,5	1,3	1,5	0,1-0,2	-	-	-	-	-
4	0,6	1,4	1,8	0,5	-	-	-	-	-
5	0,7	1,5	2,2	0,8	0,6	-	-	0,3	-
6	0,7	1,5	2,2	1,3	0,6	-	-	0,5	-
7	0,8	1,6	2,3	1,5	0,7	-	-	0,7	-
8	0,8	1,6	2,4	1,7	0,8	-	-	1,0	-
9	0,9	1,7	2,4	2,0	0,8	-	-	1,2	-
10	0,9	1,8	2,5	1,8	1,2	1,1	1,0	1,5	-

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

SUIRIRÍ REAL *Tyrannus melancholicus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 23

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-12-77	Salta	No observado	Eucaliptus	15,00
15-11-81	Cayastá	1 huevo	Aromo	3,00
15-11-81	Cayastá	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	3,40
22-11-81	Cayastá	3 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Seibo	3,80
03-12-81	Cayastá	2 huevos	Aromo	3,50
04-12-88	Cayastá	No observado	Tala	4,50
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	2,50
15-12-90	Cayastacito	No observado	Seibo	7,00
01-01-91	Isla Berduc	2 pichones	Aromo	2,10
02-01-91	Cayastá	3 huevos	Seibo	3,20
12-01-91	Grutly	2 pichones	Paraíso	5,50
13-12-91	Malabrigo	En construcción	Quebracho colorado	7,00
13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Quebracho colorado	7,50
23-11-95	Cayastá	No observado	Seibo	3,80
09-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
04-12-98	Santa Fe	No observado	Seibo	3,20
07-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
03-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
19-11-99	Esperanza	2 huevos	Curupí	5,50
19-11-99	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,80
18-01-01	Concordia	No observado	Sauce	6,20
22-01-01	Santa Fe	2 pichones	Sauce	4,70
21-10-04	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6									1	7	9

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
7 a 8 días	Pone en días corridos	16 días	18 a 19 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera o taza de tallos de enredaderas o de yuyos y pajas. Internamente fibras finas, raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 18 cm.

Diámetro interno : de 6 a 9 cm.

Profundidad : de 3 a 5 cm.

Alto : de 5 a 8 cm.

Altura.

Nido más bajo : 2,10 m.

Nido más alto : 15 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	5	Tala	1
Aromo	5	Eucaliptus	1
Seibo	5	Curupí	1
Quebracho colorado	2	Paraíso	1
Sauce	2		

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color crema con manchitas castañas,claras y oscuras y algunas grises, en toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 22,1 a 26 x 16,9 a 18 X= 23,3 x 17,4 (N= 9)

Peso lleno : 4,0 (N= 1)

Peso de las cáscaras : de 0,189 a 0,231 X= 0,209 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
401	15-11-81	Cayastá	25,5 x 17,5		0,215
697	15-11-81	Cayastá	22,0 x 17,5		0,210
			24,5 x 18,8		0,216
402	22-11-81	Cayastá	22,1 x 17,0		0,189
			22,1 x 17,6		0,190
			22,5 x 16,9		0,191
403	03-12-81	Cayastá	22,2 x 17,5		0,204
			24,5 x 18,0		0,231
771	11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	26,0 x 17,4	4,0	0,220

OBSERVACIONES


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

TIJERETA *Tyrannus savana*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓ N

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 55



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-10-72	Grutly	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paraíso	4,00
24-12-79	Miguel Escalada	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	3,50
07-11-81	San Javier	3 huevos	Aromo	1,10
14-01-89	Esperanza	3 pichones	Chañar	3,00
28-11-89	Esperanza	3 huevos	Paraíso	4,00
02-12-89	Cayastá	En construcción	Aromo	2,60
02-12-89	Cayastá	No observado	Aromo	4,50
02-11-90	Morteros	No observado	Chañar	4,50
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	3 huevos	Seibo	4,40
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	2 pichones	Aromo	3,20
13-12-90	Empalme San Carlos	1 pichón	Aromo	3,40
14-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	2,80
14-12-90	Monte Vera	En construcción	Aromo	4,20
15-12-90	Laguna Paiva	2 pichones	Curupí	3,50
19-12-90	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,20
28-12-90	Candioti	2 pichones	Chañar	5,50
01-01-91	Isla Berduc	3 huevos	Aromo	3,30
18-01-91	La Criolla	3 pichones	Curupí	6,00
08-11-91	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
12-12-92	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,30
04-12-93	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	3,50
02-12-94	Villa Roda	No observado	Eucaliptus	4,50
06-11-95	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	3,40
13-11-95	Esperanza	En construcción	Curupí	2,80
17-12-95	Esperanza	3 huevos	Curupí	3,30
17-12-95	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,90
06-12-96	Esperanza	1 pichón	Chañar	1,80
06-11-98	Esperanza	Sin postura	Aromo	2,20
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
13-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
14-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
25-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,50
30-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,10
03-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
04-12-98	Santa Fe	No observado	Seibo	3,10
04-12-98	Santa Fe	No observado	Seibo	3,20
07-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
17-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	6,50
19-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
01-12-01	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	10,0

14-12-01	Esperanza	3 pichones	Cina-cina	3,20
28-12-01	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	12,0
28-12-01	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	10,0
28-12-01	Villa Roda	En construcción	Eucaliptus	15,00
18-11-02	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	4,20
03-01-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	3,40
22-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
09-01-04	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	2,30
21-01-06	Esperanza	1 pichón	Chañar	1,40
08-12-06	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,50
05-11-08	Esperanza (*)	3 pichones	Fresno americano	5,50
15-11-12	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
23-11-12	Villa Roda	En construcción	Chañar	7,00
06-01-13	Villa Roda	No observado	Chañar	4,20

(*) Construído en el centro de la ciudad.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8									1	17	29

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
11 a 13 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o asentado en ramas de árboles. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de pajitas, tallos de yuyos, a veces hilos. Internamente fibras finas, raicillas, materiales algodonosos y plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 14 cm.
Diámetro interno : de 5 a 7 cm.
Profundidad : de 3,5 a 5,5 cm.
Alto : de 5,5 a 12 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,10 m.
Nido más alto : 15,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	25	Algarrobo	2
Aromo	9	Paraíso	2
Eucaliptus	6	Cina-cina	2
Curupí	5	Fresno americano	1
Seibo	3		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco o crema con pintas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 19,8 a 22,9 x 15,2 a 16,8 X= 21 x 15,8 (N= 12)
Peso lleno : de 2,5 a 2,8 X= 2,66 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,125 a 0,188 X= 0,136 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
398	01-10-72	Grutly	22,0 x 16,3		0,155
			21,9 x 15,9		0,182
			22,6 x 16,1		0,183
399	24-12-79	Miguel Escalada	19,8 x 16,5		0,165
			22,9 x 16,8		0,187
			23,2 x 16,8		0,188
400	07-11-81	San Javier	20,8 x 15,2		0,117
			21,4 x 15,2		0,131
			21,5 x 15,8		0,136
791	01-01-91	Isla Berduc	19,8 x 15,4	2,5	0,125
			21,4 x 15,6	2,7	0,130
			21,5 x 16,0	2,8	0,131

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarilla. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. Plumón blanquecino. Piel clara. Pico color natural.

5 días. Ojos abiertos. Dorsalmente plumón crema. Aparecen las vainas en las zonas ptéridas. Vainas ventrales blancas : 0,3 cm.

6 días. Garganta y lados del pecho, blancos. Cañones de las alas y de la cola, grises. En la cola apenas aparecen las láminas. Tiene todavía filoplumas grises.
7 días. Vainas en las zonas ptéridas : 0,7 cm. Abriendo las láminas. Pico oscuro. Comisura amarilla. Patas color natural. Ventral blanco. Dorsal gris. Escaso plumón. Grita.
9 días. Láminas de cubiertas y alares pardas, orilladas de ocre.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	0,7	1,0	-	-	-	-	-	-
2	0,5	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
3	0,6	1,5	1,8	-	-	-	-	-	-
4	0,8	1,7	2,0	-	-	-	-	-	-
5	0,9	1,9	2,4	0,7-1,0	-	0,7	-	0,5	-
6	0,9	1,9	2,5	1,2	-	1,0	-	0,6	-
7	0,9	2,0	2,6	1,5	0,2	1,2	0,2	0,7	-
8	1,0	2,1	2,8	1,6	0,5	1,1	0,5	1,0	-
9	1,0	2,2	3,0	1,7	0,9	0,9	0,9	1,4	-

OBSERVACIONES


Puede ocupar el mismo nido en una temporada.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

BURLISTO CASTAÑO *Casiornis rufus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-11-99	Resistencia	3 huevos	Hueco en tronco	1,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajitas, cerdas y exuvias.

Medidas :

Diámetro : 8 cm.

Profundidad : 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema cubierto de pintas y rayitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas :

De 20,2 a 21 x 16,4 a 16,5 X= 21,7 x 16,5 (N= 3)

NIDADA


Fecha	Localidad	Medidas
13-11-99	Resistencia	20,2 x 16,6
		20,9 x 16,5
		21,0 x 16,4

BURLISTO PICO CANELA *Myiarchus swainsoni*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 6



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
29-11-89	Calchaquí	2 huevos	Hueco en rama	4,20
26-11-90	Villa Gral. Belgrano	En construcción	Hueco en árbol	4,00
05-12-98	Esperanza	3 huevos	Caja-nido	1,50
24-12-99	Esperanza	4 huevos	Caja-nido	3,60
21-12-00	Esperanza	3 pichones	Nido de *Colaptes melanochloros*	1,50
04-12-01	Esperanza	5 huevos	Nido de *Colaptes melanochloros*	3,40

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										2	4

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 12 días	Pone en días corridos	16 días	15 a 16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles, en nido abandonados de Carpinteros y en Cajas-nido. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas, tallos de yuyos, raíces. Internamente cerdas, plumas, exuvias.

Medidas :

Diámetro total : 10 cm.
Diámetro interno : 5 cm.
Profundidad : 3 cm.
Alto : 5 cm.

Altura.

Nido más bajo a 1,50 m.
Nido más alto a 4,20 m.

HUEVOS

Pone 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color crema con pequeñas rayitas y manchitas pardas, en toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 22 a 22,8 x 16,8 a 17,3 X= 22,4 x 17 (N= 2)
Peso lleno : de 3,2 a 3,5 X= 3,3 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 0,197 a 0,204 X= 0,200 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
733	29-11-89	Calchaquí	22,0 x 16,8	3,2	0,197
			22,8 x 17,3	3,5	0,204

PICHONES


Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas.
El paladar más amarillento. Plumón gris, abundante.
1 día. Piel clara.
3 días. Ojos cerrados.Mucho plumón gris. Cavidad bucal naranja-amarillenta.
5 días. Ojos cerrados. Aparecen las vainas alares.
6 días. Ojos abiertos. Pico oscuro.
8 días. Aparecen las láminas en las plumas alares y de la cola. Primarias y secundarias, pardas. Cola parda. Láminas de las cubiertas alares, ocráceas. Láminas de las plumas dorsales, pardas. Garganta y pecho, grises. Lados del pecho y flancos, amarillentos. Tienen todavía plumón.
10 días. Dorsalmente pardo. Pecho gris. Flancos amarillentos. Abdomen y subcaudales amarillentos. Se notan dos bandas ocráceas,en las alas. Queda escaso plumón.
13 días. Pico negro. Cubiertas y secundarias, orilladas de ocre-canela. Cola con las plumas orilladas de ocre-canela. Garganta y pecho, grises. Abdomen amarillento.

OBSERVACIONES

Los adultos alimentan a los pichones con Libélulas y Mariposas. Los padres emiten gritos lastimeros. Luego de abandonar el nido los padres continúan varios días junto a los juveniles. Se los vió comiento frutos de Curupí.

BURLISTO PICO NEGRO *Myiarchus ferox*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-11-72	La Loca	3 huevos	Hueco en árbol	3,00
16-11-74	La Loca	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Hueco en tronco	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. A mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas, tallos de yuyos. Internamente fibras finas, cerdas, plumas, pelos.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 8 cm.

Diámetro interno : de 4 a 6 cm.

Profundidad : de 2 a 5 cm.

Alto : de 8 a 13 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema con rayitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 21,9 x 16,9 a 19,4 X= 21,6 x 17,7 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,192 a 0,207 X= 0,198 (N= 4)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	03-11-72	La Loca	21,5 x 17,4	0,192
			21,6 x 16,9	0,203
			21,9 x 17,2	0,207
414	16-11-74	La Loca	21,7 x 19,4	0,195

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

BURLISTO COLA CASTAÑA *Myiarchus tyrannulus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-12-89	Colmena	3 huevos	Hueco en tronco	3,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajitas y fibras finas internamente.

Medidas :

Diámetro total : 7 cm.

Diámetro interno : 4 cm.

Profundidad : 2,5 cm.

Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color crema con manchitas, pintas y rayitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21,4 a 22 x 17 a 17,4 X= 21,6 x 17,1 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,190 a 0,200

X= 0,196 (N= 3)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
413	03-12-89	Colmena	21,4 x 17,0	0,190
			21,5 x 17,4	0,198
			22,0 x 17,1	0,200

FAMILIA: COTINGIDAE

CORTARRAMAS *Phytotoma rutila*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N							N	N	N	N



Total de nidos : 19

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-10-71	Cayastacito	3 huevos	Tala	1,70
10-10-72	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,50
27-10-72	Cayastacito	4 huevos	Enredadera	2,00
29-09-74	Esperanza	3 huevos	Tala	2,40
23-02-79	Humahuaca	3 huevos	Arbusto	2,00
19-11-81	San Javier	2 huevos	Ñandubay	2,50
04-10-89	Morteros	En construcción	Arbusto	1,80
02-11-90	Morteros	3 pichones	Arbusto	2,20
07-11-90	Morteros	3 huevos	Arbusto	3,50
15-11-90	Morteros	2 huevos	Tala	4,00
15-11-90	Morteros	2 huevos	Chañar	1,90
16-10-92	Esperanza	2 pichones	Tala	2,00
15-12-93	Esperanza	En construcción	Curupí	4,00
14-10-95	Esperanza	4 huevos	Tala	2,30
03-10-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,70
25-10-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,70
28-12-98	Aconquija	2 huevos y 2 pichones	Arbusto	2,30
15-12-99	El Alamito	2 huevos	Arbusto	2,10
08-11-01	Esperanza	3 pichones	Tala	3,10

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1							1	8	6	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5 a 6 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles, arbustos, enredaderas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica de palitos, con y sin espinas. Internamente nervaduras de hojas o tallos de enredaderas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 15 cm.
Profundidad : de 2,5 a 4 cm.
Alto : de 4,5 a 10 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,70 m.
Nido más alto : 4,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Tala	7	Algarrobo	1
Arbusto	6	Curupí	1
Chañar	2	Ñandubay	1
Enredadera	1		

HUEVOS

Pone 3, raro 4 huevos.

Ovoidales. De color ocre intenso o verde con pintas y manchitas pardo oscuro y grises, más concentradas en el polo mayor.

En un nido había dos huevos celeste verdosos, sin manchas.

Medidas y pesos :

Para *P. r. rutila*

De 22,3 a 25,6 x 16,5 a 17,8
X= 23,4 x 17,3 (N= 14)

Peso lleno : de 3,3 a 3,5
X= 3,4 (N= 2)
Peso de las cáscaras : de 0,188 a 0,241
X= 0,215 (N= 14)

Para *P. r. angustirostris*
De 23,7 a 24 x 17,4 a 17,8 X= 23,8 x 17,5 (N= 3)
Peso de las cáscaras : 0,21 a 0,24 X= 0,22 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
444	09-10-71	Cayastacito	24,2 x 16,5		0,238
			24,8 x 17,3		0,240
			25,1 x 17,2		0,241
445	10-10-72	Esperanza	22,9 x 16,6		0,196
			23,3 x 17,4		0,203
			23,5 x 17,5		0,213
446	27-10-72	Cayastacito	24,8 x 17,3		0,188
			24,9 x 17, 4		0,197
			25,0 x 17,4		0,203
			25,6 x 17,0		0,205
447	23-02-79	Humahuaca	23,7 x 17,4		0,216
			23,7 x 17,8		0,223
			24,0 x 17,4		0,240
448	19-11-81	San Javier	23,8 x 17,4		0,203
			24,5 x 17,8		0,212
754	15-11-90	Morteros	22,3 x 17,2	3,3	0,190
			22,8 x 17,5	3,5	0,200

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Implume. Piel oscura. Pico gris. Comisura blanquecina. Cavidad bucal rosada, más fuerte, tirando a rojizo en el paladar.

5 días. Abren los ojos.

7 dias. Las plumas, nacen en la parte superior de la cabeza, una línea central por el lomo, que se abre en dos en el dorso inferior, uniéndose nuevamente por arriba de la cloaca. Abdomen y flancos con plumitas blanquecinas ocráceas. Alas con cañones grises. Patas rosadas.

RARA *Phytotoma rara*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
28-11-88	Arroyo La Fragua	2 huevos (*)	Arbusto (*Berberis sp*.)	1,50
21-11-98	Arroyo La Fragua	1 huevo	Arbusto	1,70

(*). Nido localizado por Anibal E. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o asentado en ramas de árboles. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza de palitos externamente, raicillas y cerdas internamente.

Medidas :

Diámetro total : 19 cm.

Diámetro interno : 8 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 8 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas castañas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 24,4 a 24,8 x 18,7 a 19,3 X= 24,6 x 19 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,270 X= 0,270 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
670	28-11-88	Arroyo La Fragua	24,6 x 18,7	0,270
			24,8 x 19,3	0,270
700	21-11-98	Arroyo La Fragua	24,4 x 18,7	0,270

FAMILIA: TITYRIDAE


TUERÉ CHICO *Tityra inquisitor*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-11-72	Puerto Zapallar	En construcción	Hueco en árbol	10,00



REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación. En huecos en árboles. Altos. En el nido localizado un ejemplar llevaba hojas.

TUERÉ GRANDE *Tityra cayana*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-11-08	Eva Perón (*)	3 huevos	Hueco en Guayacán	6,00

(*) Localizado por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles. Altos.

Características.

Oculto. Base acolchada con hojas.

Medidas del hueco:

Diámetro total : de 12 a 15 cm.

Profundidad : 25 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color ocre brillante con manchas y rayitas ocre oscuro y rojizo..

Medidas :


De 22 a 22, x 28,5 x 30 X= 29,0 x 22,1 (N= 3)

TIJERILLA *Xenopsaris albinucha*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 64



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
04-11-76	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
25-11-76	Esperanza	3 pichones	Curupí	5,00
02-12-89	Cayastá	No observado	Gravilea	10,00
06-11-90	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
30-11-90	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,30
15-12-90	Cayastacito	No observado	Seibo	7,00
18-11-91	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
26-11-91	Villa Roda	En construcción	Chañar	6,00
26-11-91	Villa Roda	3 pichones	Chañar	6,50
05-12-93	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
08-12-93	Esperanza	2 pichones	Chañar	6,00
18-12-93	Esperanza	No observado	Curupí	8,00
25-10-94	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
09-11-94	Esperanza	En construcción	Algarrobo	6,00
27-11-94	Esperanza	1 pichón	Chañar	4,30
06-12-94	Rincón de Ávila	En construcción	Chañar	4,00
30-12-94	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
21-10-95	Rincón de Ávila	En construcción	Chañar	3,50
24-11-95	Rincón de Ávila	1 huevo	Chañar	4,70
01-12-96	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,60
15-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
19-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
19-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
24-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,40
24-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,60
25-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,80
25-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
29-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70
07-11-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	6,00
09-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
30-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
07-12-98	Esperanza	En construcción	Chañar	5,00
03-01-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	6,00
09-01-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,30
17-10-99	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
30-10-99	Esperanza	No observado	Chañar	5,30
30-10-99	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,50
01-12-99	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30
16-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
19-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	6,50
03-11-00	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
07-11-00	Esperanza	No observado	Curupí	4,70
27-12-00	Esperanza	No observado	Chañar	6,40
11-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
27-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	6,80
07-11-01	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
07-11-01	Esperanza	No observado	Chañar	4,60
11-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	6,70
11-11-01	Esperanza	3 pichones	Chañar	4,20
15-12-01	Esperanza	No observado	Chañar	4,50

14-01-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	4,50
05-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,30
18-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
07-11-02	Esperanza	No observado	Chañar	5,60
03-12-02	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
02-11-03	Esperanza	En construcción	Chañar	5,80
15-12-03	Esperanza	3 pichones	Chañar	6,50
25-11-04	Esperanza	2 pichones	Chañar	7,00
04-10-09	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
05-11-12	Villa Roda	3 huevos	Chañar	5,00
05-11-12	Villa Roda	3 huevos	Chañar	5,50
08-11-12	Villa Roda	3 huevos	Curupí	3,80
14-12-12	Villa Roda	En construcción	Chañar	7,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3									21	25	15

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 13 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	16 a 17 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido, suspendido o atado en ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura abierta, semiesférica de fibras entrelazadas, a veces en forma laxa, liadas con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : de 5 a 7 cm.
Diámetro interno : de 4,5 a 6 cm.
Profundidad : de 1,5 a 3,5 cm.
Alto : de 3 a 4 cm.

Altura.

Nido más bajo : 3,50 m.
Nido más alto : 10,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	57	Grevilea	1
Curupí	4	Seibo	1
Algarrobo	1		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 14,6 a 16,9 x 11,3 a 12,9 X= 15,4 x 12,2 (N= 9)
Peso lleno : de 1,25 a 1,30 X= 1,27 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,068 a 0,072 X= 0,069 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	25-10-70	Esperanza	16,0 x 12,8 16,9 x 12,9		

375	04-11-76	Esperanza	14,6 x 12,0		0,068
			14,8 x 12,0		0,069
			15,0 x 12,2		0,072
750	06-11-90	Esperanza	15,9 x 12,5	1,250	0,070
			16,0 x 12,5	1,280	0,070
			16,2 x 12,3	1,300	0,072
915	30-10-99	Esperanza	15,0 x 11,3		0,068

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura, con plumón blanquecino-grisáceo. Comisura amarilla. Cavidad bucal, lengua y paladar rosados.

6 días. Ojos abiertos. Pico oscuro. Piel dorsal oscura. Ventral más clara. Cañones con láminas castañas. Plumas ventrales blanquecinas. Cañones de la cola con lámina ocrácea.

8 días. Piel pardo grisácea. Comisura amarillenta. Plumón blanquecino. Collar nucal blanco. Ventral blanquecino. Láminas de las plumas alares ocre-castaño.

15 días. Corona negra salpicada de castaño. Collar dorsal, blanco. Dorsalmente banda o barras pardas y castañas. Ventralmente blanco con los flancos amarillentos.

Alas pardas con las plumas ribeteadas de ocre-castaño.

Cuidados. Una semana antes de abandonar el nido, cuando traían la comida, el que llegaba al nido daba de comer y se echaba sobre los pichones y el otro se iba en busca de alimento. Así se turnaban con viajes que demoraban entre 5 a 11 minutos.

Levantan la cola y defecan fuera del nido. Se los ve a estos cubiertos de materias fecales.

Alimentación. Los alimentan con gusanitos,larvas y tucuras. A veces los buscan entre los pastos en el suelo o se alejan hasta un radio de hasta 40 m.

OBSERVACIONES

Durante el cortejo, el macho corre a la hembra por la copa de los árboles. Los dos entreabren las alas y emiten un silbido. Por momentos uno paraba y el otro atacaba y cayeron al suelo.

Cuando los machos delimitan el territorio, se tiran picotazos, uno entreabría las alas y la cola, y ambos encrespaban las plumas de la cabeza. Estuvieron 3-4 minutos, en la copa de un Aromo, hasta que uno lo corrió.

Emite una voz suave en el nido. En días anteriores cuando me aproximaba al nido estaban muy agresivos. Atacaban, abrían las alas y la cola.

ANAMBÉ VERDOSO *Pachyramphus viridis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 6



	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-11-79	Río Leyes	1 huevo	Curupí	4,00
18-11-86	Esperanza	1 huevo	Pino	18,00
04-11-89	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,80
13-12-91	Malabrigo	En construcción	Quebracho colorado	9,00
14-10-98	Esperanza	En construcción	Curupí	6,00
15-10-01	Capioví	4 huevos	Árbol	5,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									2	3	1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeado. Construido con tallos de yuyos, gramillas, líquenes. Boca pequeña, disimulada, en la parte superior y lateral.

Medidas :

Ancho : de 18 a 20 cm.

Alto : de 25 a 30 cm.

Largo antero-posterior : 20 cm.

Diámetro interno de la cámara : de 6 a 8,5 cm.

Diámetro de la boca : de 3,5 a 5 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color ocres con finas pintas y líneas pardas. A veces formando una corona en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,9 a 21,5 x 14,7 a 16 X= 20,3 x 15,2 (N= 9)

Peso lleno : de 2,1 a 2,3 X= 2,2 (N= 3)

Peso de las cáscaras: de 0,122 a 0,149 X= 0,131 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
	25-11-79	Río Leyes	21,5 x 15,7		0,149
658	18-11-86	Esperanza	20,6 x 14,6		0,130
494	04-11-89	Esperanza	19,8 x 14,5	2,1	0,122
			19,9 x 14,5	2,2	0,125
			20,9 x 14,7	2,3	0,130
	15-10-01	Capioví	20,2 x 15,4		
			20,3 x 15,7		
			20,4 x 16,0		
			20,4 x 16,0		


ANAMBÉ CASTAÑO *Pachyramphus castaneus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	Sin postura	Árbol	5,00



REPRODUCCIÓN

NIDO

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Redondeaco con entrada lateral superior. Es construido con fibras vegetales.


Medidas :

Ancho : 24 cm.
Alto : 24 cm.
Diámetro de la boca : 3,5 cm.
Diámetro de la cámara : 8 cm.

ANAMBÉ COMÚN *Pachyramphus polychopterus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N	N	N



Total de nidos : 18

Fecha	Lugar	Contenido de los nidos	Ubicación	Altura
11-12-77	Esperanza	1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	4,00
22-12-77	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	4,50
03-12-81	Cayastá	3 huevos	Aromo	4,50
20-01-82	Esperanza	1 pichón	Quebracho blanco	4,00
20-01-83	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
23-10-87	Cayastá	2 pichones	Tipa blanca	12,00
25-11-88	Cayastá	1 huevo	Curupí	5,00
08-11-89	Los Amores	No observado	Quebracho colorado	7,50
02-12-89	Cayastá	En construcción	Curupí	4,50
13-12-91	Malabrigo	No observado	Quebracho colorado	9,50
18-12-93	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	7,50
30-11-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	5,80
15-01-99	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
03-02-99	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,30
09-02-00	Esperanza	2 pichones	Curupí	5,00
17-11-01	Esperanza	En construcción	Curupí	4,30
15-12-03	Esperanza	En construcción	Curupí	5,70
04-12-04	Esperanza	3 huevos	Acacia negra	3,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	2								1	4	8

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
18 a 21 días	Pone en días corridos	18 días	21 a 22 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado.Globular o redondeado, de fibras vegetales, hojas, plásticos, hilos, materiales algodonosos. Boca pequeña disimulada, en la parte lateral-superior.

Desprolijo por fuera. Aparenta ser más grande de lo que es en realidad, en la interna.

Medidas :

Ancho : de 17 a 20 cm.
Alto : de 22 a 27 cm.
Diámetro de la boca : de 3 a 5 cm.
Diámetro de la cámara : de 8 a 9 cm.

Altura.

Nido más bajo : 3,00 m.
Nido más alto : 12,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	5	Acacia negra	2
Curupí	5	Tipa blanca	1
Quebracho blanco	2	Aromo	1
Quebracho colorado	2		

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco crema, ocre o grisáceo, con manchitas y rayitas pardas, en algunos más concentrados en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21 a 23,6 x 14,7 a 16,3 X= 21,2 x 16,0 (N= 13)
Peso lleno : de 2,78 a 3,2 X= 3,0 (N= 6)
Peso de las cáscaras : de 0,100 a 0,179 X= 0,143 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
377	22-12-77	Esperanza	22,5 x 16,0		0,168
			23,3 x 16,0		0,171
			23,6 x 15,8		0,179
378	03-12-81	Cayastá	21,0 x 14,7		0,143
			21,8 x 15,3		0,146
			21,9 x 15,4		0,159
602	20-01-83	Esperanza	21,3 x 15,9	2,78	0,100
			21,4 x 16,3	2,95	0,105
			21,4 x 16,3	3,00	0,122
376	25-11-88	Cayastá	21,5 x 15,7		0,149
	04-12-04	Esperanza	22,0 x 17,0	3,2	
			22,5 x 16,0	3,0	
			23,2 x 16,2	3,2	

PICHONES

Descripción. Nace implume. Ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal y lengua, naranjas. Piel naranja.

Permanece implume y con los ojos cerrados hasta los 8-9 días.

8º día. Apenas se ven las vainas en dorsal. Comisura amarillenta.

9º día. Abre los ojos.

10º día. Vainas ventrales blancas. Resto grises.

11º día. Ventral ocráceo-blanquecino. Láminas de las cubiertas alares canela.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,2	0,6	1,0	-	-	-	-	-	3,6
2	0,3	0,8	1,2	-	-	-	-	-	4,2
3	0,5	1,1	1,4	-	-	-	-	-	4,9
4	0,5	1,2	1,6	-	-	-	-	-	6,1-6,5
5	0,5-0,6	1,3	1,7-1,9	-	-	-	-	-	7,2-8,0
6	0,6	1,4-1,5	1,8-1,9	-	-	-	-	-	8,0-9,2
7	0,6	1,6	2,0	-	-	-	-	-	11,0
8	0,6	1,6	2,2	0,2	-	0,2	-	-	13,3
9	0,7	1,8	2,4	0,6	-	0,6	-	-	16,2
10	0,7	2,1	2,7	1,0	-	1,0	-	0,6	19,3
11	0,7	2,1	2,7	1,3	-	1,0	-	0,8	21,5
12	0,7	2,2	2,8	1,5	0,3	1,0	0,6	1,0	23,4

OBSERVACIONES

Los nidos del 15-01-99, del 09-02-00 y 04-12-04, en Esperanza, estaban a 0,70 m. ,1,50 m. y 0,80 m. de un avispero. (lechiguanas).

En los nidos con pichones, las materias fecales de los mismos, se van depositando en la parte externa de la boca.


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

FAMILIA: VIREONIDAE

JUAN CHIVIRO *Cyclarhis gujanensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-11-91	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	6,50
09-10-93	Esperanza	En construcción	Chañar	5,50
09-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	6,00
28-10-99	Esperanza	3 pichones	Quebracho blanco	4,00
21-09-04	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	7,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza colgante, atada a ramas. Emplea en la construcción fibras vegetales. Externamente líquenes, claveles del aire, ootecas, liadas con telas de arañas. Internamente raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 7 a 8 cm.

Diámetro interno : de 6,5 a 7 cm.

Profundidad : de 5,5 a 6,5 cm.

Alto : 8 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales, alargados. De color blanco con pintas castañas y algunas grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 23,5 a 23,7 x 16,9 X= 23,6 x 16,9 (N= 2)

Peso lleno : de 3,1 a 3,2 X= 3,15 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,200 X= 0,200 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
810	22-11-91	Esperanza	23,5 x 16,9	3,1	0,200
			23,7 x 16,9	3,2	0,200

CHIVÍ COMÚN *Vireo olivaceus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-11-72	La Camila	2 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Garabato	3,00
25-11-78	Cayastá	1 huevo, 1 pichón y 1 huevo de *Molothrus bonariensis*	Ombú	1,50
31-10-82	Cayastá	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Seibo	4,50
04-12-88	Cayastá	En construcción	Tala	2,20
04-12-88	Cayastá	No observado	Timbó	5,50
22-01-01	Santa Fe	No observado	Sauce	4,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza colgante, atada a ramas. Emplea en la construcción fibras vegetales entrelazadas. Externamente líquenes, liados con telas de arañas. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 7 cm.

Diámetro interno : de 4,5 a 5,5 cm.

Profundidad : de 3,5 a 6,5 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con finas pintas castañas, algunos con líneas oscuras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,4 a 19 x 13,1 a 14,4 X= 18,7 x 13,8 (N= 4)

Peso lleno : de 1,189 a 1,346 X= 1,226 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,084 a 0,110 X= 0,096 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
485	05-11-72	La Camila	19,0 x 14,0		0,106
			19,0 x 14,4		0,110
591	31-10-82	Cayastá	18,4 x 13,1	1,189	0,084
			18,5 x 13,7	1,346	0,084

OBSERVACIONES


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

FAMILIA: CORVIDAE

URRACA COMÚN *Cyanocorax chrysops*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
28-11-95	Villa Guillermina	3 huevos	Espina corona	7,50
11-12-02	Bonpland	En construcción	Árbol	12,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de palitos. Internamente pajitas.

Medidas :

Diámetro total : de 20 a 25 cm.

Diámetro interno : 9 cm.

Profundidad : 6 cm.

Alto : 10 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color ocre con pintas y manchas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie y formando corona en el polo mayor

Medidas y pesos :

De 34,2 a 35,5 x 23 a 23,5 X= 34,8 x 23,2 (N= 3)

Peso lleno : de 9,2 a 9,8 X= 9,5 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,600 a 0,610 X= 0,603 (N= 3)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
860	28-11-95	Villa Guillermina	34,2 x 23,0	9,2	0,600
			34,8 x 23,2	9,5	0,600
			35,5 x 23,5	9,8	0,610

OBSERVACIONES

En el nido del 11-12-02, en Bonpland, cuatro ejemplares intervenían en la construcción del nido.

FAMILIA: HIRUNDINIDAE

GOLONDRINA BARRANQUERA *Pygochelidon cyanoleuca*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-10-72	María Luisa	5 huevos	Cueva en barranca	1,70
05-12-77	Quebrada de Escoipe	No observado	Grieta en roca	10,00
06-12-81	Los Gigantes	3 pichones	Cueva en barranca	0,35
06-12-81	Los Gigantes	No observado	Cueva en barranca	1,35
12-01-82	Villavicencio	Pichones	Cueva en barranca	1,50
28-11-82	Los Gigantes	1 huevos y 2 pichones	Cueva en barranca	0,40
02-12-94	Villa Roda	No observado	Hueco en ladrillo	3,20
17-12-99	El Alamito	No observados (*)	Cueva en barranca	6,00

(*). Varios nidos en cuevas en la barranca de un río seco.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Huecos, grietas, cuevas, en barrancas, rocas, ladrillos en construcciones. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Plataforma de pajas y plumas.

Medidas :

Diámetro total : 9 cm.
Profundidad : 3,5 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 5 huevos.

Ovoidales, alargados. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 17,7 a 20,7 x 12,3 a 13,4 X= 18,7 x 12,9 (N= 6)
Peso lleno : 1,235 X= 1,235 (N= 1)
Peso de las cáscaras : 0,072 a 0,089 X= 0,084 (N= 6)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
458	13-10-72	María Luisa	18,5 x 13,0		0,072
			17,7 x 12,9		0,078
			18,0 x 12,7		0,079
			18,7 x 13,4		0,082
			18,9 x 13,4		0,085
596	28-11-82	Los Gigantes	20,7 x 12,3	1,235	0,089

GOLONDRINA DE CABEZA ROJIZA *Alopochelidon fucata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-10-72	María Luisa	3 pichones	Hueco en barranca	2,00
16-11-72	San Cristóbal	5 pichones	Hueco en barranca	1,90
10-10-79	María Luisa	Pichones	Hueco en barranca	2,00
10-10-79	María Luisa	Pichones	Hueco en barranca	2,00
10-10-79	María Luisa	En construcción	Hueco en barranca	2,00
25-10-81	María Luisa	6 huevos	Hueco en barranca	1,70
15-11-81	Cayastá	4 huevos	Hueco en barranca	1,50
02-11-90	Morteros	No observado	Hueco en barranca	2,00
02-12-94	Villa Roda	No observado	En ladrillo hueco	2,70
02-12-94	Villa Roda	No observado	En ladrillo hueco	2,70
15-10-96	Villa Roda	No observado	Entre tirante y techo	2,70
05-09-98	Villa Roda	5 huevos	En ladrillo hueco	2,70

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, en barrancas (de excavaciones, ríos, erosiones), en ladrillos, entretechos, caños.

A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o taza de pajas,hojas y plumas.

Demora en la construcción de 10 a 12 días..

Medidas :

La base del nido tiene la forma del lugar que lo contiene. Puede medir de 20 a 50 cm. de largo y un ancho de 7 a 10 cm.

Diámetro interno : de 5 a 6 cm.

Profundidad : de 0,5 a 3 cm.

Alto : de 5 a 6 cm.

Altura.

Nido más bajo a 1,50 m.

Nido más alto a 2,70 m.

HUEVOS

Pone de 5 a 6 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 16,4 a 17,8 x 12,8 a 13,7 X= 17,2 x 13,3 (N= 13)

Peso lleno: X= 1,5 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,067 a 0,076 X= 0,071 (N= 13)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
459	25-10-81	María Luisa	17,1 x 13,5		0,067
			17,1 x 13,5		0,069
			17,2 x 13,5		0,070
			17,3 x 13,8		0,070
			17,5 x 13,7		0,071
			17,8 x 13,3		0,075
460	15-11-81	Cayastá	16,4 x 13,4		0,073
			17,0 x 13,4		0,073

			17,3 x 13,4		0,075
			17,4 x 13,6		0,076
877	05-09-98	Villa Roda	16,8 x 12,8	1,5	0,070
			17,6 x 12,8	1,5	0,070
			17,7 x 12,8	1,5	0,070

GOLONDRINA RIBEREÑA *Stelgidopteryx ruficollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-10-75	Guayquiraró	4 huevos	Cueva en barranca	3,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Hueco en barrancas. A mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tapiza la cámara con pajas y plumas.

Medidas :

Diámetro : 8 cm.

Profundidad : 2,5 cm.

Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone de 4 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18 a 19,2 x 13 a 13,4 X= 18,4 x 13,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,079 a 0,083 X= 0,080 (N= 4)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
461	27-10-75	Guayquiraró	18,0 x 13,0	0,079
			18,5 x 13,3	0,080
			18,0 x 13,2	0,081
			19,2 x 13,4	0,083

GOLONDRINA PARDA *Progne tapera*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Total de nidos : 18

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-12-71	Laguna del Palmar	Sin postura	En nido de *F. rufus*	3,45
21-01-78	Campo Andino	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	En nido de *F. rufus*	4,00
21-01-78	Campo Andino	3 huevos	En nido de *F. rufus*	3,80
21-01-78	Campo Andino	Sin postura	En nido de *F. rufus*	3,20
21-01-78	Campo Andino	3 pichones	En nido de *F. rufus*	3,40
21-01-78	Campo Andino	3 pichones	En nido de *F. rufus*	3,60
23-12-81	San Javier	3 huevos	En nido de *F. rufus*	3,30
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	4 huevos	En nido de *F. rufus*	4,20
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	No observado	En nido de *F. rufus*	4,60
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	No observado	En nido de *F. rufus*	4,00
16-01-91	Providencia	No observado	En nido de *F. rufus*	3,80
18-01-91	Laguna del Platero	1 huevo	En nido de *F. rufus*	1,50
13-11-91	Lucas Sur	En construcción	En nido de *F. rufus*	4,50
20-11-91	Don Cristóbal	No observado	En nido de *F. rufus*	4,50
20-01-99	La Camila	En construcción	En nido de *F. rufus*	10,00
18-01-01	Concordia	Pichones	En nido de *F. rufus*	3,80
25-11-02	Esperanza	No observado	En nido de *F. rufus*	3,80
18-02-07	Jesús María	Pichones	En nido de *F. rufus*	7,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9	1									3	5

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En nidos abandonados de Hornero (*Furnarius rufus*). Raro en huecos. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tapiza la cámara con pajitas y plumas.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales, alargados. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 24,5 x 14,9 a 17 X= 23,6 x 16,4 (N= 13)

Peso lleno : de 3,3 a 3,4 X= 3,35 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,159 a 0,190 X= 0,162 (N= 13)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
453	21-01-78	Campo Andino	23,2 x 16,5		0,176
			23,7 x 17,0		0,185
			24,5 x 16,8		0,190
454	21-01-78	Campo Andino	23,5 x 16,0		0,170
			23,7 x 16,3		0,181
			23,7 x 16,3		0,182
455	23-12-81	San Javier	21,5 x 14,9		0,159
			22,4 x 16,7		0,167
			23,6 x 16,2		0,171
767	08-12-90	Cacique Ariacaiquín	23,0 x 16,7	3,3	0,145
			24,0 x 16,1	3,3	0,145
			24,3 x 16,6	3,4	0,150
			24,7 x 16,4	3,4	0,150

GOLONDRINA DOMÉSTICA *Progne chalybea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 22

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-10-81	El Cerro (1)	No observados	Cuevas en barranca	15,00
07-11-81	Cacique Ariacaiquín	5 huevos	Hueco un puente	4,00
06-12-91	Alcaraz Sur	No observado	Hueco en pared	2,80
02-12-94	Villa Roda	Pichones	Ladrillo hueco	3,20
02-12-94	Villa Roda	Pichones	Ladrillo hueco	3,20
19-09-98	Villa Roda	En construcción	Ladrillo hueco	3,20
28-09-98	Villa Roda	En construcción	Caño	3,20
28-09-98	Villa Roda	En construcción	Caño	3,20
15-10-98	Villa Roda	En construcción	Caño	3,20
15-12-00	Villa Roda	Pichones	Ladrillo hueco	3,20
19-11-00	Villa Roda	En construcción	Ladrillo hueco	3,20
22-11-00	Villa Roda	En construcción	Caño	2,70
07-12-01	Villa Roda	1 huevo	Ladrillo hueco	3,20
07-12-01	Villa Roda	4 huevos	Ladrillo hueco	3,20
10-12-01	Villa Roda	5 huevos	Tirante de galería	3,30
18-12-01	Villa Roda	4 huevos	Caño	3,20
11-10-04	Villa Roda	2 huevos	Ladrillo hueco	3,50
17-11-04	Villa Roda	5 huevos	Caño	3,50
17-11-04	Villa Roda	5 huevos	Caño	3,50
22-11-05	Villa Roda	2 huevos	Caño	3,50
22-11-05	Villa Roda	4 huevos	Caño	3,50
22-11-05	Villa Roda	4 huevos	Caño	3,50

(1). Muchos nidos en la barranca del río Paraná.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								3	3	8	8

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
20 a 26 días	Pone en días corridos	16 días	20 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en barrancas, parantes, huecos en tejas, techos, construcciones o en caños. A mediana altura y altos.

Características.

Oculto o expuesto. Elaborado. Taza de pajas, hojas y/o plumas. Coloca barro en la base de la entrada.

Medidas :

Diámetro total : de 15 a 20 cm.

Diámetro interno : de 10 a 13 cm.

Profundidad : de 2 a 10 cm.
Alto : de 8 a 10 cm.

Altura.
Nido más bajo : 2,70 m.
Nido más alto : 15,00 m.

HUEVOS

Pone de 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 22,7 a 26,0 x 15,5 a 17,4 X= 24,0 x 16,0 (N= 22)
Peso lleno : de 2,4 a 3,2 X= 2,7 (N= 17)
Peso de las cáscaras: 0,190 a 0,227 X= 0,207 (N=10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
456			24,5 x 17,4		0,217
			24,9 x 16,8		0,215
			24,3 x 17,0		0,227
			24,8 x 16,9		0,215
			24,4 x 16,8		0,213
929			24,0 x 15,5	2,8	0,190
			23,6 x 16,0	2,8	0,190
			23,7 x 16,2	2,8	0,200
			23,8 x 16,3	2,6	0,210
			23,8 x 16,0	2,6	0,210
	11-10-04	Villa Roda	25,0 x 16,0	2,4	
			25,0 x 16,0	2,5	
	17-11-04	Villa Roda	22,7 x 15,0	2,6	
			22,7 x 15,0	3,0	
			22,7 x 15,5	2,7	
			22,7 x 15,5	2,7	
			23,0 x 15,5	2,7	
	17-11-04	Villa Roda	24,4 x 16,0	3,0	
			24,8 x 16,2	3,1	
			24,8 x 16,0	3,0	
			25,0 x 16,0	3,1	
			26,0 x 16,6	3,2	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Implumes. Comisura blaquecina. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja claro.
5 días. Ojos entreabiertos.
6 días. Piel desnuda, apenas se notan vainas.
7 días. Abren los ojos.
9 días. Cañones de las plumas de la cola con pequeña lámina. Alas con cañones. Plumón pardo oscuro en los lados del dorso.
10 días. Abriendo las láminas de las plumas del cuerpo.
12 días. Plumas blancas ventralmente. Láminas de las plumas alares oscuras.
15 días. Las láminas de las plumas alares y de la cola desarrolladas.
Lados del pecho con plumas blanquecinas y parduscas.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,4-0,5	0,8-0,9	1,1-1,2	-	-	-	-	-	2,9-4,2
2	0,5	1,0	1,3-1,4	-	-	-	-	-	3,5-7,5
3	0,5	1,2	1,6-1,8	-	-	-	-	-	5,1-11,6
4	0,5	1,1-1,3	1,8-2,0	-	-	-	-	-	8,0-13,0
5	0,6	1,4	2,0-2,1	-	-	-	-	-	12,0-16,2
6	0,7	1,5	2,3	-	-	-	-	-	14,5-21,0
7	0,7	1,6	2,7	-	-	-	-	-	18,5-26,0
8	0,8	1,9	3,0	0,2	-	0,2	-	0,1	22,0-32,0
9	0,9	1,9	3,1	0,5	-	0,4	-	0,2	30,0-38,0
10	1,0	2,0	3,3	1,0	-	0,6-0,7	-	0,4	32,0-43,2
11	1,0	2,1	3,4	1,5	-	1,0	-	0,7	33,0-45,0
12	1,0	2,0-2,2	3,6	2,1	0,2	1,3-1,4	0,2	1,0	35,0-47,0
13	1,0	2,2	3,6	2,1	0,6	1,4	0,5	1,2	42,0-47,0
14	1,0	2,2	3,6	2,0	1,0	1,5	0,7	1,4	43,0-47,0
15	1,0	2,2	3,6	2,0	1,5	1,6	1,1	2,0	45,0-48,0
16	1,0	2,2	3,7	2,0	2,0	1,8	1,5	2,5	46,0-50,0
17	1,0	2,2	3,7	2,1	2,3	1,8	1,7	2,6	46,0-50,0
18	1,0	2,2	3,7	2,1	2,6	1,7	1,8	2,8	48,0-50,0
19	1,0	2,3	3,7	2,1	3,0	1,7	2,0	3,1	50,0
20	1,0	2,3	3,7	2,1	3,3	1,5	2,4	3,4	50,0
21	1,0	2,3	3,7	2,1	3,6	1,3	2,8	3,6	50,0

OBSERVACIONES

En algunos nidos no colocan plumas y en otros las hojas eran de Eucaliptus. La base de los nidos toman la forma del lugar que los contienen. Una midió hasta 70 cm. de largo. (en un caño).


GOLONDRINA NEGRA *Progne elegans*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 15

Total de colonias : 4



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-01-79	Santa Rosa de Calamuchita	Pichones (1)	Huecos en techo	4,20
20-11-81	Santa Rosa de Calamuchita	3 huevos	Hueco en techo	5,40
27-11-82	Pampa de Achala	No observados (2)	Caños	3,00 a 5,00
25-11-90	Copina	Sin postura	Repisa rocosa	2,20
25-11-90	Copina	Sin postura	Hueco en barranca	2,20
05-12-96	Villa Roda	Pichones	Hueco en ladrillo	3,20
05-12-96	Villa Roda	Pichones	Hueco en ladrillo	3,20
19-11-97	Merlo	En construcción (3)	Huecos en edificio	8,00 a 9,00
19-01-00	La Falda	No observados (4)	Huecos en edificio	6,00 a 8,00

27-11-00	Puerto Madryn	No observado	Hueco en acantilado	14,00
19-11-01	Villa Roda	No observado	Hueco en ladrillo	3,20
29-11-03	Wildermuth	No observado	Hueco en techo	5,00
12-12-03	Cayastá	En construcción	Tirante en galería	3,30
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	9,00
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	9,00
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	9,00
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	9,00
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	9,00
15-11-05	Ascochinga	No observado	Hueco en roca	2,00

(1). Varios nidos con 3 pichones cada uno.
(2). Varios nidos en caños en un paredón.
(3). Muchos nidos.
(4). Muchos nidos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en barrancas, en caños o en edificios. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza de pajas y barro. Internamente plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 16 cm.

Diámetro interno : de 6 a 7 cm.

Profundidad : 6 cm.

Alto : 5,5cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales, alargados. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 22,5 a 25,7 x 14,7 a 14,8 X= 24,2 x 14,7 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,149 a 0,162 X= 0,160 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
457	20-11-81	Santa Rosa de Calamuchita	22,5 x 14,7	0,149
			24,3 x 14,7	0,162
			25,7 x 14,8	0,160

OBSERVACIONES

A veces tienen colonias en común con *Progne chlaybea*


GOLONDRINA ALA BLANCA *Tachycineta albiventer*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	2 huevos	En un caño	6,50



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.
En huecos de árboles, caños. Altos.
Características.
Oculto. Elaborado. Taza de pastos y plumas.

Medidas :
Diámetro total : de 10 a 20 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 3 cm.
Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.
Ovoidales. De color blanco.
Medidas y pesos :
De 18,9 a 19,3 x 13,3 a 13,7 X= 19,1 x 13,5 (N= 2)
Peso de las cáscaras : 0,084 a 0,091 X= 0,087 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
449	12-10-81	Puerto Iguazú	18,9 x 13,3	0,084
			19,3 x 13,7	0,091

GOLONDRINA CEJA BLANCA *Tachycineta leucorrhoa*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N					N	N	N	N

Total de nidos : 40



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-70	Río Leyes	4 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	4,50
11-04-74	Jacinto Arauz	5 huevos	Cueva en barranca	1,50
04-10-79	Esperanza	5 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	3,50
07-11-81	Cacique Ariacaiquín	3 pichones	Hueco en un puente	3,20
24-11-83	Aguará	4 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	3,40
18-10-86	Llambi Campbell	4 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	1,50
02-11-90	Morteros	5 pichones	En nido de *Colaptes sp*.	1,00
02-11-90	Morteros	5 pichones	En nido de *Colaptes sp*.	1,60
07-11-90	Morteros	3 pichones (muertos)	Hueco en árbol seco	2,80
07-11-90	Morteros	En construcción	En nido de *Colaptes sp*.	2,00
07-11-90	Morteros	2 pichones	Hueco en árbol seco	2,00
19-12-90	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	2,50
15-11-94	Villa Roda	3 pichones	Hueco en Eucaliptus	1,00
02-12-94	Villa Roda	No observado	Hueco en Cina-cina	1,40
21-12-94	Esperanza	Pichones	Hueco en Cina-cina	0,70
25-11-95	Esperanza	4 pichones	Hueco en árbol	0,50
20-10-99	Esperanza	4 huevos	En nido de *Colaptes sp.*	1,00
14-11-99	Esperanza	4 huevos	En caja-nido	5,00
18-09-00	Esperanza	En construcción	En caja-nido	3,30

03-11-00	Esperanza	5 huevos	En caja-nido	1,70
12-09-01	Esperanza	En construcción	En caja-nido	1,80
06-10-01	Esperanza	En construcción	En nido de *Colaptes sp.*	2,70
06-10-01	Esperanza	En construcción	En caño	1,00
06-10-01	Esperanza	1 huevo	En caja-nido	1,70
25-10-01	Esperanza	5 huevos	En caja-nido	1,70
19-11-01	Villa Roda	4 pichones	En caja-nido	3,20
19-11-01	Villa Roda	5 pichones	En caja-nido	3,50
19-11-01	Villa Roda	4 pichones	En caja-nido	4,00
04-12-01	Esperanza	1 huevo	En caja-nido	1,70
06-11-02	Esperanza	En construcción	En caño	1,00
19-11-02	Esperanza	5 huevos	En caja-nido	3,30
03-11-03	Esperanza	5 huevos	En caja nido	1,50
06-10-04	Esperanza	5 huevos	En nido de *Colaptes campestris*	0,50
29-10-04	Esperanza	5 pichones	En caja-nido	3,70
03-11-04	Esperanza	4 huevos	En caja nido	3,40
15-10-05	Esperanza	3 huevos	En caja nido	3,40
15-10-05	Esperanza	3 huevos	En caja nido	1,70
18-10-06	Esperanza	5 huevos	En caja nido	1,60
18-10-06	Esperanza	2 huevos	En caja nido	1,50
19-11-07	Esperanza	3 pichones	En caja nido	1,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			1					2	15	19	4

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12 a 19 días	Pone en días corridos	15 días	15 a 17 días

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos, en barrancas, en árboles, caños, parantes de puentes, en Cajas-nido, en nidos abandonados de otras aves, principalmente de Hornero (*Furnarius rufus*) o de Carpinteros (*Colaptes melanochloros* y *Colaptes campestris*). A baja y mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Forra la cámara con pastos y plumas.

Medidas :

Variables, de acuerdo a la ubicación.

Diámetro total : de 7 a 10 cm.

Profundidad : 6 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,50 m.

Nido más alto : 5,00 m.

Ubicación y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
En Caja-nido	19	En caños	2
En nido de *Colaptes sp*.	6	En cueva en barrancas	1
En huecos en árboles	6	Hueco en puente	1
En nido de *Furnarius rufus*	5		

HUEVOS

Pone de 3 a 5, a veces 6 huevos.

Ovoidales, alargados. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 19,0 a 22,3 x 13,5 a 15,2 X= 19,6 x 14,5 (N= 26)

Peso lleno : de 1,8 a 2,1 X= 1,9 (N= 9)

Peso de las cáscaras : 0,129 a 0,178 X= 0,138 (N= 13)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
450	12-10-70	Río Leyes	21,2 x 13,7		0,141
			21,6 x 14,0		0,150
			21,8 x 13,9		0,158
			22,3 x 14,2		0,178
451	04-10-79	Esperanza	19,4 x 14,6		0,129
			19,6 x 14,5		0,130
			19,9 x 14,6		0,133
			20,3 x 14,4		0,134
			20,6 x 14,4		0,136
642	18-10-86	Llambi Campbell	19,5 x 15,2		0,135
			20,0 x 15,0		0,135
			20,2 x 14,7		0,140
			20,2 x 14,9		0,140
			19,5 x 14,4		
			19,7 x 14,0		
			19,7 x 14,4		
	06-10-04	Esperanza	19,0 x 14,3	1,8	
			19,3 x 13,8	1,9	
			19,4 x 13,8	1,8	
			19,4 x 14,0	2,0	
			20,0 x 14,4	1,9	
	03-11-04	Esperanza	20,0 x 13,5	1,9	
			20,0 x 14,0	2,0	
			20,0 x 13,8	2,1	
			21,0 x 14,0	1,9	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel y patas rosadas. Escaso plumón. Comisura blanquecina. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Pico natural (córneo).

5 días. Ojos entreabiertos. Plumón gris claro. Empiezan a salir las vainas blanquecinos en los flancos y ventralmente. Pico con punta gris.

7 días. Ojos abiertos. Comisura amarilla. Cavidad bucal y paladar, naranjas. Dorsal del pico y patas, grises. Plumón grisáceo en dorsal. Ventral blanquecino. Rabadilla blanca.

10 días. Láminas abriendo en las alas y cola, negras. Garganta y lados del pecho, blancos. Parte central del pecho y abdomen, gris y blanco.

11 días. Comisura y borde del maxilar y de la mandíbula, amarillos. Parte dorsal del pico, negro. Cavidad bucal y paladar, naranjas.

14 días. Ojos marrones. Lorum blanquecino. Patas grises. Ventalmente blanquecino.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,5	0,9	1,5	-	-	-	-	-	3,0-4,5
2	0,5	1,1	1,6	-	-	-	-	-	3,8-5,6
3	0,6	1,2	1,7	-	-	-	-	-	4,8-7,3
4	0,6	1,2	1,8	-	-	-	-	-	6,5-8,8
5	0,6	1,3	2,0	-	-	-	-	-	8,7-11,8
6	0,6	1,4	2,2	-	-	-	-	-	12,4-15,3
7	0,6	1,5	2,4	0,9	-	0,7	0,2	0,2	14,4-18,6
8	0,7	1,5	2,5	1,0	-	0,8	0,3	0,4	16,5-19,0
9	0,7	1,5	2,5	1,1-1,6	0,1-0,2	0,9-1,0	0,4	0,7	17,0-21,2
10	0,7	1,5	2,5	1,4-1,7	0,4-0,6	1,0	0,5	0,9	18,4-22,5
11	0,7	1,5	2,5	1,6-1,8	0,6-0,8	1,0	0,7	1,0	20,2-24,0
12	0,7	1,5	2,5	1,8-1,9	0,8-1,0	1,0-1,1	0,8-1,0	1,1	22,3-26,1
13	0,7	1,5	2,5	1,8	1,2-1,5	1,1	1,1-1,2	1,4	23,0-26,1
14	0,7	1,5	2,5	1,8	1,8-1,9	1,1	1,3-1,4	1,7	23,5-26,2
15	0,7	1,5	2,5	1,8	2,0-2,3	1,1-1,2	1,5-1,6	2,0	24,1-26,2

GOLONDRINA PATAGÓNICA *Tachycineta meyeni*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-11-79	Río Turbio	5 huevos	Hueco en árbol	3,50
20-11-98	Confluencia	No observados (*)	Huecos en barranca	6,00

(*). Varios nidos.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles o en barrancas. A mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Tapiza la cámara con pajitas y plumas.

Medidas :

Variables, de acuerdo a la ubicación.

Diámetro total : 8 cm.

Profundidad : 8 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18 a 19 x 12,8 a 13,2 X= 18,5 x 13 (N= 5)


Peso de las cáscaras : 0,071 a 0,082 X= 0,074 (N= 5)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
452	09-11-79	Río Turbio	18,0 x 12,8	0,071
			18,2 x 13,0	0,072
			18,4 x 13,2	0,072
			18,7 x 12,8	0,076
			19,0 x 13,2	0,082

FAMILIA: TROGLODYTIDAE

RATONA COMÚN *Troglodytes musculus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 115

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Cayastacito	3 pichones	Tarro	3,60
15-11-70	Esperanza	4 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	3,00
05-10-71	Esperanza	No observado	Tirante	3,70
05-10-71	Esperanza	No observado	Hueco en tronco de árbol	2,00
05-10-71	Esperanza	No observado	Comedero de pollos	3,80
29-10-73	Esperanza	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Bebedero para pollo	2,50
14-12-75	Esperanza	3 pichones	Regadera	3,80
14-12-75	Esperanza	2 pichones	Bolsa llena de hilos	1,60
14-12-75	Esperanza	2 pichones	Caja de raticida	0,80
14-12-75	Esperanza	4 pichones	Caja con bulbos de Dalias	1,50
14-12-75	Esperanza	3 pichones	Carrocería de auto	0,70
14-12-75	Esperanza	3 pichones	Rueda de carro	0,80
15-10-77	Esperanza	7 huevos	Tarro	2,60
22-12-77	Esperanza	5 huevos	Tarro	2,60
06-12-81	Ascochinga	5 huevos	Cueva en barranca	1,60
11-11-88	Isla Garcerosa	Pichones	Hueco en una barranca	3,50
05-11-89	Esperanza	3 pichones	Carrocería de colectivo	1,30
03-10-90	Los Amores	Pichones	En nido de *Furnarius rufus*	4,50
02-11-90	Morteros	6 huevos	Caja nido	Suelo
07-11-90	Morteros	En construcción	Caja nido	1,60
07-11-90	Morteros	3 pichones	Caja nido	1,40
26-11-90	Va. Gral. Belgrano	Sin postura	Caja nido	2,30
04-12-90	Emilia	pichones	Caño de un puente	1,00
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	5 huevos	En nido de espinas	1,70
14-12-90	Empalme San Carlos	No observado	Carrocería de colectivo	2,00
14-12-90	Monte Vera	No observado	Carrocería de colectivo	2,80
24-10-91	Villa Ocampo	2 pichones	Autito de plástico	1,00
12-11-91	Cayastacito	No observado	En nido de espinas	4,30
13-11-91	Viale	No observado	Caño en puente	0,80
13-11-91	Las Tunas	No observado	Caño en puente	0,50
20-11-91	Don Cristóbal	Pichones	Hueco en un poste	0,90
20-11-91	Nogoyá	No observado	Caño en puente	1,00
22-11-91	Esperanza	Sin postura	Taza de rueda de auto	3,10
22-11-91	Esperanza	Sin postura	Hueco en una pared	2,80
18-11-91	Esperanza	En construcción	En nido de *Furnarius rufus*	3,00
27-11-91	Gdor. Echagüe	Pichones	En nido de *Furnarius rufus*	2,80

16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	3,50
18-11-93	Esperanza	4 huevos	En nido de *Picunnus cirratus*	1,55
04-12-93	Esperanza	3 pichones	Hueco en rama seca	1,70
10-12-93	Esperanza	4 huevos y 2 de *M. bonariensis*	En nido de *Colaptes sp*	1,80
20-11-94	Esperanza	4 pichones	Sombrero	2,00
20-11-94	Esperanza	5 huevos	Caja colocada sobre una mesa	1,10
20-11-94	Esperanza	5 huevos	Pata hueca de mesa	2,30
20-11-94	Esperanza	1 huevo	Bolsillo de un pantalón	1,70
20-11-94	Esperanza	Pichones	Tarro	2,70
22-11-94	Wildermuth	Pichones	Cráneo de vaca	2,70
06-01-95	Esperanza	4 huevos	Tarro	3,10
05-09-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,20
05-09-98	Esperanza	En construcción	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,50
05-09-98	Esperanza	En construcción	Caja nido	1,50
22-09-98	Esperanza	En construcción	Caja nido	3,50
30-09-98	Esperanza	En construcción	Caja nido	2,60
12-10-98	Esperanza	Sin postura	En nido de *Colaptes sp.*	1,75
13-10-98	Esperanza	Sin postura	Caja nido	2,00
13-10-98	Esperanza	4 huevos	En nido de *Picoides mixtus*	1,10
24-10-98	Esperanza	5 huevos	Hueco en árbol	1,10
24-10-98	Esperanza	No observado	En nido de espinas	2,20
29-10-98	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	4,00
29-10-98	Esperanza	Sin postura	En *Colaptes melanochloros*	1,40
30-10-98	Esperanza	En construcción	En *Colaptes melanochloros*	1,00
14-11-98	Esperanza	No observado	Caja nido	2,00
12-12-98	Esperanza	Pichones	En nido de *Picunnus cirratus*	1,10
21-12-98	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	3,10
24-12-99	Esperanza	3 huevos	En *Melanerpes captorum*	1,20
24-12-99	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,40
24-12-99	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,50
28-10-00	Esperanza	4 huevos	Caja nido	3,00
28-10-00	Esperanza	En construcción	Caja nido	2,10
07-11-00	Esperanza	5 huevos	Caja nido	3,40
07-11-00	Esperanza	6 huevos	Caja nido	2,70
09-11-00	San José del Rincón	4 pichones	Huevo de Ñandú roto	2,80
08-12-00	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,10
08-12-00	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,10
08-12-00	Esperanza	1 huevo	Caja nido	1,70
21-12-00	Esperanza	2 huevos	Caja nido	1,60
21-12-00	Esperanza	En construcción	Caja nido	2,00
24-10-01	Esperanza	5 huevos	Caja nido	2,30
25-10-01	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,50
25-10-01	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,50
25-10-01	Esperanza	2 huevos	Caja nido	2,00
25-10-01	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,90
30-10-01	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,80
30-10-01	Esperanza	2 huevos y 3 pichones	Caja nido	2,00
25-12-01	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,70
28-09-02	Esperanza	En construcción	Caja nido	3,40
03-10-02	Esperanza	En construcción	Caja nido	4,40
11-10-02	Esperanza	En construcción	Caja nido	1,40
25-10-02	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,90
25-10-02	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,90

25-10-02	Esperanza	No observado	Hueco en cactus	1,00
25-10-02	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	0,80
31-10-02	Esperanza	5 huevos	Caja nido	2,10
31-10-02	Esperanza	5 huevos	Caja nido	2,10
14-01-03	Esperanza	9 huevos	Hueco en tapa de un tanque	5,00
03-11-03	Esperanza	En construcción	Caja nido	1,60
03-11-03	Esperanza	4 pichones	Caja nido	1,60
05-11-03	Esperanza	2 huevos	Caja nido	1,50
14-11-03	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,60
22-11-03	Esperanza	2 huevos	Caja nido	1,60
22-11-03	Esperanza	2 huevos	Caja nido	1,50
06-10-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,60
06-10-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,80
21-10-04	Esperanza	6 huevos	Caja nido	1,50
30-10-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	3,70
15-11-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,70
15-11-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	2,20
15-11-04	Esperanza	5 huevos	En nido de *Furnaruis rufus*	1,60
18-10-06	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,60
20-11-07	Esperanza	5 pichones	Caja nido	2,80
20-11-07	Esperanza	5 pichones	Caja nido	1,70
25-09-08	Esperanza	En construcción	Caja nido	1,30
25-09-08	Esperanza	En construcción	Caja nido	1,40
09-10-08	Esperanza	No observado	En nido de *Furnaruis rufus*	5,40
30-10-08	Esperanza	5 pichones	Caja nido	1,70
30-09-12	Esperanza	En construcción	Caño nido	3,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2								9	41	38	25

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 12 días.	Pone en días corridos.	14 a 15 días	16 a 17 días.

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En recipientes, huecos en árboles (naturales o de carpinteros), en huecos en barrancas, caños, carrocerías, nidos abandoinados por otras aves, objetos diversos, cajas-nidos, caños-nidos.

A baja y mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Tieme forma de taza. Emplea en la construcción palitos, tallos, pajas, clavos, cortezas, hojas, hilos. Internamente cerdas, plumas.

Medidas :

Diámetro total : de 7 a 9 cm.

Diámetro interno : de 4,5 a 5 cm.

Profundidad : de de 2 a 4,5 cm.

Alto : de 8 a 10 cm., o más.

Diámetro de la base : de 22 a 28 cm. de largo por 10 a 12 cm. de ancho. Un nido tenía una plataforma de 30 x 40 cm.

Altura.

Nido más baja : en caja-nido en el suelo.

Nido más alto : 5,00 m.

HUEVOS

Pone 5, a veces de 6 a 9 huevos.

Ovoidales, alargados. De color rosado con pintas castañas distribuidas por toda la superficie. En algunos pardas formando una corona en el polo mayor o en el menor.

Medidas y pesos :

De 16,0 a 19,4 x 12,0 a 14,0 X= 17,0 x 13,4 (N= 61)

Peso lleno : de 1,1 a 1,6 X= 1,4 (N= 36)

Peso de las cáscaras : 0,089 a 0,100 X= 0,095 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
462	29-10-73	Esperanza	17,0 x 13,0		0,095
			17,4 x 12,8		0,097
			18,0 x 12,6		0,098
			18,0 x 12,9		0,100
463	22-12-77	Esperanza	16,4 x 12,8		0,089
			16,5 x 12,0		0,094
			16,5 x 12,2		0,096
			16,5 x 12,5		0,097
			17,0 x 12,8		0,099
464	06-12-81	Ascochinga	17,3 x 13,2		0,089
			17,5 x 13,0		0,092
			17,5 x 13,3		0,095
			17,8 x 13,4		0,098
			19,0 x 13,0		0,099
856	06-01-95	Esperanza	16,3 x 12,5		0,094
			16,6 x 12,8		0,094
			16,7 x 12,8		0,096
			17,2 x 12,8		0,096
	14-01-03	Esperanza	16,0 x 13,0		
			16,8 x 13,0		
			16,8 x 13,2		
			17,0 x 13,0		
			17,2 x 13,1		
			17,2 x 13,1		
			17,3 x 13,1		
			17,4 x 13,2		
			17,5 x 13,1		
	06-10-04	Esperanza	17,7 x 12,0	1,3	
			17,7 x 12,5	1,3	
			18,3 x 12,7	1,5	
			18,3 x 13,0	1,5	
			19,4 x 12,5	1,6	
	06-10-04	Esperanza	16,0 x 12,7	1,2	
			16,0 x 13,0	1,3	
			16,0 x 13,0	1,3	
			16,6 x 13,0	1,3	
			17,0 x 13,3	1,4	
	21-10-04	Esperanza	16,6 x 12,0	1,3	
			17,0 x 13,0	1,4	
			17,0 x 12,7	1,5	
			17,0 x 13,0	1,5	

		17,0 x 13,3	1,3
		17,7 x 13,0	1,4
30-10-04	Esperanza	17,7 x 13,0	1,2
		17,7 x 13,0	1,3
		17,8 x 13,0	1,4
		18,0 x 13,0	1,4
		18,3 x 13,3	1,4
15-11-04	Esperanza	16,0 x 12,5	1,1
		16,0 x 13,0	1,2
		17,0 x 13,5	1,3
		17,0 x 13,8	1,3
		17,5 x 14,0	1,4
15-11-04	Esperanza	16,5 x 13,0	1,5
		16,8 x 13,0	1,6
		16,8 x 13,2	1,6
		17,0 x 13,8	1,5
		17,2 x 13,0	1,5
15-11-04	Esperanza	16,0 x 12,5	1,3
		16,5 x 12,5	1,4
		17,2 x 12,5	1,4
		17,8 x 13,0	1,5
		18,0 x 13,0	1,4

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal y lengua naranja-amarillentas. Piel oscura. Escaso plumón en la cabeza y dorso.

3 días. Apenas se ven las vainas alares. Ojos abiertos. Activos.

4 días. Vainas en dorsal, flancos y muslos.

5 días. Comisura amarillenta. Pico y patas grises. En la cola y ventralmente aparecen las vainas. Dorsalmente tienen 3 mm.

6 días. Plumón en la cabeza y en el lomo. Vainas alares grises. Láminas de las cubiertas alares, marrones. Bastante emplumados. Ventral jaspeado, blanquecino.

8 días. Abriendo las láminas, de las plumas primarias. Dorsal, flancos, alas y cola de color del adulto.

10 días. Color de adulto. Si se los molesta vuelan.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,4	0,9	1,2-1,3	-	-	-	-	-	3,0-4,4
2	0,4	1,2	1,4-1,5	-	-	-	-	-	4,1-5,2
3	0,5	1,4	1,9-2,0	-	-	-	-	-	5,4-6,8
4	0,6	1,4	2,0	0,5-0,9	-	0,3-0,8	-	-	7,8-9,2
5	0,6	1,5	2,0-2,1	0,7-1,0	0,1	0,5-0,9	0,1	0,1	9,0-10,5
6	0,7	1,5	2,0-2,2	0,9-1,2	0,2	0,8-1,0	0,2	0,2	9,5-11,0
7	0,7-1,0	1,8-2,1	2,5-2,7	1,0-1,2	0,3-0,5	1,0	0,3-0,6	0,5	11,3-11,8
8	0,7-1,0	1,8-2,1	2,5-2,7	1,0-1,2	0,3-0,5	1,0	0,3-0,6	0,5	11,3-11,8


OBSERVACIONES

Es parasitada por *Molothrus bonariensis*
Los pichones tienen ectoparásitos (piojillos) y son afectados por larvas de moscas.

RATONA APERDIZADA *Cistothorus platensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-82	Los Gigantes	4 huevos	En pajas	0,50
25-11-90	Pampa de Achala	Sin postura	En pajas	0,60
25-11-90	Pampa de Achala	Sin postura	En pajas	0,60
20-01-01	Merlo	4 huevos	En pajas	0,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en pajas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura globular o alargada en sentido vertical. Entrada en la parte superior y lateral. Emplea en la construcción paja. Internamente fibras finas, vegetales suaves y plumas.

Medidas :

Alto : 17 cm.
Ancho : 10 cm.
Largo : 10 cm.
Diámetro de la boca : 3 cm.
Diámetro de la cámara : de 5 a 6 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 15,4 a 17,4 x 12,1 a 13,2 X= 16,3 x 12,6 (N= 4)
Peso lleno : de 1,125 a 1,390 X= 1,262 (N= 4)
Peso de las cáscaras : 0,069 a 0,085 X= 0,079 (N= 4)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
600	18-12-82	Los Gigantes	15,4 x 12,1	1,125	0,069
			16,3 x 12,4	1,190	0,079
			16,4 x 12,8	1,350	0,080
			17,4 x 13,2	1,390	0,085

FAMILIA: POLIOPTILIDAE

TACUARITA AZUL *Polioptila dumicola*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de nidos : 209

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-11-70	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	3,50
24-11-71	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	3,50
02-01-79	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,00
24-09-79	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
18-10-86	Llambi Campbell	En construcción	Chañar	2,20
20-10-86	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	Chañar	2,00
03-10-89	Esperanza	2 huevos	Naranjo	3,20
04-10-89	Morteros	2 huevos	Chañar	2,50
21-11-89	Esperanza	No observado	Curupí	3,10
28-11-89	Esperanza	2 huevos	Tala	2,40
28-11-89	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,90
28-11-89	Esperanza	3 pichones	Curupí	2,80
10-10-90	B. de Irigoyen	Sin postura	Magnolia	4,00
10-11-90	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
15-11-90	Morteros	No observado	Chañar	4,50
01-12-90	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
02-12-90	Esperanza	No observado	Curupí	3,20
07-12-90	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	En construcción	Seibo	2,00
28-12-90	Monte Vera	2 pichones	Aromo	1,70
29-12-90	Esperanza	3 huevos	Curupí	4,00
31-12-90	Esperanza	3 pichones	Cina cina	3,60
01-01-91	Isla Berduc	Sin postura	Aromo	2,00
13-01-91	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,10
24-10-91	Villa Ocampo	Sin postura	Rama negra	2,20
26-10-91	Esperanza	2 pichones	Chañar	2,30
27-11-91	Villa Roda	3 huevos	Chañar	2,40
30-11-91	Villa Roda	3 huevos	Chañar	3,20
30-11-91	Villa Roda	3 huevos	Aromo	2,80
13-12-91	Malabrigo	Sin postura	Chañar	1,70
16-10-92	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
16-10-92	Esperanza	1 huevo	Tala	2,30
09-10-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
21-10-93	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,50
23-10-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,50
23-10-93	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,40
25-10-93	Esperanza	En construcción	Paraíso	3,50

06-11-93	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
06-11-93	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,50
20-11-93	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
20-11-93	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,20
26-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	4,00
27-11-93	Esperanza	1 pichón	Chañar	3,00
27-11-93	Esperanza	1 huevo y 1 pichón grande	Ombú	1,00
04-12-93	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,30
10-12-93	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,20
12-12-93	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,00
12-12-93	Esperanza	3 huevos	Curupí	4,00
16-12-93	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	2,60
16-12-93	Esperanza	3 huevos	Cina-cina	3,90
16-12-93	Esperanza	3 pichones	Chañar	3,00
21-12-93	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,20
27-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	6,50
08-01-94	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	2,70
30-11-94	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,70
30-11-94	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
05-12-94	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
05-12-94	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,40
16-12-94	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,80
16-12-94	Esperanza	3 pichones	Quebracho blanco	1,75
22-12-94	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,10
28-12-94	Esperanza	En construcción	Chañar	2,50
16-11-95	Esperanza	2 pichones	Chilca	1,60
24-12-97	Villa Roda	En construcción	Sauce	3,50
22-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
26-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,90
26-09-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,20
29-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,00
03-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
12-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,00
12-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
17-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,50
17-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,10
17-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,50
24-10-98	Esperanza	No observado	Albarrobo	3,60
25-10-98	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	1,80
25-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,20
30-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
04-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
09-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,40
11-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
13-11-98	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Chañar	2,40
14-11-98	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,80
14-11-98	Esperanza	3 pichones	Chañar	0,70
14-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,80
01-12-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,60
05-12-98	Esperanza	3 pichones	Aromo	2,40

11-12-98	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,90
11-12-98	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,70
05-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	2,90
20-01-99	La Camila	2 pichones	Quebracho blanco	1,50
14-10-00	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	2,10
14-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
24-10-00	Esperanza	No observado	Tala	2,90
28-10-00	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
28-10-00	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
08-11-00	Esperanza	3 pichones	Tala	2,30
08-11-00	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,60
14-11-00	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
21-12-00	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	2,20
12-01-01	Esperanza	3 pichones	Quebracho blanco	2,10
10-09-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
20-09-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
20-09-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
11-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	7,00
11-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
11-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
11-10-01	Esperanza	En construcción	Tala del Indio	1,10
11-10-01	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,70
13-10-01	Esperanza	En construcción	Tala	2,30
13-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,20
22-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50
23-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
03-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
03-11-01	Esperanza	3 huevos	Aromo	2,00
24-10-01	Esperanza	Sin postura	Quebracho blanco	1,80
24-10-01	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
25-10-01	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	1,80
30-10-01	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,80
31-10-01	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
01-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,30
02-11-01	Esperanza	3 pichones	Chañar	3,20
02-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
02-11-01	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	3,60
02-11-01	Esperanza	1 pichón	Chañar	2,90
02-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
02-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	3,40
02-11-01	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,80
02-11-01	Esperanza	En construcción	Chañar	2,00
29-12-01	Villa Roda	3 huevos	Curupí	3,30
23-09-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,00
04-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
04-10-02	Esperanza	En construcción	Curupí	1,60
07-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,10
07-10-02	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,70
11-10-02	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,70
11-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
11-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	1,80
11-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
14-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,50

14-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	4,40
17-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,80
17-10-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
17-10-02	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,70
17-10-02	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	2,00
25-10-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,20
25-10-02	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,40
29-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
31-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,60
02-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
05-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
05-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
05-11-02	Esperanza	En construcción	Quebracho blanco	2,00
19-11-02	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	3,00
26-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
15-09-03	Esperanza	En construcción	Chañar	1,00
12-10-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,50
12-10-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,10
07-11-03	Esperanza	En construcción	Chañar	1,50
07-11-03	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	3,00
07-11-03	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,20
08-11-03	Esperanza	2 huevos y 1 pichón de *M. bonariensis*	Quebracho blanco	2,80
08-11-03	Esperanza	3 pichones	Chañar	1,70
24-11-03	Esperanza	En construcción	Chañar	2,10
25-11-03	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,80
06-12-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,10
12-12-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,20
12-12-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
12-12-03	Esperanza	1 huevo	Tala	1,50
19-12-03	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Aromo	2,40
02-01-04	Esperanza	1 pichón de *M. bonariensis*	Aromo	3,20
01-10-04	Esperanza	En construcción	Chañar	2,70
01-10-04	Esperanza	En construcción	Curupí	1,80
11-10-04	Esperanza	6 huevos	Chañar	1,20
25-10-04	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,50
27-10-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
29-10-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,60
29-10-04	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala	1,90
03-11-04	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,50
13-11-04	Esperanza	Sin postura	Chañar	3,20
13-11-04	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,00
29-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,20
29-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,40
17-12-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,70
17-12-04	Esperanza	3 huevos	Aromo	3,20
06-10-05	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,00
20-10-05	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,70
20-10-05	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,00
20-10-05	Esperanza	Sin postura	Chañar	3,20
26-11-05	Esperanza	3 huevos	Aromo	2,70
26-11-05	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,60
22-12-05	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,10
18-10-06	Esperanza	En construcción	Chañar	2,90

18-10-06	Esperanza	En construcción	Aromo	2,30
20-10-06	Esperanza	En construcción	Sauco	2,50
20-10-06	Esperanza	En construcción	Chañar	1,60
09-10-08	Esperanza	En construcción	Chañar	1,70
20-10-08	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,50
20-10-08	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,40
24-10-08	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
27-10-08	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
10-10-09	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,70
13-11-09	Esperanza	No observado	Aromo	2,90
13-10-12	Villa Roda	En construcción	Chañar	4,00
13-11-12	Villa Roda	En construcción	Aromo	3,80
10-01-13	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,10

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9								11	85	66	38

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 12 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles, arbustos. Generalmente a baja y mediana altura. Raro altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de taci-ta. Emplea en la construcción fibras vegetales, recubierto externamente con líquenes. Pueden tener además ootecas, trozos de corteza o musgos. Liados con telas de arañas. Internamente plumitas o cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 5,5 a 6 cm.
Diámetro interno : de 3,5 a 4,5 cm.
Profundidad : de 3 a 4 cm.
Alto : de 4 a 6,5 cm.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	139	Cina-cina	2	Naranjo	1
Quebracho blanco	15	Seibo	1	Rama negra	1
Aromo	15	Sauce	1	Ombú	1
Algarrobo	10	Magnolia	1	Tala del indio	1
Curupí	10	Paraíso	1	Sauco	1
Tala	8	Chilca	1		

HUEVOS

Pone 3, raro 4 huevos,

Ovoidales. De color verde con pintas castañas distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 14,4 a 16,7 x 11,5 a 12,3 X= 15,8 x 11,8 (N= 24)
Peso lleno : de 0,9 a 1,0 X= 9,7 (N= 17)
Peso de las cáscaras : de 0,061 a 0,066 X= 0,063 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
482	22-11-70	Esperanza	15,3 x 12,0		0,063
			15,9 x 11,8		0,065
			15,9 x 11,8		0,066
483	24-11-71	Esperanza	15,9 x 12,3		0,061
			16,0 x 12,2		0,062
			16,1 x 12,2		0,064
847	27-11-93	Esperanza	16,7 x 11,5		0,065
	11-10-04	Esperanza	14,4 x 11,6	0,9	
			15,0 x 11,6	0,9	
			15,0 x 11,6	0,9	
			16,0 x 11,6	1,0	
			16,0 x 11,6	1,1	
			16,0 x 11,5	1,1	
	25-10-04	Esperanza	14,4 x 12,7	1,0	
			15,2 x 12,0	0,9	
	29-10-04	Esperanza	16,0 x 12,0	0,9	
			17,0 x 12,0	1,0	
			17,6 x 12,2	1,0	
	29-10-04	Esperanza	16,0 x 12,0	0,9	
			16,5 x 12,2	1,0	
			16,5 x 12,0	1,0	
	29-11-04	Esperanza	15,0 x 11,8	1,0	
			15,2 x 12,0	1,2	
			15,5 x 12,0	1,0	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel desnuda.Comisura blanquecina. Paladar naranja-amarillento. Lengua con dos puntos oscuros en la base.

3 días. Implumes. Apenas se ven las vainas en la parte dorsal.

4 días. Comienzan a salir las vainas de las plumas alares.

5 días. Vainas en las zonas ptéridas oscuras en la cabeza, con punta clara en dorsal. Ventralmente blanquecinas. Abriendo las láminas de las primarias y secundarias, blanquecinas. Centro de la cola oscuro, lados blanco. Piel oscura, más clara ventralmente.

7 días. Ojos semiabiertos. Cuerpo cubierto de plumas. El blanco de las vainas primarias es más extenso. Se nota más al blanco de la cola. Flancos blanquecinos. Vainas de la cabeza y dorso blanquecinos. Resto del plumaje, color de adulto.

9 días. Ojos abiertos, marrones. Casi todo el cuerpo cubierto de plumas. Cavidad bucal naranja. Comisura blanquecina.Cubiertas alares orilladas de blanquecino. Plumas externas de la cola, blanquecinas. Parte ventral grisácea.

12 días. Emplumados. Si se los molesta se van del nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,8-1	1-1,2	-	-	-	-	-	0,70-0,80
2	0,4	1,1	1,4	-	-	-	-	-	2,2
3	0,5	1,2	1,5	0,3	-	0,2	-	-	2,0-2,6
4	0,5	1,4	1,6	0,5	-	0,5	-	-	3,1-3,7
5	0,5	1,5	1,8	0,8	-	0,8	-	0,3	3,9-5,0
6	0,6	1,6	2,0	1,2	-	1,0	-	0,5	4,9-6,2
7	0,6	1,8	2,1	1,5	0,2	1,2	0,2	0,7	6,3
8	0,6	1,8	2,2	1,5	0,4	1,3	0,5	0,9	7,2
9	0,7	1,9	2,2	1,5	0,9	1,4	0,8	1,2	6,8-7,0
10	0,7	2,0	2,3	1,5	1,3	1,5	1,0	1,4	6,6-7,2
11	0,7	2,1	2,3	1,5	1,5	1,6	1,2	1,6	7,3
12	0,7	2,1	2,4	1,5	1,7	1,7	1,4	1,7	7,3

OBSERVACIONES

Los padres traen insectos y maripositas, con intervalos de 2 a 5 minutos. Cuando paran, puede pasar más de una hora sin que traigan comida. Buscan los insectos en un radio de 30 metros. En algunas parejas por momentos es el macho más activo, y en otras la hembra. Recorren las ramas de los árboles, hurgan debajo de la corteza y en el interior de los frutos de Quebracho blanco, en busca de insectos.

Los dos padres traen comida (mosquitos). Los buscan hasta 15 m. de donde están los juveniles.

Viajan con materiales cada 2-3 minutos.

Sacan las materias fecales en un saco blanco, que lleva a varios metros del nido.

El día antes de volar, estiran las alas, se arreglan las plumas y se paran en el borde del nido. Cuando existe un peligro los padres dan una voz de alarma y se aplastan contra el fondo.

Al aproximarse al nido, la pareja puede dar vueltas muy cerca de la cabeza del observador.

Durante unos días, los adultos recorren los árboles junto a los juveniles. Permanentemente se comunican con voces y les llevan alimentos.

El macho “acicala” las plumas de la cabeza y lados del cuello de la hembra.

Buscan telas en Chañares hasta 7-8 m. de alto y hasta 20-30 m. del nido. Corren a otras aves si se aproximan al nido.

Los pichones tienen ectoparásitos (piojillos).

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.

FAMILIA: CINCLIDAE


MIRLO DE AGUA *Cinclus schulzi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido del nido	Ubicación	Altura
04-01-02	El Alamito	1 pichón	Repisa rocosa	1,80



REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación.

En repisas rocosas. En barrancas de ríos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura redondeada, grande, de base rectangular.

Emplea en la construcción musgos y hojas de Caña brava (*Chusquea lorentziana*). La taza construida con hojas de caña y de Aliso (*Alnus acuminata*).

En el nido localizado en la parte posterior y el techo no tenía materiales, había aprovechado la roca.

Medidas :

Diámetro de la base : de 22 a 28 cm.
Alto de la base : 9 cm.
Diámetro total de la taza : 11 cm.
Diámetro interno de la taza : 8,5 cm.
Profundidad de la taza : 4 cm.
Paredes gruesas, irregulares : de 4 a 8 cm. de espesor.

PICHONES

El pichón tiene la comisura amarilla y el pecho estriado.

FAMILIA: TURDIDAE

ZORZAL PATAGÓNICO *Turdus falcklandii*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
30-01-76	Villa La Angostura	1 huevo	Árbol	2,50
01-11-89	San C. de Bariloche	3 huevos	Rosa mosqueta	1,00
12-11-89	A° La Fragua	3 huevos (*)	Arbusto (*Berberis sp.*)	0,80
21-11-98	Perito Moreno	1 pichón	Abedul	1,70
21-11-98	Perito Moreno	Sin postura	Arbusto	1,00

(*). Nido localizado por Anibal E. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles o arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales, raíces y barro. Internamente fibras finas y raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 17 cm.
Diámetro interno : de 8 a 9 cm.
Profundidad : de 4 a 6 cm.
Alto : de 9 a 12 cm.
Grosor de la pared : de 1,5 a 2,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verdoso o celeste verdoso con pintas castañas y algunas grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.


Medidas y pesos :

De 30,7 a 33,6 x 21,5 a 24,4 X= 31,9 x 22,9 (N= 7)
Peso lleno : 8,00 X= 8,00 (N= 1)
Peso de las cáscaras : 0,438 a 0,574 X= 0,503 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
617	30-01-76	Villa La Angostura	30,7 x 21,5		0,489
667	01-11-89	San C. de Bariloche	32,0 x 22,0	8,0	0,438
			32,6 x 22,6		0,440
			33,6 x 22,7		0,440
743	12-11-89	A° La Fragua	31,3 x 23,7		0,570
			31,4 x 24,4		0,570
			31,8 x 23,9		0,574

ZORZAL SABIÁ *Turdus leucomelas*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-10-81	Cataratas del Iguazú	4 pichones	Tirante de una construcción	3,80
13-10-81	Cataratas del Iguazú	3 huevos	Tirante en una casilla abandonada	3,70

REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles o tirantes en construcciones. A baja y mediana altura.


Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales, raíces y barro. Internamente fibras finas y raicillas. A veces recubierto externamente por cactáceas o líquenes.

Medidas :

Diámetro total : 14 cm.
Diámetro interno : 8 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 7,5 cm.
Grosor de la pared : 3 cm.

ZORZAL COLORADO *Turdus rufiventris*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 31

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
24-11-71	Río Leyes	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Árbol	2,00
26-11-73	Resistencia	3 huevos	Árbol	2,20
26-11-73	Resistencia	No observado	Árbol	15,00
25-11-78	Cayastá	3 huevos	Curupí	1,50
31-10-82	Cayastá	3 huevos	Tala	2,10
14-11-86	Aguará	3 huevos	Algarrobo	3,50
04-12-88	Cayastá	1 huevo	Aromo	1,80
02-12-90	Esperanza	En construcción	Tipa amarilla	8,00
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	2 huevos	Aromo	3,30
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	3 huevos	Seibo	2,10
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	3 huevos	Aromo	2,90
02-01-91	Cayastá	3 huevos	Naranjo	2,80
18-01-91	Laguna del Platero	2 pichones	Algarrobo	4,00
06-12-91	Alcaraz Sur	No observado	Árbol	3,00

13-12-91	Malabrigo	3 huevos	Árbol	3,00
13-12-91	Villa Ocampo	2 huevos	Naranjo	1,70
27-11-95	Villa Ocampo	2 huevos	Picanilla	3,60
27-11-95	Villa Ocampo	1 huevo	Aguaí	3,10
27-11-95	Villa Ocampo	2 huevos	Aguaí	3,10
27-11-95	Villa Ocampo	3 huevos	Aguaí	3,30
29-11-95	Florencia (al este)	2 pichones	Maní Guaycurú	3,70
07-01-02	El Alamito	3 pichones	Crataeus	2,30
20-10-02	Esperanza	1 huevo	Saliente de una pared	2,80
20-10-02	Esperanza	3 huevos	Juvenil	2,90
22-11-02	Esperanza	3 pichones	Naranjo	2,70
11-12-04	Monte Vera	3 pichones	Hierro de un parral	2,60
14-12-05	Monte Vera	2 pichones	Tala	2,40
29-11-09	La Granja	3 huevos	Mora	3,00
01-12-09	Santo Tomé	2 pichones	Chivato	3,50
27-09-12	Monte Vera	En construcción	Sauco	4,50
25-10-12	Monte Vera	No observado	Paraído	3,20

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3								1	4	12	11

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12 a 15 días	Pone en días corridos	14-15 días	14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles, troncos, tirantes, salientes en paredes. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales, raíces y barro. Internamente fibras finas y raicillas. A veces recubierto externamente por cactáceas o líquenes.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 16 cm.
Diámetro interno : de 5,5 a 9 cm.
Profundidad : de 5 a 6 cm.
Alto : de 8 a 13 cm.
Grosor de la pared : 2 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,50 m.
Nido más alto : 15,00 m.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde con pintas castañas y algunas grises.

Medidas y pesos :

De 26,7 a 30,8 x 19 a 22 X= 28,6 x 21,1 (N= 17)
Peso lleno : de 6,054 a 6,900 X= 6,539 (N= 5)
Peso de las cáscaras : 0,291 a 0,527 X= 0,380 (N= 17)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
475	24-11-71	Río Leyes	27,0 x 20,8		0,337
			27,5 x 20,5		0,361
			28,8 x 20,5		0,373

476	26-11-73	Resistencia	26,7 x 19,0		0,291
			26,9 x 19,7		0,297
			27,5 x 19,7		0,309
477	25-11-78	Cayastá	27,5 x 21,5		0,370
			28,5 x 21,6		0,379
			28,7 x 21,7		0,465
593	31-10-82	Cayastá	28,7 x 21,0	6,054	0,373
			29,8 x 20,8	6,241	0,446
			30,8 x 20,8	6,241	0,527
656	14-11-86	Aguará	27,5 x 19,8		0,330
			28,8 x 20,0		0,340
			29,1 x 19,7		0,350
776	11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	28,6 x 21,8	6,9	0,390
			29,6 x 22,0	6,9	0,400

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillo. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranjas. Comisura blanquecina amarillenta. Escaso plumón gris.

6 días. Ojos abiertos.
7 días. Comienzan a aparecer las láminas.
8 días. Primarias y secundarias pardas. Dorsalmente pardo.
11 días. Ventral canela.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,1	1,3-1,4	-	-	-	-	-	4,0
2	0,8	1,4	1,6	-	-	-	-	-	8,0
3	0,9	1,7	1,9-2,1	-	-	-	-	-	15
4	0,9	2,1	2,3	-	-	-	-	-	19,00
5	1,1	2,4	2,6	-	-	-	-	-	22,0
6	1,1	2,5	3,1	0,6	-	0,5	-	-	26,0
7	1,1	2,6	3,3	0,9	-	0,7	-	-	30,0
8	1,1	2,8	3,5	1,2	-	1,0	-	0,3	36,0
9	1,2	3,2	3,6	2,0	-	1,8	-	0,6	38,0
10	1,3	3,6	3,8	2,8	-	2,5	-	0,8	41,0
11	1,3	3,8	4,2	3,2	1,0	3,1	0,9	1,0	45,7
12	1,4	4,2	4,7	3,0	1,5	3,0	1,3	1,1	50,0-52,0

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

ZORZAL CHALCHALERO *Turdus amaurochalinus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 51



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	3 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Algarrobo	1,20
15-11-71	La Gallareta	3 huevos	Aromo	2,50
22-12-77	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	2,00
06-11-81	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
07-11-90	Morteros	1 huevo y 1 de *M. bonariensis*	Quebracho blanco	3,10
07-11-90	Morteros	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Quebracho blanco	3,20
15-11-90	Morteros	No observado	Quebracho blanco	7,00
15-11-90	Morteros	2 pichones	Quebracho blanco	3,50
02-12-90	Esperanza	No observado	Pino	8,00
08-11-91	Esperanza	No observado	Curupí	3,50
27-11-91	Puerto Esquina	No observado	Árbol	3,60
27-11-91	Laguna del Pescado	No observado	Árbol	4,00
13-12-91	Malabrigo	No observado	Coronillo	4,50
24-10-93	Esperanza	3 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Ombú	3,40
24-10-93	Esperanza	4 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Paraíso	4,00
18-11-93	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	Tala	2,30
21-11-93	Las Cuevas	3 huevos	Arbusto	1,30
21-11-93	Las Cuevas	No observado	Arbusto	4,30
21-11-93	Las Cuevas	No observado	Arbusto	4,00
23-11-93	Empedrado	2 huevos	Arbusto	2,80
09-12-93	Esperanza	1 pichón	Curupí	3,30
25-11-94	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,80
25-11-94	Esperanza	No observado	Ligustro	8,00
25-11-94	Esperanza	1 pichón	Curupí	2,90
25-10-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,10
29-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,50
09-11-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	2,90
14-11-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	1,80
14-11-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,70
07-12-98	Esperanza	No observado	Tala	3,20
11-12-98	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,60
11-12-98	Esperanza	3 huevos	Tala	1,50
28-12-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	2,30
28-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	3,90
22-01-00	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,80
23-12-00	Esperanza	No observado	Chañar	2,80
19-12-01	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Tala	2,30
20-12-01	Esperanza	1 huevo de *M. bonariensis*	Chañar	3,80
26-12-01	Esperanza	2 huevos	Cina cina	2,00

27-12-01	Esperanza	1 pichón, y 1 huevo y 1 pichón de *M. bonariensis*	Chañar	2,40
03-12-02	Esperanza	4 huevos	Chañar	2,20
08-11-03	Esperanza	3 huevos y 2 *M. bonariensis*	Chañar	2,70
06-12-03	Esperanza	En construcción	Algarrobo	2,40
19-12-03	Esperanza	1 pichón	Aromo	4,00
21-10-04	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Chañar	2,40
12-11-04	Esperanza	No observado	Acacia negra	4,40
29-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,60
16-11-05	Candonga	En construcción	Árbol	3,50
04-12-05	Esperanza	3 huevos	Tala del indio	1,60
17-11-07	Ascochinga	3 pichones	Acacia negra	2,70
10-01-10	Jesús María	Pichones	Ombú	7,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2									5	26	18

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
12 a 15 días	Pone en días corridos	15 días	14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles, arbustos, troncos. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales, raíces y barro. Internamente fibras finas y raicillas. A veces trozos de nylon o hilos.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 14 cm.
Diámetro interno : de 6 a 9 cm.
Profundidad : de 5 a 7 cm.
Alto : de 8 a 10 cm.
Grosor de la pared : 1,3 a 3 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,20 m.
Nido más alto : 8,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	10	Árbol	3	Pino	1
Algarrobo	7	Aromo	2	Cina-cina	1
Quebracho blanco	7	Ombú	2	Acacia negra	1
Arbusto	4	Ligustro	1	Paraíso	1
Tala	4	Coronillo	1	Acacia negra	1
Curupí	4	Tala del indio	1	Árbol	1

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas y manchitas castañas, lilas y grises.

Medidas y pesos :

De 18,2 a 21,6 x 26,4 a 30,5 X= 21,1 x 28,0 (N= 18)
Peso lleno : de 5,1 a 6,6 X= 5,73 (N= 6)
Peso de las cáscaras : 0,274 a 0,404 X= 0,365 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
478	15-11-71	La Gallareta	27,9 x 19,8		0,348
			28,0 x 20,0		0,357
			28,8 x 19,4		0,377
479	15-11-71	La Gallareta	28,6 x 20,9		0,362
			29,8 x 21,6		0,373
			30,5 x 20,9		0,375
480	22-12-77	Esperanza	26,4 x 18,5		0,274
			26,8 x 18,2		0,277
			26,9 x 18,5		0,282
481	06-11-81	Esperanza	27,3 x 21,6		0,354
			27,9 x 21,2		0,365
			28,8 x 21,3		0,404
	29-11-04	Esperanza	28,2 x 21,0	6,4	
			29,0 x 20,2	6,1	
			29,8 x 20,5	6,6	
	21-10-04	Esperanza	27,0 x 19,0	5,1	
			27,0 x 19,0	5,1	
			27,0 x 20,0	5,2	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillo. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranjas. Comisura blanquecina amarillenta. Escaso plumón gris. Piel desnuda verdosa.

6 días. Ojos abiertos, marrones. Piel ventral clara (verdosa). Lados del pecho, plumitas pardas y cañones chicos blanquecinos. Muslos con plumitas blancas. Vainas de las alas grises. Corona y línea dorsal plumitas grises. Escaso plumón.

7 días. Comisura blanca. Lados del pecho moteado con plumitas pardas, ocráceas y blanquecinas. Comienzan a aparecer las láminas, ocráceas.

8 días. Plumas blancas en los flancos y muslos. Lados del pecho pardo. Láminas de las cubiertas alares pardas. Primarias y secundarias pardas. Dorsalmente pardo.

11 días. Ventral blanquecino. Pecho jaspeado.


MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,1	1,3-1,4	-	-	-	-	-	3,7-4,1
2	0,7-0,8	1,3-1,5	1,6	-	-	-	-	-	7,8-8,1
3	0,9	1,7	1,9-2,1	-	-	-	-	-	14,4-14,9
4	0,9	2,0	2,3	-	-	-	-	-	17,4-20,0
5	1,1	2,4	2,6	-	-	-	-	-	20,5-25,8
6	1,1	2,5	3,1	0,6	-	0,5	-	-	24,5-28,8
7	1,1	2,6	3,3	0,9	-	0,7	-	-	30,0
8	1,1	2,8	3,5	1,2	-	1,0	-	0,3	36,1
9	1,2	3,0	3,6	2,0	-	1,8	-	0,6	38,0
10	1,3	3,2	3,8	2,8	-	2,5	-	0,8	40,0
11	1,3	3,2	4,2	3,2	0,5	3,1	0,3	1,0	45,7

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*. El 21-11-93 en Las Cuevas, algunos ejemplares les comían los huevos a *Zenaida auriculata*

ZORZAL PLOMIZO *Turdus nigriceps*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-12-00	Cuesta del Clavillo	3 huevos	Arbusto	2,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles, arbustos. A baja y mediana.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales y barro. Recubierto externamente con musgos. Internamente raicillas finas.

Medidas :

Diámetro total : 15 cm.
Diámetro interno : 7 cm.
Profundidad : 6 cm.
Alto : 13 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco celeste, recubierto de puntos canelas y grises, más concentrados en el polo mayor.


Medidas y pesos :

De 25,5 a 26,6 x 19 X= 26,1 x 19 (N= 3)
Peso de las cáscaras : 0,250 X= 0,250 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
927	20-12-00	Cuesta del Clavillo	25,5 x 19,0	0,250
			26,6 x 19,0	0,250
			26,6 x 19,0	0,250

ZORZAL CHIGUANCO *Turdus chiguanco*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 12

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-01-71	La Granja	1 pichón	Arbusto	1,50
06-02-77	Cuesta del Obispo	2 huevos	Arbusto	1,20
20-11-81	Santa R. de Calamuchita	2 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Árbol	2,60
09-02-83	Yaví	2 huevos	Tirante en edificio	2,60

09-01-99	Aconquija	No observado	Árbol	5,00
19-01-00	La Falda	2 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Crateus	1,80
07-01-02	El Alamito	1 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Repisa en barranca	2,30
07-01-02	El Alamito	2 huevos	Repisa en barranca	2,00
23-10-04	Ascochinga	3 huevos	Crateu	1,40
15-11-05	Ascochinga	No observado	Crateu	1,50
08-12-05	Ascochinga	2 pichones	Crateu	1,60
22-11-08	Ascochinga	No observado	Tala	3,70

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	2								1	3	1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles, arbustos, troncos, tirantes, repisas en barrancas. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de tallos de yuyos, fibras vegetales, nervaduras y barro. Internamente fibras finas y raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 22 cm.
Diámetro interno : de 8,0 a 11 cm.
Profundidad : de 4,5 a 8 cm.
Alto : de 12 a 14 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,20 m
Nido más alto : 5,00 m

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas y manchitas castañas y grises.

Medidas y pesos :

De 32,0 a 44,2 x 21,6 a 24,2 X= 33,2 x 22,5 (N= 7)
Peso lleno : de 5,2 a 5,2 X= 5,23 (N= 3)
Peso de las cáscaras : 0,492 a 0,592 X= 0,548 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
473	06-02-77	Cuesta del Obispo	33,1 x 23,0		0,492
			34,2 x 23,2		0,563
474	20-11-81	Santa R. de Calamuchita	32,4 x 23,8		0,548
			33,1 x 24,2		0,592
	23-10-04	Ascochinga	32,0 x 21,6	5,2	
			32,2 x 21,6	5,2	
			33,3 x 21,6	5,3	

ZORZAL COLLAR BLANCO *Turdus albicollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-12-88	Puerto Iguazú	1 huevo (*)	Árbol	2,00

(*). Nido localizado por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en ramas de árboles. A baja y mediana.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de fibras vegetales, raíces y barro. Internamente fibras finas y raicillas.

Medidas :

Diámetro total : 13 cm.

Diámetro interno : 8 cm.

Profundidad : 6 cm.

Grosor de la pared : 2,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas y manchitas castañas distribuidas por toda la superficie.

Medidas y peso.

De 26,2 x 19,9 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,250 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medida	Peso cáscara
834	15-12-88	Puerto Iguazú	26,2 x 19,9	0,250

FAMILIA: MIMIDAE

CALANDRIA MORA *Mimus patagonicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-11-76	Península Valdés	2 huevos	Arbusto	0,80
23-02-79	Humahuaca	Sin postura	Arbusto	1,50
14-01-82	San Juan	4 huevos	Arbusto	2,20
15-01-82	Talacasto	4 huevos	Arbusto	2,20
15-01-82	Talacasto	5 huevos	Arbusto	2,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de palitos. Internamente raicillas, pastos, hilos.

Medidas :

Diámetro total : de 21 a 24 cm.

Diámetro interno : de 9 a 10 cm.

Profundidad : de 4 a 6 cm.

Alto : de 12 a 17 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color verdoso o verde azulado, con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y peso.

De 24,6 a 27,5 x 18,3 a 19,6 X= 26,3 x 18,8 (N= 15)

Peso de la cáscara : 0,247 a 0,310 X= 0,288 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
	26-11-76	Península Valdés	24,6 x 18,5	0,289
			24,7 x 18,8	0,299
468	14-01-82	San Juan	24,4 x 18,3	0,247
			25,3 x 18,8	0,254
			25,8 x 19,3	0,277
			27,0 x 19,6	0,299
469	15-01-82	Talacasto	26,1 x 19,4	0,280
			26,4 x 19,1	0,290
			26,4 x 19,4	0,301
			27,1 x 20,0	0,308
470	15-01-82	Talacasto	26,3 x 18,4	0,287
			26,8 x 18,6	0,293
			27,0 x 18,5	0,310
			27,0 x 19,5	0,295
			27,5 x 18,9	

CALANDRIA GRANDE *Mimus saturninus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Total de nidos : 98



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-10-70	Galvez	2 huevos	Pino	1,50
10-10-70	Esperanza	1 huevo y 3 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	2,30
04-01-76	Esperanza	3 huevos y 6 de *Molothrus bonariensis*	Tala salada	1,70
20-10-76	Manucho	3 huevos y 5 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	2,50
18-10-76	Esperanza	4 huevos y 5 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	1,40
06-11-81	Esperanza	2 huevos y 4 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,50
23-09-89	Esperanza	3 huevos	Sombra de toro	1,00
25-09-89	Esperanza	2 huevos	Arbusto	2,10
26-09-89	A° Ceibal	No observado	Naranjo	4,20
04-10-89	Morteros	En construcción	Arbusto	0,50
18-10-89	Colonia Silva	2 pichones	Mandarino	1,50
20-10-89	Esperanza	2 pichones	Tala	1,95
29-10-89	Esperanza	2 pichones	Laurel comestible	6,50
30-10-89	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Acacia negra	1,70
31-10-89	Soledad	1 huevo	Pino	1,50
04-11-89	Esperanza	2 pichones	Tuna	1,50
23-11-89	Esperanza	2 pichones	Arbusto	2,20
24-11-89	Esperanza	3 pichones	Ñandubay	2,50
29-11-89	Calchaquí	1 huevo	Tala salada	0,80
31-10-90	Esperanza	1 huevo y 2 pichones	Chañar	2,00
02-11-90	Morteros	1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Chilca negra	1,00
15-11-90	Morteros	1 pichón y 1 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	2,00
15-12-90	Saladillo Dulce	1 huevo y 6 de *Molothrus bonariensis*	Matorral	2,80
15-12-90	Saladillo Dulce	3 pichones	Chañar	2,00
19-12-90	Esperanza	No observado	Matorral	3,50
12-01-91	Grutly	1 huevo	Curupí	2,20
12-01-91	Grutly	En construcción	Chañar	1,80
16-01-91	Grutly	1 huevo y 2 pichones	Chañar	2,80
08-11-91	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
22-11-91	Esperanza	Sin postura	Matorral	2,00
06-12-91	Yeso Oeste	4 huevos	Aromo	1,70
27-09-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,90
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,70
12-12-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,00
28-09-93	Esperanza	1 huevo	Sombra de toro	1,50
04-10-93	San Carlos Sur	Sin postura	Tuna	1,30
04-10-93	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
27-10-93	Esperanza	1 pichón y 1 huevo propios y 1 huevo de *Molothrus bonariensis.*	Chañar	1,60
08-11-93	Esperanza	2 pichones	Sombra de toro	1,40

20-11-93	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala	1,70
09-12-93	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,60
14-12-93	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,60
16-12-93	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,60
28-11-94	Esperanza	En construcción	Parante metálico	4,00
22-01-96	Esperanza	2 pichones	Tala	2,20
13-09-98	Esperanza	2 huevos	Pino	1,00
22-09-98	Esperanza	En construcción	Chañar	2,10
01-10-98	Esperanza	1 huevo	Tala del indio	0,80
14-10-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,10
24-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,30
25-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
30-10-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	1,70
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,40
30-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	2,70
30-11-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	1,80
07-12-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	3,70
09-12-98	Esperanza	No observado	Aromo	2,30
09-12-98	Esperanza	4 pichones	Aromo	1,60
26-12-98	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,30
26-12-98	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala	2,10
03-01-99	Esperanza	No observado	Aromo	2,90
21-01-99	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
24-10-00	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Tala salada	1,40
28-10-00	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis* (1)	Aromo	1,50
26-08-01	Esperanza	En construcción	Arbusto	2,40
01-11-01	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,60
01-11-01	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,70
07-12-01	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
07-12-01	Esperanza	1 huevo y 1 pichón propios y 1 huevo y 1 pichón de de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	1,70
17-10-02	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,60
19-10-02	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,60
19-10-02	Esperanza	4 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,50
08-11-02	Esperanza	3 huevos y 4 de *Molothrus bonariensis*(2)	Chañar	1,60
27-11-01	Esperanza	1 pichón y 2 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,50
17-12-02	Esperanza	1 pichón y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	2,50
21-12-02	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,30
12-10-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,00
11-12-03	Esperanza	1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Tala	2,20
17-12-03	Esperanza	2 huevos	Tala	2,30
30-12-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,00
31-12-03	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	1,60
01-02-04	Esperanza	2 pichones y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala	1,50
14-09-04	Esperanza	1 huevo	Tuya	2,10
27-09-04	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	1,60
04-10-04	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,70
27-10-04	Esperanza	2 huevos y 2 pichones	Tala	2,10
08-11-04	Esperanza	2 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,40
13-11-04	Esperanza	3 huevos y 4 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	1,60
16-11-04	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala	1,80
16-11-04	Esperanza	3 huevos	Tala	1,70
16-11-04	Esperanza	1 huevos y 6 de *Molothrus bonariensis*	Algarrobo	1,90

09-12-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
15-10-05	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
15-11-05	Ascochinga	2 pichones	Arbusto	1,60
18-01-06	Esperanza	3 pichones y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,20
04-11-06	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	2,60
03-11-12	Esperanza	3 huevos	Sombra de toro	0,80
04-11-12	Villa Roda	3 pichones	Sauce	2,60

(1). El huevo de *Molothrus bonariensis* es blanco.
(2). Uno de era *Molothrus bonariensis* blanco.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	1						1	10	29	29	22

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 12 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	13 a 14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Soatenido en ramas de árboles, arbustos, matorrales, construcciomes. A baja y mediana altura. Raro altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de palitos con y sin espinas. Internamente fibras finas, raicillas, pajitas, cerdas, hilos.

Medidas :

Diámetro total : de 13 a 23 cm.
Diámetro interno : de 6 a 13 cm.
Profundidad : de 4 a 10 cm.
Alto : de 13 a 15 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,50 m.
Nido más alto : 6,50 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	33	Tala salada	3	Naranjo	1
Aromo	15	Pino	3	Mandarino	1
Tala	10	Tuna	2	Acacia negra	1
Arbusto	8	Laurel comestible	1	Tala del indio	1
Algarrobo	6	Curupí	1	Parante	1
Sombra de toro	4	Ñandubay	1	Tuya	1
Matorral	3	Chilca negra	1	Sauce	1

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verdes con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y peso.

De 26 a 29,5 x 19,0 a 22 X= 27,4 x 21,2 (N= 31)
Peso lleno : de 5,4 a 7,1 X= 6,25 (N= 23)
Peso de la cáscara : 0,320 a 0,385 X= 0,338 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
466	10-10-70	Esperanza	27,3 x 20,4		0,375
			27,7 x 20,6		0,385
467	20-10-76	Manucho	29,0 x 19,9		0,363
430	30-10-89	Esperanza	26,0 x 19,8		0,349
			26,2 x 19,8		0,350
			27,2 x 20,3		0,372
	06-01-81	Esperanza	29,1 x 20,2		
			29,5 x 20,7		
780	15-12-90	Saladillo Dulce	26,0 x 20,9	6,0	0,300
			26,5 x 20,8	6,2	0,310
			28,5 x 22,0	6,2	0,310
			26,9 x 20,9	6,2	0,320
			26,9 x 20,9	6,9	0,320
	14-09-04	Esperanza	27,0 x 21,5	6,2	
	27-09-04	Esperanza	29,0 x 20,2	6,2	
			29,2 x 20,5	5,7	
	04-10-04	Esperanza	27,0 x 20,0	5,7	
			27,0 x 20,1	5,9	
			25,8 x 19,8	5,4	
	08-11-04		29,0 x 19,0	4,8	
			30,0 x 19,0	5,3	
	13-11-04	Esperanza	26,0 x 21,0	5,5	
			26,5 x 20,0	5,3	
			27,0 x 21,0	6,3	
	16-11-04	Esperanza	26,0 x 20,5	5,8	
			27,0 x 21,0	6,2	
			27,2 x 20,5	5,9	
	16-11-04	Esperanza	27,6 x 21,0	6,3	
			28,0 x 22,0	7,1	
			29,4 x 21,1	7,0	
	16-11-04	Esperanza	26,5 x 21,0	5,7	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanco-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja. Pico claro. Plumón gris oscuro. Ventral implume.

4 días. Ojos cerrados. Plumón gris oscuro.
5 días. Ojos cerrados. Pico color natural. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal, paladar, lengua, naranjas. Piel oscura en la parte dorsal, clara en ventral. Plumón gris oscuro. Vainas alares grises. Apenas se ven las vainas de la cola. Lados del pecho plumas muy chicas blanquecinas.
6 días. Ojos abiertos, marrones.
8 días. Piel clara. Pico pardusco. Comisura amarillenta. Plumón gris. Ventral blanquecino. Cañones de primarias grises con punta clara. En dorsal queda algo de plumón.
9 días. Lados del pecho plumas blanquecinas. Aparecen las láminas en las plumas de las alas y de la cola. También en dorsal. Cubiertas y secundarias con láminas ocráceas.
12 días. Punta de las plumas de cubierta, blancas. Ventral blanco jaspeado de pardo. Plumaje de adulto.
Si se los molesta se van del nido.
13-14 días. Dejan el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,3	1,6	-	-	-	-	-	5,5-6,0
2	0,7	1,4	1,8	-	-	-	-	-	7,0-9,1
3	0,8	1,5-1,8	2,0-2,3	-	-	-	-	-	9,1-13,2
4	0,8	2,0	2,7	-	-	-	-	-	-
5	0,9	2,4	3,2	0,4	-	-	-	-	-
6	1,0	2,8	3,5	1,0	-	0,8	-	-	-
7	1,1	3,1	4,0	1,7	-	1,3	-	-	-
8	1,3	3,5	4,5	2,4	0,3	1,6	0,2	0,7	-

OBSERVACIONES

El 26-02-94 en Cavour, se observó un ejemplar Albino total. Sacó con uno normal, cuatro pichones. Tres blancos y uno normal.
Los pichones son afectados por larvas de moscas. Se constató desde 1 a 7 larvas por pichón.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

CALANDRIA REAL *Mimus triurus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
03-11-79	San Antonio Oeste	4 huevos	Arbusto	3,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Soatenido en arbusta. A baja y mediana.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de palitos. Internamente fibras vegetales, raicillas, pastos, flores.

.

Medidas :

Diámetro total : 16 cm.

Diámetro interno : 8 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 15 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas y manchitas castañas distribuidas por toda la superficie.

Medidas y peso.

De 24,1 a 25,1 x 17,9 a 18,7 X= 24,5 x 18,3 (N= 4)

Peso de la cáscara : 0,248 a 0,302 X= 0,283 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
471	03-11-79	San Antonio Oeste	24,1 x 18,7	0,248
			24,3 x 17,9	0,300
			24,7 x 18,2	0,302
			25,1 x 18,5	


CALANDRIA CASTAÑA *Mimus dorsalis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Humahuaca	1 huevo	Arbusto	2,50
09-02-83	Humahuaca	1 huevo	Arbusto	2,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tazón) de palitos, claveles del aire. Internamente raicillas, pelos, lanas y "pelusas" de Cardones.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 15 cm.

Diámetro interno : de 8 a 9 cm.

Profundidad : de 5 a 7 cm.

Alto : de 10 a 13 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido con pintas castañas y algunas grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 28,4 a 30,5 x 10 a 20,9 X=29,4 x 20,4 (N= 2)

Peso lleno : 4,801 (N= 1)


Peso de la cáscara : de 0,370 a 0,609 X= 0,489 (N= 2)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
472	23-02-79	Humahuaca	30,5 x 20,0		0,370
608	09-02-83	Humahuaca	28,4 x 20,9	4,801	0,609

FAMILIA: MOTACILLIDAE

CACHIRLA CHICA *Anthus lutescens*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
22-09-89	Esperanza	3 huevos	En el suelo, entre pastos
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	3 huevos	En el suelo, entre pastos
29-09-00	Santa Fe	1 huevo	En el suelo, entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tacita) de pajitas.

Medidas :

Diámetro interno : de 4 a 5 cm.

Profundidad : de 4 a 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecinos con pintas y manchitas castañas y grises, por toda la superficie. Algunos con puntos pardos más concentrados en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18 a 19,3 x 13,9 a 14,4 X= 18,6 x 14,3 (N= 6)

Peso de la cáscara : 0,100 X = 0,100 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
765	22-09-89	Esperanza	18,0 x 13,9		0,100
			18,1 x 14,4		0,100
			18,3 x 14,4		0,100
768	08-12-90	Cacique Ariacaiquín	19,0 x 14,4	1,9	0,100
			19,1 x 14,4	1,9	0,100
			19,3 x 14,3	1,9	0,100

CACHIRLA UÑA CORTA *Anthus furcatus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
30-09-85	Arteaga	1 huevo y 3 pichones	En el suelo

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tacita) de pajitas.

Medidas :

Diámetro total : 8 cm.

Diámetro interno : 5,5 cm.

Profundidad : 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas pardas, más concentradas en el polo mayor.

Medida y peso.

20 x 15 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,140 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
711	30-09-85	Arteaga	20,0 x 15,0	0,140

CACHIRLA COMÚN *Anthus correndera*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
13-10-72	Cayastacito	3 huevos	Suelo, entre pastos
13-10-72	Cayastacito	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Suelo, entre pastos
10-12-72	San Vicente	4 huevos	Suelo, entre pastos
26-11-98	Junín de los Andes	3 pichones	Suelo, entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tacita) de pajitas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 10 cm.

Diámetro interno : de 5,5 a 8 cm.

Profundidad : de 3 a 4,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color crema con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

De 20 a 20,5 x 14,9 a 15,3 X= 20,2 x 15,1 (N= 2)

Peso de la cáscara: de 0,138 a 0,140 X= 0,139 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
484	13-10-72	Cayastacito	20,0 x 14,9	0,138
			20,5 x 15,3	0,140


OBSERVACIONES

Es parasitada por *Molothrus bonariensis*

CACHIRLA PÁLIDA *Anthus hellmayri*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
25-11-90	Pampa de Achala	3 huevos	En el suelo, entre pastos

Nido hallado junto a R. Straneck, A. Gutierrez Márquez y A. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica (con forma de tacita) de pajitas.

Medidas :

Diámetro total : 9 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 5,5 cm.
Alto : 8 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color grisáceo con pintas castaño claro y oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor formando corona.

Medidas y peso.


De 21,4 a 21,8 x 15 a 15,9 X= 21,5 x 15,5 (N= 3)
Peso lleno : de 2,4 a 2,6 X= 2,5 (N= 3)
Peso de la cáscara : 0,145 X= 0,145 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
763	25-11-90	Pampa de Achala	21,4 x 15,7	2,4	0,145
			21,5 x 15,0	2,6	0,145
			21,8 x 15,9	2,6	0,145

FAMILIA: THRAUPIDAE

CARDENAL COMÚN *Paroaria coronata*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Total de nidos : 159

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-11-70	Esperanza	3 huevos	Aromo	4,00
19-12-74	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,30
31-12-79	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	5,00
29-11-81	Esperanza	3 huevos	Curupí	4,10
30-10-83	Esperanza	4 huevos	Chañar	1,90
18-10-86	Llambi Campbell	2 huevos	Chañar	2,50
25-10-86	San Javier	2 huevos	Ñandubay	2,20
06-01-89	Esperanza	No observado	Curupí	4,00
14-01-89	Esperanza	No observado	Curupí	4,20
11-02-89	Esperanza	No observado	Ombú	7,00
31-10-89	Soledad	1 huevo	Pino	5,50
04-11-89	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,30
22-12-89	Esperanza	2 huevos	Curupí	4,00
19-10-90	Esperanza	No observado	Curupí	5,00
27-10-90	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
06-11-90	Esperanza	No observado	Curupí	5,50
15-12-90	Saladillo dulce	3 huevos	Chañar	4,00
19-12-90	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
19-12-90	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,70
01-01-91	Isla Berduc	No observado	Eucaliptus	20,0
05-01-91	Grutly	1 pichón	Chañar	2,80
16-01-91	Grutly	En construcción	Ñandubay	2,60
16-10-92	Esperanza	No observado	Chañar	4,50
16-10-92	Esperanza	1 huevo	Chañar	3,40
16-10-92	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
22-10-93	Esperanza	No observado	Curupí	4,30
25-10-93	Esperanza	No observado	Chañar	6,50
27-10-93	Esperanza	No observado	Curupí	5,50
27-10-93	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,00
18-11-93	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,50
20-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,50
20-11-93	Esperanza	1 huevo	Curupí	4,00
22-11-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,00
25-11-93	Esperanza	No observado	Chañar	6,00
26-11-93	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
07-12-93	Esperanza	No observado	Curupí	5,00
08-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,30

12-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
16-12-93	Esperanza	2 huevos	Algarrobo	6,50
18-12-93	Esperanza	3 huevos	Chañar	7,00
24-12-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	5,00
26-12-93	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,50
26-12-93	Esperanza	4 huevos	Algarrobo	2,80
26-12-93	Esperanza	4 huevos	Chañar	3,80
23-12-94	Esperanza	1 huevo	Cina cina	2,10
27-12-94	Esperanza	3 huevos	Aromo	2,20
09-11-95	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Naranjo	2,60
14-03-96	Villa Roda	2 pichones	Cina cina	2,80
04-10-96	Villa Roda	En construcción	Sauce	2,90
12-10-96	Esperanza	No observado	Eucaliptus	5,00
05-01-97	Villa Roda	2 huevos	Cina cina	2,80
08-10-98	Esperanza	Sin postura	Chañar	3,20
08-10-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,20
12-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,00
13-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	3,80
13-10-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
14-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	4,10
14-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
16-10-98	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,60
17-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	3,30
17-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	3,50
17-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	3,00
17-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,60
19-10-98	Esperanza	En construción	Chañar	4,50
25-10-98	Esperanza	2 pichones	Chañar	4,00
30-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
05-11-98	Esperanza	En construción	Chañar	4,00
07-11-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,50
09-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,90
11-11-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,00
13-11-98	Esperanza	Sin postura	Curupí	3,80
14-11-98	Esperanza	No observado	Algarrobo	3,20
14-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,00
19-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,90
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
19-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
30-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,10
30-11-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,60
30-11-98	Esperanza	En construcción	Algarrobo	5,50
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,50
01-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
01-12-98	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,30
01-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	4,30
03-12-98	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,80
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	5,20
07-12-98	Esperanza	3 huevos	Aromo	2,30
11-12-98	Esperanza	No observado	Aromo	3,00
12-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	4,10
12-12-98	Esperanza	No observado	Quebracho blanco	4,50
26-12-98	Esperanza	No observado	Curupí	3,60

09-01-99	Esperanza	3 pichones	Chañar	4,70
02-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,70
08-02-99	Esperanza	No observado	Curupí	5,30
14-02-99	Esperanza	No observado	Chañar	4,30
12-10-99	Calchaquí	2 huevos	Chañar	1,50
29-12-99	Esperanza	En construcción	Chañar	4,20
24-10-00	Esperanza	2 huevos	Tala	1,80
23-10-01	Esperanza	1 huevo	Aromo	2,00
07-11-01	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,30
09-11-01	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,80
09-11-01	Esperanza	1 huevo	Aromo	3,30
09-11-01	Esperanza	Sin postura	Aromo	1,50
15-12-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,90
14-01-02	Esperanza	3 pichones	Curupí	3,20
29-09-02	Esperanza	En construccion	Curupi	6,30
07-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,40
11-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
11-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	2,50
14-10-02	Esperanza	No observado	Chañar	4,20
25-10-02	Esperanza	En construcción	Chañar	2,30
31-10-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	5,10
01-11-02	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,60
01-11-02	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	4,40
01-11-02	Esperanza	3 huevos	Aromo	2,60
05-11-02	Esperanza	En construcción	Chañar	3,00
05-11-02	Esperanza	3 huevos	Quebracho blanco	4,80
07-11-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,60
07-11-02	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,60
11-11-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	5,00
13-11-02	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,30
18-11-02	Esperanza	2 huevos	Aromo	1,60
18-11-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
23-12-02	Esperanza	3 pichones	Chañar	5,20
03-01-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	4,10
30-10-03	Esperanza	2 pichones	Aromo	2,10
30-10-03	Esperanza	1 huevo	Acacia negra	4,30
01-11-03	Esperanza	1 huevo	Aromo	3,20
01-11-03	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,80
22-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
25-11-03	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,60
25-11-03	Esperanza	3 huevos	Aromo	1,60
15-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	3,70
15-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	4,00
21-12-03	Esperanza	No observado	Chañar	5,00
21-12-03	Esperanza	l huevo	Aromo	2,20
31-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
31-12-03	Esperanza	3 huevos	Chañar	5,00
05-01-04	Esperanza	No observado	Cina-cina	4,80
05-01-04	Esperanza	3 huevos	Chilca	2,80
19-10-04	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	2,30
19-10-04	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,90
01-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,70
03-11-04	Esperanza	3 pichones	Algarrobo	3,70

05-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,30
05-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,60
08-11-04	Esperanza	3 huevos	Acacia negra	3,40
16-11-04	Esperanza	3 pichones	Chañar	2,30
16-11-04	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,70
16-11-04	Esperanza	1 huevo	Algarrobo	2,50
23-12-04	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	Chañar	3,40
15-10-05	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,30
22-12-05	Esperanza	3 huevos	Chañar	3,20
21-10-09	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,20
21-10-09	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80
21-10-09	Esperanza	2 huevos	Acacia negra	3,00
16-11-12	Villa Roda	No observado	Chañar	3,20
16-11-12	Villa Roda	No observado (*)	Chañar	4,00
16-11-12	Villa Roda	No observado	Curupí	6,50
16-11-12	Villa Roda	No observado	Algarrobo	3,40
08-01-13	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,50

(*) Luego de volar los pichones el nido fue ocupado nuevamente en el mes de diciembre.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	4	1						1	47	56	38

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 8 días	Pone en días corridos	14 a 15 días	14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza o semiesfera de fibras vegetales. Internamente raicillas, pelos, cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 13 cm.
Diámetro interno : de 7 a 8 cm.
Profundidad : de 3 a 5,5 cm.
Alto : de 6 a 8 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,30 m.
Nido más alto : 20,00 m

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Chañar	84	Quebracho blanco	4	Chilca	1
Curupí	20	Acacia negra	3	Ombú	1
Aromo	17	Ñandubay	2	Pino	1
Algarrobo	16	Eucaliptus	2	Naranjo	1
Cina cina	5	Tala	1	Sauce	1

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verde o pardo verdoso con pintas y manchitas ocres, pardas o castañas, distribuidas por toda la superficie. Algunos pueden tener líneas negras.

Medidas y pesos :

De 22 a 24,7 x 15,7 a 19,3 X= 23,4 x 17,0 (N= 34)

Peso lleno : de 2,75 a 3,90 X= 3,2 (N= 25)

Peso de las cáscaras : de 0,186 a 0,245 X= 0,225 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
497	22-11-70	Esperanza	23,0 x 18,4		0,220
			23,2 x 19,3		0,238
			23,5 x 18,4		0,245
498	31-12-79	Esperanza	23,4 x 16,9		0,213
			24,0 x 17,0		0,215
			24,7 x 17,3		0,245
	29-11-81	Esperanza	23,8 x 16,4		0,186
			24,5 x 15,7		0,194
			24,6 x 17,0		0,196
623	30-10-83	Esperanza	22,0 x 16,0	3,220	0,192
			22,3 x 16,0	3,315	0,192
			22,3 x 16,3	3,250	0,214
			22,3 x 16,5	3,350	0,215
511	04-11-89	Esperanza	22,7 x 16,8	2,750	0,240
			22,8 x 16,8	2,790	0,240
			23,5 x 16,8	2,800	0,240
	19-10-04	Esperanza	22,7 x 17,0	3,3	
			23,0 x 17,7	3,4	
			23,3 x 17,0	3,3	
	19-10-04	Esperanza	23,6 x 18,0	3,9	
			24,0 x 18,3	3,7	
			24,0 x 18,3	3,9	
	01-11-04	Esperanza	23,6 x 17,0	3,4	
			24,0 x 16,6	3,4	
			24,0 x 16,6	3,2	
	05-11-04	Esperanza	24,0 x 18,0	3,8	
			24,5 x 17,8	3,8	
			24,5 x 17,0	3,5	
	05-11-04	Esperanza	23,0 x 16,0	3,5	
			23,0 x 17,0	3,1	
			23,5 x 16,5	3,2	
	08-11-04	Esperanza	24,0 x 18,0	3,5	
			24,0 x 17,5	3,7	
			24,2 x 17,5	3,5	

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Piel y patas oscuras. Pico gris, comisura blanquecina. Cavidad bucal y lengua rosados. Plumón fino, gris en la cabeza, dorso inferior y dorsal de las alas.

4 días. Abre los ojos, marrones. Aparecen las vainas en la cola y en la parte dorsal.

5 días. Plumón gris oscuro. Lados del pecho y muslos vainas blanquecinas. Vainas alares grises. Abriendo las láminas de las plumas alares. Aparecen las vainas en la cola.

6 días. Pequeña mancha marrón-rojiza en la garganta.

8 días. Se nota el color marrón-rojizo en las plumas del copete y en la garganta. Ventralmente blanquecino. Flancos ocráceos. Plumas de las alas y de la cola con láminas. Dorsalmente con el color del adulto. Vivaracho.

10 días. Muy activo. Si es molestado se va del nido.Grita. Corona y garganta, marrón rojiza. A los lados de la cara se notan plumitas rojizas. Collar nucal blanco. Ventral blanco. Dorsalmente, alas y cola, grises. Algunas plumas del abdomen jaspeadas de marrón. Patas y uñas grises.

PICHONES

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,5	0,8	1,0-1,3	-	-	-	-	-	3,2
2	0,5-0,6	0,9-1,0	1,3-1,7	-	-	-	-	-	3,9-6,5
3	0,6	1,1-1,2	1,41,8	-	-	-	-	-	5,2-9,0
4	0,6	1,2-1,4	1,7-1,9	0,1-0,5	-	0,2-0,4	-	-	9,6-14,0
5	0,7	1,8-2,0	2,4-2,8	0,8-1,4	-	0,7-1,0	-	-	14,2-17,3
6	0,8-0,9	1,9-2,1	2,8	1,0-1,6	0,2	1,0-1,1	0,1-0,2	0,2	17,3-21,6
7	0,9	2,1-2,4	2,9	1,3-1,7	0,2	1,1-1,4	0,3	0,3-0,4	18,3-22,0
8	0,8-0,9	2,3-2,4	2,9	1,5-1,9	0,3	1,2-1,6	0,3	0,5-0,6	19,7-23,0

OBSERVACIONES


Los pichones son alimentados con Moras y son afectados por larvas de moscas.
Es parasitada por *Molothrus bonariensis*
Puede ocupar el mismo nido en la misma temporada.

CARDENILLA *Paroaria capitata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 15



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-02-76	Esperanza	3 huevos	Arbusto	3,00
31-10-77	Río Paraná (Boca del Yacaré)	2 huevos	Laurel de la isla	3,50
18-10-79	Colonia Macías	4 huevos	Naranjo	1,40
30-11-81	Cayastá	3 huevos	Aromo	3,60
04-12-88	Cayastá	En construcción	Timbó colorado	6,50
11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Aromo	2,80
02-01-91	El Laurel	Sin postura	Aromo	3,30
26-11-91	Villa Roda	No observado	Aromo	3,00
11-01-94	Esperanza	4 huevos	Cina cina	1,50
17-10-99	Colastiné	En construcción	Aromo	2,80
08-11-01	Esperanza	Sin postura	Cina-cina	1,60

30-10-04	Villa Roda	3 huevos de *M. bonariensis*	Eucaliptus	4,10
09-11-04	Esperanza	1 huevo	Curupí	2,90
05-12-04	Villa Roda	4 huevos	Eucaliptus	4,10
08-01-13	Villa Roda	3 huevos	Cina-cina	1,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	1								4	4	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 8 días	Pone en días corridos	14-15 días	14-15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o atado a ramitas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas. A baja altura y mediana altura. Raro altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza o semiesfera de fibras vegetales. Internamente raicillas, pelos, cerdas, hilos.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.

Diámetro interno : de 6 a 6,5 cm.

Profundidad : de 2,5 a 3,5 cm.

Alto : de 5,5 a 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color crema, ocre o verdoso con pintas marrones, grises u ocres, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 19 a 22,8 x 14,9 a 16,4 X= 21,0 x 15,5 (N= 17)

Peso lleno : de 2,5 a 2,6 X= 2,55 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,116 a 0,162 X= 0,143 (N= 12)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
499	17-02-76	Esperanza	22,0 x 15,8		0,145
			20,3 x 15,7		0,156
			21,2 x 16,4		0,162
	31-10-77	Río Paraná (Boca del Yacaré)	21,7 x 15,0		0,155
501	18-10-79	Colonia Macías	19,0 x 15,3		0,116
			19,7 x 15,3		0,132
			20,0 x 15,7		0,141
			20,6 x 16,0		0,141
	30-11-81	Cayastá	19,6 x 15,0		0,128
			20,2 x 15,7		0,133
			20,3 x 14,9		0,140
500	11-12-90	Santa Rosa (S.Fe)	21,3 x 15,2		0,135
	09-11-04	Esperanza	21,0 x 15,5	2,5	
	05-12-04	Villa Roda	21,5 x 16,0	2,5	
			22,0 x 16,0	2,5	
			22,2 x 16,3	2,5	
			22,8 x 17,0	2,6	

PICHONES

Nace con los ojos cerrados. Piel oscura. Comusira amarilla. Cavidad bucal y lengua, rosados. Abundante plumón gris oscuro, en cabeza, dorso y dorsal de las alas.

4 días. Abre los ojos.
6 días. Ventralmente y muslos con vainas blancas. Resto vainas grises. Abriendo las láminas.
9 días. Vivarachos. Gritan. Rojizo en la garganta. Ventral blanco.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	1,2	1,4	-	-	-	-	-	3,5
2	0,5	1,2	1,6	-	-	-	-	-	4,7
3	0,5	1,3-1,4	1,8	-	-	-	-	-	5,8
4	0,5	1,5-1,6	2,0	-	-	-	-	-	7,2-8,3
5	0,5	1,7-1,9	2,3	1,0-1,2	-	0,8-0,9	-	-	10,5-11,0
6	0,6	1,8-2,0	2,5-2,6	1,4-1,5	0,1	1,3-1,4	-	0,1	13,0-15,2
7	0,7	2,0-2,1	2,7-2,8	1,4-1,6	0,3	1,3-1,4	0,1	0,3	15,0-17,2
8	0,7-0,8	2,1-2,3	2,8-3,0	1,4-1,7	0,7	1,2-1,3	0,6	0,6	17,0-20,0
9	0,7-0,8	2,2-2,5	3,0-3,1	1,4-1,7	1,0-1,2	1,0-1,2	0,8-1,2	0,8-1,0	20,5-22,0

OBSERVACIONES

Los pichones son afectados por larvas de moscas (*Philornis sp.*)
Es parasitada por *Molothrus bonariensis*


TANGARÁ ALISERO *Thlypopsis ruficeps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-99	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Arbusto	2,70



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO
Ubicación.
Sostenido en ramas. A baja altura y mediana altura.
Características.
Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de taza. Emplea en la construcción tallos de enredaderas, pajas y hojas. Internamente fibras vegetales finas y algunas cerdas.
Medidas :
Diámetro total : 9,5 cm.
Diámetro interno : 4,5 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 12 cm.

HUEVOS
Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color crema con pintas y líneas castañas y pardas, distribuidas por toda la superficie.
Medidas y pesos :

De 19,7 a 19,9 x 13,8 a 13,9 X= 19,8 x 13,8 (N= 2)
Peso de la cáscara : 0,090 X= 0,090 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
909	18-12-99	Cuesta del Clavillo	19,7 x 13,8	0,090
			19,9 x 13,9	0,090


SAÍRA DE ANTIFAZ *Pipraeidea melanonota*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
06-02-83	Yatasto	3 huevos	Enredadera	3,50



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

Alto : 6 cm.

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de tacita

Emplea en la construcción palitos. Internamente nervaduras de hojas y cerdas.

Medidas :

Diámetro total : 14 cm.
Diámetro : 6 cm.
Profundidad : 3,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido con pintas marrones, pardas y grises, por toda la superficie, pero en mayor cantidad hacia el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 22,4 a 23,1 x 17,8 a 18 X= 22,6 x 17,9 (N= 3)
Peso lleno : de 3,694 a 3,765 X= 3,727 (N= 3)
Peso de las cáscaras : 0,195 a 0,200 X= 0,198 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
609	06-02-83	Yatasto	22,4 x 18,0	3,694	0,195
			22,5 x 17,9	3,724	0,200
			23,1 x 17,8	3,765	0,200

CELESTINO COMÚN *Thraupis sayaca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 6



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-11-71	Campo Andino	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	3,50
15-11-71	La Gallareta	1 huevo	Ombú	5,00
23-10-79	Cayastá	3 huevos	Ombú	9,00
04-12-88	Cayastá	2 pichones	Naranjo	3,50
03-11-98	Esperanza	No observado	Acacia negra	6,50
09-01-99	Aconquija	No observado	Árbol	6,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado o sostenido en ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de tacita.

Emplea en la construcción pajitas, fibras vegetales. A veces palitos en la base. Internamente raicillas y algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 11 cm.

Diámetro interno : 6 cm.

Profundidad : 3,5 cm.

Alto : de 7 a 8 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde claro o crema con pintas y manchitas pardas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 24,2 a 24,5 x 17 a 17,5 X=24,3 x 17,2 (N= 4)

Peso de las cáscaras: 0,181 a 0,200 X= 0,193 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
488	07-11-71	Campo Andino	24,3 x 17,0	0,194
489	23-10-79	Cayastá	24,2 x 17,3	0,181
			24,2 x 17,5	0,193
			24,5 x 17,3	0,200

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

NARANJERO *Thraupis bonariensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-01-71	La Granja	2 pichones	Arbusto	3,20
12-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	4,70
27-10-98	Esperanza	En construcción	Chañar	3,70
16-01-03	Las Estancias	3 huevos	Árbol	2,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles o arbustos. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de taza.

Emplea en la construcción fibras vegetales. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : 10 cm.

Diámetro interno : 6 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 9 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido o blanquecino verdoso, con pintas, manchitas y rayitas pardo oscuro y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 23 a 24,5 x 17,5 a 18,5 X= 23,6 x 18 (N= 4)

Peso de la cáscara : 0,230 (N= 1)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
16-01-03	Las Estancias	23,0 x 17,5
		23,0 x 18,0
		24,5 x 18,0

OBSERVACIONES

Demora en la construcción del nido 12-13 días.

COMESEBO CABEZA NEGRA *Phrygilus atriceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-02-79	Humahuaca	3 huevos	Arbusto	2,50
23-02-79	Humahuaca	2 huevos	Arbusto	2,50



23-02-79	Humahuaca	4 huevos	Arbusto	2,30
23-02-79	Azul Pampa	2 pichones	Hueco	3,00
10-02-83	Azul Pampa	2 pichones	Hueco	3,10
10-02-83	Azul Pampa	2 huevos	Hueco	2,20
10-02-83	Azul Pampa	2 pichones	Arbusto	2,60
10-02-83	Azul Pampa	No observado	Arbusto	3,00

.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En arbustos o en repisas rocosas. Sostenido o asentado en la roca. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales y claveles del aire. A veces fibras solamente. Internamente lanas, pelos y "pelusas" de cardones.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 16 cm.

Diámetro interno : de 5,5 a 6 cm.

Profundidad : de 2,5 a 4 cm.

Alto : de 7 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verde azulado con pintas grises y pardas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 21,2 a 24,9 x 15,4 a 17,4 X= 23 x 16,2 (N= 11)

Peso lleno : de 2,582 a 2,817 X= 2,699 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,145 a 0,214 X= 0,162 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
528	23-02-79	Humahuaca	23,6 x 17,4		0,156
			23,9 x 15,4		0,158
			24,2 x 16,3		0,163
529	23-02-79	Humahuaca	21,2 x 16,6		0,149
			21,8 x 16,7		0,154
530	23-02-79	Humahuaca	23,0 x 15,8		0,145
			23,3 x 16,2		0,160
			23,9 x 16,4		0,163
			24,9 x 16,5		0,163
610	10-02-83	Azul Pampa	21,6 x 16,3	2,582	0,148
			22,2 x 15,6	2,817	0,214


COMESEBO ANDINO *Phrygilus gayi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-02-72	Río Grande	4 pichones	Hueco en una pared	1,90
10-11-79	Río Turbio	2 huevos	Tirante de construcción	3,10



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en paredes, tirantes de construcciones. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales y raicillas. Internamente lanas y pelos.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 15 cm.

Diámetro interno : de 5,5 a 8 cm.

Profundidad : de 4 a 8 cm.

Alto : de 8,5 a 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con finas pintas pardas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 18,8 a 21 x 16,2 a 17,8 X= 19,9 x 17 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,150 a 0,161 X= 0,155 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
527	10-11-79	Río Turbio	18,8 x 17,8	0,150
			21,0 x 16,2	0,161

COMESEBO PATAGÓNICO *Phrygilus patagonicus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-11-79	Río Turbio	1 huevo	Sobre recipiente de agua	3,20
10-11-79	Río Turbio	3 pichones	Arbusto	2,10
23-12-94	San Carlos de Bariloche	3 huevos (*)	Saliente rocosa	2,50

(*). Nido localizado por Anibal E. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en repisas, salientes rocosas, arbustos. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales. Internamente lanas y fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 16 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : de 2 a 3 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verdoso o celeste verdoso, con pintas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 22,4 x 15 a 16,8 X= 22 x 15,6 (N= 4)

Peso de las cáscaras : 0,160 X= 0,160 (N= 4)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
526	10-11-79	Río Turbio	22,4 x 15,6	0,160
855	23-12-94	San Carlos de Bariloche	21,5 x 15,0	0,160
			21,8 x 15,3	0,160
			22,4 x 16,8	0,160

YAL NEGRO *Phrygilus fruticeti*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-11-73	Península Valdés	1 pichón	Arbusto	0,40
06-02-77	Cachi	2 pichones	Arbusto	0,35
23-02-79	Humahuaca	2 huevos	Arbusto	1,50
23-02-79	Humahuaca	2 pichones	Arbusto	1,00
23-02-79	Humahuaca	2 pichones	Arbusto	0,50
03-11-79	San Antonio Oeste	2 pichones	Arbusto	0,80
03-11-79	San Antonio Oeste	2 pichones	Arbusto	0,90
15-10-04	Llancanelo	En construcción	Arbusto	0,40

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos. A baja altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales. Internamente lanas y alguna pluma.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 15 cm.

Diámetro interno : de 6 a 6,5 cm.

Profundidad : de 5 a 8 cm.

Alto : de 10 a 12 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido con pintas y manchitas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 25,4 a 27 x 17,1 a 18 X= 26,1 x 17,5 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,190 a 0,193 X= 0,192 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
719	23-02-79	Humahuaca	26,8 x 17,9	0,190
			27,0 x 18,0	0,192

YAL CHICO *Phrygilus plebejus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
23-01-79	Humahuaca	2 huevos	Arbusto	0,30
23-02-79	Abra Pampa	Sin postura	Arbusto	0,30
06-12-81	Ascochinga	4 huevos	Pasto puna	0,20
10-02-83	Azul Pampa	2 pichones	Saliente de una roca	1,60
26-01-84	Los Gigantes	3 huevos	Hueco en una piedra	1,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos, pastos, repisas rocosas. A baja altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente lanas, pelos y alguna pluma.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 10 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 2 a 3 cm.
Alto : de 6 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 2 a 4 huevos.

Ovoidales. De color verde azulado o turquesa, con pintas pardas, ocres o grises, distribuidas por toda la superficie, pero en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas y pesos :

Para *Phrygilus p. plebejus*
De 19,5 a 19,8 x 14 a 14,7 X= 19,6 x 14,3 (N= 2)
Peso de las cáscaras : 0,123 X= 0,123 (N= 2)
Phrygilus p. narosky
De 16,6 a 19,5 x 13,1 a 15,1 X= 18,1 x 14,1 (N= 7)
Peso lleno : de 1,120 a 2,070 X= 2,000 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,089 a 0,108 X= 0,098 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
532	23-01-79	Humahuaca	19,5 x 14,0		0,123
			19,8 x 14,7		
533	06-12-81	Ascochinga	16,6 x 13,1		0,089
			17,5 x 13,5		0,090
			17,7 x 13,8		0,097
			18,2 x 14,1		0,100
634	26-01-84	Los Gigantes	18,7 x 15,0	1,120	0,100
			18,8 x 15,1	1,910	0,103
			19,5 x 14,6	2,070	0,108


COMESEBO CARBONERO *Phrygilus carbonarius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-01-87	Península Valdés	3 huevos	Arbusto	0,80



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos. A baja altura.

Características.

Oculto o semiexpuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajas y unos hilos de nylon. Internamente raicillas y plumas.

Medidas :

Diámetro total : 10 x 14 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 3,5 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste pálido con pintitas pardas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 22 x 16 a 16,3 X= 21,7 x 16,1 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,160 X= 0,160 (N= 3)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
839	01-01-87	Península Valdés	21,5 x 16,0	0,160
			21,6 x 16,1	0,160
			22,0 x 16,3	0,160

DIUCA COMÚN *Diuca diuca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 4



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-02-77	Tinogasta	3 huevos	Nido de espinas (abandonado)	2,20
03-11-79	San Antonio Oeste	4 huevos	Nido de espinas (abandonado)	2,10
10-01-83	Paso Chacabuco	1 huevo (*)	En arbusto	1,70
25-11-88	Río Ñirihuau	4 huevos y 2 de *M. bonariensis* (*)	En Calafate y Rosa mosqueta	1,05

(*). Nidos localizados por Anibal E. Casas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos, matorrales o en nidos abandonados. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajas o fibras vegetales. Internamente materiales suaves o desmenuzados, plumas, lanas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 10 cm.
Diámetro interno : de 6 a 8 cm.
Profundidad : de 4 a 5 cm.
Alto : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verdosos con pintas grises y pardas u ocres, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

D.d. crassirostris
De 23,2 a 24 x 17 a 17,4 X= 23,5 x 17,1 (N= 3)
Peso de las cáscaras: 0,210 a 0,222 X= 0,217 (N= 3)

D.d.minor
De 21,1 a 22,8 x 14 a 15,5 X= 21,6 x 14,8 (N= 3)
Peso de las cáscaras: 0,182 a 0,207 X= 0,196 (N= 3)

D. d. diuca
23,7 x 17,3 a 17,8 X= 23,7 x 17,5 (N= 2)
Peso de las cáscaras: 0,198 a 0,200 X= 0,199 (N= 2)

NIDADAS


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
524	08-02-77	Tinogasta	23,2 x 17,0	0,210
			23,4 x 17,4	0,219
			24,0 x 17,0	0,222
525	03-11-79	San Antonio Oeste	21,1 x 14,0	0,182
			21,2 x 15,5	0,197
			21,3 x 15,0	0,198
			22,8 x 15,0	0,207
718	10-01-83	Paso Chacabuco	22,1 x 17,4	0,196
671	25-11-88	Río Ñirihuau	23,7 x 17,3	0,198
			23,7 x 17,8	0,200

CACHILO CANELA *Donacospiza albifrons*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-12-90	Monte Vera	3 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Yuyo	0,30

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en yuyos. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas finas. Internamente pajitas desmenuzadas.

Medidas :

Diámetro total : 9 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 6 cm.
Alto : 8 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con manchitas castañas y algunas negras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18,8 a 19,1 x 14 a 14,1 X= 19 x 14 (N= 3)
Peso lleno : de 1,3 a 1,6 X= 1,5 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,100 a 0,110 X= 0,103 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
786	20-12-90	Monte Vera	18,8 x 14,0	1,3	0,100
			19,0 x 14,1	1,6	0,110
			19,1 x 14,0	1,6	0,110


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

MONTERITA PECHO GRIS *Poospiza hypochondria*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										



Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
08-02-01	Azul Pampa	1 pichón	Hueco en pared de barro	2,00

Nido localizado por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación.

Asentado en hueco en pared de construcción. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente fibras finas y cerdas.

Medidas :

Diámetro total : 10 cm.
Diámetro interno : 4,5 cm.
Profundidad : 4 cm.
Alto : 7 cm.


MONTERITA CEJAS ROJIZAS *Poospiza erythrophrys*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-99	Río Potrero y ruta 48	3 huevos	Árbol	2,20



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A baja mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales y líquenes. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : 11,5 cm.

Diámetro interno : 6 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 9 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas negras y algunas grises y castañas, concentradas en el polo mayor.

Medida y peso.

De 19,4 a 20 x 15 a 15,2 X= 19,3 x 15 (N= 3)

Peso de la cáscara : 0,140 X= 0,140 (N= 3)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
908	18-12-99	Río Potrero y ruta 48	20,0 x 15,2	0,140
			19,5 x 15,0	0,140
			19,4 x 15,1	0,140

SIETEVESTIDOS *Poospiza nigrorufa*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 12



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-11-80	Cayastá	2 pichones	Paja brava	0,25
01-12-90	Esperanza	2 pichones y 1 huevo y 2 pichones de *M. bonariensis*	Matorral	0,80
02-12-90	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Yuyos	0,70
02-01-91	Santa Rosa (S. Fe)	1 huevo y 2 pichones	Paja brava	0,50

18-11-93	Esperanza	1 huevo y 2 pichones	Chañar caido	0,20
14-12-93	Esperanza	3 huevos	Tuna	0,10
30-11-94	Esperanza	1 huevo	Rama seca	0,30
16-12-94	Esperanza	2 huevos	Chañar caido	0,60
05-11-95	Esperanza	En construcción	Tala	0,35
24-12-95	Esperanza	3 pichones	Arbusto	0,35
30-10-00	Santa Fe	1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,70
17-12-03	Esperanza	2 pichones	Cina-cina	0,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1									1	4	6

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8-10 días	Pone en días corridos	14	16

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o asentado en ramas, troncos, arbustos, matorrales, yuyos, hojas de tunas, Paja brava.

A veces tapado por hojas de enredaderas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de tallos de yuyos, pajas, hojas. Internamente raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 11 cm.

Diámetro interno : de 5,5 a 6 cm.

Profundidad : de 2 a 4 cm.

Alto : de 4 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color gris, verdoso o gris verdoso, con pintas, manchitas y líneas grises, pardas y negras.

Medida y peso.

D19,2 a 21 x 14,4 a 15,7 X= 19,7 x 15 (N= 5)

Peso lleno : de 2,1 a 2,4 X= 2,2 (N= 5)

Peso de la cáscara: de 0,118 a 0,120 X= 0,118 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
766	01-12-90	Esperanza	19,3 x 15,7	2,1	0,118
764	02-12-90	Esperanza	19,5 x 15,0	2,2	0,118
			19,6 x 14,8	2,3	
796	02-01-91	Santa Rosa (S. Fe)	21,0 x 15,5	2,4	0,120
846	18-11-93	Esperanza	19,2 x 14,4	2,1	0,118

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Cavidad bucal, lengua y paladar, rojizos. Comisura blanca. Escaso plumón gris.

3 días. Ojos abiertos. Se notan en las zonas ptéridas dorsales las vainas.

5 días. Vainas de las plumas dorsales : 0,4 cm. Vainas de las plumas ventrales amarillentas. Punta de las vainas alares blanquecinas, resto gris. Cabeza gris como el adulto.

7 días. Ventral ocráceo amarillento jaspeado de gris. Patas verde amarillentas. Láminas pardo oscuro. Dorsal como el adulto.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,8	1,2	-	-	-	-	-	-
2	0,4	1,1	1,6	-	-	-	-	-	-
3	0,5	1,5	2,0	0,5	-	0,4	-	-	-
4	0,5	1,7	2,2	1,0	-	-	-	-	-
5	0,6	2,0	2,4	1,5	0,4	1,3	-	0,2	-
6	0,6	2,1	2,6	1,6	0,5	1,3	-	0,4	-
7	0,6	2,3	2,7	1,6	0,6	1,3	-	0,6	-

OBSERVACIONES


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

SIETEVESTIDOS SERRANO *Poospiza whitii*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-11-90	Va. Gral. Belgrano	1 huevo y 1 pichón y 1 pichón de *M. bonariensis* (*)	Crateus	0,28
20-01-10	Ascochinga	3 pichones	Arbusto	0,40

(*). Nido localizado junto con Anibal E. Casas y Roberto Straneck.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en arbustos, matorrales. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de tallos y hojas gruesas y alargadas de yuyos. Internamente raicillas finas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 12 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 2,5 cm.

Alto : 4,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color gris verdoso con pintas y manchas grises, castañas y negras.

Medida y peso.

20 x 15,6 (N= 1)

Peso lleno : 2,1 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,119 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
802	26-11-90	Va. Gral. Belgrano	20,0 x 15,6	2,1	0,119

PICHONES	OBSERVACIONES
Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris oscuro. Pico amarillento. Paladar rosado.	Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

MONTERITA DE COLLAR *Poospiza torquata*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N									N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-76	Encón (*)	2 huevos	Arbusto	1,50
10-11-95	Esperanza	1 huevo	Ombú	1,80
05-12-98	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cardo	0,60
11-12-03	Rosario de la Frontera	2 huevos	Arbusto	1,20

(*). Nido localizado por Gunnar Höy.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos, cardos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Internamente fibras finas y algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 6,5 a 7 cm.

Diámetro interno : de 4,5 a 5 cm.

Profundidad : 3 cm.

Alto : de 4 a 4,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con tono celeste, con pintas y manchitas pardas, grises y negras, más concentradas en el polo mayor.

Medida y peso.

De 17 a 17,8 x 13 a 13,7 X= 17,2 x 13,3 (N= 7)

Peso de la cáscara: de 0,089 a 0,090 X= 0,0,089 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
721	26-02-76	Encón	17,8 x 13,0	0,089
			17,8 x 13,5	0,090
861	10-11-95	Esperanza	17,0 x 13,0	0,089
	05-12-98	Esperanza	17,0 x 13,7	
			17,1 x 13,7	
	11-12-03	Rosario de la Frontera	17,2 x 13,6	
			17,4 x 13,5	

OBSERVACIONES

Es parasitada por *Molothrus bonariensis*

MONTERITA CABEZA NEGRA *Poospiza melanoleuca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de nidos : 34

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
05-01-78	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Yuyo	0,80
21-01-78	Esperanza	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Yuyo	0,60
24-10-79	Cayastá	2 pichones	Naranjo	1,00
15-11-82	Cayastá	3 pichones	Enredadera	0,50
25-10-86	San Javier	3 huevos	Naranjo	1,30
26-09-89	Las Claritas	2 huevos	Molle	2,20
02-11-90	Morteros	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cardo	1,00
07-11-90	Morteros	3 huevos	Yuyo	1,00
31-10-91	Corrientes	2 pichones	Arbusto	2,00
26-10-93	Esperanza	3 huevos	Enredadera	1,50
22-11-93	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,80
27-11-93	Esperanza	1 huevo y 2 pichones	Quebracho blanco	2,80
04-12-93	Esperanza	No observado	Curupí	6,00
10-11-95	Esperanza	1 huevo	Chilca	1,80
20-11-97	Nono	2 huevos	Yuyo	0,90
30-10-98	Esperanza	1 pichón	Chañar	1,70
14-11-98	Esperanza	2 huevos	Sal del indio	1,40
04-11-99	Esperanza	3 huevos	Eupatorio	0,50
19-10-00	Esperanza	En construcción	Chañar	0,70
26-10-00	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,80
05-11-01	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	1,70
10-11-01	Esperanza	3 pichones	Aromo	2,50
11-10-02	Esperanza	1 huevo	Arbusto	0,80
11-10-02	Esperanza	En construcción	Cambará chico	0,50
23-12-02	Esperanza	1 huevo	Chañar	2,60
22-11-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,60
22-11-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,20
02-12-03	Esperanza	1 huevo	Chañar	1,50
19-12-03	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,60
31-12-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
31-12-03	Esperanza	Sin postura	Chañar	1,70
16-01-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
17-12-04	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	1,80
20-10-06	Esperanza	En construcción	Sombra de toro	1,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3								1	10	13	7

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 9 días	Pone en días corridos	14 días	15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado o sostenido a ramitas o tallos de arbustos, enredaderas, hierbas altas. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Externamente puede colocar líquenes. Internamente fibras finas, raicillas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 4,5 a 7 cm.
Diámetro interno : de 4 a 5 cm.
Profundidad : de 2,5 a 4 cm.
Alto : de 3,5 a 7 cm.
Grosor de la pared : de 0,7 a 1 cm.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Chañar	13	Sal del indio	1	Cardo	1
Yuyo	4	Molle	1	Aromo	1
Enredadera	2	Chilca	1	Cambará chico	1
Arbusto	2	Quebracho blanco	1	Curupí	1
Naranjo	2	Tala del indio	1	Eupatorio	1

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco, verdoso o celeste claro con pintas, líneas y/o rayitas, en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,3 a 19,3 x 13,4 a 14,6 X= 18 x 13,8 (N= 12)
Peso de las cáscaras : de 0,101 a 0,115 X= 0,110 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
541	05-01-78	Esperanza	18,7 x 14,3		0,101
			19,3 x 13,8		0,106
542	21-01-78	Esperanza	18,4 x 14,0		0,114
			18,7 x 13,7		0,115
			18,7 x 13,9		0,118
679	26-09-89	Las Claritas	18,0 x 13,7		0,110
			19,0 x 14,6		0,112
	26-10-93	Esperanza	18,7 x 14,0		
			18,9 x 13,9		
848	27-11-93	Esperanza	17,7 x 13,7		0,110
921	26-10-00	Esperanza	16,3 x 13,4		0,110
932	11-10-02	Esperanza	18,5 x 14,0		0,110
	17-12-04	Esperanza	17,2 x 14,0	1,7	
			17,3 x 14,1	1,7	

PICHONES

Descripción. Nacen con con ojos cerrados. Pico color natural, con punta ocrácea. Comisura blanca. Cavidad bucal y paladar, rojizos.

3 días. Ojos cerrados. Aparecen las vainas en dorsal.
5 días. Abre los ojos, marrones. Vainas de las plumas ventrales blancas de 0,3 cm.
8 días. Piel clara.Pico grisáceo.Comisura blanquecina. Plumas cubriendo casi todo el cuerpo, grises. Escaso plumón. Lados del pecho y flancos, ocráceos. Pocas vainas en la cabeza, el resto de las plumas con láminas. Alas y cola, grises. Plumas externas de la cola, blanquecinas. Lados del pecho y flancos ocráceos. Vainas en la cabeza. Láminas en el resto. Emplumado.

Alimentación. Los padres traen insectos y gusanitos. Luego de alimentarlos, quedaban de 10 a 20 segundos posados en el borde del nido. Demoran varios minutos en traer comida y se retiran hasta 35 m. del nido, recorriendo los arbustos.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,2	1,0	1,1						
2									
3	0,5	1,2	1,5	0,3					
4									
5	0,6	1,8	2,2	1,4		1,1		0,2	
6									
7									
8	0,7	2,1	2,7	1,8	0,5	1,7	0,4	0,7	

OBSERVACIONES


Es parasitada por *Molothrus bonariensis*

JILGUERO PUNEÑO *Sicalis lutea*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N									

Total de nidos : 3



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-03-76	Tres Cruces (1)	4 huevos	Cueva en barranca	1,50
23-02-79	Chorrillos (2)	1 huevo	Cueva en barranca	1,50
10-02-83	Azul Pampa (2)	En construcción	Cueva en barranca	1,30

(1). Nido localizado por Gunnar Höy.
(2). Varios nidos en construcción, en cuevas en barrancas.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En cuevas en barrancas. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas.

Medidas :

Diámetro total : 14 cm.
Diámetro interno : 5 cm.
Profundidad : 2 cm.
Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 22,5 a 23,7 x 15,3 a 15,9 X= 22,7 x 15,7 (N= 4)

Pesos de las cáscaras : de 0,134 a 0,140 X= 0,137 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
716	15-03-76	Tres Cruces	22,5 x 15,7	0,134
			22,8 x 15,9	0,137
			23,0 x 15,8	0,138
			23,7 x 15,9	0,140
515	23-02-79	Chorrillos	21,6 x 15,3	0,138


JILGUERO CARA GRIS *Sicalis uropygialis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-02-79	Abra Pampa	4 huevos	Hueco en un cerco	0,30



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en cercos, pircas, barrancas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pastos. Internamente lanas y cerdas.

Medidas :

Diámetro total : 12 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 3 cm.
Alto : 6 cm.
Medidas del hueco : diámetro de la boca : 10 cm. Profundidad : 40 cm. Cámara de 12 cm. de ancha y 9 cm. de alta.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 20 a 21,3 x 14,9 a 15,3 X= 20,4 x 15 (N= 4)

Pesos de las cáscaras : de 0,112 a 0,125 X= 0,119 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
516	22-02-79	Abra Pampa	20,0 x 15,2	0,112
			20,0 x 15,3	0,117
			20,3 x 14,9	0,125
			21,3 x 14,9	0,125

JILGUERO DEL MONTE *Sicalis mendozae*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-01-82	Ruta 436. A 60 km. de Talacasto	Sin postura	Cuevas	5,00

REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación.

En cuevas en barrancas. A mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente pelos y lanas.

Medidas :

Diámetro total : 10 cm.
Diámetro interno : 8 cm.
Profundidad : 1,5 cm.
Alto : 6 cm.


JILGUERO AUSTRAL *Sicalis lebruni*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-01-03	Península Valdés	4 huevos	Cueva en barranca	1,40



Nido localizado por Máximo Uranga.

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En cuevas en barrancas. A baja altura y mediana altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas.

Medidas :

Diámetro total : 16 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 3,5 cm.
Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.
Ovoidales. De color blanco.

Medidas :

De 22 x 23,2 x 16,1 a 16,2 X= 22,4 x 16,1
(N= 4)

NIDADA


Fecha	Localidad	Medidas
02-01-03	Península Valdés	22,0 x 16,2
		23,2 x 16,1
		22,3 x 16,1
		22,3 x 16,1

JILGUERO DORADO *Sicalis flaveola*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Total de nidos : 243



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-70	Esperanza	4 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,20
29-11-76	Esperanza	4 huevos	En *Phacellodomus striaticollis*	2,50
21-01-78	Saladillo dulce	4 huevos y 1 de *M. bonariensis*	En *Furnarius rufus*	4,50
21-01-78	Saladillo dulce	4 huevos	En *Furnarius rufus*	3,50
31-10-86	Esperanza	Pichones	En *Anumbius annumbi*	1,80
15-10-88	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
15-10-88	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
15-10-88	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
05-11-88	Llambi Campbell	En construcción	En *Furnarius rufus*	4,50
14-01-89	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
17-01-89	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,60
17-01-89	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
17-01-89	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,00
24-11-89	Esperanza	3 huevos	En *Phacellodomus striaticollis*	2,00
02-11-90	Morteros	5 huevos	En *Furnarius rufus*	5,70
02-11-90	Morteros	5 huevos	En *Furnarius rufus*	6,00
02-11-90	Morteros	2 huevos	En hueco en rama seca	1,20
07-11-90	Morteros	3 huevos	En *Colaptes melanochloros*	1,60
15-11-90	Morteros	No observado	En nido de espinas	3,50
26-11-90	Embalse	En construcción	En nido de espinas	3,50
30-11-90	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
02-12-90	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
14-12-90	Matilde	Sin postura	En *Furnarius rufus*	1,20
14-12-90	Monte Vera	No observado	En *Furnarius rufus*	7,00
15-12-90	Saladillo dulce	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
18-12-90	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
18-12-90	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
02-01-91	El Laurel	No observado	En *Furnarius rufus*	4,50

05-01-91	Grutly	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
31-10-91	Corrientes	En construcción	En hueco en rama seca	8,00
12-11-91	Campo Andino	En construcción	En *Furnarius rufus*	1,50
03-12-91	Villa Ocampo	5 huevos	En tarro	2,70
16-10-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
16-10-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
16-10-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de espinas	3,70
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de espinas	2,80
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de espinas	4,00
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de espinas	6,50
16-10-92	Esperanza	No observado	En nido de espinas	3,70
06-11-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
06-11-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
06-11-92	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
12-12-92	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
08-12-93	Esperanza	2 pichones	En *Phacellodomus striaticollis*	3,80
22-12-93	Esperanza	5 huevos	En *Furnarius rufus*	3,90
05-01-97	Villa Roda	4 huevos	Caja nido	3,20
05-01-97	Villa Roda	4 huevos	Caja nido	3,20
12-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,00
12-09-98	Esperanza	En construcción	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00
15-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,80
15-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
15-09-98	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	2,70
16-09-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,80
16-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,60
21-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,20
21-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,70
21-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,10
21-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,40
26-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	6,00
26-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	2,60
26-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
26-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,10
26-09-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
29-09-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	7,00
29-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,00
29-09-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
01-10-98	Esperanza	No observado	En *Schoeniophylax phryganophila*	3,50
01-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,00
01-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,10
01-10-98	Esperanza	En construcción	En *Pseudoseisura lophotes*	4,30
03-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
03-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,50
03-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
03-10-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,50
08-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
08-10-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,00
13-10-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,70
13-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,40
13-10-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,20
13-10-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	6,00

14-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,60
15-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,10
16-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
16-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
17-10-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,80
17-10-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00
17-10-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,30
17-10-98	Esperanza	En construcción	En *Colaptes melanochloros*	1,70
25-10-98	Esperanza	5 huevos (1)	En Caja nido	1,70
25-10-98	Esperanza	2 huevos	En Caja nido	1,60
25-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,30
25-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
25-10-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	3,50
29-10-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	2,60
29-10-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	1,90
29-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
29-10-98	Esperanza	No observado	En *Pseudoseisura lophotes*	4,50
30-10-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	3,70
30-10-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,60
30-10-98	Esperanza	No observado	En nido de espinas	2,80
30-10-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	1,70
04-11-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,60
06-11-98	Esperanza	No observado	En nido de espinas	2,60
07-11-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	2,00
07-11-98	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	2,00
09-11-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,80
10-11-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
11-11-98	Esperanza	No observado	En nido de espinas	4,00
13-11-98	Esperanza	Sin postura	En Caja nido	2,50
25-11-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,00
30-11-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
30-11-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
01-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,60
01-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,40
07-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
07-12-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,70
11-12-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	2,40
12-12-98	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,00
12-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
16-12-98	Esperanza	No observado	En un hueco en rama	2,60
17-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,90
21-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
28-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,20
30-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
30-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,20
30-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
30-12-98	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,70
03-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
03-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,00
04-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,80
04-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
04-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,40
07-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80

07-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,40
07-01-99	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	3,70
12-01-99	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	3,50
12-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,80
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,50
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	3,40
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,00
22-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
22-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
22-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,80
22-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	3,60
22-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	3,20
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,20
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,50
26-01-99	Esperanza	Sin postura	En Caja nido	2,70
02-02-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,40
08-02-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,20
08-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,50
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	6,40
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,30
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,50
14-02-00	Esperanza	En construcción	En *Furnarius rufus*	4,50
24-10-00	Esperanza	5 huevos	En Caja nido	1,70
07-11-00	Esperanza	3 huevos	En Caja nido	1,70
07-11-00	Esperanza	1 huevo	En Caja nido	3,30
21-12-00	Esperanza	4 pichones	En Caja nido	3,30
21-12-00	Esperanza	4 huevos	En Caja nido	3,40
21-12-00	Esperanza	En construcción	En Caja nido	1,60
06-11-01	Esperanza	En construcción	En Caja nido	1,60
08-11-01	Esperanza	4 huevos	En Caja nido	1,70
16-11-01	Esperanza	4 huevos	En Caja nido	1,60
26-11-01	Esperanza	4 pichones	En Caja nido	1,70
01-12-01	Esperanza	5 pichones	En Caja nido	1,60
01-12-01	Esperanza	5 huevos	En Caja nido	2,30
01-12-01	Esperanza	5 huevos	En Caja nido	1,80
01-12-01	Esperanza	4 pichones	En Caja nido	1,80
01-12-01	Esperanza	4 pichones	En Caño nido	2,30
13-12-01	Esperanza	4 huevos	En Caja nido	2,70
28-09-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,20
28-09-02	Esperanza	No observado	En *Colaptes melanochloros*	3,60
02-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,20
04-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
04-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,10
04-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	5,00
07-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
07-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,90
11-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
11-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,40
11-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,60
11-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	6,50
11-10-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00

14-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,60
14-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,00
14-10-02	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	4,20
14-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
14-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,80
17-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,30
17-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	3,80
17-10-02	Esperanza	No observado	En Caja nido	1,70
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,20
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	6,50
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,70
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	7,00
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,80
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	4,10
24-10-02	Esperanza	No observado	En Caja nido	3,00
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,30
24-10-02	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,00
26-10-02	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	3,80
26-10-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,60
01-11-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,70
01-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
01-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,80
01-11-02	Esperanza	No observado	En *Asthenes baeri*	1,70
05-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,60
05-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
05-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,80
05-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	2,20
05-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
08-11-02	Esperanza	No observado	En *Schoeniophylax phryganophila*	2,20
08-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,70
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,80
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,40
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,00
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,70
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,60
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,00
11-11-02	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,20
22-11-03	Esperanza	3 pichones	En Caja nido	2,00
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,80
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,40
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,60
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,50
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,30
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,30
12-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,60
19-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,20
19-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,10
19-12-03	Esperanza	No observado	En *Cranioleuca pyrrhophia*	4,30
20-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	4,40
21-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	5,40
22-12-03	Esperanza	No observado	En *Furnarius rufus*	3,10
22-12-03	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	3,20

01-11-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	1,50
09-12-04	Esperanza	5 huevos	Caja nido	3,40
16-11-12	Esperanza	4 huevos	Caja nido	1,50

Número de ndos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32	8							21	80	53	49

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
11-13 días	Pone en días corridos	13-14 días	13-14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En nidos abandonados, en huecos, en recipientes, en Cajas o Caños nidos. A baja altura y mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente cerdas o pelos.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.
Diámetro interno : de 5 a 7 cm.
Profundidad : de 2,5 a 3 cm.
Alto : de 4 a 5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,20 m.
Nido más alto : 8,00 m.

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
En nidos de *Furnarius rufus*	130	En huecos en ramas	3
En nidos de *Coryphistera alaudina*	27	En nidos de *Schoeniophylax phryganophila*	2
En Caja nido	27	En nido de *Pseudoseisura lophotes*	2
En nidos de *Phacellodomus sibilatrix*	20	En nido de *Asthenes baeri*	1
En nidos de espinas	10	En nidos de *Cranioleuca pyrrhophia*	1
En nidos de *Colaptes melanochloros*	10	En nidos de *Cranioleuca pyrrhophia*	1
En nidos de *Anumbius annumbi*	5	En Caño nido	1
En nidos de *Phacellodomus striaticollis*	3		

HUEVOS

Pone 5 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido o crema con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 17,8 x 21,4 x 13,3 a 16 X= 19,2 x 14,2 (N= 38)
Peso lleno : de 1,6 a 2,6 X= 2,0 (N= 18)
Peso de las cáscaras : de 0,097 a 0,112 X= 0,110 (N= 16)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
517	15-11-70	Esperanza	18,4 x 14,3		0,097
			18,7 x 13,8		0,105
			19,3 x 14,3		0,106
			19,5 x 14,5		0,115

518	29-11-76	Esperanza	17,8 x 14,4		0,106
			18,0 x 14,5		0,108
			18,0 x 14,9		0,111
			18,4 x 14,4		0,112
519	21-01-78	Saladillo Dulce	17,8 x 14,0		0,109
			17,9 x 14,0		0,109
			18,6 x 14,0		0,112
			19,6 x 13,6		0,122
	21-01-78	Saladillo Dulce	19,0 x 13,5		
			19,0 x 14,0		
			19,0 x 14,0		
			20,0 x 14,0		
	21-01-78	Saladillo Dulce	18,5 x 14,5		
			19,0 x 14,0		
			19,0 x 14,1		
			19,0 x 14,1		
748	02-11-90	Morteros	20,2 x 15,6	2,2	0,110
			20,8 x 16,0	2,4	0,110
			21,0 x 15,8	2,5	0,110
			21,0 x 15,8	2,6	0,110
			21,4 x 15,7	2,6	
	01-11-04	Esperanza	19,0 x 14,4	1,9	
			19,4 x 14,4	2,0	
			19,7 x 14,4	2,0	
			20,0 x 14,0	2,0	
			20,0 x 14,4	2,1	
	09-12-04	Esperanza	18,0 x 14,0	1,6	
			18,8 x 14,4	2,0	
			19,0 x 13,3	1,6	
			19,0 x 14,0	1,7	
			20,0 x 14,0	1,8	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel naranja. Cavidad bucal rojiza. Comisura blanca. Casi implumes. Escaso plumón fino en la cabeza, dorso y parte dorsal de las alas.

2 días. Ojos cerrados. Comisura y pico blanco-amarillento.
5 días. Ojos abiertos, marrones. Escaso plumón.
6 días. Vivaracho. Vainas en zonas pteridas.
8 días. Abriendo las láminas de las plumas primarias. Plumas ventrales y de los muslos, blanquecinas.
9 días. Emplumado. Abriendo las láminas en las vainas de las zonas ptéridas.
10 días. Primarias pardas. Secunarias pardas orilladas de ocráceo. Ventralmente blanquecino con estrías pardas.
11 días. Extremo de los cañones de las plumas alares y de la cola, pardos oscuros, orilladas de ocráceo. Ventralmente blanquecino. Flancos con tono ocráceo.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	0,3	0,8	1,2	-	-	-	-	-	2,6-2,8
2	0,3-04	1,0	1,3	-	-	-	-	-	3,5-4,4
3	0,4-0,5	1,2	1,4	-	-	-	-	-	4,3-5,5
4	0,5	1,4	1,7	0,2	-	0,2	-	-	5,2-6,7
5	0,5	1,6	2,2	0,7	-	0,6	-	-	6,0-9,0
6	0,5	1,8	2,5	1,2	-	0,9	-	0,5-0,6	8,2-11,7
7	0,5	1,9	2,6	1,3	-	1,2	-	0,8	10,5-12,3
8	0,5	2,0	2,6	1,4	0,4	1,4	0,4	1,0	12,7-13,2
9	0,7	2,1	2,7	1,7	0,5	1,6	0,5	0,7	14,0
10	0,7	2,1	2,7	2,0	1,0	1,6	0,7	2,0	14,5

OBSERVACIONES


En el nido del 31-10-86, salía una Culebra verde (*Philodryas patagoniensis*) de comer a los pichones. El nido del 25-10-98 tenía además un huevo de *Troglodytes musculus.* Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

MISTO *Sicalis luteola*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 16



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-70	Esperanza	4 huevos	Suelo	
11-11-72	Aguará	5 huevos	Suelo	
18-10-76	Esperanza	5 huevos	Suelo	
18-10-76	Esperanza	5 huevos	Suelo	
30-11-77	Esperanza	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Suelo	
03-11-79	San Antonio Oeste	4 huevos	Suelo	
20-12-79	Esperanza	4 huevos	Suelo	
11-11-86	Teodolina	5 huevos	Suelo	
05-11-88	Llambi Campbell	4 huevos	Suelo	
26-10-91	Esperanza	En construcción	Suelo	
11-12-95	Esperanza	5 huevos	Suelo	
12-12-95	Esperanza	4 huevos	Suelo	
31-10-00	Wildermuth	3 pichones	Mata de pastos	0,30
06-11-02	Esperanza	4 pichones	Suelo	
06-11-02	Esperanza	1 huevo y 3 pichones	Suelo	
01-12-02	Santa Fe	3 huevos	Mata de pastos	0,20
04-11-03	Empalme San Carlos	3 huevos	Mata de pastos	0,05

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									4	8	4

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-8 días	Pone en días corridos	11 días	10-11 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo o entre yuyos a baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente cerdas o pelos.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 10 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 3 a 5 cm.
Alto : de 5 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco con tono celeste con pintas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,9 x 19,5 x 12,8 a 15 X= 17,7 x 13,6 (N= 20)
Peso lleno : de 1,2 a 1,5 X= 1,3 (N= 5)
Peso de las cáscaras : de 0,082 a 0,130 X= 0,102 (N= 15)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
520	25-10-70	Esperanza	16,9 x 13,8		0,103
			17,0 x 13,4		0,105
			17,5 x 13,3		0,106
			17,5 x 13,7		0,108
521	18-10-76	Esperanza	17,8 x 13,0		0,091
			18,3 x 13,3		0,096
			18,9 x 13,4		0,097
			19,1 x 13,0		0,102
			19,5 x 13,4		0,107
522	30-11-77	Esperanza	18,4 x 15,0		0,122
			18,6 x 14,4		0,130
523	20-12-79	Esperanza	17,0 x 12,8		0,082
			17,3 x 13,4		0,087
			18,0 x 13,4		0,087
			18,5 x 13,5		0,092
	11-12-95	Esperanza	17,5 x 13,8	1,2	
			17,5 x 13,8	1,4	
			17,5 x 13,8	1,4	
			17,5 x 13,8	1,4	
			17,8 x 13,9	1,5	

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Cavidfad bucal y paladar, rojos. Comusura blanca. Maxilar oscuro. Mandíbula amarilla. Plumún fino, ralo, gris claro o blanquecino, en cabeza, dorsal y alas.


3 días. Ojos semiabiertos. Aparecen vainas grises en las alas.

4 días. Abren los ojos. Aparecen las vainas del dorso, alas y cola.
6 días. Aparecen las vainas en la parte ventral. Abriendo las láminas de las plumas dorsales, alas y cola.
8 días. Las plumas de la cabeza y parte dorsal negruzcas orilladas de ocráceo. Costados del pecho y flancos crema amarillentos.
10 días. Ventralmente leve estriado. Dejan el nido.

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

VERDÓN *Embernagra platensis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Total de nidos : 8

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-03-76	Esperanza	2 pichones	Arbusto	1,50
20-10-78	Cayastá	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,60
15-11-81	Cayastá	2 pichones	Paja brava	0,45
03-12-81	San Javier	2 huevos	Paja brava	0,35
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	3 huevos de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,30
03-01-98	Esperanza	1 huevo	Cola de zorro	0,70
18-11-02	Esperanza	En construcción	Cola de zorro	0,80
23-01-03	Villa Roda	En construcción	Paja boba	0,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2		1							1	2	2

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8-10	Pone en días corridos		

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido entre hojas de Paja brava, hierbas altas, arbustos. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Taza o semiesfera de pajitas, fibras vegetales, hojas, tallos de yuyos. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 12 a 14 cm.
Diámetro interno : de 6 a 9 cm.
Profundidad : de 3,5 a 7 cm.
Alto : de 8 a 14,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas ocres y negras, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 24 a 26,9 x 18,7 a 19,2 X= 25,3 x 18,9 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,245 a 0,283 X= 0,260 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
545	20-10-78	Cayastá	24,0 x 19,3	0,264
			24,4 x 18,7	0,273
			24,5 x 18,8	0,283
546	03-12-81	San Javier	26,8 x 19,2	0,245
			26,9 x 18,8	0,251

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

El 18-01-91 en la Laguna del Platero un adulto alimentando a un juvenil.

El 18-01-01 en Concordia dos parejas con un juvenil cada una.


El 15-11-02 en Villa Roda una pareja alimentaba a dos juveniles.

El 13-03-03 al oeste de Ascochinga un adulto alimentaba a un juvenil.

VOLATINERO *Volatinia jacarina*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N



Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
14-12-75	Monte Vera	3 huevos	Chaucha	0,30
06-02-79	Monte Vera	1 pichón	Yuyo	0,50
26-02-79	Manucho	2 huevos	Maicillo	0,25
25-01-92	Monte Vera	Sin postura	Maicillo	0,50
08-12-96	Villa Roda	1 huevo	Yuyo	0,70
05-12-97	La Camila	3 huevos	Yuyo	0,50
17-12-03	Esperanza	1 huevo	Yuyo	0,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado tallos yuyos, hierbas altas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales. Internamente fibras finas, raicillas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 8 cm.

Diámetro interno : de 5 a 5,5 cm.

Profundidad : de 2,5 a 4 cm.

Alto : de 4,5 a 5 cm.

Grosor de la pared : de 0,5 a 1 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde pálido con pintitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor, formando corona.

Medidas y pesos :

De 16,7 a 17,9 x 13 a 14,3 X= 17 x 13,4 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,097 a 0,101 X= 0,098 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
505	14-12-75	Monte Vera	17,3 x 13,0		0,097
			17,8 x 13,0		0,099
			17,9 x 13,5		
506	26-02-79	Manucho	16,7 x 14,3		0,097
			17,7 x 13,3		0,101

CORBATITA DOMINÓ *Sporophila collaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-12-78	Cayastá	3 huevos	Duraznillo blanco	2,00
03-01-81	Reconquista	1 huevo	Duraznillo blanco	1,60
12-02-97	Estero del 13	2 pichones	Paja brava	2,00
25-01-99	Colastiné	2 huevos	Pirí	1,70
05-01-99	Colastiné	Sin postura	Pirí	1,60

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a ramitas o tallos de plantas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales.

Medidas :

Diámetro total : 7 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color verde azulado o blanco verdoso con pintas castañas, marrones, grises o pardas, a veces más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,3 a 19,7 x 12,8 a 13,9 X= 19,3 x 13,3 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,100 a 0,108 X= 0,103 (N= 4)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
507	22-12-78	Cayastá	19,3 x 13,4	0,100
			19,7 x 13,4	0,108
			19,7 x 13,9	0,108
	03-01-81	Reconquista	19,4 x 12,8	0,102

CORBATITA OVERO *Sporophila lineola*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-02-77	Tartagal (Salta)	2 pichones	Arbusto	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO

Ubicación.

Atado a ramitas de arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales.

Medidas :

Diámetro total : 5 cm.
Diámetro interno : 4 cm.
Profundidad : 3 cm.
Alto : 4 cm.

CORBATITA COMÚN *Sporophila caerulescens*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Total de nidos : 62

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-03-71	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paraíso	0,50
31-12-77	Esperanza	3 huevos	Yuyo	0,50
20-01-78	Esperanza	3 huevos	Yuyo	0,60
20-01-78	Esperanza	3 huevos	Yuyo	0,50
20-01-78	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,60
13-12-78	Esperanza	3 huevos	Cardo	0,50
31-12-79	Esperanza	3 huevos	Yuyo	0,40
05-01-82	Esperanza	2 huevos	Yuyo	0,45
03-01-87	Esperanza	2 huevos	Cardo	0,40
26-01-87	Esperanza	2 huevos	Cardo	0,70
03-01-90	Esperanza	3 huevos	Yuyo	0,70
18-01-90	Esperanza	1 huevo	Yuyo	0,50
02-11-90	Morteros	2 pichones	Cardo	0,50
18-12-90	Esperanza	2 pichones	Cardo	0,30
08-01-91	Esperanza	2 pichones	Cardo	0,40
12-01-91	Grutly	3 huevos	Cardo	0,70
12-01-91	Grutly	2 pichones	Yuyo	0,70
18-01-91	Laguna del Platero	2 pichones	Yuyo	0,60

18-01-91	Laguna del Platero	1 huevo	Yuyo	0,50
06-01-95	Esperanza	2 huevos	Cardo	0,45
25-12-95	Esperanza	2 huevos	Naranjillo	0,80
20-01-96	Villa Roda	3 huevos	Yuyo	0,80
20-01-96	Villa Roda	1 huevo	Arbusto	1,80
20-01-96	Villa Roda	2 huevos	Yuyo	0,90
23-01-96	Esperanza	2 huevos	Cardo	0,90
03-01-97	Villa Roda	2 pichones	Yuyo	0,30
03-01-97	Villa Roda	2 huevos	Yuyo	0,50
20-01-87	Esperanza	2 huevos	Jazmín de Cabo	1,30
13-11-98	Esperanza	En construcción	Cardo negro	0,50
05-12-98	Esperanza	2 huevos	Cardo negro	0,70
07-12-98	Esperanza	2 huevos	Cardo negro	1,00
17-12-98	Esperanza	En construcción	Cardo negro	0,60
05-01-99	Esperanza	2 pichones	Cardo negro	0,70
12-01-99	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,70
15-01-99	Esperanza	2 pichones	Cardo negro	0,70
15-01-99	Esperanza	En construcción	Cardo negro	0,50
14-02-99	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,70
14-02-99	Esperanza	Sin postura	Cardo negro	0,60
10-01-00	Esperanza	En construcción	Cardo	0,65
21-12-00	Esperanza	2 huevos	Cardo negro	0,60
24-12-00	Esperanza	Sin postura	Cardo negro	0,80
25-11-02	Esperanza	En construcción	Cardo negro	0,60
25-11-02	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,60
07-01-03	Esperanza	3 huevos	Duraznero	3,30
24-01-03	Villa Roda	3 huevos	Mata negra	1,00
19-12-03	Esperanza	2 pichones	Cardo negro	0,60
04-01-04	Esperanza	2 huevos	Cardo negro	0,35
04-01-04	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,40
04-01-04	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,50
04-01-04	Esperanza	2 pichones	Cardo negro	0,40
04-02-04	Villa Roda	2 huevos	Arbusto	1,70
22-11-04	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,60
25-11-04	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,65
30-11-04	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,40
23-12-04	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,60
15-02-05	Esperanza	2 pichones	Caña tacuara	2,80
03-03-06	Esperanza	2 huevos	Soja	0,60
25-01-07	Esperanza	3 pichones	Caña tacuara	3,40
26-01-07	Franck	2 pichones	Maiz	1,50
05-01-08	Esperanza (*)	3 huevos	Caña tacuara	3,50
20-12-09	Esperanza	3 huevos	Barba de viejo	3,00
20-02-10	Esperanza	En construcción	Caña tacuara	3,70

(*) Luego de volar los pichones, a los pocos días ocupó nuevamente el nido.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
35	5	2								7	13

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5-6 días	Pone en días corridos	11-12	12

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado tallos de plantas (hierbas altas, arbustos, árboles). A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales finas, liadas con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : de 5 a 6 cm.
Diámetro interno : de 4 a 5 cm.
Profundidad : de 3,5 a 4 cm.
Alto : de 5 a 6 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,30 m.
Nido más alto : 3,30 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº	Sostén	Nº
Cardo negro	22	Soja	1	Duraznero	1
Yuyo	15	Naranjillo	1	Mata negra	1
Cardo	10	Curupí	1	Maiz	1
Caña tacuara	4	Paraíso	1	Barba de viejo	1
Arbusto	2	Jazmín del Cabo	1		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino, crema o blanco verdoso, con pintas pardas, grises y puntos negros, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 16,5 a 18,4 x 12,0 a 13,3 X= 17,3 x 12,3 (N= 25)
Peso lleno : de 1,2 a 1,5 X= 1,4 (N= 15)
Peso de las cáscaras : de 0,079 a 0,110 X= 0,085 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
510	01-03-71	Esperanza	16,5 x 12,7		0,086
513	31-12-77	Esperanza	16,8 x 12,8		0,079
			17,4 x 12,6		0,080
			17,6 x 12,7		0,081
	31-12-79	Esperanza	18,4 x 13,0		0,099
			18,4 x 13,3		0,110
512	05-01-82	Esperanza	18,2 x 12,5		0,091
			18,2 x 13,0		0,093
800	12-01-91	Grutly	16,8 x 13,2	1,5	0,080
			18,0 x 13,0	1,5	0,080
			18,1 x 12,8	1,5	0,080
862	25-12-95	Esperanza	16,7 x 12,2		0,082
			17,3 x 12,3		0,082
	22-11-04	Esperanza	18,0 x 12,1	1,4	
			18,0 x 12,2	1,5	
			18,2 x 12,0	1,4	
	25-11-04	Esperanza	17,0 x 12,0	1,2	

		17,5 x 12,2	1,3
		17,8 x 12,0	1,3
30-11-04	Esperanza	17,6 x 12,1	1,3
		17,7 x 12,0	1,3
		17,8 x 12,0	1,3
23-12-04	Esperanza	17,2 x 12,0	1,2
		17,4 x 12,1	1,3
		17,7 x 12,0	1,4

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel naranja. Comisura amarilla. Cavidad bucal y lengua rosados. Escaso plumón fino, gris, en cabeza, dorsal y dorsal de las alas.
4 días. Abre los ojos. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal y paladar, rojizos. Mancha amarilla en la parte anterior del paladar. Plumón escaso, gris. Vainas alares canelas. Zonas ptéridas con vainas grises en dorsal y blanquecinas en ventral.
6 días. Piel verdosa. Pico color natural. Comisura amarilla. Lados del pecho amarillentos jaspeados de pardo. Flancos amarillentos. Láminas de las cubiertas canelas. Láminas de primarias y secundarias, pardas.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,7-1,0	1,1	-	-	-	-	-	1,8-2,9
2	0,3	0,7-0,8	1,1	-	-	-	-	-	2,2-2,4
3	0,3	0,8-0,9	1,2	0,2	-	-	-	-	2,6-3,6
4	0,4	1,2	1,5	0,8	-	0,6	-	-	4,2-4,7
5	0,5	1,4	1,9	1,2	-	0,9	-	-	5,4-6,0
6	0,5	1,5	1,9	1,3	0,2	1,1	0,2	0,2	6,1-6,5
7	0,5	1,6	2,0	1,4	0,6-0,8	1,0	0,6	0,5	6,8-7,1
8	0,5	1,6	2,0	1,3	1,0-1,3	1,0	0,8-1,0	0,7	7,2-8,3

OBSERVACIONES

Es parasitada por *Molothrus bonariensis*


CAPUCHINO CANELA *Sporophila hypoxantha*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Total de nidos : 3

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-12-95	Esperanza	1 huevo	Yuyo	0,80
22-12-95	Esperanza	3 huevos	Trébol blanco	0,50
02-02-99	Cayastá	Sin postura	Trébol blanco	0,70



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado tallos de hierbas altas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Internamente fibras finas, raicillas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : 5 cm.

Diámetro interno : 4,5 cm.

Profundidad : 5 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas pardas y castañas.

Medida :

17,5 x 12,3 (N= 1)


NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
22-12-95	Esperanza	17,5 x 12,3

CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ *Sporophila ruficollis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N



Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-01-76	Esperanza	3 huevos	Maicillo	0,50
23-12-97	La Camila	1 huevo	Cardo	0,60
19-01-99	Esperanza	Sin postura	Cardo negro	0,50
02-02-99	Esperanza	3 huevos	Cardo negro	0,40
24-01-03	Villa Roda	2 pichones	Mata negra	0,80

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5-6 días	Pone en días corridos	11-12	12

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado tallos de yuyos, hierbas altas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales, liadas con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : 6 cm.

Diámetro interno : 4 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 5 cm.

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas y manchitas ocres, grises y negras, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 15,6 a 16,4 x 11,8 a 12,1 X= 16,1 x 11,9 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,068 a 0,076 X= 0,073 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
514	13-01-76	Esperanza	15,6 x 12,0	0,068
			16,3 x 11,8	0,075
			16,4 x 12,1	0,076

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Pico y patas grises.
8 días. Escaso plumón. Láminas de las plumas primarias pardas con punta ocrácea. Pecho rojizo. Flancos y lados del pecho ocráceo-rojizo.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas		
	Plumas primarias		Cola
	Vaina o canón	Lámina	
8	1,8	0,3	0,2

PIQUITODEORO COMÚN *Catamenia analis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-01-99	Aconquija	3 huevos	Yuyo	0,30
01-01-99	Aconquija	3 huevos	Brusquilla	0,30
03-01-99	Aconquija	4 huevos	Pastos altos	0,70
18-12-99	El Alamito	1 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Brusquilla	0,70
18-12-99	El Alamito	5 huevos	Pastos altos	0,30
18-12-99	El Alamito	4 huevos	Pastos altos	0,20

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado tallos de hierbas altas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de tallos de yuyos, pajas. Internamente fibras finas, raicillas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 8,5 a 10 cm.

Diámetro interno : de 4,5 a 5,5 cm.

Profundidad : de 3,5 a 4 cm.

Alto : de 6,5 a 8,5 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color celeste con pintas castañas y grises, por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 17,2 a 20 x 125 a 13,9 X = 18,5 x 13,3 (N= 13)

Peso de las cáscaras : de 0,110 a 0,120 X= 0,117 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
902	01-01-99	Aconquija	17,5 x 12,5	0,115
			18,6 x 13,7	
			19,0 x 13,0	
914	18-12-99	El Alamito	17,5 x 12,6	0,115
917	18-12-99	El Alamito	17,2 x 13,5	0,110
			17,3 x 12,8	0,115
			17,4 x 13,0	0,120
			17,5 x 13,0	
			18,4 x 13,5	
919	18-12-99	El Alamito	18,7 x 13,5	0,120
			19,0 x 13,5	0,120
			19,6 x 13,9	0,120
			20,0 x 14,0	0,120

OBSERVACIONES

Es parasitada por *Molothrus bonariensis*


PIQUITODEORO GRANDE *Catamenia inornata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-02-03	Las Estancias	3 huevos	Yuyos grandes	0,80



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido entre matas de yuyos grandes. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente fibras finas y algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 13 cm.

Diámetro interno : 5,5 cm.

Profundidad : 3,3 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas pardas y grises en toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 18 a 20 x 14,5 a 15 X= 19 x 14,6 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,120 a 0,130 X= 0,126 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
937	07-02-03	Las Estancias	18,0 x 15,0	0,130
			20,0 x 14,5	0,120
			19,0 x 14,5	0,130

BRASITA DE FUEGO *Coryphospingus cucullatus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 17

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
04-11-76	Esperanza	1 huevo	Curupí	1,50
29-11-76	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Peine de mono	1,60
21-12-76	Esperanza	3 huevos	Peine de mono	1,70
21-12-76	Esperanza	2 huevos	Peine de mono	1,80
01-02-77	Tartagal	2 huevos	Arbusto	1,70
10-12-93	Esperanza	3 huevos	Curupí	2,80
21-12-94	Esperanza	Sin postura	Chañar	2,50
23-12-97	La Camila	3 huevos	Garabato negro	3,20
11-12-98	Esperanza	1 huevo y 1 de *M. bonariensis*	Tala	1,80
20-01-99	La Camila	2 huevos	Garabato negro	1,90
08-11-99	Esperanza	1 huevo y 1 de *M. bonariensis*	Zarzaparilla colorada	1,50
08-11-01	Esperanza	3 huevos	Poleo	1,00
30-12-01	Esperanza	Sin postura	Peine de mono	2,50
30-10-04	Esperanza	1 huevo	Tala	2,60
15-11-07	Esperanza	2 pichones	Tala	2,60
14-01-08	Esperanza	2 pichones	Chañar	3,40
23-11-12	Villa Roda	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Tala del indio	2,40

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	1								1	6	7

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6-7 días	Pone en días corridos	13-14 días	13 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, arbustos, enredaderas. Atado a ramitas o a tallos. A baja altura y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de fibras vegetales, líquenes, nervaduras de hojas y telas de arañas. Internamente fibras finas, hojitas.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 7 cm.
Diámetro interno : de 4,5 a 5 cm.
Profundidad : de 2 a 4 cm.
Alto : de 3 a 5 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,00 m.
Nido más alto : 3,20 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Peine de mono	4	Zarzaparrilla colorada	1
Tala	3	Poleo	1
Garabato negro	2	Arbusto	1
Chañar	2	Tala del indio	1
Curupí	2		

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,8 a 20 x 13,7 a 15,4 X= 19,1 x 14,3 (N= 11)
Peso lleno : de 1,8 a 2,0 X= 1,9 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,111 a 0,134 X= 0,126 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
534	29-11-76	Esperanza	18,8 x 14,9		0,130
			19,3 x 15,0		0,130
			20,0 x 14,8		0,133
535	21-12-76	Esperanza	19,0 x 15,0		0,122
			20,0 x 14,6		0,124
			20,0 x 15,4		0,134
536	01-02-77	Tartagal	19,8 x 13,9		0,111
			20,0 x 13,7		0,114
930	08-11-01	Esperanza	18,5 x 14,0	1,8	0,128
			18,8 x 14,0	2,0	0,130
			19,3 x 14,4	2,0	0,130
946	30-10-04	Esperanza	21,0 x 14,4	2,1	0,110

PICHONES

Pico y comisura grises. Piel oscura. Escaso plumón gris.

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

CARDENAL AMARILLO *Gubernatrix cristata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
17-11-74	La Gallareta	2 pichones	Tala	3,00
18-11-74	La Gallareta	3 huevos	Arbusto	2,80

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árbusto o árboles. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza o semiesfera de palitos. Internamente pajitas, cerdas, musgos.

Medidas :

Diámetro total : 16 cm.

Diámetro interno : 10 cm.

Profundidad : 7 cm.

Alto : 20 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas, manchitas y rayitas negras, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 25,2 a 25,9 x 18,2 a 18,7 X= 25,5 x 18,2 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,245 a 0,266 X= 0,257 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
496	18-11-74	La Gallareta	25,2 x 18,2	0,245
			25,5 x 18,7	0,260
			25,9 x 18,7	0,266

ESPIGUERO PARDO *Tiaris obscurus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



Total de nidos : 19

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
25-10-73	San Ramón de la Nueva Orán	3 huevos (*)	Ortiguilla	2,40
25-10-73	San Ramón de la Nueva Orán	2 huevos (*)	Ortiguilla	2,30
01-02-77	Tartagal (Salta)	1 huevo	Ortiguilla	2,00
02-12-97	La Camila (1)	1 huevo	Quebracho colorado	4,30
02-12-97	La Camila (2)	Sin postura	Quebracho colorado	3,80

02-12-97	La Camila (3)	Sin postura	Quebracho colorado	4,00
02-12-97	La Camila (4)	Sin postura	Quebracho colorado	3,70
20-01-99	La Camila (5)	No observado	Quebracho colorado	4,00
20-01-99	La Camila (6)	No observado	Quebracho colorado	5,00
20-01-99	La Camila (7)	4 huevos	Quebracho colorado	3,70
19-12-03	Esperanza (8)	Sin postura	Chañar	4,30
19-12-03	Esperanza (9)	Sin postura	Chañar	4,30
19-12-03	Esperanza (10)	Sin postura	Chañar	4,30
20-12-03	Esperanza (11)	Sin postura	Chañar	2,30
22-12-03	Esperanza (12)	Sin postura	Quebracho blanco	4,50
01-02-04	Esperanza (13)	Sin postura	Chañar	3,60
19-11-04	Esperanza	En construcción	Cardo negro	0,50
23-11-04	Esperanza	En construcción	Tala	7,00
02-12-04	Esperanza (14)	4 huevos	Chañar	4,30

(*). Nidos localizados por Gunnar Höy.
(1). A 30 cm. de un avispero. (2). A 50 cm. de un avispero. (3). A 45 cm. de un avispero. (4). A 55 cm. de un avispero. (5). A 40 cm. de un avispero. (6). A 30 cm. de un avispero. (7). A 60 cm. de un avispero.
(8). A 5 cm. de un avispero. (9). A 10 cm. de un avispero. (10). A 20 cm. de un avispero. (11). A 50 cm. de un avispero. (12). A 1,50 m. de un avispero. (13). A 80 cm. de un avispero. (14) A 0,30 m. de un avispero.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	2								2	2	10

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
15-20 días	Pone en días corridos	12-13	12-13

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos, árboles. A baja mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma globular, redondeado, alargado en sentido vertical. Boca redonda, en la parte superior y lateral. Desprolijo por fuera. Emplea en la construcción principalmente pajas. Internamente tienen fibras finas.

Medidas :

Alto : de 11 a 16 cm.
Ancho : de 7 a 10 cm.
Distancia antero-posterior : de 9 a 11 cm.
Diámetro de la boca : de 4 a 5 cm.
Profundidad de la cámara : 4 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas marrones, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 16,5 x 19,6 x 12 a 13,7 X= 18,0 x 12,7 (N= 15)
Peso lleno : de 1,2 a 1,4 X= 1,3 (N= 4)
Pesos de las cáscaras : de 0,077 a 0,093 X= 0,082 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
715	25-10-73	San Ramón de la Nueva Orán	16,5 x 12,7		0,077
			17,0 x 12,8		0,078

			18,0 x 12,7		0,082
714	25-10-73	San Ramón de la Nueva Orán	18,0 x 12,8		0,079
			18,3 x 12,5		0,080
504	01-02-77	Tartagal (Salta)	18,0 x 12,7		0,093
904	02-12-97	La Camila	19,6 x 12,0		0,090
	20-01-99	La Camila	17,8 x 13,0		
			18,3 x 13,3		
			18,8 x 13,7		
			18,3 x 13,8		
	02-12-04	Esperanza	17,8 x 12,0	1,2	
			17,8 x 12,2	1,3	
			18,0 x 12,5	1,3	
			18,2 x 12,2	1,4	

PICHONES

Los pichones nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris en la cabeza y dorsalmente. Comisura amarillenta.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,7	0,9	-	-	-	-	-	1,3

OBSERVACIONES


El nido del 01-02-04 en Esperanza, estaba construido con pajas de: *Deyeuxia viridiflavescens, Piptochactium lasianthum, Setaria parviflora, Eragrostis virescens, Chaetotropis elongata, Bothriochoa laguroides, Chloris ciliata, Chloris sp., Panicum sp* y *Panicum bergii.*

FAMILIA: EMBERIZIDAE

CHINGOLO *Zonotrichia capensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N



Total de nidos : 50

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-70	Río Leyes	3 huevos	Suelo	
13-01-71	La Granja	2 huevos	Suelo	
07-11-71	Campo Andino	1 huevo y 2 de *M. bonariensis*	Suelo	
19-09-74	Esperanza	3 huevos	Tuya	1,50
22-12-77	Esperanza	4 huevos	Pino	1,50
20-10-78	Cayastá	2 pichones	Suelo	
25-09-79	Esperanza	2 huevos (1)	En *Furnarius rufus*	3,50
06-12-81	Los Gigantes	2 pichones	Suelo	
11-12-82	Villa Elisa	2 huevos	Suelo	
25-10-86	San Javier	3 huevos	Suelo	
03-10-88	Esperanza	Sin postura	Tuya	2,00
04-10-89	Morteros	4 huevos	Suelo	
14-12-90	Monte Vera	3 huevos	Entre yuyos	0,05
03-12-91	Villa Ocampo	2 huevos	Suelo	
03-12-91	Villa Ocampo	3 huevos	Suelo	
03-12-91	Villa Ocampo	4 pichones	Suelo	
18-12-91	Yeso Oeste	3 huevos	Suelo	
30-12-93	Esperanza	1 huevo y 1 pichón de *M. bonariensis*	Tuya	1,00
07-11-95	Esperanza	2 huevos	Enredadera	2,50
09-11-95	Esperanza	2 pichones y 1 pichón de *M. bonariensis*	Hiedra	2,40
09-11-95	Esperanza	4 huevos	Agapanto	0,40
09-11-95	Esperanza	2 pichones	Maceta	2,30
05-12-95	Esperanza	4 huevos	Suelo	
05-12-95	Esperanza	3 pichones	Hiedra	1,40
05-12-95	Esperanza	1 pichón	Hiedra	2,80
08-12-95	Esperanza	1 huevo	Mandarino	0,50
04-10-96	Villa Roda	3 huevos	Suelo	
20-01-97	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis* (blanco)	Pino	1,10
20-01-97	Esperanza	3 huevos	Maceta	0,50
02-09-98	Santa Fe	3 huevos	Suelo	
11-01-99	Esperanza	1 huevo y 2 pichones	Maceta	1,40
05-02-99	Esperanza	En construcción	Tuya	1,40
31-01-00	Esperanza	3 huevos	Aromo	0,75
10-12-01	Esperanza	3 huevos	Maceta	0,50
22-12-01	Esperanza	2 huevos	Naranjo	1,60
22-12-01	Esperanza	3 huevos	Maceta	0,60

26-10-02	Santa Fe	3 huevos	Suelo	
02-11-02	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,60
06-10-03	Esperanza	2 pichones	Enamorada del muro	2,40
12-10-03	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,50
21-12-03	Santa Fe	2 pichones	Maceta	1,60
22-12-03	Esperanza	3 pichones	Maceta	1,50
15-01-05	Rincón	2 pichones, 1 huevo y 1 pichón de *M. bonariensis*	Ligustro	2,00
09-01-06	Esperanza	2 pichones	Laurel de comer	2,20
13-02-06	Esperanza	3 pichones	Guarán	2,30
20-12-06	Esperanza	En construcción	Ficus	5,40
20-12-06	Esperanza	2 huevos y 1 de *M. bonariensis* (blanco)	Arbusto	0,80
24-11-07	Esperanza	2 huevos	Suelo	
11-12-11	Jesús María	3 huevos	Plantera	1,70
16-12-12	Villa Roda	3 pichones	Plantera	0,60

(1). Nido semidestruido de *Furnarius rufus*.

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
7	2							3	9	7	22

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 10 días	Pone en días corridos	11 a 13 días	10 a 11 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, cercos, enredaderas, arbustos, nidos semidestruidos, planteras. A baja y mediana altura.

Características.

Semioculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas o de cerdas. Internamente raicillas, cerdas, pelos y a veces alguna plumita.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 13 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 3 a 4 cm.
Alto : de 5,5 a 8,5 cm.

Altura.

Nido más bajo . en el suelo.
Nido más alto : 5,40 m.

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Suelo	17	Arbusto	1	Naranjo	1
Maceta	9	Enredadera	1	Enamorada del muro	1
Tuya	4	En *Furnarius rufus*	1	Agapanto	1
Chañar	3	Entre yuyos	1	Aromo	1
Pino	2	Mandarino	1	Ligustro	1
Hiedra	2	Guarán	1		
Laurel de comer	1	Ficus	1		

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas y pesos :

De 18,7 a 21,4 x 14,6 a 16,6 X= 20,2 x 15,3 (N= 13)

Peso lleno : de 0,116 a 0,151 X= 0,127 (N= 13)

Peso de las cáscaras : de 0,128 a 0,135 X= 0,130 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
539	07-11-71	Campo Andino	21,4 x 15,6		0,151
540	22-12-77	Esperanza	18,7 x 14,9		0,116
			20,4 x 14,7		0,121
			20,5 x 14,6		0,126
			20,7 x 15,0		0,137
	11-12-82	Villa Elisa	20,1 x 14,8	2,135	0,114
			20,1 x 15,0	2,190	0,120
647	25-10-86	San Javier	21,0 x 15,3		0,127
			21,0 x 15,7		0,127
			21,0 x 16,0		0,127
779	14-12-90	Monte Vera	20,4 x 16,6	2,5	0,127
			20,5 x 15,0	2,5	0,127
			20,6 x 15,2	2,5	0,127

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Plumón fino gris. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, rosado fuerte (rojizo).

3 días. Ojos abiertos, marrones. Vainas alares grises. Apenas se ven en la cola. Lados del pecho gris oscuro y blanquecino. Quedan pocas filoplumas.

8 días. Pico gris.Comisura amarilla. Dorsal pardo jaspeado de ocráceo. Pecho blanquecino jaspeado de pardo. Abdomen blanquecino. Láminas de las plumas alares, pardas. Secundarias y cubiertas alares, con las barbas externas ocráceas. Cola con cañones cortos, las láminas chicas pardas y ocráceas.


MEDIDAS

Dias de vida	Medidas					
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias Vaina o canón	Plumas secundarias Vaina o canón	Cola
1	0,5	1,5	1,1	-	-	-
2	0,5	1,6	1,3	-	-	-
3	0,6	1,7	1,5	-	-	-
4	0,6	2,0	1,7	0,8	0,6	-
5	0,7	2,4	1,9	1,2	0,8	-
6	0,7	2,5	2,1	1,4	0,9	-
7	0,8	2,7	2,4	1,6	1,1	0,2
8	0,8	2,9	2,6	1,8	1,2	0,4

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

CACHILO CEJA AMARILLA *Ammodramus humeralis*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
18-10-70	Sarmiento	2 huevos	Suelo
18-10-76	Esperanza	4 huevos y 2 de *M. bonariensis*	Suelo
08-11-91	Esperanza	3 huevos	Suelo
07-11-95	Esperanza	En construcción	Suelo
18-11-95	Esperanza	3 huevos	Suelo
11-12-02	Paso de los Libres	3 pichones	Suelo

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									2	3	1

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
5-6	Pone en días corridos		10-11

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre yuyos o en la base de yuyos grandes.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas. Internamente raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.

Diámetro interno : de 6 a 7 cm.

Profundidad : de 4 a 5 cm.

Alto : de 5 a 6 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco.

Medidas y pesos :

De 18,5 a 19,7 x 13,8 a 15,2 X= 19,1 x 14,5 (N= 9)

Peso lleno : de 1,8 a 2 X= 1,9 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,128 a 0,135 X= 0,130 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
537	18-10-70	Sarmiento	19,2 x 15,2		0,130
			19,5 x 14,6		
538	18-10-76	Esperanza	18,7 x 15,0		0,123
			18,9 x 14,6		0,128

			19,5 x 14,6		0,130
			19,7 x 14,6		0,135
809	08-11-91	Esperanza	18,5 x 13,8	1,8	0,130
			18,9 x 14,4	2	0,132
			19,4 x 14,3	2	0,132

PICHONES

Descripción. Nace con la cavidad bucal, paladar y lengua, rosados. Comisura amarilla.

9 días. Pico gris oscuro. Patas gris claro. Láminas de las plumas primarias, pardas oscuras con la punta acanelada. Borde "codo" de las alas amarillento. Dorsalmente pardo con el extremo de las plumas acanelados. Ventralmente, garganta y pecho blanquecinos, jaspeados de gris. Flancos blanquecinos.

Alimentación. Los padres les traen langostas chicas.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
9	-	-	-	2,3	0,5	-	-	0,4	-


OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

CACHILO CORONA CASTAÑA *Rhynchospiza strigiceps*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-11-89	Calchaquí	2 huevos	Pasto serrucho	0,20
21-12-00	Esperanza	3 huevos	Pasto serrucho	0,30

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 11 días	Pone en días corridos		

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Entre yuyos a baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas, tallos de yuyos. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 12 cm.
Diámetro interno : de 5 a 6 cm.
Profundidad : de 4,5 a 6 cm.

Alto : de 8 a 12 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas pardo claro y oscuro, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 20 a 20,7 x 14 9 a 15,5 X= 20,2 x 15,1 (N= 5)

Peso lleno : de 2,3 a 2,6 X= 2,4 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,140 a 0,150 X= 0,144 (N= 5)


NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
730	18-11-89	Calchaquí	20,2 x 15,5	2,5	0,150
			20,3 x 15,4	2,6	0,150
924	21-12-00	Esperanza	20,0 x 14,9	2,3	0,140
			20,0 x 15,0	2,3	0,140
			20,7 x 15,0	2,4	0,140

CERQUERO DE COLLAR *Arremon flavirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
20-11-77	Rivadavia	3 huevos (*)	Entre pastos	0,20
11-12-03	Rosario de la Frontera	2 huevos	Entre raices y un tronco	0,30

(*). Nido localizado por Gunnar Höy

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Entre yuyos o raices, troncos. A baja altura.

Características.

Oculto o Semiespuesto. Elaborado. Estructura redondeada o globular, con entrada grande, lateral. Emplea en la construcción pastos, fibras, nervaduras, hojas. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : 14 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blancos con pintas castañas, negras y grises, formando una corona en el polo mayor y unas líneas oscuras.

Medidas y pesos :

De 22,8 a 23,8 x 15,6 a 16 X= 23,1 x 15,8 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,159 a 0,191 X= 0,170 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
720	20-11-77	Rivadavia	22,8 x 15,8	0,159
			23,0 x 15,6	0,160
			23,8 x 15,7	0,191
	11-12-03	Rosario de la Frontera	23,0 x 16,0	
			23,3 x 16,0	


CERQUERO AMARILLO *Atlapetes citrinellus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-99	Cuesta del Clavillo	1 huevo	Arbusto	1,50
20-12-00	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Arbusto	1,60



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo o entre yuyos a baja altura.

Características.

Semiespuesto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas y tallos de yuyos en la base. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total en la base : 14 x 18 cm.

Diámetro interno : 5,5 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 10 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con manchas pardo claro, pardo oscuro y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 23,5 a 24,6 x 17 a 17,7 X= 23,9 x 17,4 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,190 a 0,220 X= 0,210 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
928	20-12-00	Cuesta del Clavillo	24,0 x 17,7	0,220
			24,6 x 17,0	0,220

FAMILIA: CARDINALIDAE

FUEGUERO COMÚN *Piranga flava*


PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-11-99	El Palmar	3 huevos	Quebracho colorado	5,00

Nido localizado por Máximo Uranga.



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de taza.

Emplea en la construcción raicillas. Recubierto externamente con líquenes. Internamente cerdas.

Medidas :

Diámetro total : 9,5 cm.

Diámetro interno : 6 cm.

Profundidad : 4 cm.

Alto : 6,5 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color azul verdoso con pintas y manchitas marrón rojizas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas :

De 25,2 a 25,8 x 18 a 18,1 X= 25,4 x 18

(N= 3)

NIDADA

Fecha	Localidad	Medidas
13-11-99	El Palmar	25,2 x 18,1
		25,4 x 18,0
		25,8 x 18,0


REY DEL BOSQUE *Pheucticus aureoventris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-12-99	Cuesta del Clavillo	2 pichones	Arbusto	3,00
18-12-99	Cuesta del Clavillo	2 huevos	Arbusto	2,70



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos. A baja y mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón o semiesfera de tallos de enredaderas. Internamente raicillas, fibras finas. Desprolijo por fuera.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 12 cm.

Diámetro interno : de 5 a 7 cm.

Profundidad : de 5,5 a 6 cm.

Alto : de 8 a 10,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con finas pintas castañas, mas concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 25 a 25,5 x 18,8 a 19,4 X= 25,2 x 19,1 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,290 X= 0,290 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
907	18-12-99	Cuesta del Clavillo	25,0 x 18,8	0,290
			25,5 x 19,4	0,290

OBSERVACIONES

El 18-12-99 en la Cuesta del Clavillo, una pareja que alimentaba a un juvenil.


REINAMORA GRANDE *Cyanocompsa brissonii*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-12-91	Malabrigo	2 huevos	Coronillo	3,00



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles. A baja y mediana altura.

Características.

Semioculto. Elaborado. Taza o semiesfera de fibras vegetales. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : 9 cm.

Diámetro interno : 5,5 cm.

Profundidad : 5 cm.

Alto : 7,5 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color celeste con finas pintas castañas distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 22,3 a 22,6 x 16,8 a 17,2 X= 22,4 x 17 (N= 2)

Peso lleno : 3,1 X= 3,1 (N= 2)

Peso de las cáscaras : 0,160 X= 0,160 (N= 2)


NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
816	13-12-91	Malabrigo	22,3 x 17,2	3,1	0,160
			22,6 x 16,8	3,1	0,160

PEPITERO GRIS *Saltator coerulescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Total de nidos : 27

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-11-71	Campo Andino	2 huevos	Tala	3,20
20-11-71	Río Leyes	1 huevo	Arbusto	3,50
23-10-79	Cayastá	2 huevos	Naranjo	3,00
06-11-80	Isla Chapetón	Sin postura	Enredadera	3,00
10-11-90	Esperanza	2 pichones	Tala	2,80
15-11-90	Morteros	2 huevos	Arbusto	2,20
01-12-90	Esperanza	2 huevos	Curupí	3,50
18-12-90	Esperanza	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chañar	3,20
01-01-91	Isla Berduc	1 pichón	Aromo	3,60
12-01-91	Grutly	1 huevo y 1 pichón	Curupí	3,80
22-11-91	Esperanza	1 pichón	Arbusto	2,10
23-10-93	Esperanza	2 huevos	Tala	1,70
23-10-93	Esperanza	2 pichones	Tala	2,10
27-11-93	Esperanza	2 pichones	Curupí	2,80
29-11-93	Esperanza	1 pichón	Curupí	2,10
16-12-93	Esperanza	2 huevos	Curupí	2,90
28-12-94	Esperanza	2 pichones	Cina cina	2,60
28-11-95	Villa Guillermina	2 huevos	Tala	2,10
03-01-98	Esperanza	1 huevo	Tala	2,10
24-10-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,10
19-11-98	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,50
05-12-98	Esperanza	No observado	Chañar	3,20
23-10-01	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,00
07-11-02	Esperanza	No observado	Tala del indio	3,60
18-10-03	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,00
02-11-03	Esperanza	2 huevos	Tala del indio	2,40
07-11-03	Esperanza	3 huevos	Tala del indio	1,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3									6	13	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 9 días	Pone en días corridos	13 a 14 días	18 a 19 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles o arbustos, enredaderas. A baja y mediana altura.

Características.

Semioculto. Elaborado. Tazón o semiesfera de tallos, fibras vegetales. Internamente hojas, raicillas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 16 cm.
Diámetro interno : de 8 a 9 cm.
Profundidad : de 3 a 5 cm.
Alto : de 6 a 9 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,70 m.
Nido más alto : 3,80 m.

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Tala	6	Chañar	4	Naranjo	1
Curupí	5	Arbusto	3	Aromo	1
Tala del indio	5	Enredadera	1	Cina cina	1

HUEVOS

Pone 2, raro 3 huevos.

Ovoidales. De color verde azulado con líneas y puntos negros en el polo mayor

Medidas y pesos :

De 24,7 a 31,5 x 19,3 a 20,5 X= 28,5 x 19,8 (N= 6)
Peso lleno : 5,3 X= 5,3 (N= 1)
Peso de las cáscaras : de 0,269 a 0,372 X= 0,346 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
490	07-11-71	Campo Andino	29,5 x 20,0		0,331
			31,5 x 19,3		0,372
491	20-11-71	Río Leyes	30,9 x 19,7		0,341
492	23-10-79	Cayastá	24,7 x 19,7		0,269
			26,7 x 19,6		0,299
298	18-12-90	Esperanza	27,8 x 20,5	5,3	0,370

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris. Cavidad bucal, rosado fuerte. Comisura y bordes internos y externos, amarillo. Pico amarillento. Piel dorsal gris. Ventral naranja-amarillenta.

2 días. Tienen la piel ventral desnuda, verdosa-amarillenta. Dorsalmente verdosa, con plumón largo, gris, en la cabeza, dorso posterior, en dorsal de las alas (espaciado). Vainas de las plumas alares, grisazulinos. Alrededor de la cloaca, anaranjado. Borde de la mandíbula y del maxilar, amarillo. La comisura también. Dorsalmente el maxilar es oscuro, el resto más claro. El paladar tiene la parte anterior amarilla, la parte posterior y el resto del interior de la boca, rosado. Lengua rosada.

3 días. Ojos cerrados.

5 días. Ojos abiertos. Escaso plumón. Vainas de 3-4 mm. en zonas ptéridas.

8 días. Pico verdoso. Comisura amarilla. Emplumado. Ceja amarillenta.

10 días. Cabeza, dorsalmente y cubiertas alares, verdes. Flancos ocráceos. Cavidad bucal y lengua, rosadas. Comisura amarilla. Parpados superiores amarillentos. Patas verdosas. Uñas amarillentas.

PICHONES

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	
1	0,6	1,4	1,7					
2	0,6	1,4	1,9					
3	0,7	1,5	2,2					
4	0,8	1,8	2,8	0,9	0,4	0,5	0,2	
5	0,9	2,6	3,3	1,8	0,8	0,9	0,4	0,4
6	0,9	2,9	3,7	2,1	1,1	1,1	0,6	0,5
7	1.0	3,1	4,0	2,3	1,5	1,2	0,8	0,6
8	1,0	3,4	4,2	2,5	1,9	1,3	1,0	0,7


OBSERVACIONES

Es parasitado por de *Molothrus bonariensis*
Los nidos suelen estar semiocultos por enredaderas.

PEPITERO DE COLLAR *Saltator aurantiirostris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Total de nidos : 22

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
13-01-71	La Granja	3 huevos	Crateus	2,20
15-11-71	La Gallareta	2 huevos	Aromo	2,30
17-11-74	La Loca	3 huevos	Tala	3,10
22-11-81	Cayastá	3 huevos	Aromo	3,50
07-11-90	Morteros	3 pichones	Arbusto	2,70
07-11-90	Morteros	1 huevo	Arbusto	3,30
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Arbusto	2,20
05-01-91	Grutly	2 huevos	Curupí	2,60
12-01-91	Grutly	1 pichón	Curupí	2,30
05-12-95	Esperanza	1 huevo	Tala	2,20
08-10-98	Esperanza	Sin postura	Tala	2,00
04-11-99	Esperanza	3 huevos	Tala	2,20
04-11-01	Esperanza	2 huevos	Chañar	1,20
06-12-01	Esperanza	3 huevos	Tala del indio	2,00
06-12-02	Esperanza	3 pichones	Sauco	2,80
13-12-03	Esperanza	No observado	Tala	3,50
16-01-04	Esperanza	2 huevos	Chañar	3,70

14-09-04	Esperanza	En construcción	Tala del Indio	2,30
21-10-04	Esperanza	3 huevos	Algarrobo	1,90
29-11-04	Esperanza	3 huevos	Tala	4,00
16-11-07	Esperanza	1 pichón	Tala	2,30
26-11-12	Esperanza	2 huevos	Chañar	2,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4								1	2	10	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
8 a 9 días	Pone en días corridos	14 días	17 a 18 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de árboles o arbustos, enredaderas. A baja y mediana altura.

Características.

Semioculto. Elaborado. Taza o semiesfera de pajas, tallos, líquenes. Internamente raicillas, hojas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 15 cm.
Diámetro interno : de 7 a 9 cm.
Profundidad : de 2 a 6 cm.
Alto : de 7 a 12 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,20 m.
Nido más alto : 3,70 m.

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Tala	7	Curupí	2	Algarrobo	1
Arbusto	3	Aromo	2	Crateus	1
Chañar	3	Tala del indio	2	Sauco	1

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color celeste verdoso con pintas, rayitas y líneas negras en el polo mayor, a veces formando corona.

Medidas y pesos :

De 23,4 a 27,8 x 18,4 a 20,5 X= 25,9 x 19,1 (N= 23)
Peso lleno : de 4,1 a 5,4 X= 4,9 (N= 11)
Peso de las cáscaras : de 0,264 a 0,400 X= 0,335 (N= 17)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
493	13-01-71	La Granja	25,7 x 19,4		0,288
			27,5 x 19,1		0,305
			27,6 x 19,0		0,316
	15-11-71	La Gallareta	25,8 x 19,5		0,324
			26,5 x 19,5		0,324
495	17-11-74	La Loca	26,0 x 19,5		0,264
			26,2 x 19,6		0,303
			26,4 x 19,4		0,313

509	22-11-81	Cayastá	25,6 x 20,0		0,300
			26,8 x 20,5		0,350
			27,8 x 20,4		0,353
756	07-11-90	Morteros	26,6 x 18,4		0,360
769	08-12-90	Cacique Ariacaiquín	24,9 x 19,3	5,1	
			26,5 x 19,6	5,4	
			26,9 x 19,5	5,4	
798	05-01-91	Grutly	23,4 x 19,3	4,7	
			24,0 x 19,7	5,0	
	21-10-04	Esperanza	25,0 x 19,3	4,1	
			25,5 x 18,8	4,5	
			26,6 x 19,4	4,9	
	29-11-04	Esperanza	26,2 x 19,0	5,1	
			26,5 x 19,0	5,1	
			27,0 x 19,2	5,4	

PICHONES

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Pico	Tarso	Tibia	Medidas					Peso
				Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,8	1,0-1,2	1,9	-	-	-	-	-	5,1-5,4
2	0,9	1,4	2,2	-	-	-	-	-	9,0-11,0
3	0,9	1,8	2,5	0,3	-	-	-	-	11,3-16,6
4	0,9	1,9	2,7	0,8	-	0,3	-	-	13,8-17,8
5	0,9	2,2	3,0	1,2	-	0,7	-	-	17,0-20,0
6	1,0	2,4	3,2	1,5	-	1,2	-	-	21,0-25,0
7	1.0	2,6	3,6	2,0	0,5	1,7	0,3	0,4	26,0-27,0
8	1,0	3,3	4,0	2,6	0,9	2,0	0,5	0,7	32,0-33,0

PICHONES


Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Cavidad bucal, paladar y lengua, rojos. Comisura amarilla. Parte dorsal del pico verdosa. Escaso plumón grisáceo, en la cabeza, dorso y dorsal de las alas.

4 días. Escaso plumón fino en la cabeza, dorsalmente y parte dorsal de las alas. Vainas de primarias grises.
5 días. Abre los ojos.
6 día. Se notan las vainas en dorsal y ventral. Escaso plumón en la cabeza y dorso.
7 días. Plumas ventrales oscuras en los lados del pecho, flancos crema. Cabeza y dorsalmente gris.
9 día. Leve deja ocrácea. Ventral ocráceo. Pico verdoso.

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Los nidos suelen estar semiocultos por enredaderas.

PEPITERO CHICO *Saltatricula multicolor*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 17

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	3 huevos	Caraguatá	0,30
04-11-76	Esperanza	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Espartillo bravo	0,20
29-11-76	Esperanza	2 huevos y 5 de *Molothrus bonariensis*	Curupí	1,20
15-01-88	Esperanza	3 huevos	Chañar	2,00
05-01-91	Grutly	3 huevos	Chañar	1,00
13-12-91	Malabrigo	3 pichones	Molle	1,50
27-12-94	Esperanza	1 pichón	Tala	2,20
14-11-98	Esperanza	En construcción	Tala	1,70
03-12-98	Esperanza	3 pichones	Quebracho blanco	1,50
15-01-99	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	Quebracho blanco	1,40
11-11-00	Esperanza	2 huevos y 1 pichón	Tala salada	0,70
01-11-01	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Tala salada	0,60
01-12-01	Esperanza	1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*	Molle	0,80
14-12-02	Esperanza	2 huevos	Tala salada	1,20
25-11-03	Esperanza	3 huevos	Aromo	0,80
24-12-03	Esperanza	3 pichones	Molle	0,80
10-11-07	Esperanza	3 pichones	Yuyos	0,10

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3										8	6

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10-12 días	Pone en días corridos	13 días	10 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En árboles, arbustos, plantas diversas. Atado a ramitas o sostenido entre hojas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Taza o semiesfera de fibras vegetales, pajas. Internamente raicillas, fibras finas, algunas cerdas.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 10 cm.
Diámetro interno : de 6 a 7,5 cm.
Profundidad : de 3 a 4,5 cm.
Alto : de 6 a 7 cm.

Altura.

Nido más bajo : 0,10 m.
Nido más alto : 2,20 m.

Elemento sostén y número de nidos

Sostén	Nº	Sostén	Nº
Tala salada	3	Caraguatá	1
Molle	3	Curupí	1
Chañar	2	Espartillo bravo	1
Quebracho blanco	2	Aromo	1
Tala	2	Yuyo	1

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas negras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21 a 23 x 15,8 a 17,6 X= 21,8 x 16,5 (N= 11)

Peso lleno : de 3,3 a 3,5 X= 3,4 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,156 a 0,208 X= 0,188 (N= 11)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
543	15-11-71	La Gallareta	21,0 x 16,0		0,156
			21,3 x 16,4		0,172
			21,9 x 16,0		0,182
544	29-11-76	Esperanza	22,0 x 15,8		0,195
			23,0 x 16,2		0,208
665	15-01-88	Esperanza	21,9 x 15,9		0,190
797	05-01-91	Grutly	21,5 x 17,3	3,3	0,180
			21,5 x 17,6	3,4	0,180
			22,2 x 17,3	3,5	0,180
933	14-12-02	Esperanza	21,5 x 16,4		0,190
			22,0 x 16,4		0,190

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Piel negra. Pico gris. Comisura blanquecina. Cavidad bucal, paladar y lengua, rosados. Parte anterior del paladar, amarillenta. Escaso plumón fino, gris claro.

4 días. Color general oscuro. Vainas alares y de la cola, oscuros.

7 días. Muy vivaracho. Si se lo suelta se escapa. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal rosada. Parte anterior del paladar amarillento. Dorsalmente pardo. Garganta y lados del pecho, grises. Abdomen blanquecino. Cejas postocular, blanquecina. Pecho grisáceo. Flancos canelas. Alas parduscas. Cañones de las plumas externas de la cola, blancos.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas		
	Pico	Tarso	Tibia
2	0,5	1,1	1,5

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Mientras la hembra construye el macho canta en ramas altas, cercanas al nido.


FAMILIA: PARULIDAE

PITIAYUMÍ *Parula pitiayumi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Total de nidos : 4



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
02-12-97	La Camila	3 huevos	Chañar	3,50
23-12-97	La Camila	No observado	Quebracho colorado	3,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En ramas de árboles.Entre matas de líquenes (*Usnea sp*). A mediana altura y altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de tacita. Construido con líquenes. En la base unas cerdas.

Medidas :

Diámetro interno : 3 cm.

Profundidad : 3 cm.

Alto : 6 cm.

Diámetro de la boca de entrada : 3 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas finas pardo rojizas, más concentradas en el polo mayor

Medidas y peso.

De 16,1 a 16,3 x 11,4 a 12 X= 16,2 x 11,7 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,075 X = 0,075 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
875	02-12-97	La Camila	16,1 x 12,0	0,075
			16,2 x 11,8	0,075
			16,3 x 11,4	0,075

OBSERVACIONES


El 23-03-01, en Concordia una pareja alimentaba a un juvenil. Se desplazaban en lo alto de los árboles.

ARAÑERO CARA NEGRA *Geothlypis aequinoctialis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos : 7



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-11-71	Villa San José	3 huevos	Caraguatá	0,10
15-11-81	Cayastá	3 pichones	Paja brava	0,30
11-11-99	Santa Fe	3 huevos	En pastos	0,05
15-12-02	Santa Fe	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,30
10-01-03	Santa Fe	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,10
15-01-03	Santa Fe	2 pichones	En pastos	0,10
28-01-03	Santa Fe	2 pichones	Paja brava	0,30

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 7 días	Pone en días corridos	14 días	10 a 11 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En la base o en el interior de plantas. Desde el suelo hasta 30 cm. de alto. En algunas zonas el vegetal más usado es la Paja brava (*Panicum prionitis*)

Características.

Oculto o semioculto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de tacita. Es construido con fibras vegetales y hojas. Internamente raicillas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 11 cm.

Diámetro interno : de 4 a 6 cm.

Profundidad : de 3,5 a 6 cm.

Alto : de 9 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor, formando una corona.

Medidas y peso.

De 18 a 19,3 x 13,3 a 15 X= 18,6 x 13,8 (N= 10)

Peso de las cáscaras : de 0,106 a 0,110 X= 0,107 (N= 8)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
486	27-11-71	Villa San José	18,5 x 15,0	0,106
			18,9 x 14,7	0,107
			19,2 x 14,5	0,109
934	15-12-02	Santa Fe	18,3 x 13,5	0,110
			18,5 x 13,6	0,110
			18,5 x 13,7	0,110
935	10-01-03	Santa Fe	18,0 x 13,6	0,108
			18,6 x 13,5	0,108
			18,7 x 13,3	0,110
			19,3 x 13,5	0,110

PICHONES

Descripción. Nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris. Cavidad bucal y paladar, rojos. Comisura amarilla.

4 días. Ojos cerrados. Vainas dorsales emergiendo, grises. Ventrales amarillentas. Vainas de las plumas primarias de 0,9 cm.

5 días. Abren los ojos.

Alimentación. Los padres alimentan a los pichones con larvas (gusanos) y langostas.

OBSERVACIONES

El 12-03-81, en Chumbicha, una pareja de adultos andaban con dos juveniles.

El 15-12-02, en Santa Fe un macho alimentaba a un juvenil con una langosta chica.

Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Los nidos sufren elevado índice de depredación, de huevos y de pichones.

ARAÑERO CORONADO CHICO *Basileuterus culicivorus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
22-11-81	Cayastá	2 huevos	Suelo

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Suelo

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura redondeada, con boca amplia. Emplea en la construcción gramillas.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas y manchitas pardo claro y oscuro, en mayor cantidad hacia el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 17,7 a 18 x 13,5 a 13,6 X= 17,8 x 13,5 (N= 2)

Peso de la cáscara : 0,083 a 0,084 X = 0,083 (N= 2)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
443	22-11-81	Cayastá	17,7 x 13,6	0,083
			18,0 x 13,5	0,084

ARAÑERO SILBÓN *Basileuterus leucoblepharus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-10-01	Capioví	2 huevos	Enredadera	2

Localizado por Máximo Uranga

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas o enredaderas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica, forma de tacita. Emplea en la construcción fibras vegetales y hojas en la base. Internamente fibras negras.

Medidas :

Diámetro total : 11 cm.
Diámetro interno : 6 cm.
Profundidad : 4 cm.
Alto : 7 cm.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintas y manchas grises y castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y peso :

De 21,3 a 21,8 x 14,3 a 14,6 X= 21,5 x 14,4 (N= 2)

NIDADA


Fecha	Localidad	Medidas
15-10-01	Capioví	21,3 x 14,3
		21,8 x 14,6


ARAÑERO RIBEREÑO *Basileuterus rivularis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Total de nidos : 1





Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
12-10-81	Puerto Iguazú	1 huevo y 1 pichón	Hueco en una barranca	1,20

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos poco profundos, en barrancas. A baja altura.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de tacita, cubierta por detrás con fibras.

Emplea en la construcción pajitas y hojas. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro interno de la tacita : 6 cm.
Profundidad : 3 cm.
Ancho : 8 cm.
Boca oval de 6 x 5 cm. de diámetro.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas marrones y castañas, formando una corona y pocas dispersas en el resto de la superficie.

Medida y peso.

17,6 x 13,3 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,079 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
487	12-10-81	Puerto Iguazú	17,6 x 13,3	0,079

FAMILIA: ICTERIDAE

BOYERO NEGRO *Cacicus solitarius*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N						N	N	N

Total de nidos : 22

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-10-71	Cayastacito	2 huevos	Chañar	4,00
15-11-71	La Gallareta	Sin postura	Garabato negro	3,80
15-11-71	La Gallareta	2 huevos	Garabato negro	4,00
01-11-75	Reconquista	No observado	Timbó colorado	4,50
24-11-83	Aguará grande	2 pichones	Garabato negro	2,50
24-11-83	Aguará Grande	2 pichones	Garabato negro	3,50
04-12-88	Cayastá	En construcción	Tala	3,50
13-04-89	Calchaquí	En construcción	Quebracho colorado	7,00
08-11-89	Los Amores	3 huevos	Guayacán	4,50
03-10-90	Los Amores	En construcción	Garabato negro	4,00
24-10-91	Villa Ocampo	2 pichones	Ibirá-pitá	5,00
12-11-91	Cayastá	En construcción	Chañar	3,50
09-10-93	Esperanza	En construcción	Chañar	4,50
10-11-95	Diamante	No observado	Sauce	3,60
27-11-95	Villa Ocampo	No observado	Viraró blanco	4,40
11-11-98	Esperanza	No observado	Chañar	6,30
19-10-99	Esperanza	No observado	Eucaliptus	12,00
31-10-99	Esperanza	En construcción	Chañar	6,00
19-10-01	Esperaza	En construcción	Chañar	9,00
20-12-07	Esperaza	No observado	Chañar	7,00
05-12-08	Esperaza	No observado	Chañar	7,00
20-10-09	Esperaza	En construcción	Acacia negra	10,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			1						8	10	3

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado, colgante de ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma de saco o bolsa, alargado. La boca en la parte lateral superior, alargada.

Emplea fibras vegetales entretejidas. Internamente fibras finas. En la cámara a veces coloca hojas.

Medidas :

Largo : de 45 a 70 cm.

Diámetro en la parte inferior : 15 cm.
Diámetro en la parte superior : de 7 a 10 cm.
Boca : de 10 a 18 cm. de alto x 5 a 7 cm. de ancha.

Altura.
Nido más bajo : 2,50 m.
Nido más alto : 12 m.

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Chañar	8	Ibirá-pitá	1	Quebracho colorado	1
Garabato negro	5	Tala	1	Timbó colorado	1
Viraró blanco	1	Sauce	1	Acacia negra	1
Guayacán	1	Eucaliptus	1		

HUEVOS

Pone 2, a veces 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas pequeñas, rayitas y manchitas pardas, grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :
De 29,5 a 31 x 19,8 a 20,7 X= 30,2 x 20,2 (N= 7)
Peso lleno : de 6,1 a 6,5 X= 6,3 (N= 3)
Peso de las cáscaras : de 0,355 a 0,420 X= 0,390 (N= 7)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
561	09-10-71	Cayastacito	31,0 x 20,4		0,355
			31,0 x 20,7		0,358
562	15-11-71	La Gallareta	29,5 x 20,5		0,387
			29,8 x 19,8		0,401
728	08-11-89	Los Amores	29,6 x 20,0	6,1	0,390
			30,0 x 20,4	6,3	0,410
			30,5 x 19,8	6,5	0,420

OBSERVACIONES

En Esperanza, el 31-12-00 una pareja andaba con un juvenil.
La pareja construye. En una oportunidad trajo una fibra larga de unos 60 cm. Demoró 1 minuto y 30 segundos en tejerla. Demoró en la construcción unos 16 días.

BOYERO CACIQUE *Cacicus haemorrhous*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Total de nidos : 7

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-09-71	Cataratas del Iguazú	En construcción	Palmera pindó	8,00
12-10-81	Puerto Iguazú	2 pichones y 1 huevo de *M. oryzivorus*	Palmera pindó	10,00

21-09-93	Cataratas del Iguazú	En construcción	Palmera pindó	9,00
02-12-94	Puerto Iguazú	1 huevo	Palmera pindó	6,00
29-09-95	Puerto Iguazú	2 huevos	Fumo bravo	7,00
15-10-01	Capioví	2 huevos	Araucaria	11,00
15-10-01	Capioví	2 huevos	Araucaria	11,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								3	3		1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado, colgante de ramas de árboles, hojas de palmeras. Altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma de saco o bolsa, alargado. La boca en la parte lateral superior, alargada.

Emplea fibras vegetales entretejidas. En la cámara a veces coloca hojas, vilanos, plumas.

Medidas :

Largo : de 33 a 70 cm.

Diámetro en la parte inferior: de 11 a 13 cm.

Diámetro en la parte superior : de 9 a 10 cm.

Boca : de 10 a 13 cm. de alto x 5 a 7 cm. de ancha.

HUEVOS

Pone 2 huevos.

Ovoidales. De color blanco crema con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 28 a 29,5 x 19,4 a 19,6 X= 28,4 x 19,5 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,350 a 0,400 X= 0,310 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
854	02-12-94	Puerto Iguazú	29,5 x 19,5		0,400
858	29-09-95	Puerto Iguazú	28,0 x 19,4		0,350
			28,2 x 19,6		0,380

OBSERVACIONES


El 18-09-71 en Cataratas del Iguazú, una Palmera tenía 120 nidos.

BOYERO ALA AMARILLA *Cacicus chrysopterus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 12



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-11-71	Lanteri	1 huevo y 4 de *Molothrus bonariensis*	Garabato negro	4,50
18-11-71	Lanteri	En construcción	Garabato negro	5,00
11-11-73	La Loca	3 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Guayacán	2,20
08-12-79	La Loca	3 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Guayacán	3,00
07-11-81	Cayastá	2 huevos	Tala	2,40
15-11-81	Cayastá	En construcción	Tala	4,00
15-10-86	Cayastá	Sin postura	Tala	3,50
08-11-89	Los Amores	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Guayacán	3,90
23-11-93	Empedrado	4 huevos de *Molothrus bonariensis*	Quebracho colorado	6,00
28-11-95	Villa Guillermina	No observado	Guayacán	6,00
04-02-97	Arroyo Ñatiú	No observado	Timbó colorado	7,00
04-02-97	Arroyo Ñatiú	No observado	Timbó colorado	8,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	2								1	8	1

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado, colgante de ramas de árboles. A mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma de saco o bolsa, alargado. La boca en la parte lateral superior, alargada.

Emplea fibras vegetales entretejidas. En la cámara a veces coloca hojas.

Algunos construidos con fibras negras de un hongo del género *Marasmius*, otros no.

Medidas :

Largo : de 50 a 70 cm.

Diámetro en la parte inferior : de 9 a 12 cm.

Diámetro en la parte superior : de 4 a 7 cm.

Boca : de 9 a 16 cm. de alto x 2,5 a 4 cm. de ancha.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas castañas, pardas y grises, en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 25,7 a 26,4 x 16,5 a 18,5 X= 26 x 17,5 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 0,225 a 0,267 X= 0,238 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
558	18-11-71	Lanteri	25,8 x 16,7	0,230
559	08-12-79	La Loca	25,7 x 18,5	0,252
			26,0 x 18,4	0,256
			26,3 x 18,3	0,267
560	07-11-81	Cayastá	25,8 x 17,1	0,225
			26,4 x 16,5	0,231

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

BOYERITO *Icterus pyrrhopterus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Total de nidos : 20

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
15-11-71	La Gallareta	2 huevos y 3 de *M. bonariensis*	Algarrobo blanco	5,00
15-12-86	Villa San José	1 huevo y 1 de *M. bonariensis*	Banano	3,00
03-01-87	Villa Elisa	1 huevo y 2 de *M. bonariensis*	Banano	3,10
25-01-88	Curupaití	2 pichones	Palmera china	1,60
15-11-88	Humboldt	Sin postura	Palmera blanca	3,50
04-12-88	Ataliva	Sin postura	Palmera blanca	4,00
19-11-91	Esperanza	3 pichones y 3 huevos *M. bonariensis*	Tipa amarilla	2,60
28-12-93	Esperanza	2 pichones	Araucaria	6,30
06-01-95	Rincón de Ávila	1 pichón y 1 huevo *M. bonariensis*	Banano	2,80
27-12-95	Esperanza	2 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Palmera china	1,80
20-02-97	Esperanza	Sin postura	Palmera blanca	6,00
19-12-98	Calchaquí	2 pichones	Quebracho colorado	6,50
11-12-99	Esperanza	2 pichones	Banano	2,90
09-01-00	Esperanza	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Banano	3,30
16-02-01	Concordia	No observado	Tacuara	10,00
07-01-02	Esperanza	1 pichón y 2 pichones y 1 huevo de *Molothrus bonariensis*	Palmera blanca	2,60
20-12-05	Colonia Pujol	No observado	Pino	6,50
20-12-05	Esperanza	No observado	Palmera blanca	5,80
22-10-08	Santa Rosa (S.Fe)	En construcción	Seibo	1,80
10-11-08	Esperanza	No observado	Nuez pecán	8,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	2								1	4	8

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
	Pone en días corridos		14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado, colgante de ramas de árboles, hojas de palmeras. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Forma de saco o bolsita abierta.

Emplea fibras vegetales o cerdas entretejidas.

Medidas :

Diámetro total : de 8 a 11 cm.

Diámetro interno : de 5 a 10 cm.

Profundidad : de 6 a 10 cm.

Alto : de 8 a 13 cm.

Altura.

Nido más bajo : 1,60 m.

Nido más alto : 10,00 m.

Elemento sostén y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
Banano	5	Quebracho colorado	1	Algarrobo	1
Palmera blanca	5	Tipa amarilla	1	Tacuara	1
Palmera china	2	Araucaria	1	Nuez pecán	
Pino	1	Seibo	1		

HUEVOS

Pone 2 ó 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 22,8 a 23,6 x 15,6 a 16,6 X= 23,1 x 15,9 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,185 a 0,190 X= 0,189 (N= 5)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
564	15-11-71	La Gallareta	22,8 x 15,8	0,185
			23,4 x 16,6	0,190
662	03-01-87	Villa Elisa	22,8 x 16,2	0,190
863	27-12-95	Esperanza	22,9 x 15,6	0,190
			23,6 x 15,7	0,190

PICHONES

Descripción.

12 días. Comisura blanquecina. Pico gris. Cavidad bucal rosada. Plumaje negro. Cubiertas alares canelas.

OBSERVACIONES


El 10-01-94, en Esperanza un adulto con dos juveniles.


Se observó adultos imitando el canto de *Furnarius rufus, Buteo magnirostris* y *Guira guira.*

CHOPÍ *Gnorimopsar chopi*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	





Total de nidos : 5

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
19-11-76	Los Amores	4 huevos	Hueco en Palmera blanca	2,00
19-11-76	Los Amores	5 huevos	Caja nido	4,00
19-11-76	Los Amores	2 pichones	Caja nido	4,50
19-11-76	Los Amores	3 pichones	Caja nido	5,00
23-11-95	Esperanza	No observado	En nido de *Colaptes sp.*	4,50

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										5	

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En huecos en árboles, nidos de Carpinteros, cajas nidos. A baja y mediana altura.

Características.

Oculto. Poco elaborado. Acolcha la base con hojas, cortezas.

Medidas :

Diámetro total : de 10 a 13 cm.

Diámetro interno : de 6 a 8 cm.

Profundidad : de 5 a 10 cm.

Alto : de 10 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos.

Ovoidales. De color celeste pálido con rayitas y manchas negras en el polo mayor.

Medidas y pesos :


De 27 a 27,3 x 19,3 a 19,9 X= 27,2 x 19,5 (N= 4)

Peso de las cáscaras : de 0,306 a 0,314 X= 0,309 (N= 4)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
563	19-11-76	Los Amores	27,0 x 19,3	0,306
			27,3 x 19,4	0,309
			27,3 x 19,6	0,314
			27,3 x 19,9	0,314

FEDERAL *Amblyramphus holosericeus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
10-12-72	San Vicente	4 huevos	Espadaña	1,30

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado juncos o espadañas. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de fibras vegetales. (de juncos, espadañas).

Medidas :

Diámetro total : 12 cm.

Diámetro interno : 8 cm.

Profundidad : 7,5 cm.

Alto : 15 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color verdoso con pintas y manchitas pardas en el polo mayor.

VARILLERO NEGRO *Agelasticus cyanopus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
22-12-78	Cayastá	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Aromo	1,20
22-12-78	Cayastá	3 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	2,00
11-12-90	Santa Rosa	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Aromo y Paja brava	1,60
11-12-90	Santa Rosa	3 huevos	Aromo	1,60
11-12-90	Cayastá	En construcción	Achira amarilla	1,50
20-02-96	Villa Roda	4 huevos	Talia	1,40

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1										5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 7 días	Pone en días corridos	12 a 13 días	15 a 16 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a ramas de árboles o plantas, en o cerca del agua. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de fibras vegetales.

Medidas :

Diámetro total : de 9 a 12 cm.

Diámetro interno : de 6 a 9 cm.

Profundidad : de 6 a 7 cm.

Alto : de 8 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 2 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21,7 a 24 x 15,6 a 17,5 X= 23,1 x 16,6 (N= 10)

Peso lleno : de 2,5 a 3,6 X= 3,0 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 0,190 a 0,220 X= 0,208 (N= 10)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
572	22-12-78	Cayastá	24,0 x 17,0		0,211
573	22-12-78	Cayastá	23,9 x 16,9		0,202
			24,0 x 17,0		0,208
			24,0 x 17,5		0,228

774	11-12-90	Santa Rosa	21,7 x 15,6	2,5	0,190
			22,4 x 15,7	2,6	0,200
			22,4 x 15,8	2,8	0,200
773	11-12-90	Santa Rosa	22,7 x 17,0	3,4	0,210
			23,0 x 16,8	3,5	0,220
			23,5 x 17,2	3,6	0,220


PICHONES

Los pichones tienen el color de la hembra. Los dos padres los alimentan, pero con mayor intensidad la hembra. Les traen langostas y gusanitos. El macho vigila y corre a otras aves (picaflores, benteveo, varillero, músico).

OBSERVACIONES

El 24-12-93, en Esperanza una pareja alimentaba a dos juveniles, en un Espadañal.

VARILLERO ALA AMARILLA *Agelasticus thilius*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 4

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
27-10-77	Campo Andino	3 huevos y 1 de *M. bonariensis*	Junco	0,80
10-01-92	Isla Verde	3 huevos	Junco	1,50
21-10-98	Isla Verde	3 pichones	Junco	1,20
21-10-98	Isla Verde	3 huevos	Junco	1,20

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1									3		

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a juncos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de fibras de juncos.

Medidas :

Diámetro total : de 11 a 12 cm.

Diámetro interno : de 8 a 9 cm.

Profundidad : de 6 a 7 cm.

Alto : de 8 a 9 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color ocres o blancos con pintas, manchitas y rayitas negras, castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21,9 a 23,5 x 16,4 a 16,9 X= 22,4 x 16,7 (N= 6)

Peso de las cáscaras : de 0,197 a 0,250 X= 0,225 (N= 6)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
565	27-10-77	Campo Andino	21,9 x 16,9	0,197
			22,8 x 16,8	0,206
			23,5 x 16,6	0,227
833	10-01-92	Isla Verde	22,0 x 16,6	0,230
			22,3 x 16,4	0,240
			22,5 x 16,9	0,250

VARILLERO CONGO *Chrysomus ruficapillus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



Total de colonias : 47

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-70	Esperanza	3 huevos	Duraznillo blanco	0,80
15-12-72	Esperanza	2 huevos y 8 de *Molothrus bonariensis*	Duraznillo blanco	0,90
03-01-77	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Cina cina	1,70
05-01-79	Candioti (1)	4 huevos	Cina cina	1,10
24-12-79	Miguel Escalada	3 huevos	Junco	0,50
02-01-82	Morteros	2 huevos	Junco	1,20
24-11-83	Aguará	Huevos y pichones	Espadaña	
20-10-86	Saladero Cabal	3 huevos	Junco	1,20
03-01-87	Esperanza	1 huevo	Junco	1,40
23-01-88	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Junco	1,00
11-01-89	Esperanza	2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Viznaga	1,50
08-11-89	Los Amores	Huevos	Junco	
16-12-89	Esperanza (2)	No observado	Olmo	7,00
17-11-90	Cacique Ariacaiquín	Huevos y pichones	Junco	
01-12-90	Esperanza	Huevos	Chilca negra y Cina cina	
04-12-90	Río Salado y Ruta 4	4 huevos	Capín	
04-12-90	Río Salado y Ruta 4	Sin postura	Saeta	
04-12-90	Río Salado (Emilia)	1 huevo y 1 de *Molothrus bonariensis*	Chilca negra	1,70
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	3 huevos	Junco	1,50
13-12-90	Empalme San Carlos	1 huevo	Duraznillo blanco	1,20
14-12-90	Desvío Arijón	En construcción	Junco	
15-12-90	Laguna Paiva	En construcción	Junco	
18-12-90	Esperanza	4 huevos	Duraznillo blanco	1,10
18-12-90	Esperanza (3)	Huevos y pichones	Duraznilllo y junco	
02-01-91	Cayastá	En construcción	Junco	
02-01-91	El Laurel	En construcción	Junco	
20-11-91	Don Cristóbal	En construcción	Junco	
05-02-92	Isla Verde	Huevos y pichones	Junco	
21-11-93	Las Cuevas	Huevos	Espadaña	

23-12-93	Esperanza	En construcción y huevos	Espadaña	
07-01-94	Río Salado y Ruta 4	Huevos y pichones	Junco	
07-01-94	Río Salado y Ruta 70	Huevos	Caña de Castilla	
21-12-94	Esperanza	En construcción y huevos	Junco	
21-12-94	Rincón de Ávila	En construcción	Maizal	
14-03-96	Villa Roda	En construcción, huevos y pichones	Talia	
14-12-00	Villa Roda	Huevos	Talia y Junco	
13-01-01	Villa Roda	Pichones	Junco	
26-01-01	Villa Roda	Huevos y pichones	Junco	
26-01-01	Villa Roda	Sin postura	Catay colorado	
15-11-01	Esperanza	2 huevos	Junco	1,60
21-11-01	Esperanza	2 pichones y 1 pichón de *Molothrus bonariensis*	Duraznillo blanco	1,10
07-12-01	Esperanza	2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Duraznillo blanco	1,50
03-12-02	Villa Roda	En construcción	Duraznillo blanco	1,40
17-12-02	Villa Roda	Huevos y pichones	Duraznillo blanco	1,50
09-01-04	Esperanza	En construcción y huevos	Junco	1,60
15-01-04	Villa Roda	En construcción y huevos	Duraznillo blanco	1,35-1,50
19-11-04	Villa Roda	Huevos	Duraznillo blanco	1,35-1,50

(1). En un campo inundado había unos 200-250 nidos, con huevos y con pichones. Estaban en Cina cina o en yuyos, casi a ras del suelo.
(2). Varios nidos en una granja de pollos.
(3). En bañados del río Salado, había una colonia, con 74 nidos en Duraznilllo blanco y muy pocos en Juncos, 50 nidos tenían huevos y 24 pichones. Nidos con huevos : 13 con 1 huevo, 7 con 2 huevos, 23 con 3 huevos (uno de estos tenía 1 huevo de *Molothrus bonariensis*) y 7 con 4 huevos.
Nidos con pichones : 4 con 1 pichón, 14 con 2 pichones (uno tenía además 1 huevo) y 6 con 3 pichones.

Número de colonias por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	3	1							1	8	19

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
6 a 7 días	Pone en días corridos	11 días	11 a 12 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado a ramas de árboles o arbustos, plantas acuáticas, yuyos, cañas, sobre el agua o en lugares secos. Generalmente a baja altura. A veces altos.
Características.

Expuesto. Elaborado. Tazón de fibras vegetales. (de juncos, espadañas).
Medidas :

Diámetro total : de 10 a 13 cm.
Diámetro interno : de 6 a 8 cm.
Profundidad : de 5 a 10 cm.
Alto : de 10 a 11 cm.

HUEVOS

Pone 3, a veces 4 huevos.

Ovoidales. De color verde claro o celeste con pintas, manchitas y rayas negras, más concentradas en el polo mayor. Algunos con manchitas grises.
Medidas y pesos :

De 21,3 a 25,5 x 15,5 a 17,4 X= 23,3 x 16,2 (N= 45)

Peso lleno : de 3,1 a 3,6 X= 3,4 (N= 22)

Peso de las cáscaras : de 0,166 a 0,216 X= 0,195 (N= 24)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
566	26-02-70	Esperanza	21,3 x 15,7		0,183
			21,5 x 15,9		0,185
			21,9 x 15,7		0,186
567	15-12-72	Esperanza	22,8 x 16,9		0,197
			23,5 x 16,1		0,200
568	03-01-77	Esperanza	22,6 x 16,5		0,166
			22,9 x 15,9		0,182
			23,2 x 16,9		0,212
569	05-01-79	Candioti	22,4 x 16,9		0,204
			22,8 x 16,8		0,209
			23,5 x 17,4		0,213
			24,0 x 17,0		0,216
570	24-12-79	Miguel Escalada	21,4 x 16,0		0,165
			21,4 x 16,4		0,191
			22,0 x 15,8		0,197
571	02-01-82	Morteros	22,8 x 16,0		0,180
			23,1 x 16,2		0,194
640	20-10-86	Saladero Cabal	22,8 x 16,5		0,200
			23,0 x 16,6		0,200
			23,5 x 16,4		0,200
666	23-01-88	Esperanza	22,0 x 16,0		0,180
			22,2 x 16,4		0,180
			22,8 x 15,5		0,190
781	18-12-90	Esperanza	24,2 x 16,3	3,4	0,200
			24,6 x 17,0	3,6	0,210
			24,7 x 16,8	3,6	0,210
			25,5 x 16,2	3,6	0,210
	19-11-04	Villa Roda	23,0 x 16,0	3,3	
			23,2 x 16,2	3,4	
			23,3 x 16,0	3,3	
	19-11-04	Villa Roda	25,0 x 16,3	3,4	
			25,1 x 16,2	3,4	
			25,2 x 16,3	3,4	
	19-11-04	Villa Roda	24,0 x 15,6	3,4	
			24,5 x 15,5	3,4	
			24,2 x 16,0	3,4	
	19-11-04	Villa Roda	21,6 x 16,0	3,0	
			23,2 x 16,0	3,3	
			23,2 x 16,2	3,4	
	19-11-04	Villa Roda	22,0 x 15,0	3,1	
			23,0 x 16,0	3,2	
	19-11-04	Villa Roda	22,7 x 17,0	3,4	
			23,0 x 16,6	3,4	
	19-11-04	Villa Roda	24,0 x 15,7	3,5	
			25,1 x 16,2	3,4	

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Piel amarillenta. Comisura blanca. Interior de la cavidad bucal rosada. Plumón gris.

4 día. Ojos cerrados. Piel amarillo-verdosa. Comisura blanquecina. Cavidad bucal rosada. Escaso plumón gris.

6 día. Ojos abiertos. Abriendo las láminas de las plumas ventrales.

8 día. Dorsalmente marrón. Ventralmente color de la hembra. Pico oscuro. Solamente una manchita blanca en la base de la mandíbula.

9 día. Vainas dorsales y ventrales : 0,5 cm.

12 día. Emplumado. Pico y patas grises. Alas pardo oscuras.

PICHONES

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	0,9	1,2-1,5	-	-	-	-	-	3,0-4,8
2	0,4-0,5	1,1-1,3	1,4-1,9	-	-	-	-	-	3,7-6,0
3	0,6-0,7	1,2-1,7	1,5-2,2	0,1	-	0,2	-	-	4,5-9,5
4	0,7	1,6-1,8	2,0-2,5	0,4-0,5	-	0,3	-	-	11,0-13,0
5	0,8	1,8-2,2	2,2-2,7	0,7-1,2	-	0,5-1,0	-	-	15,0-16,0
6	0,9-1,0	2,3-2,7	2,7-3,0	1,8-2,0	0,2	1,0-1,5	0,3	0,4	16,0-22,0
7	1,0	2,6-3,0	2,9-3,7	2,1	0,4	1,5-1,7	0,5	0,8-1,0	19,0-24,0
8	1,1	3,0-3,2	3,4-3,9	2,6	1,0	1,7	1,0	1,1	22,0-27,0
9	1,1	3,3	3,4-4,0	2,7	2,3	1,8	2,2	1,2	29,0
10	1,1	3,4	3,9-4,0	2,8	2,4	1,9	2,3	1,3	29,0
11	1,1	3,4	4,0	2,8	2,5	1,9	2,4	1,4	30,0,0
12	1,1	3,4	4,0	2,8	2,6	1,9	2,7	1,5	31,0

OBSERVACIONES

El 24-11-83 en Aguará, se observó un ejemplar albino.

El 28-12-01, en Villa Roda, un ejemplar albino parcial. Tenía blanco en la corona, rabadilla, flancos y ventralmente.

Observaciones de la construcción de un nido.

El macho trae pajas que busca a 50 m. del lugar. La hembra viene sin materiales y acomoda el nido.

También busca fibras mojadas muy cerca del nido (2-3 m.).

La hembra sacaba pajitas de un nido de *Fluvicola albiventer* que estaba a 3 m. y fue abandonado por la creciente del agua. El macho canta y entreabre las alas, se echa como para incubar.


Los pichones son afectados por larvas de moscas.

PECHO AMARILLO COMÚN *Pseudoleistes virescens*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Total de nidos : 9



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-10-71	Cayastacito	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,40
09-10-71	Cayastacito	4 huevos	Paja brava	0,70
25-09-77	Campo Andino	4 huevos	Paja brava	0,70
22-11-81	Cayastá	3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,80
24-11-83	Aguará Grande	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Junco	1,10
24-11-83	Aguará Grande	3 pichones	Junco	1,10
24-11-83	Aguará Grande	3 pichones	Junco	1,00
03-10-86	Cayastá	4 huevos de *Molothrus bonariensis*	Paja brava	0,90
12-11-91	Campo Andino	2 huevos	Paja brava	0,80

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								1	3	5	

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido entre hojas de pajas bravas o en juncos. A baja altura.

Características.

Expuesto. Elaborado.Tazón de fibras vegetales, tallos y barro en la base. Internamente fibras finas.

Medidas :

Diámetro total : de 13 a 16 cm.

Diámetro interno : de 7 a 9 cm.

Profundidad : de 6,5 a 7,5 cm.

Alto : de 14 a 16 cm.

HUEVOS

Pone 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco o rosado con pintas y manchitas castañas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 24,8 a 27,5 x 18,4 a 20 X= 26,4 x 18,8 (N= 14)

Peso de las cáscaras : de 0,317 a 0,405 X= 0,375 (N= 14)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
574	09-10-71	Cayastacito	25,7 x 19,0	0,317
			27,3 x 19,6	0,402
			27,4 x 19,0	0,405
575	09-10-71	Cayastacito	26,0 x 19,7	0,365
			26,5 x 20,0	0,378
			27,0 x 19,4	0,385
			27,2 x 19,8	0,390
576	25-09-77	Campo Andino	24,8 x 18,6	0,331
			24,9 x 18,4	0,357
			26,0 x 18,9	0,362
			26,0 x 19,0	0,380
577	22-11-81	Cayastá	26,7 x 19,2	0,382
			26,8 x 18,4	0,385
			27,5 x 19,5	0,396

OBSERVACIONES


El 27-11-91, en Gdor. Mancilla un ejemplar alimentaba dos pichones de *Molothrus bonariensis.*

TORDO MÚSICO *Agelaioides badius*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Total de nidos : 101



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
26-02-71	Esperanza	4 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
02-01-72	Esperanza	4 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
25-11-76	Esperanza	4 huevos y 2 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,50
21-01-78	Saladillo Dulce	3 huevos y 1 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,70
17-12-78	Esperanza	2 huevos propios, 2 de *M. rufoaxisllaris* y 2 de *M. bonariensis*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
10-12-79	Esperanza	3 huevos y 2 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
29-01-82	Esperanza	4 huevos propios, 2 de *M. rufoaxillaris* y 2 de *M. bonariensis*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,20
29-01-82	Manucho	1 huevos y 2 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,40
11-02-83	Salta	No observado	En *Phacellodomus rufifrons*	4,00
14-01-89	Esperanza	1 huevo	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,50
14-01-89	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00
14-01-89	Esperanza	8 huevos y 3 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,60
14-01-89	Esperanza	3 huevos y 2 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,70
10-03-89	Río Salado y Ruta 4	4 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,10
30-11-90	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
07-12-90	Esperanza	4 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis.*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,20
07-12-90	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,80
18-12-90	Esperanza	4 huevos y 6 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,60
19-12-90	Esperanza	No observado	En nido de palitos	3,20
29-12-90	Esperanza	5 huevos y 5 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
29-12-90	Esperanza	2 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,50
31-12-90	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus ruber*	3,00
31-12-90	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus ruber*	4,50
02-01-91	Cayastá	No observado	En *Phacellodomus ruber*	4,50
02-01-91	Cayastá	No observado	En *Phacellodomus ruber*	4,00
05-01-91	Grutly	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
08-01-91	Esperanza	6 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
12-01-91	Grutly	3 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,20
01-02-91	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,40
02-01-92	Esperanza	No observado	En *Pitangus sulphuratus*	5,00

06-11-92	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,30
12-12-92	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00
04-12-93	Esperanza	2 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,30
07-12-93	Esperanza	6 huevos	En *Phacellodomus ruber*	2,40
09-12-93	Esperanza	14 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,40
16-12-93	Esperanza	3 huevos y 1 de *Molothrus rufoaxillaris*	En *Phacellodomus sibilatrix*	5,00
16-12-93	Esperanza	3 pichones	En *Phacellodomus striaticollis*	1,70
04-01-94	Villa Roda	8 huevos	En *Pitangus sulphuratus*	5,00
08-01-94	Villa Roda	4 huevos	En *Agelaius ruficapillus*	3,80
17-01-94	Esperanza	4 huevos y 3 de *Molothrus rufoaxillaris*	En nido de palitos	3,10
13-01-95	Rincón de Ávila	5 pichones	En *Zonotrichia capensis*	2,50
05-01-97	Villa Roda	3 pichones	En Caja nido	3,50
30-11-98	Esperanza	3 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,90
05-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,80
12-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,40
12-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,70
12-12-98	Esperanza	No observado	En nido de palitos	3,00
26-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,40
28-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,70
30-12-98	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,20
04-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,80
07-01-99	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	3,20
09-01-99	Esperanza	No observado	En *Pitangus sulphuratus*	4,00
12-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,90
12-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,60
12-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,80
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,60
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Coryphistera alaudina*	4,10
15-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus ruber*	4,00
21-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,10
25-01-99	Esperanza	16 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,70
25-01-99	Esperanza	5 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,60
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,90
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,30
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,80
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Pitangus sulphuratus*	7,00
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Pitangus sulphuratus*	5,00
26-01-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
02-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus ruber*	4,50
08-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,40
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,10
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,10
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,00
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,80
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,80
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,40
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus ruber*	6,00
14-02-99	Esperanza	No observado	En *Anumbius annumbi*	3,70
04-03-99	Esperanza	Pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,30
13-03-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
13-03-99	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,00

13-03-99	Esperanza	Pichones	En *Coryphistera alaudina*	6,00
29-01-00	Esperanza	En construcción	En *Phacellodomus sibilatrix*	5,00
29-01-00	Esperanza	Pichones	En *Phacellodomus ruber*	4,40
01-03-00	Esperanza	4 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,60
25-12-01	Esperanza	No observado	En *Pitangus sulphuratus*	5,40
28-01-02	Esperanza	4 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,00
14-11-02	Esperanza	5 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,80
03-12-02	Esperanza	5 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,20
03-12-02	Esperanza	10 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,40
17-12-02	Esperanza	2 huevos y 5 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,40
21-12-02	Esperanza	En construcción	En *Anumbius annumbi*	3,60
21-12-02	Esperanza	3 huevos propios, 2 de *M. rufoaxis-llaris* y 1 de *M. bonariensis*	En *Phacellodomus sibilatrix*	2,00
23-12-02	Esperanza	6 huevos	En *Anumbius annumbi*	3,50
09-01-03	Esperanza	3 huevos y 1 pichón	En *Phacellodomus sibilatrix*	1,40
13-12-03	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,70
13-12-03	Esperanza	No observado	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,50
31-12-03	Esperanza	3 huevos	En *Asthenes baeri*	2,30
16-01-04	Esperanza	2 huevos y 4 pichones	En *Phacellodomus sibilatrix*	4,60
29-11-04	Esperanza	9 huevos	En *Phacellodomus sibilatrix*	3,70
20-12-04	Villa Roda	6 huevos	En *Phacellodomus ruber*	2,60

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
42	13	6								6	34

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10 a 12 días	Pone en días corridos	13 días	13 a 14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En nidos abandonados, cajas nido. A baja y mediana altura y altos.

Características.

Expuesto. Elaborado. Tacita de pajitas y raicillas.

Medidas :

Diámetro interno : de 7 a 8 cm.

Profundidad : de 2,5 a 3 cm.

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
En *Phacellodomus sibilatrix*	70	En nidos de palitos	3	En Caja nido	1
En *Phacellodomus ruber*	10	En *Coryphistera alaudina*	2	En *Phacellodomus striaticollis*	1
En *Pitangus sulphuratus*	6	En *Phacellodomus rufifrons*	1	En *Asthenes baeri*	1
En *Anumbius annumbi*	4	En *Agelaius ruficapillus*	1	En *Zonotrichia capensis*	1

HUEVOS

Pone 4 huevos. Pero se encuentran nidos con hasta 9.

Ovoidales. De color blanquecino, crema o crema verdoso con pintas y manchitas castañas y grises.

Medidas y pesos :

De 22 a 25,9 x 16,3 a 19,3 X= 23,3 x 17,42 (N= 33)

Peso lleno : de 3,3 a 4,9 X= 4,1 (N= 14)

Peso de las cáscaras : de 0,216 a 0,388 X= 0,281 (N= 33)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
549	26-02-71	Esperanza	22,4 x 18,2		0,251
			22,8 x 17,3		0,259
			23,5 x 17,8		0,259
			23,7 x 17,7		0,268
550	02-01-72	Esperanza	23,4 x 17,2		0,257
			24,3 x 17,5		0,268
			24,6 x 18,2		0,270
			24,8 x 17,0		0,272
551	26-11-76	Esperanza	23,3 x 18,0		0,263
			23,7 x 18,0		0,279
			23,8 x 17,7		0,281
			23,8 x 17,9		0,288
552	21-01-78	Saladillo Dulce	23,4 x 17,4		0,275
			23,4 x 17,8		0,282
			24,0 x 17,7		0,284
554	17-10-78	Esperanza	22,5 x 17,3		0,220
			24,0 x 18,2		0,235
555	10-12-79	Esperanza	22,0 x 17,5		0,247
			22,5 x 16,3		0,251
			22,9 x 16,5		0,299
553	29-01-82	Esperanza	23,0 x 16,8		0,216
			23,0 x 16,5		0,228
			23,2 x 16,4		0,234
			23,3 x 16,8		0,235
556	29-01-82	Manucho	25,9 x 18,7		0,388
599	14-01-89	Esperanza	23,1 x 18,2		0,340
			23,5 x 19,3		0,340
			23,7 x 18,6		0,360
790	29-12-90	Esperanza	24,6 x 17,9	4,0	
			25,0 x 18,1	4,4	
			25,0 x 18,2	4,4	
			25,0 x 18,2	4,4	
			25,7 x 18,5	4,7	
	29-11-04	Esperanza	21,2 x 18,0	3,7	
			21,5 x 17,8	3,7	
			22,0 x 16,8	3,3	
			23,0 x 18,0	4,0	
			23,0 x 18,0	4,0	
			23,0 x 18,9	4,6	
			23,2 x 18,0	4,1	
			23,5 x 18,2	4,4	
			25,5 x 19,0	4,9	

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Pico y patas grises. Cavidad bucal rosado claro. Piel naranja. Escaso plumón gris en cabeza, dorsal y dorsal de las alas.

2 días. Apenas se ven las vainas alares.

3 días. Abren los ojos, marrones.

4-5 días. Aparecen las vainas en las zonas ptéridas. Ventralmente en extremo de las vainas es blanquecino en todos.

7 días. Abriendo las láminas. Escaso plumón. Vainas dorsales gris claro. Láminas ventrales pardas.

8 días. Emplumando color del adulto.

9 días. Emplumados. Si son molestados se van del nido.

PICHONES

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	1,0-1,3	1,3-1,9	-	-	-	-	-	4,9-9,7
2	0,4-0,5	1,3-1,5	1,6-2,4	-	-	-	-	-	7,2-14,0
3	0,6-0,7	1,2-1,7	1,5-2,2	0,1	-	0,2	-	-	10,4-18,0
4	0,7	1,6-1,8	2,0-2,5	0,4-1,3	-	0,3	-	-	20,0-22,5
5	0,8	1,9-2,2	2,4-3,0	0,5-1,5	-	0,5-1,0	-	-	24,0-26,0
6	0,9-1,0	2,3-2,7	2,7-3,0	1,3-1,8	0,2	1,0-1,5	0,3	0,4	28,0-30,0
7	1,0	2,4-2,9	3,0-3,7	1,2-2,0	0,5-1,0	1,5-1,7	0,5	0,8-1,0	30,0-31,0
8	1,1	2,7-2,9	3,4-3,8	2,0	1,2	1,7	1,0	0,6-1,1	31,0-32,0
9	1,1	3,0	3,8-4,0	2,0	1,5	2,0	1,1	1,4-1,9	32,0-33,5

OBSERVACIONES

Los nidos a veces tienen muchos huevos, porque ponen más de una hembra. Pueden estar fuera de la cámara o en el suelo.

El 06-12-02, en Esperanza un ejemplar rompió y comió un huevo de *Tyrannus savana.*

Es parasitado por *Molothrus rufoaxillaris* y *Molothrus bonariensis*

Alimentación.

Se observó llevando a los pichones Mamboretá (*Stagmatotera hyaloptera*).

TORDO PICO CORTO *Molothrus rufoaxillaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Total de nidos parasitados : 14

Fecha	Lugar	Nº de huevos de la especie parásita	Especie hospedante
25-11-76	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
21-01-78	Saladillo Dulce	1 huevo	*Agelaioides badius*
17-12-78	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
10-12-79	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
29-01-82	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
29-01-82	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
14-01-89	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
17-01-89	Esperanza	3 huevos	*Agelaioides badius*
10-11-90	Morteros	2 huevos	*Agelaioides badius*
18-12-90	Esperanza	6 huevos	*Agelaioides badius*
29-12-90	Esperanza	5 huevos	*Agelaioides badius*
17-01-94	Esperanza	3 huevos	*Agelaioides badius*
29-11-04	Esperanza	2 huevos	*Agelaioides badius*
01-12-04	Esperanza	1 huevo	*Pitangus sulphuratus*

Número de nidos parasitados por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6										3	5

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
		13 días	13 a 14 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Especie parásita.

HUEVOS

Ovoidal. De color crema rosado con pintas castañas y grises.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 24,6 x 16,3 a 18,9 X= 23,0 x 17,8 (N= 23)

Peso lleno : de 3,3 a 4,4 X=3,8 (N= 8)

Peso de la cáscara : de 0,321 a 0,385 X= 0,353 (N= 20)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
551	25-11-76	Esperanza	23,9 x 18,0		0,358
			24,0 x 18,8		0,378
552	21-01-78	Saladillo Dulce	23,7 x 18,4		0,353
554	17-12-78	Esperanza	23,0 x 16,3		0,321
			23,3 x 16,6		0,385
555	10-12-79	Esperanza	23,0 x 18,7		0,364
			23,9 x 18,7		0,371
553	29-01-82	Esperanza	21,5 x 18,0		0,364
			22,8 x 18,0		0,371
556	29-01-82	Esperanza	23,2 x 18,3		0,300
			23,5 x 18,4		0,353
599	14-01-89	Esperanza	22,0 x 18,0		0,330
			22,4 x 17,5		0,330
755	10-11-90	Morteros	23,5 x 18,5		0,335
			24,6 x 18,0		0,340
790	29-12-90	Esperanza	21,8 x 17,8	3,5	0,350
			22,6 x 18,1	4,0	0,360
			22,7 x 18,7	4,1	0,360
			23,4 x 18,3	4,3	0,360
			23,6 x 18,9	4,4	0,370
	29-11-04	Esperanza	22,5 x 17,0	4,0	
			23,0 x 17,2	3,9	
	01-12-04	Esperanza	23,3 x 18,4	3,3	

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Cavidad bucal rosada. Comisura blanca. Plumón fino, gris oscuro, en cabeza, dorso y dorsal de las alas. Piel verdosa.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas			
	Pico	Tarso	Tibia	Peso
1	0,7	0,7	1,2	4,0
2	0,7	0,7	1,2	4,1
3	0,7	0,8	1,3	4,3

TORDO GIGANTE *Molothrus oryzivorus*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos parasitados : 1

Fecha	Lugar	Nº de huevos de la especie parásita	Especie hospedante
12-10-81	Puerto Iguazú	1 huevo	*Cacicus haemorrhous*

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Especie parásita.

HUEVOS

Ovoidal. De color blanco.

Medidas y pesos :

33,9 x 24,3 (N= 1)

Peso de la cáscara : 0,845 (N= 1)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
557	12-10-81	Puerto Iguazú	33,9 x 24,3	0,845

TORDO RENEGRIDO *Molothrus bonariensis*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Total de nidos parasitados: 197

Fecha	Lugar	Nº de huevos o pichones de la especie parásita	Especie hospedante
04-10-70	Esperanza	2 huevos	*Pitangus sulphuratus*
09-10-70	Esperanza	1 huevo	*Phacellodomus striaticollis*
10-10-70	Esperanza	3 huevos	*Mimus saturninus*
12-10-70	Río Leyes	1 huevo	*Satrapa icterophrys*
01-03-71	Esperanza	1 huevo	*Sporophila caerulescens*
09-10-71	Cayastacito	1 huevo	*Pseudoleistes virescens*
31-10-71	Aguará	2 huevos	*Xolmis irupero*
07-11-71	Campo Andino	1 huevo	*Thraupis sayaca*
07-11-71	Campo Andino	2 huevos	*Zonotrichia capensis*
15-11-71	La Gallareta	3 huevos	*Icterus cayanensis*
15-11-71	La Gallareta	2 huevos	*Turdus amaurochalinus*
18-11-71	Lanteri	4 huevos	*Cacicus chrysopterus*
24-11-71	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
24-11-71	Río Leyes	1 huevo	*Turdus rufiventris*
01-10-72	Grutly	1 huevo	*Tyrannus savana*
01-10-72	Esperanza	1 huevo	*Phacellodomus striaticollis*
07-10-72	Ataliva	1 huevo	*Colaptes melanochloros*

13-10-72	Cayastacito	2 huevos	*Machetornis rixosus*
13-10-72	Cayastacito	1 huevo	*Anthus correndera*
05-11-72	La Camila	3 huevos	*Vireo olivaceus*
11-11-72	Aguará	2 huevos	*Fluvicola leucocephala*
15-12-72	Esperanza	8 huevos	*Agelaius ruficapillus*
29-10-73	Esperanza	1 huevo	*Troglodytes musculus*
16-12-73	Aguará	1 huevo	*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*
16-11-74	La Loca	2 huevos	*Myiarchus ferox*
18-10-76	Esperanza	2 huevos	*Ammodramus humeralis*
20-10-76	Manucho	5 huevos	*Mimus saturninus*
04-11-76	Esperanza	2 huevos	*Saltatricula multicolor*
05-11-76	Río Leyes	1 huevo	*Phacellodomus ruber*
29-11-76	Esperanza	5 huevos	*Saltatricula multicolor*
29-11-76	Esperanza	1 huevo	*Coryphospingus cucullatus*
11-12-76	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
03-01-77	Esperanza	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
27-10-77	Campo Andino	1 huevo	*Agelaius thilius*
30-11-77	Esperanza	1 huevo	*Sicalis luteola*
13-12-77	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
22-12-77	Esperanza	1 huevo	*Pachyramphus polychopterus*
05-01-78	Esperanza	2 huevos	*Poospiza melanoleuca*
20-01-78	Saladillo dulce	1 huevo	*Sicalis flaveola*
21-01-78	Campo Andino	1 huevo	*Progne tapera*
10-10-78	Esperanza	1 huevo	*Furnarius rufus*
10-10-78	Esperanza	1 huevo	*Asthenes baeri*
20-10-78	Cayastá	1 huevo	*Embernagra platensis*
17-12-78	Esperanza	2 huevos	*Molothrus badius*
22-12-78	Cayastá	1 huevo	*Agelaius cyanopus*
22-12-78	Cayastá	3 huevos	*Agelaius cyanopus*
08-12-79	La Loca	1 huevo	*Cacicus chrysopterus*
10-12-79	Esperanza	2 huevos	*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*
24-12-79	Miguel Escalada	2 huevos	*Tyrannus savana*
24-10-81	Esperanza	1 huevo	*Machetornis rixosus*
06-11-81	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
15-11-81	Cayastá	1 huevo	*Tyrannus melancholicus*
20-11-81	Santa Rosa de Calamuchita	2 huevos	*Turdus chiguanco*
22-11-81	Cayastá	3 huevos	*Tyrannus melancholicus*
22-11-81	Cayastá	2 huevos	*Pseudoleistes virescens*
17-12-81	Ascochinga	1 huevo	*Sturnella loyca*
29-01-82	Esperanza	2 huevos	*Molothrus badius*
31-10-82	Cayastá	1 huevo	*Vireo olivaceus*
03-10-86	Cayastá	4 huevos	*Pseudoleistes virescens*
15-10-86	Esperanza	2 huevos	*Furnarius rufus*
15-10-86	Esperanza	1 huevo	*Furnarius rufus*
03-01-87	Villa Elisa	2 huevos	*Icterus cayanensis*
18-11-87	Cululú	2 huevos	*Sturnella superciliaris*
23-01-88	Esperanza	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
11-01-89	Esperanza	2 huevos	*Agelaius ruficapillus*
30-10-89	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
08-11-89	Los Amores	1 huevo	*Cacicus chrysopterus*
16-12-89	Esperanza	1 huevo	*Myiodynastes maculatus*
22-12-89	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*

22-12-89	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
03-01-90	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
02-11-90	Morteros	1 huevo	*Poospiza melanoleuca*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Furnarius rufus*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Furnarius rufus*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Furnarius rufus*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Furnarius rufus*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Furnarius rufus*
02-11-90	Morteros	1 pichón	*Mimus saturninus*
07-11-90	Morteros	1 huevo	*Turdus amaurochalinus*
07-11-90	Morteros	1 huevo	*Turdus amaurochalinus*
07-11-90	Morteros	2 huevos	*Taraba major*
10-11-90	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
15-11-90	Morteros	1 huevo	*Mimus saturninus*
26-11-90	Va. Gral. Belgrano	1 huevo	*Poospiza whitii*
01-12-90	Esperanza	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
01-12-90	Esperanza	2 pichones	*Poospiza nigrorufa*
02-12-90	Esperanza	1 huevo	*Poospiza nigrorufa*
04-12-90	Río Salado y Ruta 62	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
08-12-90	Cacique Ariacaiquín	2 huevos	*Saltator aurantiirostris*
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	2 huevos	*Tyrannus melancholicus*
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	2 huevos	*Agelaius cyanopus*
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	3 huevos	*Embernagra platensis*
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
11-12-90	Santa Rosa (S. Fe)	1 huevo	*Paroaria capitata*
18-12-90	Esperanza	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
18-12-90	Esperanza	1 huevo	*Saltator coerulescens*
20-12-90	Monte Vera	3 huevos	*Donacospiza albifrons*
12-01-91	Grutly	3 huevos	*Taraba major*
11-11-91	Esperanza	1 huevo	*Satrapa icterophrys*
15-11-91	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
19-11-91	Esperanza	3 huevos	*Icterus cayanensis*
26-11-91	Villa Roda	2 huevos	*Taraba major*
27-12-91	Isla Verde	1 huevo	*Pseudocolopteryx flaviventris*
24-10-93	Esperanza	2 huevos	*Turdus amaurochalinus*
24-10-93	Esperanza	1 huevo	*Turdus amaurochalinus*
27-10-93	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
06-11-93	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
19-11-93	Esperanza	1 pichón	*Taraba major*
23-11-93	Empedrado	4 huevos	*Cacicus chrysopterus*
04-12-93	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
04-12-93	Esperanza	1 huevo	*Phacellodomus striaticollis*
04-12-93	Esperanza	1 huevo	*Fluvicola albiventer*
06-12-93	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
09-12-93	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
10-12-93	Esperanza	1 huevo	*Troglodytes musculus*
10-12-93	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
12-12-93	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
14-12-93	Esperanza	2 huevos	*Mimus saturninus*
16-12-93	Esperanza	2 huevos	*Mimus saturninus*

30-12-93	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	*Zonotrichia capensis*
31-12-93	Esperanza	2 huevos	*Guira guira*
07-01-94	Esperanza	2 huevos	*Agelaius ruficapillus*
08-01-94	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
09-11-95	Esperanza	1 pichón	*Zonotrichia capensis*
09-11-95	Esperanza	1 huevo	*Paroaria coronata*
14-11-95	Esperanza	1 huevo	*Satrapa icterophrys*
27-12-95	Esperanza	1 huevo	*Icterus cayanensis*
20-01-97	Esperanza	1 huevo	*Zonotrichia capensis*
13-10-98	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
30-10-98	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
04-11-98	Esperanza	3 huevos	*Fluvicola albiventer*
07-11-98	Esperanza	1 huevo	*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*
05-12-98	Esperanza	1 huevo	*Poospiza torquata*
11-12-98	Esperanza	1 huevo	*Coryphospingus cucullatus*
17-12-98	Esperanza	1 huevo	*Empidonumos aurantioatrocristatus*
26-12-98	Esperanza	2 huevos	*Mimus saturninus*
26-12-98	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
08-11-99	Esperanza	1 huevo	*Coryphospingus cucullatus*
18-12-99	El Alamito	1 huevo	*Catamenia analis*
02-01-00	Esperanza	1 huevo	*Icterus cayanensis*
09-01-00	Esperanza	1 huevo	*Icterus cayanensis*
19-01-00	La Falda	2 huevos	*Turdus chiguanco*
24-10-00	Esperanza	2 huevos	*Mimus saturninus*
28-10-00	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
30-10-00	Santa Fe	1 pichón	*Poospiza nigrorufa*
26-01-01	Villa Roda	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
01-11-01	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
01-11-01	Esperanza	1 huevo	*Saltatricula multicolor*
21-11-01	Esperanza	1 pichón	*Agelaius ruficapillus*
22-11-01	Esperanza	1 pichón	*Agelaius ruficapillus*
01-12-01	Esperanza	1 huevo	*Saltatricula multicolor*
07-12-01	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
17-12-01	Esperanza	1 huevo	*Pitangus sulphuratus*
19-12-01	Esperanza	1 huevo	*Turdus amauchalinus*
20-12-01	Esperanza	1 huevo	*Turdus amauchalinus*
26-12-01	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
27-12-01	Esperanza	1 huevo y 1 pichón	*Turdus amauchalinus*
07-01-02	Esperanza	1 huevo y 2 pichones	*Icterus cayanensis*
07-01-02	El Alamito	2 huevos	*Turdus chiguanco*
11-10-02	Esperanza	2 huevos	*Fufus rufus*
15-10-02	Esperanza	1 huevo	*Poospiza melanoleuca*
19-10-02	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
19-10-02	Esperanza	2 huevos	*Mimus saturninus*
01-11-02	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
08-11-02	Esperanza	4 huevos	*Mimus saturninus*
03-12-02	Esperanza	5 huevos	*Mimus saturninus*
03-12-02	Esperanza	1 huevo	*Tyrannus savana*
14-12-02	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
15-12-02	Santa Fe	1 huevo	*Geothlypis aequinoctialis*

17-12-02	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
21-12-02	Esperanza	1 huevo	*Molothrus badius*
10-01-03	Santa Fe	1 huevo	*Geothlypis aequinoctialis*
23-10-03	Esperanza	1 pichón	*Furnarius rufus*
07-11-03	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
08-11-03	Esperanza	1 pichón	*Furnarius rufus*
08-11-03	Esperanza	1 huevo	*Turdus amaurochalinus*
18-11-03	Esperanza	1 pichón	*Polioptila dumicola*
24-11-03	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
11-12-03	Esperanza	2 pichones	*Mimus saturninus*
12-12-03	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
19-12-03	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
19-12-03	Esperanza	2 huevos	*Poospiza melanoleuca*
24-12-03	Esperanza	1 huevo	*Taraba major*
02-01-04	Esperanza	1 pichón	*Polioptila dumicola*
15-01-04	Villa Roda	1 huevo	*Agelaius ruficapillus*
01-02-04	Esperanza	1 pichón	*Mimus saturninus*
27-09-04	Esperanza	5 huevos	*Furnarius rufus*
20-10-04	Esperanza	1 huevo	*Pitangus sulphuratus*
21-10-04	Esperanza	3 huevos	*Turdus amaurochalinus*
29-10-04	Esperanza	1 huevo	*Polioptila dumicola*
30-10-04	Villa Roda	3 huevos	*Paroaria capitata*
01-11-04	Esperanza	2 huevos	*Machetornis rixosus*
08-11-04	Esperanza	3 huevos	*Mimus saturninus*
15-11-04	Esperanza	4 huevos	*Mimus saturninus*
16-11-04	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
16-11-04	Esperanza	1 huevo	*Mimus saturninus*
16-11-04	Esperanza	6 huevos	*Mimus saturninus*
17-11-04	Villa Roda	4 huevos	*Agelaius ruficapillus*

Número de nidos parasitados por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21	1	1						1	41	66	66

Especie hospedante y número de nidos parasitados

Especie hospedante	Nº	Especie hospedante	Nº	Especie hospedante	Nº
Mimus saturninus	32	*Coryphospingus cucullatus*	3	*Turdus rufiventris*	1
Agelaius ruficapillus	13	*Agelaius cyanopus*	3	*Anthus correndera*	1
Polioptila dumicola	12	*Molothrus badius*	3	*Geothlypis aequinoctialis*	1
Furnarius rufus	12	*Pitangus sulphuratus*	3	*Thraupis sayaca*	1
Taraba major	10	*Machetornis rixosus*	3	*Saltator aurantiirostris*	1
Turdus amaurochalinus	10	*Troglodytes musculus*	2	*Saltator coerulescens*	1
Fluvicola albiventer	8	*Embernagra platensis*	2	*Poospiza torquata*	1
Icterus cayanensis	7	*Vireo olivaceus*	2	*Poospiza whitii*	1
Saltatricula multicolor	4	*Paroaria coronata*	2	*Sporophila caerulescens*	1
Griseotyrannus aurantioatrocristatus	4	*Guira guira*	1	*Donacospiza albifrons*	1
Cacicus chrysopterus	4	*Colaptes melanochloros*	1	*Sicalis luteola*	1
Zonotrichia capensis	4	*Phacellodomus ruber*	1	*Sicalis flaveola*	1
Poospiza melanoleuca	4	*Asthenes baeri*	1	*Paroaria capitata*	1
Phacellodomus striaticollis	3	*Fluvicola leucocephala*	1	*Catamenia analis*	1
Poospiza nigrorufa	3	*Pachyramphus polychopterus*	1	*Ammodramus humeralis*	1

Pseudoleistes virescens	3	*Pseudocolopteryx flaviventris*	1	*Agelaius thilius*	1
Satrapa icterophrys	3	*Myiarchus ferox*	1	*Sturnella superciliaris*	1
Turdus chiguanco	3	*Xolmis irupero*	1	*Sturnella loyca*	1
Tyrannus melancholicus	3	*Myiodynastes maculatus*	1		
Tyrannus savana	3	*Progne tapera*	1		

Total de especies hospedantes : 58

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
		12 a 13 días	14 a 15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Especie parásita.

HUEVOS

Ovoidales o redondeados. Color de base variable: blanquecino, blanco, celeste, verdoso, rosado u ocre, con pintas y manchitas muy variables, castañas, grises, pardas, distribuidas por toda la superficie, a veces más concentradas en el polo mayor. Algunos huevos son enteramente blancos.

Medidas y pesos :

De 21,5 a 27,8 x 18 a 22,6 X= 24,0 x 20,7 (N= 166)

Peso lleno : de 3,7 a 6,6 X= 4,8 (N=48)

Peso de las cáscaras : de 0,220 a 0,520 X= 0,388 (N= 138)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
410	04-10-70	Esperanza	24,3 x 19,8		0,399
			26,0 x 21,2		0,467
354	09-10-70	Esperanza	27,5 x 18,9		0,404
466	10-10-70	Esperanza	23,4 x 18,3		0,359
			23,8 x 19,8		0,377
			23,9 x 19,8		0,389
393	12-10-70	Río Leyes	27,0 x 21,8		0,511
510	01-03-71	Esperanza	22,0 x 18,9		0,343
574	09-10-71	Cayastacito	24,6 x 20,1		0,468
380	31-10-71	Aguará Grande	24,3 x 19,4		0,375
			27,0 x 21,0		0,452
488	07-11-71	Campo Andino	23,5 x 18,9		0,349
539	07-11-71	Campo Andino	23,2 x 19,9		0,398
			24,9 x 20,6		0,465
564	15-11-71	La Gallareta	23,5 x 19,5		0,369
			24,4 x 20,0		0,395
			25,5 x 20,7		0,429

478	15-11-71	La Gallareta	23,1 x 18,0	0,351
			24,4 x 20,2	0,406
558	18-11-71	Lanteri	23,2 x 20,0	0,367
			23,3 x 19,9	0,388
			23,9 x 21,0	0,389
			25,5 x 20,0	0,420
483	24-11-71	Esperanza	24,4 x 20,4	0,384
475	24-11-71	Río Leyes	25,0 x 19,3	0,396
355	01-10-72	Esperanza	24,2 x 19,8	0,408
398	01-10-72	Grutly	23,8 x 20,2	0,408
280	07-10-72	Ataliva	27,2 x 19,5	0,391
396	13-10-72	Cayastacito	24,7 x 20,7	0,406
			26,4 x 21,8	0,477
484	13-10-72	Cayastacito	23,5 x 19,0	0,351
485	05-11-72	La Camila	24,9 x 20,8	0,409
			25,3 x 22,6	0,448
			25,9 x 20,8	0,485
389	11-11-72	Aguará Grande	24,8 x 19,6	0,405
			26,7 x 20,0	0,475
567	15-12-72	Esperanza	22,7 x 19,4	0,357
			23,5 x 20,5	0,365
			24,0 x 19,3	0,388
			24,3 x 19,0	0,399
			24,8 x 20,0	0,414
			24,9 x 20,3	0,432
			25,0 x 20,5	0,436
			25,4 x 20,4	0,469
462	29-10-73	Esperanza	24,0 x 19,8	0,370
405	16-12-73	Aguará Grande	23,9 x 19,4	0,393
414	16-11-74	La Loca	23,7 x 19,4	0,390
538	18-10-76	Esperanza	23,9 x 19,2	0,390
			24,6 x 20,3	0,415
467	20-10-76	Manucho	24,8 x 20,9	0,378
			25,0 x 19,8	0,386
			25,0 x 20,0	0,392
			26,5 x 21,3	0,449

			26,9 x 20,8	0,473
351	05-11-76	Río Leyes	23,6 x 20,8	0,384
544	29-11-76	Esperanza	23,3 x 19,6	0,370
			23,6 x 20,0	0,371
			24,2 x 20,2	0,377
			24,3 x 20,0	0,391
			24,3 x 21,0	0,400
534	29-11-76	Esperanza	25,3 x 19,3	0,394
369	11-12-76	Esperanza	24,7 x 19,3	0,393
568	03-01-77	Esperanza	25,4 x 20,4	0,426
565	27-10-77	Campo Andino	23,0 x 20,2	0,345
522	30-11-77	Esperanza	23,2 x 20,0	0,442
387	13-12-77	Esperanza	27,4 x 21,9	0,520
377	22-12-77	Esperanza	25,0 x 19,6	0,390
541	05-01-78	Esperanza	25,4 x 20,0	0,396
			25,9 x 20,0	0,425
519	20-01-78	Saladillo Dulce	24,6 x 20,4	0,400
453	21-01-78	Campo Andino	25,0 x 19,0	0,366
304	10-10-78	Esperanza	23,2 x 19,2	0,377
341	10-10-78	Esperanza	25,5 x 20,5	0,437
545	20-10-78	Cayastá	25,7 x 21,5	0,501
554	17-12-78	Esperanza	22,9 x 19,6	0,358
			24,5 x 18,7	0,362
572	22-10-72	Cayastá	24,4 x 19,1	0,380
573	22-12-78	Cayastá	22,9 x 19,2	0,378
			23,8 x 18,7	0,386
			25,4 x 18,6	0,392
559	08-12-79	La Loca	24,4 x 20,0	0,360
408	10-12-79	Esperanza	25,0 x 19,9	0,386
			25,4 x 19,4	0,396
399	24-12-79	Miguel Escalada	23,2 x 20,5	0,362

			24,7 x 21,0		0,442
397	24-10-81	Esperanza	24,6 x 20,5		0,430
372	06-11-81	Esperanza	23,7 x 19,7		0,396
697	15-11-81	Cayastá	23,3 x 18,2		0,330
474	20-11-81	Santa Rosa de Calamuchita	23,5 x 19,8		0,460
			26,4 x 20,0		0,422
402	22-11-81	Cayastá	24,6 x 19,5		0,388
			25,0 x 20,0		0,418
			25,2 x 20,4		0,433
577	22-11-81	Cayastá	24,0 x 18,9		0,351
			24,6 x 19,4		0,385
581	17-12-81	Ascochinga	25,4 x 19,2		0,408
553	29-01-82	Esperanza	22,7 x 19,8		0,378
			23,0 x 19,8		0,394
591	31-10-82	Cayastá	24,4 x 18,6	4,5	
650	03-10-86	Cayastá	21,8 x 17,5		0,220
			25,4 x 20,2		0,320
			26,5 x 20,0		0,430
			26,6 x 20,2		0,500
637	15-10-86	Esperanza	27,8 x 21,9		0,400
			24,3 x 20,0		0,400
638	15-10-86	Esperanza	26,8 x 22,0		0,500
662	03-01-87	Villa Elisa	24,8 x 20,2		0,350
			25,0 x 19,8		0,360
664	18-11-87	Cululú	26,0 x 21,0		0,450
			26,8 x 21,8		0,460
666	23-01-88	Esperanza	23,1 x 19,3		0,330
430	30-10-89	Esperanza	24,8 x 20,0	5,4	0,410
737	16-12-89	Esperanza	25,0x 20,8	5,4	
738	22-12-89	Esperanza	25,4 x 21,1	6,1	
739	22-12-89	Esperanza	25,4 x 21,1	6,1	0,430
764	02-12-90	Esperanza	22,4 x 20,8	5,1	0,330

769	08-12-90	C.Ariacaiquín	23,3 x 20,5	5,1	
			23,9 x 20,5	5,3	
771	11-12-90	Santa Rosa	22,8 x 19,0	4,4	
			23,0 x 19,0	4,5	
774	11-12-90	Santa Rosa	20,8 x 18,6	3,7	
			24,0 x 19,3	4,3	
770	11-12-90	Santa Rosa	23,6 x 18,8	4,2	
			24,2 x 19,0	4,3	
			24,5 x 19,4	4,4	
298	18-12-90	Esperanza	24,6 x 20,4	5,3	
799	20-01-91	Grutly	22,3 x 20,8		0,290
			24,7 x 20,4		0,400
			25,5 x 21,0		0,430
849	31-12-93	Esperanza	23,3 x 19,4		0,440
			24,8 x 19,7		0,420
914	18-12-99	El Alamito	23,6 x 18,0		0,300
	27-09-04	Esperanza	24,0 x 19,0	4,6	
			23,4 x 20,0	4,6	
			24,0 x 19,6	4,7	
			25,5 x 21,5	5,7	
			26,5 x 21,0	6,1	
	20-10-04	Esperanza	25,0 x 18,3	4,5	
	21-10-04	Esperanza	24,0 x 19,4	5,5	
			24,4 x 21,5	6,6	
			24,4 x 19,8	5,1	
	29-10-04	Esperanza	23,4 x 19,8	4,6	
	30-10-04	Villa Roda	25,0 x 18,3	4,5	
			25,0 x 20,0	5,3	
			26,0 x 21,5	5,9	
	01-11-04	Esperanza	24,0 x 18,6	4,4	
			26,0 x 22,5	6,1	
	08-11-04	Esperanza	23,4 x 20,0	4,5	
			25,0 x 21,0	5,6	
			27,0 x 21,0	5,7	
	15-11-04	Esperanza	22,0 x 19,0	4,0	
			23,7 x 20,0	4,7	

		24,0 x 19,5	4,9
		25,0 x 20,5	5,3
16-11-04	Esperanza	23,8 x 20,5	5,4
16-11-04	Esperanza	25,5 x 21,0	5,6
16-11-04	Esperanza	22,0 x 19,5	4,4
		22,4 x 19,0	4,4
		25,0 x 21,8	5,2
		25,0 x 22,3	6,1
		25,5 x 20,5	5,2
		26,3 x 22,0	6,3
17-11-04	Villa Roda	24,2 x 21,0	5,6
		25,0 x 21,6	5,4
		26,0 x 20,5	5,5
		26,0 x 21,2	6,2

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento o verdoso amarillento. Piel verdosa. Comisura amarilla. Interior de la cavidad bucal rojo pálido. Anterior del paladar amarillento. Escaso plumón gris.

2 días. Ojos cerrados. Escaso plumón fino gris.Grita. Piel clara, verdosa. Comisura amarilla. Pico verdoso-amarillento. Cavidad bucal rojiza. Anterior del paladar amarillento.
3 días. Ojos cerrados. Aparecen las vainas en las zonas ptéridas.
4 días. Ojos abiertos. Marrones. Piel casi desnuda. Escaso plumón grisáceo
5 días. Lados del pecho y abdomen, con vainas grises. Plumón en la cabeza gris oscuro. Vainas de las alas, grises. Apenas se ven las vainas de las plumas de la cola, el resto del cuerpo con piel desnuda.
6 días. Escaso plumón en la cabeza.. Abriendo las láminas en las zonas ptéridas.
8 días. Dorsal pardo jaspeado de ocráceo. Pecho blanquecino jaspeado de pardo.Abdomen blanquecino.
Láminas de las plumas alares, pardas. Secundarias y cubiertas alares, con las barbas externas ocráceas. Cola con cañones cortos, las láminas chicas pardas y ocráceas.
12 días. Color de adulto. Grita. Se escapa del nido.


MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,7	1,4-2,5	1,9	-	-	-	-	-	-
2	0,8	1,8	2,4	0,2-03	-	0,2	-	-	-
3	1,0	2,2	2,9	0,5	-	0,5	-	-	-
4	1,0	2,4	3,2	1,0	-	1,0	-	-	-
5	1,0	2,7	3,6	1,6	-	1,4	-	-	-
6	1,1	3,0	4,0	2,4	0,3	1,8	0,1	0,5	-
7	-	-	-	-	0,8	-	0,3	0,6	-
8	-	-	-	-	1,2	-	0,9	0,7	-
9	-	-	-	-	1,5	-	1,3	0,8	-

Abren los ojos entre los 3 a 5 días. Los pichones son afectados por larvas de moscas.

PECHO COLORADO *Sturnella superciliaris*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos : 16

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
17-12-70	Recreo	5 huevos	Alfalfar
17-12-70	Recreo	3 huevos	Alfalfar
17-12-70	Recreo	3 pichones	Alfalfar
17-12-70	Recreo	4 pichones	Alfalfar
18-11-87	Cululú	5 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*	Pastizal
18-11-95	Esperanza	4 huevos	Alfalfar
10-12-95	Esperanza	3 pichones	Alfalfar
11-12-95	Esperanza	4 huevos	Alfalfar
23-12-95	Esperanza	4 huevos	Alfalfar
24-12-95	Esperanza	4 huevos	Moha
13-01-96	Esperanza	4 huevos	Moha
13-01-96	Esperanza	3 huevos	Moha
06-11-01	Esperanza	4 huevos	Alfalfar
04-11-03	Empalme San Carlos	3 huevos	Alfalfar
04-11-03	Empalme San Carlos	4 huevos	Alfalfar
15-11-04	Esperanza	2 huevos	Alfalfar

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2										6	8

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
4 a 5 días	Pone en días corridos	12 a 13 días	11 a 12 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre yuyos, pasturas o cultivos, pricipalmente de Alfalfa.

Características.

Oculto. Elaborado. Tacita o semiesfera de pajitas, en pocitos o depresiones.

Medidas :

Diámetro total : de 6 a 10 cm.

Profundidad : de 2,5 a 5 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales. De color blanco verdoso con pintitas ocres, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 21,2 a 26 x 16,9 a 18,2 X= 22,4 x 17,6 (N= 15)
Peso lleno : de 3,1 a 3,8 X= 3,45 (N= 2)

Peso de las cáscaras : de 0,188 a 0,246 X= 0,219 (N= 13)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
578	17-12-70	Recreo	21,2 x 17,0		0,188
			21,2 x 17,1		0,199
			22,0 x 17,2		0,200
			22,0 x 17,7		0,205
			22,0 x 17,7		0,214
579	17-12-70	Recreo	24,8 x 17,9		0,220
			24,9 x 17,5		0,230
			26,0 x 16,9		0,246
664	18-11-87	Cululú	22,5 x 18,1		0,200
			22,8 x 18,0		0,220
			22,8 x 18,2		0,230
			22,9 x 18,0		0,230
			23,5 x 18,0		0,230
	15-11-04	Esperanza	21,5 x 17,0	3,1	
			23,0 x 18,0	3,8	

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Piel ventral amarillenta, dorsal gris.
1 día. Plumón gris en la cabeza, parte dorsal y superior de las alas.
3 días. Ojos abiertos, marrones. Pico gris. Cavidad bucal rosada. Parte anterior del paladar, oscura. Alrededor de la fosa palatina, puntillado de blanquecino.Comisura blanquecina. Plumón fino, gris en la corona, parte dorsal y alas. Vainas alares grises. Aparecen las vainas en las zonas ptéridas.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Pico	Tarso	Tibia	Medidas				Cola	Peso
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,2	1,5	-	-	-	-	-	-
2	0,7	1,5	1,8	-	-	-	-	-	-
3	0,7	1,8	2,2	0,3	-	0,4	-	-	-

OBSERVACIONES


Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

LOICA COMÚN *Sturnella loyca*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Total de nidos : 2



Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación
07-11-79	Puerto Deseado	5 huevos	Entre pastos
17-12-81	Ascochinga	3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*	Entre pastos

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En el suelo, entre pastos.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o tazón de gramíneas.

Medidas :

Diámetro total : de 14 a 18 cm.

Diámetro interno : de 8 a 11 cm.

Profundidad : de 4,5 a 5 cm.

Alto : de 5,5 a 9 cm.

HUEVOS

Pone de 3 a 5 huevos.

Ovoidales.

Color :

Para *Sturnella l.loyca* crema completamente salpicado con pintas castañas y grises.

Para *Sturnella l. obscura* gris con pintas y manchitas grises y pardo oscuro.

Medidas y pesos :

Para *Sturnella l.loyca*

De 30,9 a 33 x 19,4 a 20 X= 31,9 x 19,8 (N= 5)

Peso de las cáscaras : de 0,359 a 0,413 X= 0,378 (N= 5)

Para *Sturnella l. obscura*

De 28,8 a 29,8 x 20,3 a 20,8 X= 29,3 x 20,4 (N= 3)

Peso de las cáscaras : de 0,339 a 0,359 X= 0,350 (N= 3)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
580	07-11-79	Puerto Deseado	30,9 x 20,0	0,359
			31,6 x 19,4	0,360
			31,6 x 19,8	0,370
			32,7 x 19,8	0,391
			33,0 x 20,0	0,413
581	17-12-81	Ascochinga	28,8 x 20,3	0,339
			29,8 x 20,8	0,352
			29,3 x 20,3	0,359

OBSERVACIONES

Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

FAMILIA: FRINGILLIDAE

CABECITANEGRA PICUDO *Sporagra crassirostris*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Total de nidos: 1

Fecha	Lugar	Contenido del nido	Ubicación	Altura
09-02-01	Azul Pampa	3 huevos	Arbusto	2,50

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido en ramas de arbustos. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera de fibras vegetales y raicillas. Internamente lana y unas plumitas.

Medidas :

Diámetro total : 7 x 9 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 1,8 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con finas pintas castañas en el polo mayor y escasas en el resto de la superficie.

Medidas y pesos :


De 17,3 a 18,3 x 12,5 a 13,2 X= 17,8 x 12,9 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,070 X= 0,070 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
925	09-02-01	Azul Pampa	17,3 x 12,5	0,070
			18,0 x 13,2	0,070
			18,3 x 13,1	0,070

CABECITANEGRA COMÚN *Sporagra magellanica*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Total de nidos : 6

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
18-10-78	Cayastá.	4 pichones	Ciprés	4,00
18-10-78	Cayastá.	3 pichones	Ciprés	5,00
18-10-79	Cayastá	2 huevos	Ciprés	4,50
23-10-79	Cayastá	3 huevos	Ciprés	4,50
06-12-81	Taninga	Sin postura	Pino	5,50
06-12-91	Yeso Oeste	4 huevos	Pino Eliotti	6,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Sostenido o asentado en ramas. Pueden estar apenas atados. Altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Semiesfera o tacita de fibras vegetales, finos palitos o tallos de yuyos, en la base. Internamente raicillas, lanas y cerdas.A veces alguna plumita o nervaduras. Liados con telas de arañas.

Medidas :

Diámetro total : de 7 a 7,5 cm.

Diámetro interno : 4 cm.

Profundidad : de 2 a 3 cm.

Alto : de 4 a 7 cm.

HUEVOS

Pone 3 ó 4 huevos.

Ovoidales. De color blanco o celeste claro sin manchas o con finas pintas y líneas castañas.

Medidas y pesos :

De 16 a 17,3 x 11,9 a 12,9 X= 16,8 x 12,4 (N= 9)

Peso lleno : de 1,3 a 1,5 X= 1,4 (N= 4)

Peso de las cáscaras: 0,055 a 0,080X= 0,068 (N= 9)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
547	18-10-79	Cayastá	16,5 x 12,6		0,063
			17,0 x 12,5		0,063
548	23-10-79	Cayastá	16,0 x 12,3		0,055
			16,5 x 11,9		0,056
			16,5 x 12,0		0,056
818	06-12-91	Yeso Oeste	16,7 x 13,0	1,3	0,075
			16,9 x 12,4	1,4	0,075
			17,3 x 12,7	1,5	0,080
			17,3 x 12,9	1,5	0,080


NEGRILLO *Sporagra atrata*

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
09-02-01	Azul Pampa	3 huevos	Tirante de construcción	2,80



REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Asentado en tirante de construcción, arbustos. A mediana altura.

Características.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera de pajitas, tallos. Reborde superior de lana. Internamente lana y raicillas.

Medidas :

Diámetro total : 10 x 13 cm.

Diámetro interno : 5 cm.

Profundidad : 1,5 cm.

Alto : 6 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanco con finas pintas castañas en el polo mayor y escasas en el resto de la superficie.

Medidas y pesos :

De 17,3 a 18,3 x 12,8 a 14 X= 17,7 x 13,2 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,070 X= 0,070 (N= 3)

NIDADA

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
926	09-02-01	Azul Pampa	17,3 x 14,0	0,070
			17,6 x 13,0	0,070
			18,3 x 12,8	0,070

OBSERVACIONES

El nido tiene muchas materias fecales distribuidas en el reborde superior (blancas y negras).

TANGARÁ COMÚN *Euphonia chlorotica*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Total de nidos : 1

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
07-10-95	Romang	3 huevos	Pino Elliottii	8,00

REPRODUCCIÓN

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

Atado y adherido a ramas. Altos.

Características.

Oculto. Elaborado. Estructura semiesférica, con forma de taza profunda.

Emplea en la construcción fibras vegetales. Internamente cerdas.

Medidas :

Diámetro interno : 4 cm.

Profundidad : 7 cm.

Alto : 8 cm.

El grosor de la pared : de 1 a 3 cm.

HUEVOS

Pone 3 huevos.

Ovoidales. De color blanquecino con pintitas y manchitas castaño claro y castaño oscuro, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas y pesos :

De 15,5 a 16 x 12 a 12,2 X= 15,7 x 12,1 (N= 3)

Peso de las cáscaras : 0,060 X= 0,060 (N= 3)

NIDADA


Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso cáscaras
859	07-10-95	Romang	15,5 x 12,0	0,060
			15,7 x 12,0	0,060
			16,0 x 12,1	0,060

OBSERVACIONES

La pareja construye.Traen pajitas y se turnan para entrar al nido.
Demora en la construcción 8 días. Pone los huevos en días corridos.

FAMILIA: PASSERIDAE

GORRIÓN *Passer domesticus*



PERÍODO DE REPRODUCCIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Total de nidos observados : 28

Fecha	Lugar	Contenido	Ubicación	Altura
01-10-72	Esperanza	4 huevos	Casuarina	4,00
01-10-72	Esperanza	4 huevos	Casuarina	4,50
23-11-75	Esperanza	5 huevos	Casuarina	3,50
05-11-76	Río Leyes	4 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	3,80
04-01-78	Cayastacito	5 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	4,30
29-11-81	Esperanza	2 huevos	En nido de *Furnarius rufus*	1,70
20-01-82	Esperanza	2 huevos	Ramas de árbol	4,80
05-09-89	Esperanza	5 huevos	Tirante de galpón	4,00
05-09-89	Esperanza	5 huevos	Tirante de galpón	4,00
05-09-89	Esperanza	5 huevos	Tirante de galpón	4,00
05-09-89	Esperanza	5 huevos	Tirante de galpón	4,00
05-09-89	Esperanza	5 huevos	Tirante de galpón	4,00
02-02-90	Esperanza	4 pichones	Tirante de galería	3,70
26-10-03	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	4,00
26-10-03	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	5,00
16-10-03	Esperanza	2 huevos	Tirante de techo de habitación	4,00
16-10-03	Esperanza	En construcción	Tirante de techo de habitación	4,00
16-10-03	Esperanza	En construcción	Tirante de techo de habitación	4,00
16-10-03	Esperanza	4 huevos	Tirante de techo de habitación	4,00
16-10-03	Esperanza	2 pichones	Tirante de techo de habitación	4,00
16-10-03	Esperanza	3 pichones	Tirante de techo de habitación	4,00
16-11-03	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	4,00
16-11-03	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	4,50
16-11-03	Esperanza	No observado	En nido de *Furnarius rufus*	5,00
23-12-03	Esperanza	4 pichones	Tirante de techo de habitación	4,00
23-12-03	Esperanza	4 huevos	Tirante de techo de habitación	4,00
23-12-03	Esperanza	3 huevos	Tirante de techo de habitación	4,00
02-10-04	Esperanza	3 huevos	Tirante de techo de habitación	4,00

Número de nidos por mes

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	1							5	11	6	3

REPRODUCCIÓN

Demora en la construcción del nido	Ritmo de puesta	Período de incubación	Permanencia de los pichones en el nido
10-15 días	Pone en días corridos	15 días	14-15 días

NIDO Y HUEVOS

NIDO

Ubicación.

En nidos abandonados de aves, huecos, espacios entre tirantes, construcciones, parantes de tinglados, recipientes, en ramas de árboles.

Características.

Expuesto. Elaborado. Globular, de pajas. Internamente plumas.

HUEVOS

Pone de 4 a 5 huevos.

Ovoidales. Blanco grisáceo o gris celeste, con pintas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Una nidada es gris sin pintas.

Medidas y pesos :

De 20,7 a 23,5 x 15 a 16,7

X= 22,3 x 15,8 (N= 26)

Peso de las cáscaras : de 0,165 a 0,201

X= 0,192 (N= 26)

NIDADAS

Nº Nidada	Fecha	Localidad	Medidas	Peso lleno	Peso cáscaras
582	01-10-72	Esperanza	20,7 x 15,3		0,175
			21,3 x 15,4		0,194
			21,5 x 15,8		0,196
			23,2 x 15,5		0,201
583	01-10-72	Esperanza	21,0 x 15,8		0,165
			20,7 x 15,8		0,186
			20,7 x 16,3		0,190
			21,1 x 15,0		0,195
584	23-11-75	Esperanza	22,7 x 15,9		0,175
			22,7 x 16,0		0,184
			23,0 x 16,0		0,185
			23,5 x 16,5		0,185
			23,5 x 16,7		0,189
585	05-11-76	Río Leyes	21,0 x 15,8		0,183
			21,4 x 15,8		0,187
			21,8 x 15,6		0,190
			22,4 x 16,2		0,197
586	04-01-78	Cayastacito	22,8 x 15,8		0,181
			22,8 x 16,1		0,190
			22,9 x 16,0		0,191
			23,3 x 16,3		0,193
			23,4 x 16,3		0,198
587	29-11-81	Esperanza	23,4 x 16,0		0,204
			23,4 x 16,0		0,213
588	20-01-82	Esperanza	22,5 x 15,0		0,190
			22,4 x 16,3		0,204
	02-10-04	Esperanza	23,0 x 16,0	3,1	
			23,2 x 16,0	3,0	
			24,5 x 16,0	3,2	

PICHONES

Descripción de pichones. Nacen con los ojos cerrados. Implumes.

3 días. Ojos abiertos. Vivaracho. Implume, excepto alas y cola. Vestigios de vainas en las zonas ptéridas. Pico color natural. Comisura amarillo fuerte. Cavidad bucal rojiza, parte anterior del paladar amarillo.

5 días. Aparecen las láminas. Ventralmente las plumas son blanquecinas. En las alas se ven las dos bandas.

7 días. Bastante emplumado. Color de macho adulto.

10 días. Plumaje de adulto. Pico fuerte. Comisura amarilla. Interior del borde del pico amarillo.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
				Plumas primarias		Plumas secundarias			
	Pico	Tarso	Tibia	Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina	Cola	Peso
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
2	0,5	0,9	1,2	-	-	-	-	-	2,5
3	0,8	1,5-1,6	2,3-2,5	0,5-0,7	-	0,5-0,7	-	0,2-0,4	4,2
4	0,8	1,7-2,0	2,7	1,2	-	1,0	-	0,6	7,5
5	0,9	1,9-2,3	3	1,7	-	1,4	-	1,1	13,3-15,5
6	0,9	2,4	3,1	1,8	-	1,5	-	1,5	14,0-17,0
7	0,9	2,6	3,2	1,9	0,7-1,3	1,4-1,6	0,7-0,9	2,0	16,0-19,2
8	0,9	2,7	3,3	2,0	1,8	1,7	1,2	2,3	18,0-21,2
9	0,9	2,8	3,5	2,1	2,2	1,8	1,7	2,5	20,2-24,3
10	0,9	2,9	3,6	2,1	2,7	1,9	2,1	2,7	22,7-26,7

Apéndice I. Especies vegetales citadas

Abedul (*Betulasp.*)
Acacia blanca (*Robinia pseudoacacia*)
Acacia negra (*Gleditsiatriacanthos*)
Achira amarilla (*Canna glauca*)
Agapanto (*Agapanthusafricanus*)
Aguaí (*Pouteriagardneriana*)
Aguaribay (*Schinus molle*)
Alamo plateado (*Populus alba*)
Alfalfa (*Medicago sativa*)
Algarrobo blanco (*Prosopis alba*)
Aliso de río (*Tessariaintegrifolia*)
Araucaria (*Araucaria bigwillii*)
Aromo (*Acacia caven*)
Banano (*Musa paradisiaca*)
Barba de viejo (*Tillandsiausneoides*)
Brusquilla (*Discaria americana*)
Bignonia rosada (*Podranearicasoliana*)
Botón azul (*Lycianthesrantonnei*)
Cactus (*Opuntia sp.*)
Cactus trepador (*Rhipsalisaculeata*)
Calafate (*Berberisdarwinii*)
Camalote(*Eichhorniacrassipes*)
Cambará chico(*Bubblejatubiflora*)
Campanilla (*Ipomoeacairica*)
Canelón (*Myrsinelaetevirens*)
Caña bambú (*Pleioblastussimoni*)
Caña coligüe (*Chusqueaculeou*)
Caña de Castilla (*Arundodonax*)
Caña Tacuara (*Guadua sp.*)
Capín (*Echinochloacruspavonis*)
Caraguatá (*Eryngiumpandanifolium*)
Carda(*Eryngiumpaniculatum*)
Cardo (*Carduusthoermeri*)
Cardo negro (*Cirsiumvulgare*)
Cardón (*Stetsoniacoryne*)
Carqueja (*Baccharissp.*)
Cascada (*Begonia coccinea*)
Casuarina (*Casuarina cunninghamiana*)
Catay colorado (*Polygonumpunctatum*)
Cedro deodara (*Cedrus deodara*)
Chañar (*Geoffroeadecorticans*)
Chaucha (*Phaseolusvulgaris*)
Chilca negra (*Tessariadodoneifolia*)
Chivato (*Delonix regia*)
Cina cina(*Parkinsoniaaculeata*)
Ciprés (*Cupressus sempervirens*)
Ciruelo (*Prunus domestica*)
Coco (*Fagara coco*)
Coihue (*Nothofagusombeyi*)
Cola de zorro (*Cortadeiraselloana*)
Coronillo (*Scutiabuxifolia*)
Crateus(*Pyracanthacoccinea*)
Curupí (*Sapiumhaematospermun*)
Olivo (*Olea europea*)
Olmo (*Ulmus procera*)
Ombú (*Phytolacca dioica*)
Espina corona(*Gleditsiaamorphoides*)
Eucaliptus(*Eucaliptussp.*)
Eupatorio (*Eupatoriumivifolium*)
Ficus (*Ficus benjamina*)
Fresno (*Fraxinus americana*)
Fresno americano (*Fraxinuspennsylvanica*)
Fumo bravo (*Solanumgranulosom-leprosum*)
Garabato (*Acacia bonariensis*)
Garabato negro (*Acacia praecox*)
Gramillón (*Stenotaphrumsecundatum.*)
Gravilea (*Grevillea robusta*)
Guaco(*Mikaniasp.*)
Guayabo blanco (*Eugenia uruguayensis*)
Guayacán (*Caesalpiniaparaguariensis*)
Hiedra (*Hederasp*)
Hiedra (*Hederahelix*)
Ibirá-pitá(*Peltophorumdubium*)
Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*)
Jazmín de Cabo (*Gardenia augusta*)
Jazmín de Córdoba (*Solanumamygdalifolium*)
Jazmín del cielo (*Plumbago auriculata*)
Jume (*Sarcocorniaperennis*)
Junco (*Schoenoplectuscalifornicus*)
Junquillo (*Juncussp.*)
Juvenil (*Althea sp.*)
Laura (*Schinuspatagonicus*)
Laurel comestible(*Laurusnobilis*)
Laurel de jardín (*Nariumoleander*)
Laurel de la isla (*Nectandra angustifolia*)
Ligustrina (*Ligustrumsinense*)
Ligustro (*Ligustrumlucidum*)
Limpiatubo (*Calistemoncitrinun*)
Magnolia (*Magnolia sp.*)
Maicillo (*Sorghumhalepense*)
Maiz (*Zea mays*)
Mandarino (*Citrus reticulata*)
Maní guaycurú (*Geoffroeastriata*)
Machaí (*Berberislinearifolia*)
Mata negra (*Conyzabonariensis*)
Molle(*Schinuslongifolius*)
Moha (*Setariaitalica*)
Mora (*Morus alba*)
Naranjo (*Citrus sinensis*)
Naranjillo (*Solanumchroniotrichum*)
Nuez pecán(*Caryaillinoensis*)
Ñandubay (*Prosopis algarrobilla*)
Santa Rita (*Bougainvilleaspectabilis*)
Simbol (*Penniseptumfrutescens*)
Trébol blanco (*Melilotusalbus*)
Tumbergia azul (*Thunbergia grandiflora*)
Tuna (*Opuntia sp.*)
Tutía (*Solanumsisymbriifolium*)
Tuya (*Thujasp.*)
Ubajay (*Eugenia pyriformis*)
Urunday (*Astroniumbalansae*)
Vid (*Vitisvinifera*)

Ortiguilla (*Urerabaccifera*)
Paja boba(*Leptochloachloridiformis*)
Pajabrava(*Panicumprionitis*)
Palmera blanca(*Copernicia alba*)
Palmera caranday (*Trithinaxcampestris*)
Palmera china(*Trachycarpusfortunei*)
Palmera pindó (*Syagrusromanzoffiana*)
Palmera yatay (*Butia yatay*)
Palo borracho (*Ceiba insignis*)
Paraíso (*Meliaazedarach*)
Pasto serrucho (*Melicamacra*)
Peine de mono (*Pithecocteniumcynanchoides*)
Petiribí (*Cordiatrichotoma*)
Picanilla (*Guadua paraguayana*)
Pino (*Pinussp*.)
Pino del cerro (*Podocarpusparlatorei*)
PinoElliottii (*Pinuselliottii*)
Pirí (*Cyperusgiganteus*)
Poleo (*Aloysiagratissima*)
Primavera (*Primulasp.*)
Quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho blanco*)
Quebracho colorado (*Schinopsisbalansae*)
Repollito del agua (*Pistiastratiotes*)
Retama (*Diosteajuncea*)
Rama negra (*Sesbaniavirgata*)
Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*)
Saeta (*Sagittariamontevidensis*)
Sarandí colorado (*Cephalantusglabratus*)
Sauce (*Salixhumboldtiana*)
Sal del indio (*Maytenusvitis-idaea*)
Sauco (*Sambucusaustralis*)
Seibo(*Erythrinacristagalli*)
Soja (*Glycinemax*)
Sombra de Toro (*Jodinarhombifolia*)
Tacuara (*Guadua angustifolia*)
Tala del indio (*Holmbergiateweedii*)
Tala (*Celtis tala*)
Tala salada (*Grabowskiaduplicata*)
Timbó blanco (*Albiziainundata*)
Talia(*Thaliageniculata*)
Timbó colorado (*Enterolobiumcontortisiliquum*)
Tipa blanca (*Tipuanatipu*)
Tipa amarilla (*Cascaroniaastragalina*)
Duraznero (*Prunuspersica*)
Duraznillo blanco (*Solanumglaucophyllum*)
Enamorada del muro (*Ficus pumila*)
Espadaña (*Typhasp*.)
Espartillo (*Spartinaargentinensis*)
Eucaliptus de adorno (*Eucaliptus cinerea*)
Espartillo bravo (*Melicamacra*)
Viraró blanco (*Ruprechtialaxiflora*)
Viznaga (*Ammivisnaga*)
Zarzaparrilla colorada (*Muehlenbekiasagittifolia*)

Apéndice II.
Localidades citadas, departamentos, partidos y provincias

LUGAR	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	Lat. S	Long. W
Abra Pampa	Cachinoca	Jujuy	22º 44´	65º 41´
Aconquija	Andalgalá	Catamarca	27º 29´	66º 01´
Aguará Grande	San Cristóbal	Santa Fe	30º 12´	60º 52´
Alcaraz Sur	La Paz	Entre Ríos	31º 28´	59º 36´
Alejandra	San Javier	Santa Fe	29º 54´	59º 50´
Alvear	Diamante	Entre Ríos	31º 57´	60º 41´
Amenabar	Gral.López	Santa Fe	33º 53´	61º 42´
Andalgalá	Andalgalá	Catamarca	27º 34´	66º 18´
Anzoategui	Caleucaleu	La Pampa	38º 58´	63º 51´
Arias	Marcos Juárez	Córdoba	33º 39´	62º 24´
Arroyo Ceibal	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 43´	59º 28´
Arroyo Culúlú (Esperanza)	Las Colonias	Santa Fe	31º 21´	60º 56´
Arroyo Gutierrez	Bariloche	Río Negro	41º 10´	71º 24´
Arroyo La Fragua	Pilcaniyeu	Río Negro	41º 06´	70º 38´
Arroyo Ñatiú	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 26´	59º 07´
Arroyo Potrero	La Capital	Santa Fe	31º 29´	60º 24´
Arrufó	San Cristóbal	Santa Fe	30º 05´	61º 48´
Arteaga	Caseros	Santa Fe	33º 05´	61º 48´
Ascochinga	Colón	Córdoba	30º 57´	64º 16´
Ataliva	Castellanos	Santa Fe	30º 59´	61º 27´
Azul	Azul (Partido)	Buenos Aires	36º 46´	59º 51´
Azul Pampa	Humahuaca	Jujuy	23º 12´	65º 20´
Balnearia	San Justo	Córdoba	31º 00´	62º 40´
Barrancas	ChosMalal	Neuquén	38º 71´	71º 08´
Bernardo de Irigoyen	San Jerónimo	Santa Fe	32º 10´	61º 09´
Bonpland	Paso de los Libres	Corrientes	29º 49´	57º 25´
CaboVírgenes	GüerAike	Santa Cruz	52º 20´	68º 24´
Cachi	Cachi	Salta	25º 07´	66º 10´
Cachipampa	Cachi	Salta	25º 11´	65º 52´
Cacique Ariacaiquín	San Javier	Santa Fe	30º 39´	60º 13´
Cafayate	Cafayate	Salta	26º 04´	65º 58´
Calchaquí	Vera	Santa Fe	29º 53´	60º 16´
Camarones	F. Ameghino	Chubut	44º 48´	65º 42´
Campo Andino	La Capital	Santa Fe	31º 14´	60º 31´
Campo Crespo	La Capital	Santa Fe	31º 30´	60º 44´
Campo Garay	9 de Julio	Santa Fe	29º 40´	61º 37´
Cancha Carrera	GüerAike	Santa Cruz	51º 14´	72º 14´
Candioti	La Capital	Santa Fe	31º 24´	60º 45´
Candonga	Colón	Córdoba	31º 04´	64º 17´
Cañada Ombú (al este)	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 13´	59º 53´
Capilla del Monte	Punilla	Córdoba	30º 50´	64º 28´
Capioví	Lib. Gral. San Martín	Misiones	26º 55´	55º 03´
Carmen de Patagones	Patagones (Partido)	Buenos Aires	40º 48´	62º 59´
Cataratas del Iguazú	Iguazú	Misiones	25º 41´	54º 26´
Catriló	Catriló	La Pampa	36º 25´	63º 23´
Cayastá	Garay	Santa Fe	31º 12´	60º 10´
Cayastacito	San Justo	Santa Fe	31º 06´	60º 34´
Chorrillos	Humahuaca	Jujuy	24º 13´	66º 27´
Chumbicha	Capayán	Catamarca	28º 52´	66º 14´
Claromecó	Tres Arroyos (Partido)	Buenos Aires	38º 51´	60º 05´
Colastiné	La Capital	Santa Fe	31º 40´	60º 37´
Colmena (al oeste)	Vera	Santa Fe	28º 45´	60º 13´
Colmena	Gral. Obligado	Santa Fe	29º 45´	60º 52´

Colón	Colón	Entre Ríos	32º 13´	58º 07´
Colonia Bossi	San Cristóbal	Santa Fe	30º 40´	61º 47´
Colonia Macías	Garay	Santa Fe	30º 48´	60º 00´
Colonia Pujol	Las Colonias	Santa Fe	30º 26´	57º 52´
Colonia Silva	San Justo	Santa Fe	30º 26´	60º 25´
Colonia Teresa	San Javier	Santa Fe	30º 15´	59º 58´
Comandante Piedrabuena	CorpenAike	Santa Cruz	49º 58´	68º 54´
Comodoro Rivadavia	Escalante	Chubut	45º 47´	67º 28´
Concordia	Concordia	Entre Ríos	31º 23´	58º 01´
Confluencia	Los Lagos	Neuquén	38º 57´	68º 03´
Constanza	San Cristóbal	Santa Fe	30º 39´	61º 19´
Copina	Punilla	Córdoba	31º 34´	64º 42´
Coronda	San Jerónimo	Santa Fe	31º 58´	60º 55´
Corrientes	Capital	Corrientes	27º 27´	58º 49´
Cuesta de Singuil	Ambato	Catamarca	27º 48´	65º 51´
Cuesta del Clavillo	Andalgalá	Catamarca	27º 29´	66º 06´
Cuesta del Obispo	Chicoana	Salta	25º 16´	65º 850´
Cululú	Las Colonias	Santa Fe	31º 12´	60º 56´
Curupaití	San Cristóbal	Santa Fe	30º 23´	61º 39´
Desvío Arijón	San Jerónimo	Santa Fe	31º 52´	60º 53´
Diamante	Diamante	Entre Ríos	32º 03´	60º 38´
Dique San Roque	Punilla	Córdoba	31º 22´	64º 28´
Don Cristóbal	Nogoyá	Entre Ríos	32º 04´	59º 59´
El Calafate	Lago Argentino	Santa Cruz	50º 20´	72º 18´
El Cerro	Paraná	Entre Ríos	31º 43´	60º 29´
El Laurel	Garay	Santa Fe	30º 57´	60º 04´
El Palmar	San Fernando	Chaco	27º 32´	58º 01´
El Ramblón	Paraná	Entre Ríos	31º 40´	60º 25´
El Rey	Anta	Salta	24º 38´	64º 50´
Elisa	Las Colonias	Santa Fe	30º 41´	61º 30´
Embalse	Calamuchita	Córdoba	32º 10´	64º 28´
Emilia	La Capital	Santa Fe	31º 04´	60º 44´
Empalme San Carlos	Las Colonias	Santa Fe	31º 32´	60º 48´
Empedrado	Empedrado	Corrientes	27º 57´	58º 48´
Encón (Valle de Lerma)	Rosario de Lerma	Salta	24º 51´	65º 32´
Esperanza	Las Colonias	Santa Fe	31º 27´	60º 55´
Esquel	Futaleufú	Chubut	42º 54´	71º 19´
Estación Caroya	Colón	Córdoba	31º 01´	64º 06´
Estancia La Salamandra	Vera	Santa Fe	28º 44´	60º 44´
Estero del 13	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 26´	59º 26´
Eva Perón	Bermejo	Chaco	26º 39´	58º 37´
Florencia	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 02´	59º 15´
Florentino Ameghino	Florentino Ameghino	Chubut	43º 41´	65º 28´
Fortín Chilcas	Vera	Santa Fe	29º 07´	60º 40´
Fortín Olmos	Vera	Santa Fe	28º 47´	60º41´
Franck	Las Colonias	Santa Fe	31º 35´	60º 56´
Galvez	San Jerónimo	Santa Fe	32º 01´	61º 13´
Garré	Guaminí (Partido)	Buenos Aires	36º 33´	62º 35´
Gato Colorado	9 de Julio	Santa Fe	28º 09´	61º 13´
General Pico	Mara Co	La Pampa	35º 41´	63º 47´
General Villegas	Villegas (Partido)	Buenos Aires	35º 01´	63º 05´
Gobernador Echagüe	Tala	Entre Ríos	32º 23´	59º 16´
Gobernador Gregores	Río Chico	Santa Cruz	48º 45´	70º 15´
Gobernador Mancilla	Tala	Entre Ríos	32º 33´	59º 22´
Gobernador Virasoro	Santo Tomé	Corrientes	28º 02´	56º 01´
Golondrina	Vera	Santa Fe	28º 33´	60º 03´
Grutly	Las Colonias	Santa Fe	31º 16´	61º 04´
Gualeguay	Gualeguay	Entre Ríos	33º 08´	59º 19´
Gualeguaychú	Gualeguaychú	Entre Ríos	33º 02´	58º 30´

Guayquiraró	Esquina	Corrientes	30º 18´	59º 32´
Helvecia	Garay	Santa Fe	31º 06´	60º 05´
Hernandarias	Paraná	Entre Ríos	31º 10´	59º 58´
Huaco	Jachal	San Juan	30º 09´	68º 28´
Huanqueros	San Cristóbal	Santa Fe	30º 03´	61º 12´
Humahuaca	Humahuaca	Jujuy	23º 12´	65º 21´
Humberto Primo	Castellanos	Santa Fe	30º 52´	61º 22´
Humboldt	Las Colonias	Santa Fe	31º 24´	61º 05´
Isla Anhinga	Victoria	Entre Ríos	33º 00´	60º 34´
Isla Berduc	La Capital	Santa Fe	31º 37´	60º 28´
Isla Chapetón	Paraná	Entre Ríos	31º 34´	60º 17´
Isla CuruzúChalí	La Paz	Entre Ríos	30º 30´	59º 37´
Isla de los Pájaros	Biedma	Chubut	42º 25´	64º 30´
Isla El Rico	San Jerónimo	Santa Fe	32º 25´	60º 40´
Isla Garcerosa	La Capital	Santa Fe	31º 31´	60º 22´
Isla Los Marinos	Victoria	Entre Ríos	32º 54´	60º 38´
Isla Verde	Marcos Juárez	Córdoba	33º 14´	62º 24´
Isla Yaguareté	Goya	Corrientes	27º 28´	58º 50´
Itá-Ibaté	San Miguel	Corrientes	27º 25´	57º 20´
Ituzaingó	Ituzaingó	Corrientes	27º 35´	56º 41´
Jacinto Arauz	Las Colonias	Santa Fe	30º 44´	60º 57´
Jesús María	Colón	Córdoba	30º 59´	64º 05´
Junín de los Andes	Huiliches	Neuquén	39º 56´	71º 04´
La Brava	San Javier	Santa Fe	30º 26´	60º 08´
La Calera	Colón	Córdoba	31º 20´	64º 20´
La Camila	San Justo	Santa Fe	30º 04´	60º 29´
La Clara	San Cristóbal	Santa Fe	30º 18´	61º 14´
La Criolla	San Justo	Santa Fe	30º 14´	60º 22´
La Esperanza	GüerAike	Santa Cruz	51º 13´	70º 49´
La Falda	Punilla	Córdoba	31º 05´	64º 28´
La Gallareta	Vera	Santa Fe	29º 34´	60º 23´
La Granja	Colón	Córdoba	31º 10´	64º 20´
La Hierra	Feliciano	Entre Ríos	30º 27´	58º 24´
La Loca	Vera	Santa Fe	28º 45´	60º 15´
La Pelada	Las Colonias	Santa Fe	30º 51´	60º 58´
La Puerta	Ambato	Catamarca	26º 10´	65º 48´
La Viña	La Viña	Salta	25º 27´	65º 48´
Lago Argentino	Lago Argentino	Santa Cruz	50º 20´	72º 45´
Lago Guillelmo	Bariloche	Río Negro	50º 06´	72º 65´
Lago Futalaufquen	Futaluafquen	Chubut	39º 46´	71º 22´
Lago Huechulafquen	Huiliches	Neuquén	39º 49´	71º 33´
Lago Mascardi	Bariloche	Río Negro	41º 21´	71º 32´
Laguna del Palmar	Vera	Santa Fe	29º 37´	60º 42´
Laguna del Pescado	Victoria	Entre Ríos	32º 41´	60º 00´
Laguna del Platero	San Justo	Santa Fe	30º 15´	60º 12´
Laguna Paiva	La Capital	Santa Fe	31º 19´	60º 39´
Laguna Setubal	La Capital	Santa Fe	31º 33´	60º 40´
Lanteri	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 50´	59º 39´
Lapataia	Ushuaia	Tierra del Fuego	54º 51´	68º 34´
Las Claritas	Gral.Obligado	Santa Fe	28º 36´	59º 39´
Las Cuevas	Diamante	Entre Ríos	32º 21´	60º 28´
Las Estancias	Andalgalá	Catamarca	27º 22´	65º 58´
Las Tunas	Las Colonias	Santa Fe	31º 34´	60º 59´
Las Tunas	Paraná	Entre Ríos	31º 52´	59º 43´
Llambi Campbell	La Capital	Santa Fe	31º 11´	60º 45´
Llancanelo	Malargüe	Mendoza	35º 45´	69º 08
Logroño	9 de Julio	Santa Fe	29º 30´	61º 42´
López	San Jerónimo	Santa Fe	31º 54´	61º 17´
Loreto	San Miguel	Corrientes	27º 46´	57º 16´

Los Amores	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 06´	59º 58´
Los Cardos	San Martín	Santa Fe	32º 19´	61º 37´
Los Cerrillos	Garay	Santa Fe	31º 21´	60º 22´
Los Gigantes	Punilla	Córdoba	31º 16´	64º 48´
Los Sunchos	La Paz	Catamarca	29º 24´	65º 14´
Lucas González	Nogoyá	Entre Ríos	32º 24´	59º 33´
Lucas Sur	Villaguay	Entre Ríos	31º 51´	59º 01´
Malabrigo	Gral. Obligado	Santa Fe	29º 20´	59º 58´
Malbrán	Aguirre	Santiago del Estero	29º 21´	62º 27´
Manucho	La Capital	Santa Fe	31º 16´	60º 48´
Maquinchao	25 de mayo	Río Negro	41º 15´	68º 44´
Marayes	Caucete	San Juan	31º 2t´	67º 21´
Marcelino Escalada	San Justo	Santa Fe	30º 35´	60º 29´
María Luisa	Las Colonias	Santa Fe	31º 04´	60º 54´
Matilde	Las Colonias	Santa Fe	31º 48´	60º 59´
Mburucuyá	Mburucuyá	Corrientes	28º 02´	58º 13´
Melincué	Gral. López	Santa Fe	33º 41´	61º 27´
Mercedes	Mercedes	Corrientes	29º 11´	58º 04´
Merlo	Junín	San Luis	32º 20´	65º 00´
Miguel Escalada	San Justo	Santa Fe	31º 01´	60º 31´
Milagro	Gral. Ocampo	La Rioja	31º 01´	65º 59´
Monigotes	San Cristóbal	Santa Fe	30º 30´	61º 39´
Monte Vera	La Capital	Santa Fe	31º 31´	60º 40´
Morteros	San Justo	Córdoba	30º 42´	62º 00´
Naré	San Justo	Santa Fe	30º 56´	60º 28´
Nelson	La Capital	Santa Fe	31º 16´	60º 45´
Nogoyá	Nogoyá	Entre Ríos	32º 24´	59º 48´
Nono	San Alberto	Córdoba	31º 46´	65º 00´
Ñacuñan	Santa Rosa	Mendoza	34º 02´	67º 55´
Ombúes	La Paz	Entre Ríos	33º 02´	59º 01´
Ongamira	Ischillín	Córdoba	30º 50´	64º 28´
Padre P. Iturralde	9 de Julio	Santa Fe	28º 37´	61º 37´
Pampa de Achala	San Alberto	Córdoba	31º 40´	64º 50´
Paraje Chuhume. Los Cóndores	Calamuchita	Córdoba	32º 11´	64º 12´
Paraje Collón Curá	Collón Curá	Neuquén	40º 07´	70º 44´
Paraje 29	Vera	Santa Fe	29º 03´	60º 23´
Paraná	Paraná	Entre Ríos	31º 43´	60º 31´
Paso Chacabuco	Pilcaniyeu	Río Negro	40º 39´	70º 58´
Paso de los Libres	Paso de los Libres	Corrientes	29º 42´	57º 05´
Paso Gregores	Deseado	Santa Cruz	47º 48´	66º 34´
Península Valdés	Biedma	Chubut	42º 31´	63º 55´
Perito Moreno	Pilcaniyeu	Río Negro	41º 07´	71º 25´
Pichanal	Orán	Salta	23º 20´	64º 13´
PicúnLeufú	PicúnLeufú	Neuquén	38º 57´	68º 04´
Pilar	Las Colonias	Santa Fe	31º 27´	61º 15´
Pirané	Pirané	Formosa	25º 43´	59º 06´
Portugalete	San Cristóbal	Santa Fe	30º 19´	61º 14´
Progreso	Las Colonias	Santa Fe	31º 08´	60º 59´
Pronunciamiento	Uruguay	Entre Ríos	32º 21´	58º 26´
Providencia	Las Colonias	Santa Fe	30º 58´	61º 01´
Puelches	Curá Co	La Pampa	38º 09´	65º 55´
Puente del Inca	Las Heras	Mendoza	32º 49´	69º 54´
Puerto Algarrobo	La Paz	Entre Ríos	30º 378´	59º 34´
Puerto Esquina	Victoria	Entre Ríos	32º 05´	60º 00´
Puerto Campichuelo	Uruguay	Entre Ríos	32º 42´	58º 10´
Puerto Deseado	Deseado	Santa Cruz	47º 45´	65º 55´
Puerto Iguazú	Iguazú	Misiones	25º 36´	54º 34´
Puerto Madryn	Biedma	Chubut	42º 46´	65º 02´
Puerto Piracuacito	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 12´	59º 06´

Puerto Rico	Lib. Gral. San Martín	Misiones	26º 48´	55º 01´
Puerto Zapallar	Lib. Gral. San Martín	Chaco	26º 19´	59º 22´
Pujato	Las Colonias	Santa Fe	33º 11´	61º 23´
Punta Clara	F. Ameghino	Santa Cruz	43º 58´	65º 58´
Punta Delgada	Biedma	Chubut	42º 46´	63º 38´
Punta Logaritmo	Biedma	Chubut	42º 25´	64º 30´
Punta Loma	Biedma	Chubut	42º 53´	64º 42´
Punta Norte	Biedma	Chubut	42º 05´	63º 46´
Punta Tombo	F. Ameghino	Chubut	44º 02´	65º 12´
Quebrada de Escoipe	Chicoana	Salta	25º 88´	65º 39´
QuemúQuemú	QuemúQuemú	La Pampa	36º 03´	63º 33´
Quitilipi	Quitilipi	Chaco	26º 52´	60º 12´
Reconquista	Gral.Obligado	Santa Fe	29º 09´	59º 39´
Recreo	La Capital	Santa Fe	31º 30´	60º 44´
Resistencia	San Fernando	Chaco	27º 27´	58º 59´
Rincón de Ávila	La Capital	Santa Fe	31º 19´	60º 54´
Rincón Potrero	La capital	Santa Fe	31º 30´	60º 27´
Río Bermejo (Puerto Zapallar)	Lib. Gral. San Martín	Chaco	26º 19´	59º 22´
Río Gallegos	GüerAike	Santa Cruz	51º 37´	69º 12´
Río Grande	Río Grande	Tierra del Fuego	53º 48´	67º 43´
Río Las Cañas	Andalgalá	Catamarca	27º 23´	65º 57´
Río Leyes	Garay	Santa Fe	31º 28´	60º 20´
Río Marucho	Catán Lil	Neuquén	39º 27´	70º 09´
Río Ñirihuau	Pilcaniyeu	Río Negro	41º 06´	71º 08´
Río Paraná (Boca del Yacaré)	Garay	Santa Fe	31º 26´	60º 11´
Río Paraná	Paraná	Entre Ríos	31º 43´	60º 31´
Río Paraná	La Paz	Entre Ríos	30º 33´	59º 35´
Río Paraná (Goya)	Goya	Corrientes	29º 07´	59º 19´
Río Potrero y ruta 48	Andalgalá	Catamarca	27º 23´	65º 58´
Río Salado y ruta 4	La Capital	Santa Fe	31º 14´	60º 53´
Río San Vicente (Va. Ocampo)	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 40´	59º 10´
Río Turbio	GüerAike	Santa Cruz	51º 32´	72º 18´
Rivadavia	Rivadavia	Salta	24º 11´	62º 53´
Roldán	San Lorenzo	Santa Fe	32º 54´	60º 54´
Romang	San Javier	Santa Fe	29º 29´	59º 45´
Rosario de la Frontera	Rosario de la Frontera	Salta	25º 48´	64º 58´
Ruta 13 y 36	Vera	Santa Fe	28º 55´	60º 40´
Ruta l3 y 98	Vera	Santa Fe	29º 20´	61º 01´
Ruta 13 y río Salado	Vera	Santa Fe	29º 37´	61º 05´
Ruta 70 y río Salado	La Capital	Santa Fe	31º 29´	60º 46´
Ruta 4 y río Salado	La Capital	Santa Fe	31º 15´	60º 53´
Saladero Cabal	Garay	Santa Fe	30º 54´	60º 01´
Saladillo Dulce	Garay	Santa Fe	31º 00´	60º 10´
Salado	Tinogasta	Catamarca	28º 18´	67º 15´
Salta	La Capital	Salta	24º 47´	65º 24´
San Agustín	Las Colonias	Santa Fe	31º 41´	60º 56´
San Antonio Oeste	San Antonio	Río Negro	40º 44´	64º 57´
San Carlos de Bariloche	Bariloche	Río Negro	41º 08´	71º 18´
San Carlos Sur	Las Colonias	Santa Fe	31º 45´	61º 05´
San Cristóbal	San Cristóbal	Santa Fe	30º 19´	61º 14´
San Javier	San Javier	Santa Fe	30º 34´	59º 57´
San Jerónimo del Sauce	Las Colonias	Santa Fe	31º 37´	61º 08´
San Jerónimo Norte	Las Colonias	Santa Fe	31º 33´	61º 05´
San José	Las Colonias	Santa Fe	31º 35´	60º 53´
San José del Rincón	La Capital	Santa Fe	31º 36´	60º 34´
San Juan	Capital	San Juan	31º 31´	68º 32´
San Ramón de la Nueva Orán	Orán	Salta	23º 08´	64º 20´
San Salvador de Jujuy	Capital	Jujuy	24º 11´	65º 17´
San Vicente	San Vicente (Partido)	Buenos Aires	35º 01´	58º 25´

Santa Clara de Buena Vista	Las Colonias	Santa Fe	31º 46´	61º 19´
Santa Fe	La Capital	Santa Fe	31º 38´	60º 41´
Santa Rosa de Calamuchita	Calamuchita	Córdoba	32º 04´	64º 32´
Santa Rosa	Capital	La Pampa	36º 37´	64º 17´
Santa Rosa	Garay	Santa Fe	31º 24´	60º 19´
Santo Pipó	San Ignacio	Misiones	27º 08´	55º 24´
Santo Tomé	La Capital	Santa Fe	31º 40´	60º 46´
Sarmiento	Las Colonias	Santa Fe	31º 04´	61º 10´
Sauce de Luna	Villaguay	Entre Ríos	31º 14´	59º 13´
Sauce Sud	Tala	Entre Ríos	32º 30´	59º 10´
Soledad	San Justo	Santa Fe	30º 37´	60º 55´
Tafí del Valle	Tafí	Tucumán	26º 51´	65º 42´
Talacasto	Ullún	San Juan	31º 06´	68º 38´
Taninga	Pocho	Córdoba	31º 21´	65º 05´
Tartagal	Gral. J. de San Martín	Salta	22º 52´	63º 52´
Tartagal	Gral. Obligado	Santa Fe	29º 19´	60º 07´
Teodelina	Gral. López	Santa Fe	34º 11´	61º 32´
Tigre	Tigre (Partido)	Buenos Aires	34º 25´	58º 35´
Tinogasta	Tinogasta	Catamarca	28º 04´	67º 33´
Toba	Vera	Santa Fe	29º 14´	60º 10´
Tres Cruces	Humahuaca	Jujuy	22º 55´	65º 35´
Unquillo	Colón	Córdoba	31º 14´	64º 19´
Valle Encantado	Chicoana	Salta	25º 11´	65º 50´
Vaquerías	Punilla	Córdoba	31º 07´	64º 33´
Vera y Pintado	San Justo	Santa Fe	30º 09´	60º 21´
Vera	Vera	Santa Fe	29º 28´	60º 12´
Viale	Paraná	Entre Ríos	31º 52´	60º 00´
Videla	San Justo	Santa Fe	30º 56´	60º 39´
Viedma	A. Alsina	Río Negro	40º 48´	62º 59´
Villa Carlos Paz	Punilla	Córdoba	31º 25´	64º 29´
Villa de María	Río Seco	Córdoba	32º 24´	63º 15´
Villa Elisa	Colón	Entre Ríos	32º 09´	58º 23´
Villa Georgina	Las Colonias	Santa Fe	31º 25´	60º 47´
Villa Gral. Belgrano	Calamuchita	Córdoba	31º 59´	64º 34´
Villa Guillermina	Gral. Obligado	Santa Fe	28º 14´	59º 27´
Villa La Angostura	Los Lagos	Neuquén	40º 45´	71º 39´
Villa Ocampo	Gral.Obligado	Santa Fe	28º 29´	59º 21´
Villa Roda	La Capital	Santa Fe	31º 22´	60º 53´
Villa San José	Colón	Entre Ríos	32º 12´	58º 13´
Villa Santa Isabel	Calamuchita	Córdoba	31º 29´	64º 14´
Villavicencio	Las Heras	Mendoza	32º 31´	69º 01´
Wildermuth	San Martín	Santa Fe	31º 57´	61º 23´
Yatasto	Metán	Salta	25º 35´	64º 57´
Yaví	Yaví	Jujuy	22º 08´	65º 27´
Yeso Oeste	La Paz	Entre Ríos	30º 56´	59º 28´

Índice de nombres vulgares y científicos

Aeronautes andecolus 199
AGACHONA CHICA 127
Agelaioides badius 549
Agelasticus cyanopus 542
Agelasticus thilius 543
Agriornis montanus 366
AGUATERO 131
ÁGUILA CORONADA 95
ÁGUILA MORA 99
ÁGUILA NEGRA 94
AGUILUCHO COLORADO 94
AGUILUCHO COMÚN 98
AGUILUCHO PAMPA 90
ALILICUCU COMÚN 187
Alopochelidon fucata 418
Amazilia chionogaster 211
Amazonetta brasiliensis 33
Amblyramphus holosericeus 541
Ammodramus humeralis 518
Anairetes flavirostris 331
Anairetes parulus 332
ANAMBÉ CASTAÑO 410
ANAMBÉ COMÚN 411
ANAMBÉ VERDOSO 409
Anas bahamensis 39
Anas cyanoptera 41
Anas flavirostris 37
Anas geórgica 38
Anas platalea 42
Anas sibilatrix 36
Anas versicolor 40
Anhinga anhinga 65
ANINGA 65
ANÓ CHICO 178
ANÓ GRANDE 177
Anthus correndera 462
Anthus furcatus 461
Anthus hellmayri 463
Anthus lutescens 461
Anumbius annumbi 286
Aphrastura spinicauda 269
Aramides cajanea 102
Aramides ypecaha 102
Aramus guarauna 100
ARAÑERO CORONADO CHICO 533
ARAÑERO DE CARA NEGRA 531
ARAÑERO RIBEREÑO 534
ARAÑERO SILBÓN 533
Aratinga acuticaudata 236
Aratinga mitrata 237
Ardea alba 77
Ardea cocoi 75
Arremon flavirostris 520
Arundinicola leucocephala 378
Asio flammeus 191
Asthenes baeri 293
Asthenes dorbignyi 296
Asthenes modesta 295
Asthenes pyrrholeuca 292
Asthenes sclateri 297
ATAJACAMINOS CHICO 195
ATAJACAMINOS ÑAÑARCA 194
ATAJACAMINOS TIJERA COMÚN 196
Athene cunicularia 189
ATÍ 137
Atlapetes citrinellus 521
BANDURRIA MORA 85
BANDURRITA ANDINA 264
BANDURRITA CHAQUEÑA 255
BANDURRITA COMÚN 264
BANDURRITA DE COLA CASTAÑA 254
BANDURRITA DE PICO RECTO 254
BARULLERO 340
Basileuterus culicivorus 533
Basileuterus leucoblepharus 533
Basileuterus rivularis 534
Batara cinerea 242
BATARÁ GIGANTE 242
BECASINA COMÚN 126
BENTEVEO COMÚN 382
BENTEVEO RAYADO 389
BIGUÁ 59
BIRRO COMÚN 354
BIRRO GRANDE 370
BOYERITO 539
BOYERO CACIQUE 536
BOYERO DE ALAS AMARILLAS 537
BOYERO NEGRO 535
BRASITA DE FUEGO 510
Bubo virginianus 188
Bubulcus ibis 72
BURLISTO CASTAÑO 399
BURLISTO DE COLA CASTAÑA 401
BURLISTO DE PICO CANELA 399
BURLISTO DE PICO NEGRO 401
BURRITO COMÚN 103
Busarellus nigricollis 90
Buteogallus coronatus 95
Buteogallus meridionalis 94
Buteogallus urubitinga 94
Butorides striata 70
CABECITANEGRA COMÚN 569
CABECITANEGRA PICUDO 569
CABURÉ CHICO 189
CACHILO CANELA 480
CACHILO DE CEJAS AMARILLAS 518
CACHILO DE CORONA CASTAÑA 519
CACHIRLA CHICA 461
CACHIRLA COMÚN 462
CACHIRLA DE UÑA CORTA 461
CACHIRLA PÁLIDA 463
CACHOLOTE CASTAÑO 301
CACHOLOTE PARDO 303
CACHUDITO DE PICO AMARILLO 331
CACHUDITO DE PICO NEGRO 332
Cacicus chrysopterus 537
Cacicus haemorrhous 536
Cacicus solitarius 535
Cairina moschata 31
CALANCATE COMÚN 236
CALANCATE DE CARA ROJA 237
CALANDRIA CASTAÑA 460
CALANDRIA GRANDE 455
CALANDRIA MORA 454
CALANDRIA REAL 459
CALANDRITA 342
Callipepla californica 50
Callonetta leucophrys 32
CAMINERA COLORADA 250
CAMINERA COMÚN 249
CAMINERA PUNEÑA 249
Campephilus leucopogon 226
Camptostoma obsoletum 326
CANASTERO CHAQUEÑO 293
CANASTERO COLUDO 292
CANASTERO ESTRIADO 300
CANASTERO PÁLIDO 295
CANASTERO ROJIZO 296
CAPUCHINO CANELA 506
CAPUCHINO DE GARGANTA CAFÉ 507
Caracara plancus 229
CARACOLERO 91
CARANCHO 229
CARAU 100
CARDENAL AMARILLO 512
CARDENAL COMÚN 464
CARDENILLA 469
CARPINTERITO COMÚN 218
CARPINTERO ANDINO 224
CARPINTERO BATARAZ CHICO 221
CARPINTERO BLANCO 219
CARPINTERO CAMPESTRE 225
CARPINTERO DE LOMO BLANCO 226
CARPINTERO DEL CARDÓN 220
CARPINTERO OLIVA CHICO 221
CARPINTERO REAL 223
Casiornis rufus 399
Catamenia analis 508
Catamenia inornata 509
Cathartes aura 87
CATITA ENANA 241
CATITA SERRANA CHICA 241
CAUQUÉN COMÚN 30
CAUQUÉN REAL 31
CELESTINO COMÚN 473
CERQUERO AMARILLO 521
CERQUERO DE COLLAR 520
Certhiaxis cinnamomea 308
CHACURÚ DE CARA NEGRA 217
CHAJÁ 24
Charadrius collaris 119
CHARATA 48
Chauna torquata 24
CHIFLÓN 79
CHIMANGO 232
CHINCHERO CHICO 252
CHINCHERO GRANDE 250
CHINGOLO 515
CHIRICOTE 102
CHIVÍ COMÚN 414
Chloephaga picta 30
Chloephaga poliocephala 31
Chloroceryle amazona 214
Chloroceryle americana 215
Chlorostilbon lucidus 206
CHOCA COMÚN 245
CHOIQUE 14
CHOPÍ 540
Chordeiles nacunda 194

CHORLITO DE COLLAR 119
CHORORÓ 242
CHOTOY 304
Chroicocephalus cirrocephalus 134
Chroicocephalus maculipennis 133
Chrysomus ruficapillus 544
Chunga burmeisteri 227
CHUÑA DE PATAS NEGRAS 227
CHURRINCHE 356
Ciconia maguari 57
CIGÜEÑA AMERICANA 57
Cinclodes albiventris 266
Cinclodes atacamensis 268
Cinclodes comechingonus 265
Cinclodes olrogi 267
Cinclodes patagonicus 269
Cinclus schulzi 443
Circus cinereus 93
CISNE DE CUELLO NEGRO 27
Cistothorus platensis 435
Coccyzus cinereus 173
Coccyzus melacoryphus 175
CODORNIZ DE CALIFORNIA 50
Colaptes campestris 225
Colaptes melanochloros 223
Colaptes rupícola 224
Colibri coruscans 200
COLIBRÍ GRANDE 200
COLORADA 16
Colorhamphus parvirostris 379
COLUDITO CANELA 270
COLUDITO COPETÓN 270
COLUDITO DE COLA NEGRA 273
Columba livia 151
Columbina picuí 144
Columbina talpacoti 144
COMESEBO ANDINO 475
COMESEBO DE CABEZA NEGRA 474
COMESEBO PATAGÓNICO 476
Coragyps atratus 87
CORBATITA COMÚN 503
CORBATITA DOMINÓ 502
CORBATITA OVERO 503
CORMORÁN DE CUELLO NEGRO 61
CORMORÁN GRIS 60
CORMORÁN IMPERIAL 63
CORTARRAMAS 403
Coryphistera alaudina 289
Coryphospingus cucullatus 510
COSCOROBA 28
Coscoroba coscoroba 28
COTORRA 238
Cranioleuca pyrrhophia 298
Cranioleuca sulphurifera 297
Crax fasciolata 49
CRESPÍN 182
CRESTUDO 289
Crotophaga ani 178
Crotophaga major 177
Crypturellus tataupa 16
CUCLILLO CANELA 175
CUCLILLO CHICO 173
CUERVILLO DE CAÑADA 82
CUERVILLO DE CARA PELADA 83
CUERVILLO PUNEÑO 83
CURIANGO 195
CURUTIÉ BLANCO 298
CURUTIÉ COLORADO 308
CURUTIÉ OCRÁCEO 297
Cyanocompsa brissonii 523
Cyanocorax chrysops 416
Cyanoliseus patagonus 237
Cyclarhis gujanensis 414
Cygnus melancoryphus 27
Cypseloides rothschildi 198
Cypseloides senex 198
Dendrocygna autumnalis 27
Dendrocygna bicolor 26
Dendrocygna viduata 26
DIUCA COMÚN 479
Diuca diuca 479
DIUCÓN 366
Donacospiza albifrons 480
DORADITO COMÚN 339
DORADITO COPETÓN 338
DORMILONA GRIS 365
Drymornis bridgesii 250
DURMILÍ 217
Egretta thula 80
Elaenia albiceps 320
Elaenia obscura 326
Elaenia parvirostris 321
Elaenia spectabilis 317
Elaenia strepera 325
Elanus leucurus 89
Embernagra platensis 500
Empidonomus aurantioatrocristatus 391
Empidonomus varius 390
ESCÚA PARDA 132
ESPARTILLERO SERRANO 297
ESPÁTULA ROSADA 85
ESPIGUERO PARDO 512
ESPINERO ANDINO 279
ESPINERO CHICO 274
ESPINERO DE FRENTE ROJIZA 274
ESPINERO DE PECHO MANCHADO 280
ESPINERO GRANDE 283
Eudromia elegans 22
Euphonia chlorotica 571
Euscarthmus meloryphus 340
Falco femoralis 234
Falco peregrinus 235
Falco sparverius 233
FEDERAL 541
FIOFÍO CENICIENTO 317
FIOFÍO DE PICO CORTO 321
FIOFÍO GRANDE 317
FIOFÍO OSCURO 326
FIOFÍO PLOMIZO 325
FIOFÍO SILBÓN 320
Fluvicola albiventer 371
Forpus xanthopterygius 241
FUEGUERO COMÚN 522
Fulica ardesiaca 112
Fulica armillata 109
Fulica leucoptera 113
Fulica rufifrons 111
Furnarius cristatus 262
Furnarius rufus 256
GALLARETA ANDINA 112
GALLARETA CHICA 113
GALLARETA DE ESCUDETE ROJO 111
GALLARETA DE LIGAS ROJAS 109
Gallinago paraguaiae 126
GALLINETA COMÚN 105
GALLINETA OVERA 104
Gallinula galeata 105
Gallinula melanops 107
GALLITO COPETÓN 248
GALLITO DE COLLAR 247
GARCITA AZULADA 70
GARCITA BLANCA 80
GARCITA BUEYERA 72
GARZA BLANCA 77
GARZA BRUJA 69
GARZA MORA 75
GAUCHO SERRANO 366
GAVILÁN CENICIENTO 93
GAVILÁN MIXTO 97
GAVIOTA COCINERA 135
GAVIOTA DE CAPUCHO CAFÉ 133
GAVIOTA DE CAPUCHO GRIS 134
GAVIOTÍN CHICO COMÚN 136
GAVIOTÍN DE PICO AMARILLO 140
GAVIOTÍN LAGUNERO 139
GAVIOTÍN REAL 140
GAVIOTÍN SUDAMERICANO 138
Geositta cunicularia 249
Geositta punensis 249
Geositta rufipennis 250
Geothlypis aequinoctialis 531
Geranoaetus melanoleucus 99
Geranoaetus polyosoma 98
Glaucidium brasilianum 189
Gnorimopsar chopi 540
GOLONDRINA BARRANQUERA 417
GOLONDRINA DE ALAS BLANCAS 424
GOLONDRINA DE CABEZA ROJIZA 418
GOLONDRINA DE CEJAS BLANCAS 425
GOLONDRINA DOMÉSTICA 421
GOLONDRINA NEGRA 423
GOLONDRINA PARDA 419
GOLONDRINA PATAGÓNICA 428
GOLONDRINA RIBEREÑA 419
GORRIÓN 573
GUAICURÚ 228
GUANAY 62
Gubernatrix cristata 512
Guira guira 179
Haematopus ater 121
Haematopus leucopodus 122
Haematopus palliatus 121
HALCÓN PEREGRINO 235
HALCÓN PLOMIZO 234
HALCONCITO COLORADO 233
HALCONCITO GRIS 228
Heliomaster furcifer 203
Hemitriccus margaritaceiventer 347
Herpetotheres cachinnans 228
Heteronetta atricapilla 44
Himantopus mexicanus 124
Hirundinea ferruginea 354
HOCÓ COLORADO 67
HORNERITO COPETÓN 262
HORNERO 256
Hydropsalis torquata 196
Hylocharis chrysura 211

Hymenops perspicillata 360
Icterus pyrrhopterus 539
Ictinia plumbea 92
INAMBÚ COMÚN 20
INAMBÚ MONTARAZ 18
INAMBÚ PÁLIDO 19
INAMBÚ SILBÓN 18
IPACAÁ 102
Ixobrychus involucris 67
Jabiru mycteria 58
JACANA 128
Jacana jacana 128
JILGUERO AUSTRAL 490
JILGUERO DE CARA GRIS 489
JILGUERO DEL MONTE 490
JILGUERO DORADO 491
JILGUERO PUNEÑO 488
JOTE DE CABEZA COLORADA 87
JOTE DE CABEZA NEGRA 87
JUAN CHIVIRO 414
JUNQUERO 263
Knipolegu saterrimus 360
Knipolegus signatus 359
Larus dominicanus 135
Laterallus melanophaius 103
Lathrotriccus euleri 354
LAVANDERA 378
LECHUCITA VIZCACHERA 189
LECHUZA DE CAMPANARIO 185
LECHUZÓN DEL CAMPO 191
LECHUZÓN OREJUDO 191
Legatus leucophaius 382
LEÑATERO 286
Lepidocolaptes angustirostris 252
Leptasthenu raplatensis 270
Leptasthenura aegithaloides 273
Leptasthenura fuliginiceps 270
Leptotila rufaxilla 172
Leptotila verreauxi 170
Lessonia rufa 358
LOICA COMÚN 567
Lophonetta specularioides 36
LORO BARRANQUERO 237
MACÁ COMÚN 51
MACÁ DE PICO GRUESO 52
MACÁ GRANDE 53
MACÁ PLATEADO 54
Machetornis rixosus 380
MARTÍN PESCADOR CHICO 215
MARTÍN PESCADOR GRANDE 214
MARTÍN PESCADOR MEDIANO 214
MARTINETA COMÚN 22
Megaceryle torquatus 214
Megarhynchus pitangua 390
Megascops choliba 187
Melanerpes cactorum 220
Melanerpes candidus 219
Melanopareia maximiliani 247
Microstilbon burmeisteri 205
MILANO BLANCO 89
MILANO PLOMIZO 92
Milvago chimango 232
Mimus dorsalis 460
Mimus patagonicus 454
Mimus saturninus 455
Mimus triurus 459
MIRASOL COMÚN 67
MIRLO DE AGUA 443
MISTO 498
Molothrus bonariensis 555
Molothrus oryzivorus 555
Molothrus rufoaxillaris 553
MONJITA BLANCA 368
MONJITA CHOCOLATE 370
MONJITA GRIS 367
MONTERITA DE CABEZA NEGRA 486
MONTERITA DE CEJAS ROJIZAS 482
MONTERITA DE COLLAR 485
MONTERITA DE PECHO GRIS 481
MOSQUETA COMÚN 342
MOSQUETA DE CABEZA CANELA 349
MOSQUETA DE OJOS DORADOS 347
MOSQUETA ESTRIADA 350
MOSQUETA PARDA 354
MUITÚ 49
Muscisaxicola rufivertex 365
Myiarchus ferox 401
Myiarchus swainsoni 399
Myiarchus tyrannulus 401
Myiodynastes maculates 389
Myiopagis caniceps 317
Myiophobus fasciatus 350
Myiopsitta monachus 238
Myiotheretes striaticollis 370
NARANJERO 474
NEGRILLO 570
Neoxolmis rufiventris 370
Netta peposaca 42
Nomonyx dominicus 45
Nothoprocta cinerascens 18
Nothoprocta pentlandii 18
Nothura darwinii 19
Nothura maculosa 20
Nyctibius griseus 193
Nycticorax nycticorax 69
Nycticryphes semicollaris 131
Nyctidromus albicollis 195
Nystalus chacuru 217
Nystalus maculatus 217
ÑACUNDA 194
ÑACURUTÚ 188
ÑANDÚ 13
Ochetorhynchus andaecola 254
Ochetorhynchus ruficaudus 254
Oreotrochilus estella 202
Ortalis canicollis 48
OSTRERO AUSTRAL 122
OSTRERO COMÚN 121
OSTRERO NEGRO 121
Oxyura jamaicensis 46
Oxyura vittata 46
Pachyramphus castaneus 410
Pachyramphus polychopterus 411
Pachyramphus viridis 409
PALOMA DOMÉSTICA 151
PALOMA MANCHADA 155
PALOMA PICAZURÓ 153
Parabuteo unicinctus 97
Pardirallus maculatus 104
Pardirallus sanguinolentus 105
Paroaria capitata 469
Paroaria coronata 464
Parula pitiayumi 531
Passer domesticus 573
Patagioenas maculosa 155
Patagioenas picazuro 153
Patagonas gigas 202
PATO BARCINO 37
PATO CAPUCHINO 40
PATO COLORADO 41
PATO CRESTÓN 36
PATO CUCHARA 42
PATO CUTIRÍ 33
PATO DE CABEZA NEGRA 44
PATO DE COLLAR 32
PATO FIERRO 45
PATO GARGANTILLA 39
PATO MAICERO 38
PATO OVERO 36
PATO PICAZO 42
PATO REAL 31
PATO ZAMBULLIDOR CHICO 46
PATO ZAMBULLIDOR GRANDE 46
PAVA DE MONTE COMÚN 48
PECHO AMARILLO COMÚN 547
PECHO COLORADO 566
Penelope obscura 48
PEPITERO CHICO 529
PEPITERO DE COLLAR 526
PEPITERO GRIS 524
PEUTRÉN 379
Phacellodomus ruber 283
Phacellodomus rufifrons 274
Phacellodomus sibilatrix 274
Phacellodomus striaticeps 279
Phacellodomus striaticollis 280
Phaetusa simplex 137
Phalacrocorax atriceps 63
Phalacrocorax bougainvillii 62
Phalacrocorax brasilianus 59
Phalacrocorax gaimardi 60
Phalacrocorax magellanicus 61
Phimosus infuscatus 83
Phleocryptes melanops 263
Phrygilus atriceps 474
Phrygilus carbonarius 479
Phrygilus fruticeti 477
Phrygilus gayi 475
Phrygilus patagonicus 476
Phrygilus plebejus 478
Phylloscartes ventralis 342
Phytotoma rara 405
Phytotoma rutila 403
PICABUEY 380
PICAFLOR BRONCEADO 211
PICAFLOR COMETA 201
PICAFLOR COMÚN 206
PICAFLOR DE BARBIJO 203
PICAFLOR DE CORONA VIOLÁCEA 210
PICAFLOR ENANO 205
PICAFLOR GIGANTE 202
PICAFLOR PUNEÑO 202
PICAFLOR RUBÍ 200
PICAFLOR VIENTRE BLANCO 211
PICO DE PLATA 360
PICOCHATO GRANDE 350
PICOLEZNA PATAGÓNICO 254
Picumnus cirratus 218

PIJUÍ DE COLA PARDA 314
PIJUÍ DE FRENTE GRIS 311
PIJUÍ PLOMIZO 315
PINGÜINO PATAGÓNICO 56
PIOJITO COMÚN 335
PIOJITO DE CABEZA GRIS 337
PIOJITO GRIS 333
PIOJITO SILBÓN 326
Pipraeidea melanonota 472
PIQUITODEORO COMÚN 508
PIQUITODEORO GRANDE 509
Piranga flava 522
PIRINCHO 179
PITANGUÁ 390
Pitangus sulphuratus 382
PITIAYUMÍ 531
Platalea ajaja 85
Plegadis chihi 82
Plegadis ridgwayi 83
Podiceps major 53
Podiceps occipitalis 54
Podilymbus podiceps 52
Poecilotriccus plumbeiceps 349
Polioptila dumicola 436
POLLONA AZUL 108
POLLONA NEGRA 105
POLLONA PINTADA 107
Poospiza erythrophrys 482
Poospiza hypochondria 481
Poospiza melanoleuca 486
Poospiza nigrorufa 482
Poospiza torquata 485
Poospiza whitii 484
Porphyrio martinica 108
Progne chalybea 421
Progne elegans 423
Progne tapera 419
Pseudasthenes humicola 300
Pseudocolopteryx flaviventris 339
Pseudocolopteryx sclateri 338
Pseudoleistes virescens 547
Pseudoscops clamator 191
Pseudoseisura gutturalis 303
Pseudoseisura lophotes 301
Psilopsiagon aurifrons 241
Pygarrhinchas albogularis 254
Pygochelidon cyanoleuca 417
Pyrocephalus rubinus 356
QUETRO AUSTRAL 35
QUETRO VOLADOR 34
QUIULA PATAGÓNICO 23
RARA 405
RATONA APERDIZADA 435
RATONA COMÚN 430
RAYADITO 269
RAYADOR 142
REINAMORA GRANDE 523
REMOLINERA ANDINA 266
REMOLINERA ARAUCANA 269
REMOLINERA CASTAÑA 268
REMOLINERA CHOCOLATE 267
REMOLINERA SERRANA 265
Rhea americana 13
Rhea pennata 14
Rhinocrypta lanceolata 248
Rhynchospiza strigiceps 519
Rhynchotus rufescens 16
Rollandia rolland 51
Rostrhamus sociabilis 91
Rupornis magnirostris 96
Rynchops niger 142
SAÍRA DE ANTIFAZ 472
Saltator coerulescens 524
Saltatoraur antiirostris 526
Saltatricula multicolor 529
Sapphos parganura 201
Satrapa icterophrys 361
Sayornis nigricans 355
Schoeniophylax phryganophila 304
Sephanoides sephaniodes 200
Serpophaga griseicapilla 337
Serpophaga nigricans 333
Serpophaga subcristata 335
Setopagis parvulus 195
Sicalis flaveola 491
Sicalis lebruni 490
Sicalis lutea 488
Sicalis luteola 498
Sicalis mendozae 490
Sicalis uropygialis 489
SIETEVESTIDOS 482
SIETEVESTIDOS SERRANO 484
SIRIRÍ COLORADO 26
SIRIRÍ DE VIENTRE NEGRO 27
SIRIRÍ PAMPA 26
SOBREPUESTO COMÚN 358
Spheniscus magellanicus 56
Spiziapteryx circumcincta 228
Sporagra atrata 570
Sporagra crassirostris 569
Sporagra magellanica 569
Sporophila caerulescens 503
Sporophila collaris 502
Sporophila hypoxantha 506
Sporophila lineola 503
Sporophila ruficollis 507
Stelgidopteryx ruficollis 419
Stercorarius antarcticus 132
Sterna hirundinacea 138
Sterna trudeaui 139
Sternula superciliaris 136
Stigmatura budytoides 342
Streptoprocne zonaris 198
Sturnella loyca 567
Sturnella superciliaris 566
Sublegatus modestus 343
SUIRIRÍ AMARILLO 361
SUIRIRÍ COMÚN 329
SUIRIRÍ DE PICO CORTO 343
SUIRIRÍ REAL 394
Suiriri suiriri 329
SURUCUÁ AMARILLO 213
SURUCUÁ COMÚN 213
Synallaxis albescens 314
Synallaxis frontalis 311
Synallaxis spixi 315
Syndactyla rufosuperciliata 269
Syrigma sibilatrix 79
Systellura longirostris 194
TACHURÍ SIETECOLORES 346
Tachuris rubrigastra 346
Tachycineta albiventer 424
Tachycineta leucorrhoa 425
Tachycineta meyeni 428
Tachyeres patachonicus 34
Tachyeres pteneres 35
TACUARITA AZUL 436
TAGUATÓ COMÚN 96
TANGARÁ ALISERO 471
TANGARÁ COMÚN 571
Tapera naevia 182
Taraba major 242
Tarphonomus certhioides 255
TATAUPÁ COMÚN 16
TERO COMÚN 115
TERO REAL 124
TERO SERRANO 119
Thalasseus maximus 140
Thalasseus sandvicensis 140
Thalurania glaucopis 210
Thamnophilus caerulescens 245
Theristicus caerulescens 85
Thinocorus rumicivorus 127
Thlypopsis ruficeps 471
Thraupis bonariensis 474
Thraupis sayaca 473
Tiaris obscurus 512
TICOTICO COMÚN 269
Tigrisoma lineatum 67
TIJERETA 396
TIJERILLA 406
Tinamotis ingoufi 23
Tityra cayana 406
Tityra inquisitor 406
Tolmomyias sulphurescens 350
TORCACITA COLORADA 144
TORCACITA COMÚN 144
TORCAZA 157
TORDO DE PICO CORTO 553
TORDO GIGANTE 555
TORDO MÚSICO 549
TORDO RENEGRIDO 555
TREPADOR GIGANTE 252
Troglodytes musculus 430
Trogon rufus 213
Trogon surrucura 213
TUERÉ CHICO 406
TUERÉ GRANDE 406
TUQUITO CHICO 382
TUQUITO GRIS 391
TUQUITO RAYADO 390
Turdus albicollis 452
Turdus chiguanco 451
Turdus falcklandii 444
Turdus leucomelas 445
Turdus nigriceps 451
Turdus rufiventris 445
Turdusam aurochalinus 448
Tyrannus melancholicus 394
Tyrannus savana 396
Tyto alba 185
Upucerthia dumetaria 264
Upucerthia validirostris 264
URRACA COMÚN 416
URUTAÚ COMÚN 193
Vanellus chilensis 115
Vanellus resplendens 119
VARILLERO CONGO 544

VARILLERO DE ALAS AMARILLAS 543
VARILLERO NEGRO 542
VENCEJO BLANCO 199
VENCEJO DE CASCADA 198
VENCEJO DE COLLAR 198
VENCEJO NEGRUZCO 198
Veniliornis mixtus 221
Veniliornis passerinus 221
VERDÓN 500
Vireo olivaceus 414
VIUDITA BLANCA 371
VIUDITA COMÚN 360
VIUDITA DE RÍO 355
VIUDITA PLOMIZA 359
VOLATINERO 501
Volatinia jacarina 501
Xenopsaris albinucha 406
Xiphocolaptes major 252
Xolmis cinereus 367
Xolmis irupero 368
Xolmis pyrope 366
YABIRÚ 58
YAL CARBONERO 479
YAL CHICO 478
YAL NEGRO 477
YERUTÍ COLORADA 172
YERUTÍ COMÚN 170
Zenaida auriculata 157
Zonotrichia capensis 515
ZORZAL CHALCHALERO 448
ZORZAL CHIGUANCO 451
ZORZAL COLORADO 445
ZORZAL DE COLLAR BLANCO 452
ZORZAL PATAGÓNICO 444
ZORZAL PLOMIZO 451
ZORZAL SABIÁ 445

Libros publicados

1. de la Peña, M. R. 1976-77. Aves de la Provincia de Santa Fe. Ed. del autor. pp. 1-218.
2. de la Peña, M. R. 1978-79. Enciclopedia de las aves Argentinas. Ed. del autor. pp. 1-321.
3. de la Peña, M. R. 1980. Manual de enfermedades de las aves. Ed. del autor. pp. 1-74.
4. de la Peña, M. R. y P. O. Roteta. 1980. Andanzas de un naturalista. Ed. del autor.pp. 1-157.
5. de la Peña, M. R. 1981. Las Aves. Ed. U.N.L. pp. 1-100.
6. de la Peña, M. R. 1982. Las aves argentinas y sus ambientes. Ed. U.N.L. pp. 1-51.
7. de la Peña, M. R. 1983. Relatos de un viajero. Ed. del autor. pp. 1-116.
8. de la Peña, M. R. , E. Calleja , E. Fioramonti , L. Zabala , C. Virasoro y A. Panattieri. 1983. Guía de flora y fauna del río Paraná Medio. Ed. del autor. pp. 1-300.
9. Narosky, S., R. Fraga y M. R. De la Peña. 1983. Nidificación de las aves argentinas. (Dendrocolaptidae y Furnariidae) . Ed. AOP. pp. 1-98.
10. de la Peña, M. R. 1983. Reproducción de las aves argentinas. Ed. U.N.L. pp. 1-51.
11. de la Peña, M. R. 1983. Manual para el reconocimiento de las aves en la naturaleza. Ed. del autor. pp. 1-58.
12. Pachoud, J. y M. R. De la Peña. 1983. Histología de las aves. Ed. U.N.L. pp. 1-68.
13. de la Peña, M. R. 1986. Guía de aves argentinas. Ed. del autor. pp. 1-587.
14. de la Peña, M. R. 1986. Diccionario de nombres vulgares de la fauna argentina. Ed. del autor. pp. 1-206
15. de la Peña, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Ed. del autor. pp. 1-262.
16. de la Peña, M. R. 1987. Características ecológicas y algunos ambientes que frecuentan las aves argentinas. Ed. del autor. pp. 1-181.
17. de la Peña, M. R. , E. Calleja , E. Fioramonti , L. Zabala , C. Virasoro y A. Panattieri. 1991. Nueva guía de flora y fauna del río Paraná Medio. Ed. del autor. pp. 1-290.
18. de la Peña, M. R. 1992. Nueva guía de aves argentinas. (incluye nidos y huevos).Ed. L.O.L.A. pp. 1-671
19. de la Peña, M. R. 1993. De animales y de hombres. Ed. del autor. pp. 1-127.
20. de la Peña, M. R. 1993. Fauna del departamento Las Colonias.(Santa Fe). Ed. Municipalidad de Esperanza. pp. 1-93.
21. de la Peña, M. R. 1995. Ciclos reproductivos de las aves argentinas. Tomo I. Ed. UNL. pp.1-194.
22. de la Peña, M. R. 1995. Lista y distribución de las aves del departamento Las Colonias (Santa Fe) Ed. del autor. pp. 1-90.
23. de la Peña, M. R. 1996. Ciclos reproductivos de las aves argentinas. Tomo II.Ed. L.O.L.A. pp. 1-162
24. de la Peña, M. R. 1997. En extinción. (Animales extinguidos y amenazados en la provincia de Santa Fe). Ed. Fundación Habitat. Santa Fe. pp. 1-91.
25. de la Peña, M. R. 1997. Nidos y huevos de aves argentinas. Guía de campo. Ed. del autor. pp. 1-369
26. de la Peña, M. R. 1997. Catálogo de nombres vulgares de la flora argentina. Ed.UNL. pp.1-192
27. de la Peña, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Ed. L.O.L.A. pp. 1-126
28. de la Peña, M. R. y M. Rumboll. 1998. Birds of southern south America and Antarctica. Ed. H. Collins. Londres. pp. 1-304.

29. de la Peña, M. R. 1998. Guía de peces, anfibios, reptiles y mamíferos del litoral argentino. Ed. del autor. pp. 1-398.
30. de la Peña, M. R. 1999. Aves argentinas. Lista y distribución. Ed. L.O.L.A. pp.1-244.
31. de la Peña, M. R. y José Pensiero. 2004. Plantas argentinas. Catálogo de nombres comunes. Ed. L.O.L.A pp. 1-373.
32. de la Peña, M.R. 2005. Las aves de la Reserva de Esperanza (Santa Fe). UNL. Pp. 1-74.
33. de la Peña, M.R. 2005. Reproducción de las aves argentinas. Ed. L.O.L.A. pp.1-845.
34. de la Peña, M.R. 2006. Guía de fotos de nidos huevos y pichones de aves argentinas. Ed. L.O.L.A. pp.1-221.
35. de la Peña, M.R. 2006. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Ed. L.O.L.A. pp.1-137.
36. Raffo, F. C., Silva, R. L., de la Peña, M. R., Capuccio Martínez, G. y Bonín, L. M. 2008. Aves del Río Uruguay. CA-RU.
37. de la Peña, M. R. 2010. Los alimentos de las aves. UNL. (Digital)
38. de la Peña, M. R. 2010. Nidos de aves Argentinas. UNL. (Digital)
39. de la Peña, M. R. y Sergio A. Salvador. 2010. Manual de la alimentación de las aves argentinas. UNL. (Digital)
40. de la Peña, M. R. 2010. Lista y distribución de aves Argentinas. UNL. (Digital)
41. de la Peña, M. R. 2010. Nidos de aves del Paraguay. Guyrá Paraguay. Asunción. Paraguay.
42. de la Peña, M. R. 2011. Guía de aves de la provincia de Santa Fe. Santa Fe.
43. de la Peña, M. R. y José Pensiero. 2011. Catálogo de nombres comunes de la flora argentina. UNL. pp. 1-463.
44. de la Peña, M. R. 2011. Enciclopedia de aves de Santa Fe. UNL. (Digital)
45. de la Peña, M. R. 2011. Enciclopedia de aves Argentinas. UNL. (Digital)
46. de la Peña, M. R. 2011. Diccionario de nombres vulgares de las aves de Argentina. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 1. Santa Fe, Argentina, 100 pp.
47. de la Peña, M. R. 2011. Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 4. Santa Fe, Argentina, 500 pp.
48. de la Peña M. R. y R. F. Tittarelli (2011) Guía de aves de La Pampa. Gobierno de La Pampa. Santa Rosa.
49. de la Peña M. R. (2012) Distribución y citas de aves de Entre Ríos. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 6. Santa Fe, Argentina, 206 pp.

Premios y distinciones

1. Diploma de honor **"Sociedad protectora de animales"**. Por la contribución a la causa aviar. Buenos Aires. Abril de 1978.

2. Premio **Brigadier Estanislao López.** Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santa Fe. Por la labor conservacionista. Santa Fe. Diciembre de 1979.

3. Premio el Mérito **"Día Nacional del Agricultor".** Municipalidad de Esperanza. Diciembre de 1980.

4. Premio **"Difusión"**, otorgado por la Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 1981.

5. Premio **"Ferroviario de bronce"**, otorgado por la Comisión Fiesta Nacional del Ferroviario. Laguna Paiva. Santa Fe. 1982.

6. Premio **"Florián Paucke"** a Conductas destacadas, otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Santa Fe. 1982.

7. Premio **"A. Schweitzer"**, 1984. Otorgado por el Instituto de Defensa Ecológica "A.Schweitzer". Rosario. Marzo de 1984.

8. Mención en el Certamen Literario Nacional **"N.O. de Bobbio".** Canal 13. Santa Fe. Noviembre de 1984.

9. Socio honorario, otorgado por la comisión de la Asociación de ex alumnos del Colegio Nacional, 23 de noviembre de 1991. (Santa Fe)

10. Título **"Honoris causa"** de Ornitólogo de campo, otorgado por la Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires. Octubre de 1992.

11. **Académico Honorario Correspondiente**. Otorgado por la Universidad de Pilar (Paraguay). 10 de abril de 1993.

12. Designación de **"Socio Honorario"** del Círculo de Médicos Veterinarios del departamento Las Colonias. Esperanza, setiembre de 1993.

13. La Comisión comunal de San Jerónimo Norte (provincia de Santa Fe) declara de **"Interés comunal"** la trayectoria de Martín R. De la Peña. Julio de 1994.

14. El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Tostado (Santa Fe), declara de **Interés municipal"** el video de Flora y fauna del chaco santafesino, realizado por Martín R. de la Peña. Abril de 1995.

15. La municipalidad de Santa Fe, declara de **"Interés municipal"** la obra de Martín R. de la Peña. Santa Fe, mayo de 1996.

16. Designación de **"Socio vitalicio"** y entrega de medalla por los 30 años de actividad en la defensa de las aves. Reconocimiento de la Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, Julio de 1996.

17. Plaqueta **"en reconocimiento a su labor de investigación y protección de las aves".** Municipalidad de Esperanza, 20 de setiembre de 1996.

18. **Rosa plateada.** Otorgada por Ediciones Plateadas. Rosario, marzo de 1997.

19. **Académico correspondiente.** Designado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Buenos Aires, abril de 1997.

20. **Primer premio a la Excelencia Humana** (IADE). Santa Fe, noviembre de 1997.

21. El Gobierno Municipal de la ciudad de San Cristóbal (Santa Fe) declara de **"Interés municipal y educativo"** la obra de Martín R. De la Peña. Setiembre de 1998.

22. El Gobierno Municipal de la ciudad de San Cristóbal (Santa Fe) declara **"Huesped distinguido a Martín R. de la Peña"**. Setiembre de 1998.

23. Padrino del Tercer Festival Folclórico "Provincianía". San Justo (Santa Fe). Febrero de 1999.

24. Distinción como Médico Veterinario por su tarea en **"áreas que tienen que ver con las ciencias y la cultura"**. Otorgada por el colegio de Médicos Veterinarios de la Primera Circunscripción. Santa Fe, Agosto de 2000.

25. Distinción **"Francisco de Asís"** otorgada por la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Paraná, octubre de 2001.

26. Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Litoral. Diciembre de 2005.

27. Socio adherente. Guyra Paraguay. Asunción (Paraguay). Julio de 2006.

28. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, declara de su interés los libros Reproducción de las aves argentinas; Lista y distribución de las aves de Santa Fe y de Entre Ríos; Guía de fotos de nidos, huevos y pichones de aves argentinas. Noviembre 2006.