

AVES ARGENTINAS

Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución

(ACTUALIZACIÓN)

Martín R. de la Peña



TOMO 6

**Columbidae, Cuculidae, Tytonidae, Strigidae, Nyctibiidae,
Caprimulgidae, Apodidae, Trochilidae**

Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento,
Reproducción y Distribución
(ACTUALIZACIÓN)

TOMO 6

Columbidae, Cuculidae, Tytonidae, Strigidae, Nyctibiidae,
Caprimulgidae, Apodidae, Trochilidae

2020

Martín R. de la Peña

Colaborador: Alejandro Bodrati

ORDEN: COLUMBIFORMES

PALOMAS

FAMILIA: COLUMBIDAE

Aves de cabeza pequeña, pico débil y cuello corto.

De hábitos terrícolas y arborícolas. Andan solitarias, en pareja o formando bandadas.

Son buenas voladoras.

Construyen el nido en los árboles, arbustos, rocas, construcciones y en el suelo.

La postura es de 1 ó 2 huevos.

Construyen el nido en los árboles, arbustos, rocas, construcciones, huecos, planteras y en el suelo.

Nidifican en forma solitaria. Una especie (*Zenaida auriculata*) puede formar colonias.

Emplean en la construcción palitos, pajitas, hojas, líquenes, plumas.

La postura es de 1 ó 2 huevos. Raro posturas de 3 huevos.

Se alimentan de granos, semillas, frutas y algunas especies, además de insectos.

Frecuentan praderas, estepas, montes, bosques, selvas, áreas rurales y urbanas, serranías, montañas.

Subfamilia: Columbinae

PALOMA DOMÉSTICA *Columba livia* J. F. Gmelin, 1789

Otros nombres: Paloma bravía. Paloma casera. Paloma común. Paloma de las rocas. Paloma de plaza. Paloma mensajera.

DESCRIPCIÓN

Largo: 31-34 cm.

Peso: Salvador en De la Peña (2016c): N= 13 (?) X= 337 g

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris anaranjado oscuro o naranja pálido.

Coloración general gris azulada con reflejos verdes violáceos en el cuello y en el pecho.

Dos bandas negras en las alas.

Existe una gran variación en los colores; algunas tienen dominancia del blanco, otras del negro o diversas combinaciones.

COMPORTAMIENTO

Anda en grupos o en bandadas.

Alimentación

Klimaitis (1993). Semillas. Piedritas.

Christie et al. (2004). Frutos. Semillas. Desperdicios. Pan.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Semilla (partida) de *Glycine max*, *Sorghum bicolor*, *Zea mays*. Pan.

Quiroga (2017b): Fruto de *Myrsine laetevirens*

De la Peña (2019b). Jesús María. Dpto. Colón. Córdoba. 22-02-2016. Come frutos de Tala (*Celtis ehrenbergiana*) en el suelo.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El macho durante el cortejo hace un gutural Cuturrucú...cuturrucú... Otra voz emitida en el nido es un grave Buuú..buú..

HÁBITAT

Praderas, áreas rurales, plazas, parques, edificios, acantilados.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz.



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En construcciones, casilleros, huecos en paredes o en árboles, recipientes colocados de expofeso, sobre techos o en plataformas diversas. A veces nidos superpuestos.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos, pajas.

Nellar Ramonella (1993). Las especies asilvestradas, nidifican en barrancas.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Albrieu et al (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica sobre cualquier superficie lisa, con forma de balcón, que le brinde soporte y refugio para la construcción del nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en construcciones en huecos o repisas.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, se observaron 6 nidos, entre 04-10-1979 y 01-08-2003, desde 2,20 m a 5,0 m del suelo. Los nidos miden: diámetro total: de 9 a 20 cm, profundidad: de 1 a 2 cm y alto: de 2 a 7 cm. Santa Fe, dpto. La Capital, 09-09-2006. Nido en hueco a 3,20 m del suelo en una Tipa (*Tipuana tipu*)
Gelain (2014b). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Se reproduce durante todo el año.
Torres, S. J. (2015). Costa Bonita, pdo. Necochea, Buenos Aires, nido con 2 huevos.
Salvador et al. (2017). Nidos en Córdoba.
Fernández-Maldonado et al. (2017). Ciudad de San Juan, nidos.
Quiroga (2017b). Tucumán, nido.
Bodratí (*in litt.* 2019). Parque Provincial Guasamayo, Malanzán, La Rioja. Numerosos nidos en paredones de piedra con huevos o pichones de diferentes edades el 14 de febrero de 2009.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

De la Peña (2013c): 37,5 a 43,2 x 27,8 a 31,2 X= 39,5 x 30,3 (N= 6)

Pesos

De la Peña (2013c): cáscaras 1,000 a 1,305 X= 1,163 (N= 6)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Ojos cerrados. Pico gris con banda negra cerca de la punta. Ápice claro. Plumón crema amarillento.

5 días. Abre los ojos. Pico oscuro con punta blanca.

7 días. En las vainas de las plumas primarias y secundarias, de 1 cm., aparecen las láminas. Apenas se ven las vainas de las plumas de la cola.

10 días. Vainas dorsales grises de 0,7 cm. Abriendo las láminas de todas las plumas.

14 días. Emplumado.

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						1,4	1,9	1
2						1,5	2,3	1,2

3						2,1	2,9	1,4
5						2,2	3,3	1,5
7	1,0		1,0			2,8	4,3	1,9
10	1,3		1,4		0,5	3,1	4,6	1,9
12	2,3	0,5	1,6	1,0	1,4	3,4	5,0	2,0
14	2,7	2,4	2,4	1,1	2,5	3,4	5,6	2,2
16	2,9	3,7	2,4	3,1	4,9	3,6	5,8	2,5
18	2,6	4,9	2,7	3,5	5,1	3,7	6,1	2,5
20	2,5	6,2	2,3	4,5	5,4	3,8	6,2	2,5

No se describen los colores de las plumas por la variación existente.

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días, pero es variable. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 16-18 días. Los pichones permanecen en el nido 30-32 días.



Esperanza. Santa Fe. 02-11-2008



Esperanza. Santa Fe. 26-11-2006



Santa Fe. 09-09-2006. Nido en hueco en árbol



Jesús María. Córdoba. 12-06-2009. Bañándose

Depredadores

De adultos: *Parabuteo unicinctus* en Mendoza, Gelain y Pereyra Lobos (2011a), *Tyto alba* en Misiones, Massoia (1988b), en Córdoba, Nores y Gutiérrez (1990), en Buenos Aires, Morici (1990b y 2009e), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Santa Fe, De la Peña en De la Peña y Salvador (2010), en Córdoba, Salvador et al. (2017), *Falco femoralis* en Buenos Aires, Bó (1999), en La Pampa, Liébana (2015), *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Vasina (1975), en San Luis, Nellar (1991), en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004), en La Pampa, Galmes et al. (2008b), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), en Santa Cruz, Santillán et al. (2010b), en Tierra del Fuego, McNutt (1981), *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires,

Olivero, G. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019., *Falco peregrinus* en Jujuy, Fernández Campos, L. (2018). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019. *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires, Cusano, E. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019. *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires, Bonifacio, V. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019., *Caracara plancus* en San Cristóbal, Santa Fe, Capovilla, P. (2016). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019. *Falco peregrinus* en Tucumán, Quiroga (2017b).
De pichones: *Caracara plancus* y *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), *Parabuteo unicinctus* y *Milvago chimango* en Buenos Aires, Olivero, G. (2018). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019. *Milvago chimango* en Alta Gracia, Córdoba, Espíndola, A. (2015). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 21/05/2019.
De huevos: *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Gris azulada. Bandas negras en las alas.
Variados colores. Bandadas. Común en poblaciones.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columba livia livia J. F. Gmelin, 1789 en todo el país.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Trece subespecies. Nativa de Europa, África y Asia. Introducida en todo el mundo (en América a fines del siglo XVII) donde hoy existe doméstica y silvestre.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columba livia livia J. F. Gmelin, 1789

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bó (1999); Bodrati et al. (2006b); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Leveau y Leveau (2004a, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo y Claver (1986); Morici (1990b, 2009e); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Vargas et al. (2007); Vasina (1975)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. de Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca

Citas : Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 09-03-1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut

Citas: Pagnoni (2012a, 2012b); Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 01-02-1976)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Gutiérrez (1990); Olrog (1979); Salvador (1983a, 2016b); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Mina Clavero, dpto. San Alberto, 05-12-1981)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy

Citas : Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 03-02-1977)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008a, 2008b); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

La Rioja

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia, 16-01-1982)
Bodrati (*in litt.* 2019). Chamical 22 de febrero de 2012, Banda Florida, 26 de junio de 2003, Villa Unión 25 junio de 2003, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2007, Dique de Anzulón 24 de febrero de 2012, Olta 25 de febrero de 2012, Malanzán 13 al 15 de febrero de 2009, Termas de Santa Teresita de Mazán, 14 de febrero de 2008, Parque Provincial Guasamayo 14 de febrero de 2009.

Mendoza

Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Gelain y Pereyra Lobos 2011a); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Sosa (2005)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Massoia (1988b)

Observaciones: De la Peña (Posadas, dpto. Capital, 10-10-1981)

Bodrati (*in litt.* 2019), establecida y nidificante en todos los pueblos de la provincia, San Pedro, Eldorado, Iguazú, Puerto Libertad, Montecarlo, San Vicente, Colonia Andresito, Bernardo de Yrigoyen, El Soberbio, Oberá, entre otros.

Neuquén

Citas: Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (San Martín de los Andes, dpto. Lácar, 26-11-1998)

Río Negro

Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas (1987a); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina, 03-11-1979)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. J. de San Martín, 01-02-1977)

San Juan

Citas: Fava y Acosta (2016); Fernández-Maldonado et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a, 2014b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Observaciones: De la Peña (San Juan, dpto. Capital, 15-01-1982)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1991, 1993)

Observaciones: De la Peña (San Luis, dpto. La Capital, 10-01-1982)

Santa Cruz

Citas: Albrieu et al. (2004); Daciuk (1977b); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Santillán et al. (2010b); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe

Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Gastaudo et al. (2019); López-Lanús et al. (2013a); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo et al. (2006, 2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2007, 2011b); Echevarría y Chani (2000); Juri y Chani (2005); Juri (2007); Lucero et al. (2002, 2005); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2000); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Presti y Echevarría (2009); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpo. Capital, 30-01-1977)

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); McNutt (1981)

PALOMA TROCAL *Patagioenas speciosa* (J. F. Gmelin, 1789)

DESCRIPCIÓN

Largo: 28-34 cm (macho) - 28-32 cm (hembra)

Peso: ffrench (1973): N= 1 (M) 325 g; N= 2 (H) 335 y 335 g

Coloración. Pico rojo con punta clara. Patas pardas rojizas. Iris anaranjado.

Macho. Cabeza castaña purpúrea. En la nuca, cuello, garganta y pecho, las plumas presentan un triángulo blanco, orillado de negro, lo que le da el aspecto de “escamado”. Dorso castaño con las plumas orilladas de negro, por lo cual parece “escamado”. Hombros violáceos. Pecho salpicado de castaño. Abdomen blanquecino con el extremo de las plumas castaño. Subcaudales blancas.

Alas pardas; cubiertas pardas con reflejos purpúreos. Cola negra.

Hembra. Es de colores más apagados y dorso pardo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Partridge en Navas y Bó (1986c). Frutos de *Allophyllus edulis*.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Cuello y pecho “escamados”. Alas pardas. Cola negra. Pico rojo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas speciosa (J. F. Gmelin, 1789) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Amplia área de distribución desde sur de Méjico. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Corrientes

Citas: Baldo et al. (1995)

Formosa.

Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010a); Chebez (1992a, 1996a); Navas y Bó (1986c)

Santa Fe

Citas: Gaii (1950); Zotta (1939a)

PALOMA PICAZURÓ *Patagioenas picazuro* (Temminck, 1813)

Otros nombres: Kono. Paloma campera. Paloma de monte. Paloma gaucha. Paloma grande. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma pampeada. Paloma turca. Palomón. Picazuro. Salera. Torcaza. Torcaza colorada. Torcaza paraguaya. Turca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 34-36 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 212,5 g (Rango: 210 a 215)

Salvador (1988): N= 1 (?) 435,0 g

Salvador (2014a): N= 12 (M) X= 439,1 g (Rango: 409 a 463); N= 15 (H) X= 420,4 g (Rango: 412 a 446)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 426, N= 1 (H) 413 g

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris rojo.

Cabeza y cuello borraños. Posterior del cuello vinoso con estrecha banda blanca subterminal y punta negra en las plumas. Dorso pardo. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales, de color gris plumizo. Ventral gris vinosa. Alas grises con pardo oscuro en las primarias. Cubiertas mayores grises orilladas de blanco; menores grises ocráceas orilladas de blanquecino. Cola gris con ancha banda negra en el extremo

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria, en pareja o en pequeños grupos. Tiene un vuelo rápido y sostenido.

Alimentación

Zotta (1932). Semillas. Huesos de columna vertebral, posiblemente de roedor.

Baliño (1984). **Frutos:** *Melia azedarach*.

Magno (1984a). Brotes. Frutos. Hojas. Insectos. Moluscos.

Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. Libélula (Odonata). Semillas: *Zea mays*.

Montaldo (1993a). **Frutos:** *Citharexylum montevidense*, *Ligustrum* sp.

Montaldo (2000). **Frutos:** *Blepharocalyx salicifolius*, *Citharexylum montevidense*, *Ligustrum lucidum*.

Montaldo (2005). **Frutos:** *Citharexylum montevidense*, *Ligustrum lucidum*, *Ligustrum sinense*, *Myrsine laetevirens*.

Di Giacomo (2005h). **Frutos:** *Maclura tintoria*. **Semillas:** *Sorghum* sp., *Zea mays*.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** Fruto *Melia azedarach*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** *Celtis* sp., *Ligustrum* sp., *Morus alba*, *Pyracantha coccinea*. **Semillas:** *Glycine max*, *Helianthus annuus*, *Panicum miliaceum*, *Sorghum* sp., *Triticum aestivus*, *Zea mays*, Gramíneas. **Brotes:** *Medicago sativa*.

De la Peña y Pensiero (2017). **Frutos:** *Ligustrum* (*Ligustrum lucidum*), *Mora* (*Morus alba*)

Salvador (2018a). Néctar.

De la Peña (2019b). Esperanza. 07-11-2015. Come frutos de Mora (*Morus alba*). 16-12-2017. Come frutos de Curupí (*Sapium haematospermum*), los traga enteros.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un Ouuuuu uh uh ouu repetido 3 ó 4 veces. Luego de una pausa vuelve a iniciarlo.

HÁBITAT

Praderas, sabanas, orillas de montes.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Catamarca, San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



En árboles. Altos y a mediana altura.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos, sostenida entre las ramas.

Gibson (1880). Buenos Aires. Nido.

Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nido con 2 huevos.

Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos en 1873, 1875 y 1909.

Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 24-01-1925, un huevo.

Dinelli (1929). Nido en noviembre.

Carman (1971a). San Mayol, pdo. Tres Arroyos, Buenos Aires, el 30-09-1970, nido con un pichón.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.

Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el estrato superior de la selva.

Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con un huevo.

Bodrati y Pietrk (2000). Chaco. Nido.

Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.

Di Giacomo y Krapovickas (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre julio y enero.

Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.

De la Peña (2013c). Desde el 07-02-1976 a 13-12-2003, se hallaron 45 nidos, de los cuales, 39 estaban en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. En Claromecó, pdo. Tres Arroyos, Buenos Aires, el 07-02-1976, 2 nidos en *Eucalyptus* sp. con un huevo cada uno; 03-09-1993, Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba. Nido en una Ligustrina, a 8 m. del suelo, con un huevo; en Santa Rosa, dpto. Capital, La Pampa, el 19-11-1998 y en Picún Leufú, dpto. Picún Leufú, Neuquén, nidos en construcción. 18-12-2001, El Remanso, Ruta 4 y río Salado, dpto. La Capital, Santa Fe, nido en un Araucaria a 4,50 m con un huevo.

Posturas durante todo el año. En una oportunidad ocupó el mismo nido del año anterior. Nido más bajo: 2,50 m, nido más alto: 8,00 m. Medidas: diámetro total: de 17 a 30 cm, profundidad: 0,5 cm, alto: de 2 a 4 cm.

Tolosa, H. (2014). Laguna Las Barrancas, Lezama, Buenos Aires, 26-01-2014, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Wilson en Salvador (2016a). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, 18-11-1972, dos nidos en *Eucalyptus* sp. a 3,0 y 3,5 m de altura, ambos con un huevo.

Rumboll en Salvador (2016a). Lobería, pdo. Lobería, Buenos Aires, 06-09-1972, dos nidos en *Eucalyptus* sp. a 3,5 y 4,5 m de altura, uno con un huevo y el otro con un pichón. Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, dos nidos en Coronillos a 2,5 y 3,5 m de altura, ambos con un pichón.

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 17-12-1982, 2 nidos, uno en un *Prosopis* sp., a 3,5 m de altura, con un huevo y el otro en un *Celtis* sp., a 4 m del suelo, con un huevo. Médanos, dpto. Villarino, Buenos Aires, 17-11-1986, un nido en un *Prosopis caldenia*, a 3,5 m de altura con un huevo incubado.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 348 nidos, posturas en todos los meses del año. Ubicados principalmente en *Celtis tala*, *Prosopis alba*, *Eucalyptus* sp., *Geoffroea decorticans*, *Acacia caven*, *Prosopis nigra*, *Jodina rombifolia* y *Ulmus procera*, entre 1,5 y 11 m de altura ($X=4,8$). Ponen un huevo.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). La Pampa, Chaco, San Luis, Buenos Aires. Nidos.

Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Santa Fe. Nido.

Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Montero, R. (2016). Ciudad de Buenos Aires, 29-10-2016, nido con un pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 17/05/2019.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

De la Peña (2019b). Esperanza. 04-01-2019. Nido en un Fresno, a 8 m del suelo. 1 huevo.
 Bodrati (*in litt.* 2019). Villa Adelina, partido de San Isidro, Buenos Aires, nido en un tala (*Celtis ehrenbergiana*) en el patio de una vivienda a 3,7 metros de altura, reutilizado dos veces más en el transcurso del año 2017.
 Martínez et al. (2019). Embalse El Carrizal, dpto. Rivadavia, Mendoza, 08-08-2017, nido.
 De la Peña (2020). Esperanza. 01-09-2019. Nido en construcción en Pino (*Pinus* sp.) a 3,50 m de alto.

Huevos

Pone 1 huevo. Elíptico. Blanco.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 40,5 a 44,0 x 28,0 a 30,5		
Gibson (1920): 38,0 x 27,0		
Smyth (1927): 38,5 x 28,0		
Dinelli (1929): 38,0 x 28,5		
Di Giacomo (2005h): 40,2 a 32,2 x 27,5 a 29,6	X= 42,0 x 28,6	(N= 6)
De la Peña (2013c): 40,8 a 43,7 x 28,7 a 30,7	X= 41,9 x 29,5	(N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 35,8 a 44,6 x 26,3 a 31,3	X= 41,4 x 29,1	(N= 98)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 15,5 a 21,0	X= 18,9	(N= 69)
Di Giacomo (2005h): 14,5 a 19,5	X= 16,7	(N= 5)
De la Peña (2013c): 18,6	X= 18,6	(N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,1 a 1,5	X= 1,29	(N= 4)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Ojos cerrados. Piel gris pardusca. Pico grisáceo con banda oscura cerca de la punta. Ápice claro.
 Cavidad bucal grisácea oscura. Patas grises. Plumón canela claro.
 5días. Abre los ojos y apenas de ven las vainas de las plumas alares.

Otros

Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.





Esperanza. Santa Fe. 16-08-2006

Esperanza. Santa Fe. 22-08-2015

Depredadores

De adultos: *Accipiter bicolor* en Areta en Salta, Salvador (2017a), *Circus buffoni* en Buenos Aires, Bó et al. (1996), *Tyto alba* en Córdoba, Diéguez y Corbella (1997), *Asio clamator* en Buenos Aires, Baladrón y Bó (2017), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Córdoba, Salvador (2017a), *Falco femoralis* en Buenos Aires, Bó (1999)

Mamíferos: Zorro pampa o gris (*Lycalopex gymnocercus*), en Buenos Aires, Canel et al. (2016)

Varios adultos fueron capturadas por un Gato montés (*Leucopodus geoffroyi*) cuando comían granos de maíz. Di Giacomo (2005h). Formosa.

De pichones: *Caracara plancus* en Córdoba, Salvador (2013a), *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), Paloma picazuro (*Patagioenas picazuro*), en Buenos Aires. Montero, R. (2016). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 17/05/2019.

De huevos: *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)

Di Giacomo (2005h). Un nido con un huevo fue depredado por un grupo de Urracas moradas (*Cyanocorax cyanomelas*)

Bodrati (*in litt.* 2019) de pichones, volantones y adultos: *Parabuteo unicinctus* en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. De adultos: *Falco peregrinus* en San Pedro, Misiones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Posterior del cuello “escamado”. Línea blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas picazuro picazuro (Temminck, 1813) desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y Chubut. Observada en Santa Cruz.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Amplio Rango: de distribución desde el noreste de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas picazuro picazuro (Temminck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Baladrón y Bó (2017); Bauni et al. (2017); Bó (1999); Bó et al. (1996); Bodrati et al. (2006b); Canel et al. (2016); Carman (1975); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917c); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878b); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018);

Gibson (1920); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993, 2000, 2005); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Bodrati en Salvador (2017a); Soave et al. (1999b); Vargas et al. (2007); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Singuil, dpto. Ambato, 14-12-1999)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 05-10-1972)

Chubut

Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); De la Peña (2013c); Diéguez y Corbella (1997); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador (1983a, 1988, 2013a, 2016b, 2017a); Salvador et al. (2017); Straneck (1999d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (La Granja, dpto. Colón, 13-01-1971)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979; Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 12-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990b)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Cabezas (1988); Camperi et al. (2012); Fiora (1933); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña (2013c); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Catriló, dpto. Catriló, 01-12-2000)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Chamental, febrero de 2012, Villa Unión, junio de 2003, febrero y marzo de 2007, Santa Teresita de Mazán, febrero de 2008, Olta, febrero de 2012, entre otros.

Mendoza

Citas: Contreras (1979g); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (2019); Olrog y Pescetti (1991); Roig (1965); Sosa (2005)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); De la Peña (2013c); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Nores y Yzurieta (1995); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Areta en Salvador (2017a)

San Juan

Citas: Fava et al. (2017); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993); Nores e Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 10-01-1982)

Santa Cruz

Citas: Roesler et al. (2014)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaud et al. (2019); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Trucco y Caziani (2008)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2006, 2013); Brandán (2005); Brandán et al. (2006); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998, 2007, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

PALOMA MANCHADA *Patagioenas maculosa* (Temminck, 1813)

Otros nombres: Conú. Maikono. Paloma ala manchada. Paloma campera. Paloma cenicienta. Paloma de alas moteadas. Paloma de campo. Paloma de cobijas manchadas. Paloma de lunares blancos en las alas. Paloma de monte. Paloma de monte de alas manchadas. Paloma de monte pintada. Paloma goteada. Paloma grande de alas manchadas. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma montera grande común. Paloma moteada. Paloma pintada. Paloma torcaza. Picazuró. Torcaza bataraza. Torcaza grande. Torcaza puntana. Turca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 33 cm.

Peso: Navas y Bó (1986b): N= 2 (M) 308,4 y 389,5 g

Camperi (1992c): N= 1 (H) 350 g

Salvador (2014a): N= 16 (M) X= 358,6 g (Rango: 318 a 398); N= 13 (H) X= 334,5 g (Rango: 322 a 352)

Salvador y Di Giacomo (2014): N = 4 (?) 289, 392, 289 y 408 g

Coloración. Pico gris oscuro. Patas rojas. Iris blanco o apizarrado.

Cabeza, cuello y parte ventral grises vinosos. Manto y escapulares pardos. Dorso, rabadilla y supracaudales, grises plumizas.

Alas pardas. Cubiertas mayores pardas orilladas de blanco, menores pardas con mancha blanca en la extremidad.

Cola gris plumiza con ancha banda terminal negra.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria, en pareja o en grupos. Es de vuelo rápido y sostenido.

Alimentación

Pereyra (1927e). Uvas, semillas, arena.

Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros (Pentatomidae). Himenópteros. **Otros:** Vegetales (frutos, semillas). Arácnidos. Minerales.

Martínez et al. (1975). **Semillas:** *Avena byzantina*, *Erodium* sp.

Magno (1983). Vegetales (frutos, semillas). Caracoles. Moluscos.

Baliño (1984). **Frutos:** *Melia azedarach*.

Di Giacomo (2005h). **Semillas:** *Sorghum* sp., *Zea mays*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Arachis hypogaea*, *Avena sativa*, *Chenopodium* sp., *Fraxinus pensylvanica*, *Glycine max*, *Ligustrum* sp., *Panicum mileaceum*, *Sorghum* sp., *Triticum aestivum*, *Zea mays*. **Frutos:** *Pyracantha coccinea*, *Melia azedarach*, *Morus alba*. Arena.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** *Celtis ehrenbergiana*, *Morus alba*. **Semillas:** *Glycine max*, *Sorghum bicolor*, *Zea mays*.

De la Peña (2019b). Jesús María. Dpto. Colón. Córdoba. 22-02-2016. Come frutos de Tala (*Celtis ehrenbergiana*). 25-02-2016. Come en el suelo semillas de Yuyo blanco (*Urochloa panicoides*). 01-03-2016. Come frutos de Tala (*Celtis ehrenbergiana*). Come en el suelo semillas de Yuyo blanco (*Urochloa panicoides*). 15-06-2017. Come frutos de Ligustro (*Ligustrum lucidum*). 10-10-2017. Esperanza. Come Moras (*Morus alba*). 16-12-2017. Come frutos de Curupí (*Sapium haematospermum*). Traga entero. 27-10-2018. Come Moras. 24-12-2018. Esperanza. 8 km al NO. En un sembrado de Girasol (*Helianthus annuus*), comen semillas en el suelo.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es similar a la de la Paloma picazuró pero más ronca.

HÁBITAT

Praderas arboladas, sabanas, montes, parques, áreas urbanas, serranías.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Chubut.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En árboles, arbustos o enredaderas.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos.

Hudson (1872a). Río Negro. Nido.
Durnford (1877a). Chubut. Nido.
Barrows (1884c). Concepción del Uruguay, Entre Ríos, nido con 1 huevo.
Hartert y Venturi (1909). Sur de Santiago del Estero, nido.
Castellanos (1927). Córdoba. Nido.
Dinelli (1929). Pone en el mes de noviembre.
Pereyra (1937b). La Pampa. Nido.
Casares (1944). San Luis. Nido.
Contino (1980). Nidifica en el chaco salteño. Nido precario, a unos 5 m de altura. Pone 1 huevo.
Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.
Haro y Gutiérrez (1992). Córdoba. Nido.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.
Leiva et al. (2004). Santa Fe, Entre Ríos. Nidos.
Maron et al. (2012). Córdoba. Nido.
De la Peña (2013c). Se localizaron 42 nidos, en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis y Córdoba. Medidas: diámetro total: de 12 a 25 cm, alto: 3 a 3,5 cm. Ubicados en árboles, arbustos o enredaderas., desde 1,60 a 8,00 m del suelo.
Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nidos el 14-07-2012 y 04-11-2013. Se reproduce durante todo el año.
Gelain (2014i). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan, 07-12-2014, nido con un huevo.
Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Rosa, dpto. Capital, La Pampa, 02-11-1972, 2 nidos, uno en un Chañar a 2,20 m de altura y el otro en un Caldén a 1,50 m de altura, ambos con un huevo.
Straneck en Salvador (2016a). Villa General Belgrano, dpto. Calamuchita, Córdoba, 25-10-1976, nido a 4 m de altura con un huevo.
Salvador en De la Peña (2016c). Carnerillo, dpto. Juárez Celman, Córdoba, 19-07-1979, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 4 m. de altura, un huevo. El Rincón, dpto. Merlo, San Luis, 26-06-1981, un nido en *Lithraea ternifolia*, a 3 m de altura, un huevo incubado. Nono, dpto. San Alberto, Córdoba, 20-12-1986, nido en un *Schinus* sp., a 2,80 m de altura, un huevo.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 595 nidos, posturas en todos los meses del año, ubicados principalmente en *Prosopis alba*, *Geoffroea decorticans*, *Celtis tala*, *Eucalyptus* sp., *Acacia caven*, *Prosopis nigra*, *Ulmus procera*, *Prosopis nigra*, *Cassuarina cunninghamiana*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Pinus* sp. y *Melia azederach*, entre 1,9 y 11,0 m de altura (X= 4,2). Pone un huevo.
Salvador y Nores en Salvador (2016a). San Luis. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Buenos Aires, La Pampa, San Luis. Nidos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Fernández-Maldonado et al. (2017). Ciudad de San Juan, nidos.
De la Peña (2019b). Jesús María. Dpto. Colón. Córdoba. 09-09-2017. Nido en Aromo a 3 m del suelo, un huevo. El 07-10 tenía un pichón. 26-10-2017. Nido en Tala, a 3,80 m de altura con un huevo.
Esperanza. 6 km al NO. 15-10-2018. Nido a 3,4 m en un Paraíso cubierto por una enredadera. Un huevo.
Esperanza. 5 km. al Sur. 04-01-2019. Nido en Paraíso a 3,50 m de altura. 1 huevo.
Bodrati (*in litt.* 2019). La Lonja, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, varios nidos con postura o pichones, en bosques plantados de *Ligustrum* sp. entre los años 1973 y 1979.
De la Peña (2020). Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 17-01-2020, Nido en Cina-cina a 3,50 metros del suelo, un huevo; 25-02-2020, nido en Cina-cina a 5 metros de alto, un huevo.

Huevo

Pone 1 huevo. Elíptico. Blanco.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 37,0 a 40,0 x 28,0

Dinelli (1929): 37,0 x 27,0

Contino (1980): 39,6 x 16,2

De la Peña (2013c): 38,3 a 43 x 26,2 a 30,0

X= 39,2 x 27,5 (N= 7)

Gelain (2014i): 37,2 x 26,4

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 36,2 a 41,9 x 27,6 a 29,9

X= 39,4 x 28,4 (N= 123)

Peso

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 16 a 20,5

X= 15,4 (N= 91)

Contino (1980): 14

De la Peña (2013c): 13,6 a 15,2

X= 14,4 (N= 2)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,80 a 1,01

X= 0,93 (N= 6)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Ojos cerrados. Piel grisásea. Pico gris claro con banda oscura cerca de la punta. Ápice claro.

Patas y cavidad bucal grisáceas. Plumón (filoplumas) crema

5 días. Ojos abiertos. Aparecen las láminas en primarias.

7 días. Cañones largos. Lámina gris en flancos

11 días. Emplumado. Solamente en cabeza y pecho plumón. Plumas secundarias con ribete claro.

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 6-8 días. Período de incubación 18-19 días. Permanencia de los pichones en el nido 20-22 días.

Otros

Urcola (2011). Un ejemplar con la coloración general canela. (Brown)

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* en La Pampa, Galmes et al. (2008b), en Córdoba, Salvador et al. (2017), *Parabuteo unicinctus*, *Falco femoralis* en Córdoba, Salvador (2012a), *Geranoaetus melanoleucus* en Córdoba, Salvador (2017a), Carancho (*Caracara plancus*) en Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Di Mauro, S. (2011).

EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019. *Parabuteo unicinctus*, en Buenos Aires, Scofield, R. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 17/05/2019.

Parabuteo unicinctus, Villa Ventana, Buenos Aires, Rosa, D. A. (2012). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 17/05/2019.

De pichones: *Caracara plancus* en Córdoba, Salvador (2013a), *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)

De huevos: *Rupornis magnirostris* en Córdoba, Salvador (2016b), *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), *Pseudoseisura lophotes* y *Mimus triurus* en Córdoba, Salvador (2017a)

Más información:

De la Peña (2019a)



Esperanza. Santa Fe. 06-04-2010. Ubicación nido



Esperanza. Santa Fe. 08-01-2006. Pichón de 8 días.



Esperanza. Santa Fe. 22-12-2005



Jesús María. Córdoba. 24-09-2006. Incubando



Jesús María. Córdoba. 31-01-2015.
Comiendo frutos de Tala



Jesús María. Córdoba. 16-09-2006

	
Jesús María. Córdoba. 05-05-2007. Comiendo granos de maíz	La Granja.Córdoba.17-10-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Cuello gris vinoso. Manchas blancas en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas maculosa albipennis (P. L. Sclater y Salvín, 1876) (*) en el oeste de Salta y en el norte de Jujuy y *Patagioenas maculosa maculosa* (Temminck, 1813) desde el norte del país hasta Chubut.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. El Rango: de distribución de la especie se extiende por el sur de Perú, Bolivia, Paraguay, extremo sur de Brasil, Uruguay y Argentina.

(*). Considerada especie, del Hoyo y Collar (2014). *Patagioenas albipennis*

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas maculosa albipennis (P. L. Sclater y Salvín, 1876) (*)

Jujuy

Citas: Mamaní et al. (2018); Pearman en Navas y Camperi (2005)

Salta

Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Patagioenas maculosa maculosa (Temminck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Cueto y López de Casenave (2000a, 200b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Gasparri et al. (2018); Jaramillo (2000); Leveau y Leveau (2005); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Tambussi y Moschione (1988); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Juan Cousté, pdo. Villarino, 05-02-1976)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Salvador y Di Giacomo (2014); Steullet y Deautier (1935-1946); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Singuil, dpto. Ambato, 14-12-1999)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 03-05-1988)

Chubut

Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Burmeister (1860, 1861); Castellanos (1931); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 2012a, 2016b, 2017a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, 24-06-1972)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); De la Peña (2013c); Fandiño et al. (2017); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biolo (1984); Barrows (1884c); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2011b, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Canevari et al. (1991); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986b); Pereyra (1927d, 1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (General Acha, dpto. Utracán, 19-11-1998)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Mezquida y Marone (2001); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1995d, 2005)

Misiones

Citas: Chebez (1996a)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Villa Regina, dpto. Gral. Roca, 05-02-1976)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Fernández-Maldonado et al. (2017); Gelain (2008a, 2012e, 2014a, 2014b, 2014i); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Casares (1944b); De la Peña (2013c); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaud et al. (2019); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Trucco y Caziani (2008)

Observaciones: De la Peña (Malbrán, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2020); Echevarría et al. (1998, 2007, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

PALOMA DE NUCA BLANCA *Patagioenas fasciata* (Say, 1823)

Otros nombres: Paloma de collar blanco. Paloma nuca blanca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 34-40 cm. (macho) - 33-39 cm. (hembra)

Peso: Fiora (1933): N= 15 X= 322 g (Rango: 300 a 350)

Salvador (1988): N= 1 (M) 300 g; N= 1 (H) 270 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 332 g

Coloración. Pico y patas amarillos. Anillo ocular rojo. Iris rojo.

Cabeza y partes ventrales grises con tinte violáceo. Banda en posterior del cuello blanca. Por debajo de la misma hasta el dorso superior, verde bronceado. Dorso superior con tinte verdoso. Dorso inferior y rabadilla grises. Alas pardas oscuras. Cola gris pardusca con banda oscura en la parte media.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Salvador (obs. pers.). **Semillas:** de *Alnus jorullensis* y de Gramíneas.

Dinelli (1929). Frutos de Solanáceas y Vervénáceas.

Magno (1982). Frutos. Pimpollos.

HÁBITAT

Bosques entre los 1800 y los 2500 m de altura. En invierno baja a 1000 m

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Banda blanca en la nuca. Pico y patas amarillos.

Se parece a la Paloma araucana. Se diferencian en el color del plumaje, el color del pico y patas y en la distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas fasciata albilinea (Bonaparte, 1854) entre los 1800 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En invierno baja hasta los 1000 m



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Desde Alaska hasta noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas fasciata albilinea (Bonaparte, 1854)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Salvador (1988)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

PALOMA ARAUCANA *Patagioenas araucana* (Lesson, 1827)

Otros nombres: Paloma de la Patagonia. Torcaza chilena. Torcaza de Patagonia. Torcaza de la Patagonia.

DESCRIPCIÓN

Largo: 35 cm.

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris rojo amarillento.

Cabeza, cuello, ventral y dorso superior castaños vinosos. Banda en la nuca blanca. Por debajo de ésta, verde bronceado, dando un aspecto “escamado”. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales grises azulados.

Alas pardas. Cubiertas superiores y media, pardas y grises. Cola gris con ancha banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Magno (1984b). **Semillas:** *Araucaria araucana*. **Frutos:** *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Pseudopanax laetevirens*.

Christie et al. (2004). **Semillas:** *Chusquea culeou*. **Frutos:** *Luma apiculata*, *Pseudopanax laetevirens*.

Sainz-Trápaga, S. 2014a. **Frutos:** *Crateus (Pyracantha copccinea)*, Ciprés común (*Cupressus sempervirens*)

HÁBITAT

Bosques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chubut.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N				

En árboles, a baja y mediana altura. Plataforma de palitos.

Kovacs et al. (2005). Nidifica en el oeste de Chubut, en la parte media y baja de los árboles.

Vidoz en De la Peña (2016c). Lago Puelo, dpto. Cushamen, Chubut, nido en Pitra (*Myrceugenia exsucca*) a 3 m del suelo, el 14-08-1992 con un huevo y el 17-08-1992, otro sin postura.

Huevo

Pone 1 huevo. Blanco.

Medidas

Goodall et al. (1946): 37,5 a 44,1 x 28,0 a 30,5

Más información:

Baptista et al. (1997). Goodall et al. (1946). Housse (1945). Wexman et al. (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Coloración general oscura con línea blanca en la nuca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas araucana (Lesson, 1827) en el oeste de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz y este y oeste de Chubut. Accidental en las Islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Bosque Araucano de Chile y Argentina.

	
Lago Puelo. Chubut. 14-12-1994 Foto: Anibal Casas	Villa Traful. Neuquén. 08-10-2017 Foto: María Fernanda Gauna

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut

Citas: Camperi (1998); Kovacs et al. (2005); Lynch Arribalzaga (1902); Sainz-Trápaga (2014a); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Lago Puelo, dpto. Cushamen, 22-11-1998)

Mendoza

Citas: Chebez (2009)

Observación: Pereyra Lobos en De la Peña (2016c)

Neuquén

Citas: Canevari et al. (1991b); Casas y De la Peña (1987); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1989); Dabbene (1913); Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Casas y De la Peña (1987); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Kovacs et al. (2005); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Povedano (2016)

Santa Cruz

Citas: Zoratti en Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005); Fjeldsa y Krabbe (1990); Imberti (2003, 2005e)

PALOMA COLORADA *Patagioenas cayennensis* (Bonnaterre, 1792)

Otro nombre: Llanta colorada. Montera colorada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25-28 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 425 y 464 g

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris rojo.

Frente, corona anterior y pecho vinosos purpúreos. Corona posterior y nuca verdes bronceadas con reflejos purpúreos. Lados de la cabeza grises. Garganta blanquecina. Dorso y cubiertas alares castaños purpúreos. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales grises plumbeos. Abdomen, flancos y subcaudales grises.

Alas pardas. Cola gris con banda gris pardusca en la extremidad.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Quiroga (2017b): **Vegetales:** Fruto *Solanum granulosum-leprosum*

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es similar al de la Picazuró, pero algo más agudo y la primera nota: houuuu es más larga.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Santa Fe, Misiones, Chaco.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Plataforma de palitos, pajitas.

Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nidos con 2 huevos.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Parque Nacional Baritú, dpto. Santa Victoria, Salta, dos nidos a mediados de noviembre de 1992, a baja altura, en matorrales densos, orillas de un camino abandonado, separados unos 15 m entre sí.

Bodrati et al (2010). Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, nido con un pichón muy desarrollado en noviembre de 2009, en una acumulación de enredaderas apoyantes sobre un Tala gateador (*Celtis iguanea*)

Delpietro, H. A. en De la Peña (2016c). Posadas, dpto. Capital, Misiones, 24-11-2012, nido en un mandarino a 3 m del suelo, 2 huevos.

Salvador en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Provincial Pampa del Indio, dpto, Gral San Martín, Chaco. Nido en una acumulación de enredaderas a 2, 5 metros del suelo, en la selva en galería del riacho Nogueira, un pichón pequeño.



Posadas. Misiones. 24-11-2012.

Foto: H. A. Delpietro

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 35,5 a 39,0 x 26,5 a 28,0

Depredadores

De adultos: *Falco deiroleucus* en Chaco, Olrog (1985a)

Bodrati (*in litt.* 2019). De adultos y volantones: *Micrastur ruficollis* en Misiones y Chaco.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Coloración general vinosa purpúrea con las cubiertas alares castañas. Garganta blanquecina. Cola gris.

Se parece a las Yerutí pero carece de blanco en la cola y de canela en la parte ventral del ala.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas cayennensis sylvestris (Vieillot, 1818) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y noreste de Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Amplio Rango: de distribución desde el sur de México hasta el norte de Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas cayennensis sylvestris (Vieillot, 1818)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Olrog (1985a)

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Norez e Yzurieta (1985)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 31-10-1991)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); Narosky y Martelli (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1907)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Contreras (1979f); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (1998b); Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: Manassero et al. (2004); Hartert y Venturi (1909)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Echevarría et al. (2007, 2011b); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Juri y Chani (2005); Juri (2007); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

PALOMA PLOMIZA *Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818)

DESCRIPCIÓN

Largo: 34 cm.

Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (M) 320 g; N= 1 (H) 250 g

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris rojo vinoso.

Cabeza, cuello y parte ventral grises plumizos. Dorsal, alas y cola grises parduscas.

HÁBITAT

Selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de información.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas plumbea plumbea (Vieillot, 1818) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Amplia área de distribución desde Colombia hasta **sureste de** Brasil y extremo **noreste de** Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas plumbea plumbea Vieillot, 1818

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Pearman et al. (2011)

PALOMA MONTERA CASTAÑA *Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Paloma castaña. Paloma colorada. Paloma perdiz. Paloma perdiz rojiza.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20-26 cm.

Peso: Capllonch et al. (2015b): N= 1 (?) X= 120 g; N=1 (H) 140 g

Coloración. Pico y patas rojizos. Iris pardo anaranjado.

Macho. Dorsal, alas y cola castañas rojizas con reflejos purpúreos en la nuca y en la espalda. Línea debajo de los ojos y en los hombros blanca. Franja castaña a los lados de la cabeza. Garganta blanca. Pecho vinoso. Abdomen ocráceo. Parte ventral de las alas canela.

Hembra. Frente y lados de la cabeza canelas. Dorso y plumas centrales de la cola pardos oliváceos con reflejos verdosos. Plumbras externas de la cola pardas olivas y rojizas. Garganta y anterior del cuello blancos. Pecho canela. Vientre y subcaudales ocráceos.

Alas pardas.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N		

Casquete de forma irregular, emplea tallitos y hojas verdes y secas.

Almirón et al. (2012). Reserva Natural Cultural Papel Misionero, Colonia La Flor, dpto. Guaraní, Misiones, 18-01-2010, nido a 1,30 m del suelo con un huevo.

Bodrati y Salvador (2013a). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 12-10-2012, nido a 1,18 m de altura en un chachí bravo (*Alsophila procera*). Era un casquete de forma irregular, elaborado con tallitos y abundantes hojas verdes y secas. Mide 17 cm de diámetro y 9 cm de alto. Contenía 2 huevos de color crema ocráceo claro. El 14-10-2009, nido en construcción. Ambos miembros de la pareja aportaban materiales. El 18-10-2010 se localizó otro nido con 2 huevos.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Color crema ocráceo.

Medidas

Bodrati y Salvador (2013a): 27,1 x 20,6 y 27,1 x 21,2

Pesos

Bodrati y Salvador (2013a): 6,3 y 6,5

PICHONES

Descripción

Bodrati y Salvador (2013a). Nacen con los ojos cerrados y tienen la piel de color rosa violáceo. En la porción dorsal y pecho estaban cubiertos con un plumón natal, corto y ralo de color crema acanelado. Patas color violáceo negruzcas oscuro, uñas color marfil. Pico violáceo negruzco oscuro.

Generalidades

Bodrati y Salvador (2013a). El período de incubación es de 12 días.

Observaciones

Partridge (1954). Misiones. Adulto con pichones.

Más información:

Kuecker et al. (2012)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Cola corta. Macho con franjas castañas a los lados de la cabeza. Dorso, alas y cola rojizos. Línea blanca en los hombros. Hembra, canela en la cabeza y pecho. Dorso pardo verdoso. Ambos sexos con rojo alrededor de los ojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Geotrygon montana montana (Linnaeus, 1758) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Islas del Caribe, Centro América y Sud América hasta extremo noreste de Argentina. Comprende: Cuba, Jamaica, Barbados, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geotrygon montana montana (Linnaeus, 1758)

Misiones

Citas: Almirón et al. (2012); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2013a); Capllonch et al. (2015b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954)

PALOMA MONTERA VIOLÁCEA *Geotrygon violacea* (Temminck, 1810)

Otros nombres: Paloma de espalda violácea. Paloma perdiz violácea. Palomita de dorso violáceo. Yerutí. Yurutí-pirang.

DESCRIPCIÓN

Largo: 21-24 cm.

Peso: Contreras et al. (1994): N= 1 (M) 105 g

Coloración. Pico rojo. Patas rosadas. Iris anaranjado.

Macho. Lados de la cabeza grises. Frente y garganta blancas. Corona gris con reflejos violáceos. Cuello posterior y dorso superior violáceos metálicos. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales color oliva con las plumas orilladas de violáceo. Anterior del cuello y pecho grises vináceos. Resto de la parte ventral blanco.

Alas y cola castañas.

Hembra. Frente castaña. Dorso oliváceo con ápice de las plumas más oscuro. Garganta blanquecina. Pecho pardo. Resto de la parte ventral blanquecino.

Alas y cola, pardos.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Pineschi (1990). Fruto de *Myrsine coriacea*.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Pichones

Observaciones

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Anillo ocular rojo. Macho, ventral blanquecino con reflejos violáceos en la parte dorsal del cuello y en la espalda. Hembra, frente castaña y olivácea en el dorso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Geotrygon violacea violacea (Temminck, 1810) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extenso Rango: de distribución con poblaciones separadas que rodean la Amazonia. En Centro América: Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En norte de Sud América: Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayanas. A esta distribución se le suma Perú, este de Brasil, este de Paraguay, este de Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geotrygon violacea violacea (Temminck, 1810)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Gai (1950); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988a)

YERUTÍ GRIS *Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855

Otros nombres: Bumbuna. Cuncuna. Llanta. Paloma ala colorada. Paloma cuyana. Paloma de la isla. Paloma del monte. Paloma montaraz. Paloma montaraz común. Paloma montaraz menor. Paloma montera. Paloma parda tapadas rojas. Paloma yerutí de los bosques. Palomita del monte. Pumpuna. Puposa. Quejona. Yierutí.

DESCRIPCIÓN

Largo: 30 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 14 X= 172 g (Rango: 160 a 205)

Contreras (1979f): N= 3 (M) 185,0, 169,0 y 165,0 g; N= 1 (H) 183,0 g

Fraga (1983a): N= 2 223,0 y 212,0 g

Salvador (1990a): N= 1 (?) 186,0 g

Camperi (1992a): N= 1 (M) 210,0 g; N= 2 (H) 164,3 y 207,3 g

Di Giacomo (2005h): N= 6 207 g (Rango: 165 a 290)

Salvador (2014a): N= 6 (M) X= 185 g (Rango: 172 a 193); N= 4 (H) X= 181 g (Rango: 172 a 188)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 291 g; N=4 X= 191 g (Rango: 172 a 214), N=1 (M) 193 g; N=1 (H) 188g

Pagano y Salvador (2017): N=2 (?) 210 y 195 g

Bodrati (*in litt.* 2019): N= 2 (?) 204 y 198 g

Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris anaranjado.

Corona grisácea. Nuca, cuello posterior y espalda tornasolados de verde y violeta. Dorso pardo.

Garganta blanca. Resto de las partes ventrales vinoso. Abdomen y subcaudales blanquecinos.

Alas pardas. Ventralmente son canelas.

Cola parda con banda blanca en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria o en pareja. Bastante terrícola.

Alimentación

Baliño (1984). **Fruto:** *Melia azedarach*.

Montaldo (1993a). **Fruto:** *Ligustrum* sp.

Montaldo (2000). **Fruto:** *Ligustrum lucidum*.

Montaldo (2005). **Fruto:** *Ligustrum* sp.
 Bodrati y Haene (2008). **Fruto:** *Allophylus edulis*.
 Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Amaranthus* sp. *Chenopodium* sp. , Gramíneas
Frutos: *Cestrum parqui*, *Condalia microphylla*, *Sapium haematospermum*, Solanáceas. Arena.
 Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Morus alba*.
 De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Ligustrum lucidum*.
 De la Peña y Pensiero (2017): **Semillas:** Maíz (*Zea mays*) (partidas en el suelo)
 Quiroga (2017b): **Vegetales:** Fruto *Allophylus edulis*
 Bodrati (in litt. 2019). **Frutos:** de *Trichilia elegans*, *Ligustrum lucium*, *Blepharocalyx salicifolius*, *Morus alba*.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es melancólico y suave: Hou huuuuuu, repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Bosques, sabanas, montes, selvas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N			N	N	N	N	N

A baja y mediana altura, en árboles, arbustos o enredaderas.

Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos o de enredaderas, hojas.

Internamente fibras finas o plumitas.

Barrows (1884c). Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Nido.

Hartert y Venturi (1909). Barracas al Sur, nido con 2 huevos.

Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 22-01-1923, nido.

Pereyra (1933). Buenos Aires. Nido.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en la zona.

Masramón (1977). Ubica el nido en horquetas a baja altura.

Zapata (1977). Entre Ríos. Nido.

Contino (1980). Nidifica entre los meses de noviembre y febrero, a poca altura.

Fraga (1983a). Lobos, pdo. Lobos, Buenos Aires, nidifica desde agosto a enero. Se localizaron 15 nidos entre 1974 y 1979. De este total, 2 estaban en edificios abandonados, uno de estos sobre el tanque de agua de un baño a 40 cm del cielorraso. Parque San Martín, dpto. Paraná, Entre Ríos, 03-08-1980, nido con un huevo.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en la vegetación más densa y sombría.

Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nidifica en noviembre.

Bodrati y Pitrek (2000). Chaco. Nido.

Antoniazzi et al. (2001). Santa Fe. Nido.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido con pichones en noviembre.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y enero.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Grassini, C. M. (2012). Cajarí, Entre Ríos, 05-10-2012, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Zanotti, M. (2012). Cueva de los Pajaritos, Córdoba, 28-12-2012, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Salvador y Bodrati (2013c). Entre Ríos. Nido.

De la Peña (2013c). Se localizaron 30 nidos en Santa Fe, Entre Ríos y el 13-03-1981, uno en la Puerta, dpto. Amabato, Catamarca. Medidas: diámetro total: de 9 a 20 cm, diámetro interno: 9 a 10 cm, profundidad: 2 a 3 cm y alto: 3,5 a 10 cm. El nido más bajo: 1,10 m y el más alto: 3,50 m.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, tres nidos con 2 huevos cada uno.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 4 nidos.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Nido

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido

Girard en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Sin datos, IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Salvador en De la Peña (2016c). Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, Corrientes, 20-10-1984, nido en un árbol seco cubierto en parte por una enredadera, a 3,4 m de altura, con 2 huevos. Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 10-12-1984, un nido en un *Schinus* sp., a 2,1 m de altura, con 2 huevos. Aguas Blancas, dpto. Castro Barros, La Rioja, 01-11-1985, un nido en un *Lithraea ternifolia*, a 2,2 m de altura, con 2 pichones de unos 10 días. Tanti, dpto. Punilla, Córdoba, 21-12-1989, un nido en un *Acacia* sp., a 2,6 m de altura, con 2 pichones de unas 48 hs., Chuquis, dpto. Castro Barros, La Rioja, 09-02-1990, un nido en un *Schinus* sp., a 1,9 m de altura, con 2 huevos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 41 nidos, posturas entre agosto y marzo, ubicados principalmente en *Schinus longifolia*, *Celtis tala*, *Geoffroea decortican*, *Sapium haematospermum*, *Solanum* sp., *Baccharis* sp. y *Celtis iguanea*, también en el suelo entre gramíneas, altura (X= 1,9 m). Ponen 2 huevos.

Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Narosky en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. De color crema.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 27,0 a 34,0 x 22,0 a 24,5

Smyth (1927): 27,5 a 29,5 x 20,5 a 21,5

Pereyra (1938b): 31,0 x 25,0

Contino (1980): 31,5 x 24,0

Fraga (1983a): 28,4 a 32,8 x 21,6 a 24,0

X= 30,8 x 22,9 (N= 8)

Alabarce y Antelo (1998): 32,8 x 24,0

Di Giacomo (2005h): 29,2 a 34,1 x 22,1 a 22,6

X= 31,0 x 22,3 (N= 4)

De la Peña (2013c): 28,3 a 34,9 x 20,7 a 25,3

X= 31,4 x 22,9 (N= 9)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 27,3 a 31,6 x 21,6 a 24,4

X= 29,83 x 23,12 (N= 48)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 6,9 a 10,2

X= 8,8 (N= 32)

Contino (1980): 4

Fraga (1983a):

X= 9,1 (N= 11)

Di Giacomo (2005h): 7,4 a 8,4

X= 7,8 (N= 4)

De la Peña (2013c): 6,31 a 8,70

X= 7,63 (N= 4)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,547 a 0,675

X= 0,567 (N= 9)

PICHONES

Descripción

Fraga (1983a). Nacen con los ojos cerrados. Corto plumón ocráceo cubre la piel rosada. Pico grisáceo con banda subterminal negra y diente blanco. Al tercer día comienzan a abrir los ojos.

Los pichones abandonan el nido entre los 14 a 17 días.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico oscuro con punta de color natural. Por detrás de la punta tiene una línea más oscura que el resto del pico. Cavidad bucal oscura (morada). Mandíbula ventralmente oscura. Fino plumón crema en las zonas ptéridas.

4 días. Abre los ojos, marrones. Patas grises. Uñas largas.

5 días. Se nota más el contraste entre la punta del pico y el resto. Cañones alares largos, aparecen las láminas finas que parecen pelos. Más fuerte el color ventral crema.

10 días. Láminas de las plumas externas de la cola, blancas. Las dos que siguen, blanquecinas. Las centrales, no. Alas con láminas como plumas de adulto, también en el cuello y lados del pecho. Abdomen blanco. Quedan escaso plumón crema en el cuello.

Observaciones

De la Peña (2013c). Los adultos con los pichones continúan juntos durante 8 a 10 días, después de abandonar el nido.

Generalidades

Fraga (1983a). El período de incubación es de 14 días.

Di Giacomo (2005h). Permanencia de los pichones en el nido, 15 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 5 a 6 días, pero puede ser variable. Pone en días alternos.

Período de incubación de 14 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido de 14 a 17.

Otros

Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Depredadores

De adultos: *Accipiter poliogaster* en Misiones, Bodrati y Areta en Salvador (2017a), *Accipiter bicolor* en Formosa, Di Giacomo (2005h), *Accipiter striatus*. Sin datos, Seipke y Cabane (2008), Halcón negro grande (*Falco deiroleucus*), en Jujuy, Cuñado, C. (2016). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Mamíferos: Di Giacomo (2005h). Varios adultos fueron capturadas por un Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) cuando comían granos de maíz.

De huevos: *Pitangus sulphuratus* en Entre Ríos, Salvador y Bodrati (2013c), *Cyanocorax chrysops* en Misiones, Bodrati (*in litt.* 2019)

Más información:

Fraga (1983a). De la Peña (2019a)



Cayastá. Santa Fe. 16-04-2008



Esperanza. Santa Fe. 23-10-2010. Incubando

	
Esperanza. Santa Fe. 30-10-2010. Juveniles	Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009. Ubicación nido
	
Cayastá. Santa Fe. 14-01-2008. Juvenil	Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009
	
Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009	Esperanza. Santa Fe. 22-10-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Nuca y espalda con reflejos verdosos. Parte ventral de las alas canela y la punta de la cola blanca, visibles cuando vuela. Difícil de diferenciar de las otras Yerutíes.
Prestar atención al canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptotila verreauxi chalcauchenia P. L. Sclater y Salvin, 1870 desde el norte del país hasta San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Catorce subespecies. Amplio Rango: de distribución desde el sur de Texas, hasta centro Argentina y Uruguay. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptotila verreauxi chalcauchenia P. L. Sclater y Salvin, 1870

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Fraga (1983a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993a, 2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1933b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999b)

Observaciones: De la Peña (Pinamar, pdo. Gral. J. Madariaga, 14-01-1983)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); De la Peña (2013c); White (1882)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Castellanos (1931); Dardanelli et al. (2006a); Dardanelli y Nores (2001); Frenzel (1891); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 18-07-2004)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Barrows (1884c), Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a.); Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2012b, 2013c); Fandiño et al. (2010); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Salvador y Bodrati (2013c); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Bodrati (2005c)

La Rioja

Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923)

Mendoza

Citas: A. Elías en Ferrer et al. (2019)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Bodrati y Areta en Salvador (2017a)

Salta

Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Pagano y Salvador (2017); Rodríguez (2012b); Salvador (1990); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990f)

San Juan

Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Nores e Yzurieta (1982b); Ortiz et al. (2016)

San Luis

Citas: Casares (1944); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Salvador y Di Giacomo (2014); Trucco y Caziani (2008)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2000, 2006, 2013); Antelo y Brandán (2006); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (1998, 2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2020); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (2007, 2008a, 2011b); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Presti y Echevarría (2009); Quiroga (2017b); Rougés y Blake (2001); Vides Almonacid (1991, 1993)

YERUTÍ COLORADA *Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)

Otros nombres: Paloma colorada de monte. Paloma montaraz rojiza. Yerutí rojiza.

DESCRIPCIÓN

Largo: 28 cm.

Peso: Contreras (1979): N= 1 (M) 169 g; N= 1 (H) 183 g

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo naranja claro.

Frente grisácea. Corona gris azulada. Posterior del cuello y espalda violáceos tornasolados. Dorso y cubiertas alares pardos oliváceos oscuros. Garganta blanquecina. Partes ventrales ocráceas vinosas más claras en el abdomen.

Subcaudales blancas.

Alas pardas, ventralmente canelas.

Cola pardaoscura con banda blanca en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria o en pareja. Terrícola.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un suave y grave Houuuuu... repetido en forma esporádica.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

En árboles, arbustos, matorrales o enredaderas.

Oculto o Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallitos de enredaderas, pajitas.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Jardín América, dpto. San Ignacio, Misiones, 12-12-1988, un nido se hallaba en un área selvática a 20 m de un arroyo, bien oculto a 2,8 m de altura en un pequeño árbol con abundantes epífitas, hecho con tallitos de enredaderas, tallitos con líquenes adheridos y por dentro gramíneas, tenía 13 cm de diámetro, 5 cm de altura y 3,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.

Bodrati y Salvador (2013b). Localizaron 4 nidos en Misiones: 12-12-1988, Jardín América, dpto. San Ignacio, nido bien oculto en un árbol seco, cubierto por epífitas, a 2,80 m del suelo. Casquete elaborado de tallitos, líquenes, ramitas finas, tallos, zarcillos y en la base algunas cortezas. Diámetro externo de 13 cm, interno de 8 cm, alto 5 cm y 3,5 cm de profundidad. Tenía 2 huevos. Otro fue hallado el 21-10-2001, en 9 de Julio, dpto. El Dorado, a 1,30 m del suelo, contenía un huevo y un pichón. El 11-11-2006, en el Parque Provincial de la Araucaria, dpto. San Pedro, nido a 1,50 m del suelo dentro de una densa mata de Yuquerí (*Acacia polyphylla*), contenía 2 huevos. El 07-11-2007, en el Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, nido muy oculto dentro de un Tala gateador (*Celtis iguanea*) a 1,30 m de altura. Contenía 2 huevos blanco cremosos.

De la Peña (2013c). Puerto Iguazú y Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, nido en una enredadera, a 1,50 m del suelo con 2 pichones y el otro en un matorral, a 1,60 m de altura con 2 huevos. Medidas, diámetro total: de 13 a 15 cm.

Uranga, M. en De la Peña (2016c). El Soberbio, dpto. Guaraní, Misiones, 08-11-2013, nido con 2 huevos.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos con tinte crema o crema.

Medidas

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 29,8 a 30,3 x 22,7 a 22,8

Bodrati y Salvador (2013b): 29,4 a 31,1 x 22,1 a 22,8 X= 30,1 x 22,4 (N= 5)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 8,2 y 8,4

Bodrati y Salvador (2013b): 7,1 a 8,4 $X = 7,9$ (N= 3)

PICHONES

Descripción

Bodrati y Salvador (2013b). Ojos cerrados. Piel color carne rosada, plumón dorsal amarillento acanelado, pico gris claro con una faja subterminal negra y ápice blanco, patas color carne grisácea.

Peso al nacer

Bodrati y Salvador (2013b): 7,1



Cataratas del Iguazú. Misiones. 21-09-1993



Puerto Iguazú. Misiones. 12-10-1981

Depredadores

Bodrati (*in litt.* 2019). En un dormidero, del Lechuzón mocho chico (*Pulsatrix koeniswaldiana*) en el Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, se encontraron restos de *Leptotila rufaxilla*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Parte ventral de las alas canela y punta de la cola blanca, visibles en vuelo. Piel alrededor de los ojos rojiza. Corona gris azulada.

Difícil de diferenciar de las otras Yerutíes. Prestar atención al canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptotila rufaxilla reichenbachii Pelzeln, 1870 en Misiones, Corrientes y Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. En buena parte de Sud América al este de los Andes. Comprende: Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptotila rufaxilla reichenbachii Pelzeln, 1870

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fandiño et al. (2017); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Isla Apipé, Ituzaingó, Corrientes, A. Bodrati y R. M. Fraga la encontraron como relativamente común en octubre de 1999.

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2013b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

YERUTÍ YUNGUEÑA *Leptotila megalura* P. L. Sclater y Salvin, 1879

Otros nombres: Paloma de cola grande. Paloma montaraz colilarga. Paloma montaraz de cola larga. Yerutí coluda.

DESCRIPCIÓN

Largo: 28-32 cm.

Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 138 y 161 g

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo castaño.

Frente grisácea. Corona, cuello y dorso superior violáceos tornasolados. Dorso inferior, cubiertas alares, rabadilla pardos oliváceos. Garganta blanquecina. Ventral ocrácea vinosa. Subcaudales blancas.

Remeras pardas oscuras. Parte ventral de las alas canela.

Cola parda oscura con las plumas externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria o en pareja. Terrícola.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto está compuesto por cinco notas: Uh.uh.uh.uh.Uuuuu..

Uh.uh.uh.uh.Uuuuu.. repetido con cierta frecuencia.

HÁBITAT

Bosques entre los 1500 y los 2500 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Cola larga. Canela en la parte ventral de las alas y blanco en la punta de la cola, visibles en vuelo.

Se parece a la Yerutí colorada, pero tiene la corona violácea.

Diferenciarla de las otras Yerutíes. Prestar atención al canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptotila megalura P. L. Sclater y Salvin, 1879 entre los 1500 y los 2500 m de altura en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y oeste de Santiago del Estero.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. En la cordillera de los Andes entre 1.500 y 2.500 metros de altura en Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009); Esteban (1953); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Chebez (2005); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

La Rioja

Citas: Nores e Yzurieta (1982a)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); White (1882)

Santiago del Estero

Citas: Ferrari et al. (2004b)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Boletta et al. (1995); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Echevarría et al. (2008d); Gianini (2000); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Rougés y Blake (2001); Vides Almonacid (1993)

TORCAZA ALAS BLANCAS *Zenaida meloda* (Tschudi, 1843)

Otro nombre: Paloma china.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25-33 cm.

Coloración. Gris ocrácea con tinte rosado en la corona. Banda blanca en las alas.

HÁBITAT

Zonas áridas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en La Rioja, San Juan.

MESES DE NIDIFICACIÓN



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Plataforma de palitos entrelazados.

Vitale et al. (2010). Banda Florida, dpto. General Felipe Varela, La Rioja, el 10-02-2009, se localizó un nido en una rama lateral de un Olivo, a unos 7 m del suelo. Plataforma de palitos entrelazados. El 29 y 30 de diciembre de 2007, en Villa Unión, dpto. General Felipe Varela, el 30 y 31 de diciembre de 2007 en Alto Jagüé, dpto. General Sarmiento, se observaron ejemplares transportando materiales para nidificar.

Uranga, M. en De la Peña (2019b). Calingasta, dpto. Calingasta, provincia de San Juan, 30-01-2017, nido en un plátano de una plaza, asentado sobre ramas, a 10 m del suelo aproximadamente. Tenía un huevo.

Huevos

Pone 2 huevos. Ovoides. Color crema.

Observaciones

Fava et al. (2013). Canal Ing. G. Céspedes, dpto. Pocitos, San Juan, pareja en cortejo.



Calingasta. San Juan. 30-01-2017. Fotos: Máximo Uranga



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Banda blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Zenaida meloda (Tschudi, 1843) desde La Rioja a Chubut, por el Oeste.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Regiones áridas de Ecuador, Perú, norte y centro de Chile, oeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut

Observaciones: Rost, G. E. (2019). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

La Rioja

Citas: Bodrati y Cockle (2008); Ramos, D. en Chebez (2009); Vitale et al. (2010)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019)

San Juan

Citas: Fava et al. (2013); Fava y Acosta (2016); Ortiz et al. (2016); Uranga en De la Peña (2019b)

Neuquén

Citas: Bianchini (2018a), Miller et al. (2018); Veiga y Bianchini (2017)

Río Negro

Citas: Bianchini (2018a); Miller et al. (2018)

TORCAZA *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)

Otros nombres: Apoca. Cubincoqui. Cucule. Llanta. Mediana. Paloma. Paloma con orejas. Paloma de monte. Paloma de pecho dorado. Paloma dorada. Paloma mediana. Paloma moteada. Paloma parda manchada. Paloma puntana. Paloma sacha. Paloma segunda. Paloma torcaz. Paloma torcaz común. Paloma torcaza. Pecho dorado. Quito. Sacha. Sacha paloma. Torcaza de cola blanca. Tórtola. Tórtola dorada. Tórtola mediana. Tórtola torcaza. Tortolita. Tortolita puntana. Tuerca. Urpila. Zurita.

DESCRIPCIÓN

Largo: 26 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 128 g (Rango: 116 a 140)

Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 134 y 140 g

Contreras (1975): N= 8 X= 145,9 g (Rango: 130,7 a 168,5)

Salvador (1988): N= 13 (H) X= 130,9 g (Rango: 117 a 153), N= 30 (M) X= 138,2 g (Rango: 116 a 155)

Camperi (1992a): N= 1 (H) 124,8 g

Camperi (1992c): N= 1 (M) 150 g; N= 1 (H) 175 g

Darrieu y Bó (1992) : N= 3 (M) X= 135,0 g (Rango: 119 a 146); N= 24 (M) X= 138,8 g (Rango: 103,6 a 173,2); N= 10 (H) X= 133,9 g (Rango: 110,3 a 147,3)

Christie et al. (2004): 120 g

Camperi y Darrieu (2004): N= 1 130,1 g

Salvador (2014a): N= 43 (M) X= 133,4 g (Rango: 116 a 155); N= 27 (H) X= 129,6 g (Rango: 117 a 153)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 12 X= 130 g (Rango: 102 a 144)

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris pardo.

Frente gris vinosa. Corona y nuca grises. Manchitas subauriculares negras azuladas. A los lados del cuello, plumas tornasoladas. Dorso pardo. Garganta blanquecina. Pecho gris vinoso. Abdomen más claro.

Alas grises oscuras con manchas negras en las cubiertas. Cola con las plumas centrales grises, externas grises con banda subterminal negra y punta blanca en las más distales.

COMPORTAMIENTO

Anda en pareja o formando bandadas.

Alimentación

Marelli (1919). Vegetales. Insectos.

Aravena (1927). **Semillas:** *Medicago sativa*, *Triticum* sp., *Zea mays*. Insectos. Piedritas.

Zotta (1940). **Semillas:** *Triticum* sp.

Bucher y Nores (1973). **Semillas:** *Amaranthus* sp., *Arachis hypogaea*, *Argemone subfusiformis*, *Chenopodium* sp., *Digitaria sanguinalis*, *Croton* sp., *Echinochloa colona*, *Panicum miliaceum*, *Polygonum convolvulus*, *Helianthus annuus*, *Secale cereale*, *Setaria italica*, *Setaria pampeana*, *Sorghum alnum*, *Sorghum halepense*, *Sorghum* sp., *Zea mays*, *Triticum* sp.

Martínez et al. (1975). **Semillas:** *Erodium* sp., *Sorghum alnum*.

Bucher y Nores (1976). **Semillas:** *Amaranthus quitensis*, *Amaranthus* sp., *Arachis hypogaea*, *Argemone subfusiformis*, *Brachiaria extensa*, *Brassica* sp., *Chenopodium album*, *Chenopodium* sp., *Croton* sp., *Descurainia argentina*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa colona*, *Eragrostis cilianensis*, *Euphorbia hirta*, *Euphorbia ovalifolia*, *Euphorbia serpens*, *Helianthus annuus*, *Hordeum hexastichum*, *Kochia scoparia*, *Linum usitatissimum*, *Panicum miliaceum*, *Polygonum convolvulus*, *Polygonum aviculare*, *Secale cereale*, *Setaria italica*, *Setaria pampeana*, *Sorghum halepense*, *Sorghum* sp., *Stipa brachychaeta*, *Zea mays*, *Triticum* sp.

Pergolani de Costa y Zapata (1980). **Semillas:** *Amaranthus* sp., *Ambrosia ternifolia*, *Brassica campestris*, *Brassica* sp., *Carduus alantoides*, *Carduus nutans*, *Carduus pycnocephalus*, *Centaurea calcitrapa*, *Cerastium arvense*, *Certhamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Chenopodium* sp., *Cuscuta* sp., *Cynara cardunculus*, *Cynodon* sp., *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa colona*, *Echinochloa* sp., *Echinum plantagineum*, *Eleusine indica*, *Euphorbia peplus*, *Galium mollugo*, *Galium* sp., *Geranium* sp., *Heleocharis* sp., *Heliotropium* sp., *Linum usitatissimum*, *Lolium multiflorum*, *Malvastrum coramandalianum*, *Panicum urvilleanum*, *Paspalum dilatatum*, *Oryzopsis* sp., *Oxalis corniculata*, *Panicum bergii*, *Panicum miliaceum*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvulus*, *Potamogeton* sp., *Ranunculus* sp., *Setaria* sp., *Sida* sp., *Silene gallica*, *Urtica urens*, *Vaccaria segetalis*, *Vicia irsuta*, *Vicia* sp., *Vigna* sp., *Raphanus sativus*, *Rumex crispus*, *Sorghum halepense*. **Insectos:** Langostas (desoves). **Crustáceos:** *Porcellus* sp. (bicho bolita).

Klimaitis (1993). **Semillas:** no determinadas. Piedritas.

Di Giacomo (2005h). **Semillas:** *Cirsium vulgare*, *Sorghum* sp., *Zea mays*.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Lampranthus* sp., *Euphorbia serpens*, *Helianthus annuus*, *Portulaca oleracea*, *Oryza sativa*, *Sorghum* sp., *Zea mays*. **Hojas:** *Lampranthus* sp. Pan

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Avena sativa*, *Chenopodium* sp., *Panicum miliaceum*, *Sorghum* sp., *Zea mays*, *Glycine max*.

De la Peña y Pensiero (2017): **Frutos:** Tala (*Celtis ehrenbergiana*), Mora (*Morus alba*). **Semillas:** Nabiza (*Brassica napus*), Soja (*Glycine max*), Mamón (pulpa y semilla), Rayito de sol (*Lampranthus productus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Brucuyá (*Passiflora caerulea*) (en el suelo), Trigo (*Triticum aestivum*)

De la Peña (2019b). Carne.

De la Peña (2019b). Esperanza. 11-03-2014. Come las hojas de la Flor de seda (*Portulaca grandiflora*). Hojas y semillas de *Portulaca* (*Portulaca* sp.). 22-10-2015. Come frutos de Mora (*Morus alba*). 17-11-2015 y 01-12-2015. Come semillas de Mijo (*Panicum miliaceum*). Picotea en la panoja. 10-01-2016. Come semillas de Girasol (*Helianthus annuus*). Se posa en la panoja. 31-01-2016. Come granos de Sorgo (*Sorghum bicolor*). 21-03-2016. Come frutos de Sangre de toro (*Rivina humilis*). Pega saltitos para agarrarlos. 10-01-2017. Come hojas de Acelga (*Beta vulgaris*). 12-01-2017. Come hojas de Flor de seda (*Portulaca grandiflora*). 25-08-2018. Come granos de Trigo (*Triticum aestivum*) de un rastrojo (Rollo). 24-12-2018. Come granos de Girasol (*Helianthus annuus*) caídos en un sembrado.

Jesús María. Dpto. Colón. Córdoba. 26-01-2015. Come frutos de Tala (*Celtis ehrenbergiana*). Los Traga enteros. 25-02-2016 y 01-03-2016. Come en el suelo semillas de Yuyo blanco (*Urochloa panicoides*)

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto del macho es un suave y descendente huu.huu.huu.. repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Praderas, estepas, montes, plazas, parques, áreas rurales y urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Nidifica en forma solitaria generalmente. Pero puede formar colonias.

Ubica el sostenido en árboles, arbustos, enredaderas, matorrales. También en el suelo, tirantes de techos o sobre plataformas de palitos de nidos abandonados o semidestruidos, en planteras colgantes.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos, gramillas, hojitas. A veces alguna pluma.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.

Gibson (1880, 1920). Buenos Aires. Nido.

Holland (1892). Buenos Aires. Nido.

Hussey (1916). Buenos Aires. Nido.

Reed (1921). Mendoza. Nido.

Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.

Peters (1923). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, 01-12-1920, nido con huevos.

Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone 2 ó 3 huevos.

Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 16-10-1916, Tigre, pdo. Tigre, Buenos Aires, 25-12-1917, Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 10.11.1923, nidos.

Dinelli (1929). Nidos desde noviembre a marzo.

Castellanos (1931). Valle de los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba, diciembre de 1919, nido en el suelo con huevos.

Pereyra (1937). La Pampa. Nido.

Partridge (1953). San Luis. Nido.

Horvath y Tropal (1963). Río Negro. Nido.

Korschenewski (1969b). Chubut. Nido.

Zapata y Cabrera (1969). Buenos Aires. Nido.

Humphrey et al (1970). Viamonte, 12 a 24 de octubre, varios nidos con 2 huevos cada uno

Zuberbühler (1971). Buenos Aires. Nido.

Carman (1973). Buenos Aires. Nido.

Bucher y Nores (1973). Piquillín, dpto. Río Primero y Villa Ascasubi, dpto. Tercero Arriba, Córdoba, anida durante todo el año.

Murton et al. (1974). Córdoba. Nido.

Bucher y Di Tada (1975). Piquillín, dpto. Río Primero, Córdoba, nidos en abril y junio de 1970.

Bucher et al. (1977). Córdoba. Nido.

Masramón (1977). Anida durante todo el año.

Bucher y Orueta (1977). En el período de 1970-1972, colonias de nidificación en: 5 km al este de Marull, dpto. San Justo, 5 km al oeste de Salsipuedes, dpto. Colón, 2 km al este de Piquillín, dpto. Río Primero, 3 km al norte de Río Primero y Santiago Temple, dpto. Río Primero, dos colonias a 12 km y 5 km al norte de Despeñaderos, dpto. Santa María, El Parador, entre San Agustín y Embalse de río Tercero y en el Río de los Sauces, dpto. Calamuchita, Villa Ascasubi y 30 km al sur de Gral. Fotheringham, dpto. Tercero Arriba, 5 km al norte de Algodón, dpto. Gral. San Martín, 7 km al norte de Ballesteros, dpto. Unión, 11 km al este de Berrotarán, 14 km al este de Alcira y 12 km al este de Coronel Baigorria, dpto. Río Cuarto, Córdoba.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.

Zapata (1977). Entre Ríos. Nido.

Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en la reserva.

Carman (1979). San Cayetano, pdo. San Cayetano, Buenos Aires, 18-12-1972, nido con 2 pichones.

Contreras (1980o). Laguna del Viborón, dpto. Maipú, Mendoza, 05-11-1975, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Nido.

Haro y Gutierrez (1992). Córdoba. Nido.

Miatello et al. (1999). Córdoba. Nido.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.

Mezquida (2000). Mendoza. Nido.

Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.

Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.

Pautasso (2002b). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 5 nidos entre el 23-11-1999 y el 11-11-2000, con huevos o con pichones.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 4 nidos con huevos entre octubre y noviembre.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida desde agosto a enero.

Capllonch (2007). Tucumán. Nido.
Tajer et al. (2007). Buenos Aires. Nido.
Cozzani y Zalba (2009). Buenos Aires. Nido.
Antoniazzi et al. (2010). Santa Fe. Nido.
Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Gelain (2012b). Río Negro. Nido.
Salvador y Bodrati (2013c). Córdoba. Nido.
De la Peña (2013c). Se localizaron 534 nidos en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos. Miden: diámetro total: de 12 a 15 cm. El nido más bajo, en el suelo, el más alto a 25 m.
Gelain (2014b). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nidifica localmente. Un nido el 12-10-2008.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, tres nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 4 nidos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron cientos de nidos (solitarios y en colonias). Posturas en todos los meses del año, ubicado en todo tipo de árboles y arbustos, en el suelo, en construcciones humanas y en totorales en lagunas. Ponen 2 huevos, pero también se han encontrado varios con 3 huevos.
Salvador en Salvador (2016a). San Juan. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). La Pampa, San Luis. Nidos.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Nido en Córdoba.
De la Peña (2019b). Jesús María, dpto. Colón, Córdoba. 14-02-2014, nido con 4 huevos. Esperanza. Dpto Las Colonias, Santa Fe. 29-03-2017. Nido en un Seibo a 2,70 m del suelo. 3 huevos. Jesús María, dpto. Colón, Córdoba. 28-10-2017. Nido en un tirante de una galería, a 3 m del suelo, 2 pichones grandes. Esperanza, 17-09-2017, nido en el suelo con 2 huevos.
Quiroga y Llugdar (2019c). Varios nidos en Santiago del Estero.

Huevos

Pone 2, a veces 3 ó 4 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 27,0 a 32,0 x 20,5 a 24,5

Gibson (1920): 31,0 x 22,0

Smyth (1927): 28,5 a 31,5 x 20,5 a 22,5

Dinelli (1929): 29,0 a 30,0 x 21,0 a 22,0

Zapata y Cabrera (1969): 29,2 a 32,4 x 21,8 a 23,4

Contino (1980): 30,0 x 22,0

Di Giacomo (2005h): 25,4 a 29,8 x 20,2 a 22,5

X= 27,9 x 21,4 (N= 18)

De la Peña (2013c): 28 a 30,8 x 21,4 a 23,5

X= 29,3 x 22,1 (N= 12)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 25,4 a 32,3 x 20,3 a 24,2

X= 29,1 x 22,3 (N= 93)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 6,2 a 9,1

X= 7,8 (N= 66)

Di Giacomo (2005h): 5,6 a 7,5

X= 6,7 (N= 18)

Zapata y Cabrera (1969): 7

De la Peña (2013c): 8,60 a 8,90

X= 8,7 (N= 2)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,40 a 0,51

X= 0,499 (N= 10)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico color natural con punta negra. Cavidad bucal y paladar rosado claro. Plumón amarillento. Garganta desnuda.

1 día. Largo del cuerpo: 3,5 cm.

3 días. Largo del cuerpo: 4,8 cm.

5 días. Ojos abiertos. Apenas se ven las láminas en las alas. Largo del cuerpo: 5,3-6,0 cm.

8 días. Cañones de las plumas alares grises con punta ocráceo-canela. Plumaz laterales de la cola blancas, centrales grises. Largo del cuerpo: 6,5-8,0 cm.

10 días. Largo del cuerpo: 8-9 cm.

Se escapan del nido si son molestados.

El largo del cuerpo se tomó estando el pichón apoyado sobre el nido, desde el buche a la rabadilla.

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						1,0-1,1	1,4	0,6-0,7
2						1,4	1,8	0,9
3						1,0-1,5	1,7-2,0	0,8-0,9
5	0,7-1,2		0,6-1,0			1,6-1,9	2,3-2,6	1,0-1,1
6	1,8	0,3	1,3		0,7	2,0	3,0	1,1
8	2,5-3,6	1,0-1,2	2,0-2,1	0,9-1,2	1,1-1,8	2,3	3,1-3,2	1,2-1,4
10	2,7-2,8	1,4-2,2	1,7-2,0	1,3-1,7	1,4-2,2	2,3	3,5-4	1,3-1,4

Observaciones

De la Peña (2013c). Se localizaron cinco nidos construidos sobre nidos semidestruidos de *Furnarius rufus*, uno en *Turdus amaurochalinus*, uno a 25 m de altura, en uno de *Parabuteo unicinctus* y uno en *Taraba major*.

El 18-09-1989, en Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, una colonia con cientos de nidos. Algunos con 3 huevos.

El 21-11-1993, en Las Cuevas, dpto. Diamante, Entre Ríos, colonia con muchos nidos. Ejemplares de *Turdus amauchalinus* les comían los huevos.

De la Peña (2016c). Jesús María, dpto. Colón, Córdoba, el 14-02-2014 un nido tenía 4 huevos. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-10-2014 un ejemplar Leucístico con nido a 5 m del suelo en un Fresno.

Generalidades

Bucher y Orueta (1977). El período de incubación es de 14 días.

Di Giacomo (2005h). La postura ocurre en días alternos. El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecen en el nido entre 12 y 15 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 5-6 días pero puede ser variable. Pone en días alternos.

Período de incubación 14 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido de 12 a 14 días.

De la Peña (2020). La hembra incuba más tiempo que el macho.

Otros

Harper (1923a). Un ejemplar Albino.

Haro (2002). Un ejemplar con Albinismo total en el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba.

De la Peña y Bruno (2008). Un ejemplar Albino (F. Bruno).

Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.

Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

De la Peña (2019b). Un ejemplar con Leucismo.

Depredadores

De adultos: *Elanus leucurus* en Buenos Aires, Leveau et al. (2002), *Circus cinereus* en Buenos Aires, Cáceres et al. (1996), en Buenos Aires, Bó et al. (2000c), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Circus buffoni* en Buenos Aires, López (1993b), en Buenos Aires, Bó et al. (1996), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Accipiter chilensis* en Tierra del Fuego, Reynolds en Humphrey et al. (1970), *Rupornis magnirostris* en Buenos Aires, Morici (2010), *Parabuteo unicinctus* en Córdoba, Castellanos (1932), en Buenos Aires, Aguilar y Kowalinski (1996a), en Córdoba, Salvador en De la Peña y Salvador (2010) y Salvador (2012), *Geranoaetus albicaudatus* en Córdoba, Salvador et al. (2017), *Geranoaetus polyosoma* en Córdoba, Salvador et al. (2017), en La Pampa, De Luca (2011b), en Patagonia, Travaini et al (2012), *Geranoaetus melanoleucus* en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), en Neuquén, Hiraldo et al. (1995), en Río Negro, Trejo et al. (2006a), *Buteo albigula* en Río Negro, Trejo et al. (2006b), *Tyto alba* en Misiones, Massoia (1988k), en Buenos Aires, Morici (1990b, 2009e), en Chubut, Noriega et al. (1990), en Chubut, García Esponda et al. (1998), en Chubut, Noriega et al. (1993), en Río Negro, Trejo et al. (2005a), *Bubo magellanicus* en Neuquén, Donázar et al. (1997), en Neuquén y Río Negro, Teta et al. (2001), *Asio clamator* en Buenos Aires, Martínez et al. (1998), en Buenos Aires, Baladrón y Bó (2017), *Asio flammeus* en Buenos Aires, Diéguez (1996a), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Córdoba, Salvador (2017a), *Falco femoralis* en San Luis, Nellar Romonella (1993), en Buenos Aires, Bó (1999), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), en Córdoba, Salvador (2012), en Chaco, Bodrati en Salvador (2012c), *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Zotta (1940c), en Córdoba, Vasina y Straneck (1984), en San Luis, Nellar (1991), en

Patagonia, Ellis et al. (2002), en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), en Tierra del Fuego, McNutt (1981), en La Pampa Galmes et al. (2008b), Quiroga (2017b), *Rupornis magnirostris* en Tucumán.

Mamíferos: Zorro pampa o gris (*Lycalopex gymnocercus*) en Buenos Aires, Canel et al. (2016), Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) en La Pampa, Santillán et al. (2014)

De pichones: *Rupornis magnirostris*, *Caracara plancus* y *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), *Milvago chimango* en Córdoba, Bucher y Orueta (1977)

De huevos: *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), *Pseudoseisura lophotes* en Córdoba, Salvador y Bodrati (2013), *Taraba major* en Santa Fe, De la Peña (2013c), *Pseudoseisura lophotes* en Córdoba, Bucher y Orueta (1977), *Pitangus sulphuratus* en Santa Fe, De la Peña en De la Peña y Salvador (2010), *Turdus amaurochalinus* en Entre Ríos, De la Peña (2001), *Agelaioides badius* en Córdoba, Bucher y Orueta (1977)

Más información:
 Bucher y Nores (1973). Bucher et al. (1977). Bucher y Di Tada (1975). Bucher y Orueta (1977). De la Peña (2019a)

	
Esperanza. Santa Fe. 06-09-2008. Incubando	Esperanza.Santa Fe. 06-10-2005
	
Esperanza. Santa Fe. 20-02-2010	Esperanza. Santa Fe. 17-08-2007. Nido en semáforo

	
Esperanza. Santa Fe. 24-11-2006. Nido en plantera	Esperanza. Santa Fe. 25-01-2009. Juvenil
	
Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009. Nido en el suelo	Esperanza. Santa Fe. 31-10-2010

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Plumas tornasoladas en el cuello. Manchas negras en las cubiertas alares. Franja negra y punta blanca en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Zenaida auriculata virgata W. Bertoni, 1901 desde el norte del país hasta La Rioja en el oeste y Río Negro en el Sur y *Zenaida auriculata auriculata* (Des Murs, 1847) por el oeste, desde La Rioja, San Juan y Mendoza a Tierra del Fuego. Accidental en las islas Malvinas y Georgias del Sur.

En algunas provincias hay áreas de superposición entre ambas razas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Once subespecies. Amplio Rango: de distribución en toda Sud América a excepción de Amazonia.

Comprende: Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina,

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Zenaida auriculata virgata W. Bertoni, 1901

Buenos Aires

Citas: Aguilar y Kowalinski (1996a); Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Baladrón y Bó (2017); Bauni et al. (2017); Bó (1999); Bó et al. (1996, 2000c); Bodrati et al. (2006b); Cáceres et al. (1996); Camperi (1992c); Canel et al. (2016); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000a, 200b); Dabbene (1917c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2013c); Diéguez (1996a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Leveau et al. (2002); López (1993b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Martínez et al. (1998); Mérida y Bodrati (2006); Morici (1990b, 2009e, 2010, 2012b, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Vargas et al. (2007); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1940c); Zuberhübler (1971)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Darrieu y Bó (1992); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Bodrati en Salvador (2012c)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 03-05-1988)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher et al. (1977); Bucher (1970); Bucher y Di Tada (1975); Bucher y Orueta (1977); Bucher y Nores (1976); Castellanos (1931, 1932); Darrieu y Bó (1992); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Haro (2002); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 1988, 2012, 2016b, 2017a); Salvador et al. (2017); Salvador y Bodrati (2013); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Vasina y Straneck (1984); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Río Primero, dpto. Río Primero, 14-08-1972)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Darrieu y Bó (1992); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2011b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2011a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Mamani et al. (2018); Moschione y Segovia (2005); Darrieu y Bó (1992); Fiora (1933)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b) (*chrysauchenia*); Darrieu y Bó (1992); De la Peña y Bruno (2008); De la Peña y Tittarelli (2011); De Luca (2011b); Galmes et al. (2008b); Maceda y Kin (2001); Noriega et al. (1993); Santillán et al. (2014); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Adela, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1982, 1986); Darrieu y Bó (1992); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia, 09-02-1977)

Mendoza

Citas: Darrieu y Bó (1992)

Observaciones: De la Peña (Las Heras, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Darrieu y Bó (1992); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Massoia (1988k)

Neuquén

Citas: Christie et al. (2004)

Río Negro

Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977, 1978c); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Darrieu y Bó (1992); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Darrieu y Bó (1992); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain (2008a, 2014a, 2014b); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Observaciones: De la Peña (San Agustín del Valle Fértil, dpto. Valle Fértil, 16-01-1982)

San Luis

Citas: Bó (1965b); Casares (1944b); Darrieu y Bó (1992); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1991, 1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 10-01-1982)

Santa Fe

Citas: Antoniazzi et al. (2011); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaud et al. (2019); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Darrieu y Bó (1992); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Quiroga y Llugdar (2019c); Trucco y Caziani (2008)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo et al. (2006, 2013); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán (2000, 2006, 2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán et al. (2006); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2020); Chani et al. (2000); Darrieu y Bó (1992); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2007, 2008c, 2011b); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2005b, 2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Presti y Echevarría (2009)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Zenaida auriculata auriculata (Des Murs, 1847)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977b); Darrieu y Bó (1992); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Harris (2008); Noriega et al. (1990, 1993); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Epuyén, dpto. Cushamen, 01-02-1976)

La Pampa

Citas: Maceda et al. (2001)

Mendoza

Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Milesi et al. (2002); Mezquida y Marone (2001); Naumburg (1933); Olivera et al. (2009); Ordano y Bosisio (2001); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-2004)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1978); Darrieu y Bó (1992); Donázar et al. (1997); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Hiraldo et al. (1995); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Teta et al. (2001); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro

Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992); Contreras (1975); Daciuk (1977c); Darrieu y Bó (1992); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Teta et al. (2001); Trejo et al. 2005a, 2006a, 2006b)

Observaciones: De la Peña (Ñorquínco, dpto. Ñorquínco, 04-02-1976)

Santa Cruz

Citas: Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Hellmayr y Conover (1942); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1904a); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, pdo. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego

Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); McNutt (1981); Olrog (1948)

Islas Malvinas

Citas: Grerory (1994); Wace (1921); Wood (1988, 2006)

Georgias del Sur

Citas: Curtis (1994)

Alta mar

Citas: Seco Pon y Favero (2013)

TÓRTOLA DE COLLAR *Streptopelia risota***Tucumán**

Citas: Mamaní et al. (2017)

PALOMA MONTERA GRANDE *Zentrygon frenata* (Tschudi, 1843)

Otros nombres: Paloma perdiz parda. Paloma tonta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 30-34 cm.

Coloración.

Peso: Salvador (1988): N= 5 (M) X= 310 g (Rango: 265 a 325); N= 5 (H) X= 304 g (Rango: 270 a 320)

Coloración. Pico rojizo. Patas rosadas. Iris amarillento.

Dorso pardo oscuro con reflejos violáceos. Estrecha línea negra a través de los ojos. Otra línea negra pasa por debajo de la cara hasta la nuca. Garganta blanca. Partes ventrales grises parduscas.

Alas y cola pardas. Secundarias ribeteadas de castaño.

COMPORTAMIENTO

Terrícola. Relativamente mansa.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Su canto es un suave y sonoro Buuuuup.. repetido en forma esporádica.

HÁBITAT

Bosques y selvas entre los 1500 y los 2500 m de altura. En invierno a menos altura.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Parte dorsal oscura, ventral más clara. Garganta blanca. Dos líneas negras en la cara.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Zentrygon frenata margaritae Blake, Höy y Contino, 1961 entre los 1500 y los 2000 m de altura en Jujuy y Salta.

**SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN**

Cuatro subespecies. Selva montana en los Andes hasta los 3.000 metros en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Zentrygon frenata margaritae Blake, Höy y Contino, 1961

D.G. Entre los 1.500 y los 2.000 metros de altura en Jujuy y Salta.

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta

Citas: Chebez et al. (1998); Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Subfamilia: Peristerinae

TORCACITA ENANA *Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Palomita de la Virgen. Palomita enana. Tortolita. Tortolita minuta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 14-16 cm.

Coloración. Pico pardo. Patas rosadas. Iris rojo violáceo.

Macho. Cabeza gris. Parte dorsal gris pardusca. Supracaudales grises con el ápice pardo. Ventral color gris rosáceo con el ápice de las plumas del pecho canela.

Alas pardas. Cubiertas alares con puntos azules. Parte ventral de las alas rojiza. Cola con las plumas centrales grises, externas grises con ancha banda negra y las dos distales orilladas de canela.

Hembra. Coloración general parda, más clara en la zona ventral.

Cubiertas alares mayores y secundarias orilladas de blanco.

Alas y cola como el macho.

HÁBITAT

Sabanas, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño muy chico. Rojizo en las alas, notable en vuelo. Manchitas azules en las alas. Cola corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina minuta minuta (Linnaeus, 1766) en Misiones y este de Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Amplio Rango: de distribución desde sur de Méjico hasta extremo noreste de Argentina en 2 áreas discontinuas. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina minuta minuta (Linnaeus, 1766)

Corrientes

Citas: Mazar Barnett y Pearman (2001)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1986c); Partridge (1954)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Un individuo observado por A. Bodrati y J. I. Areta en Península de Andresito, dpto. Gral Belgrano, Misiones, el 19 abril de 2009.

TORCACITA COLORADA *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)

Otros nombres: Palomita castaña. Palomita rojiza. Palomita talpacoti. Tortolita.

DESCRIPCIÓN

Largo: 14-18 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 4 (M) X= 52,1 g (Rango: 50,5 a 53,5)

Salvador (2014a): N= 1 (M) 51,5 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 51,5 g

Coloración. Pico pardo. Patas rosadas. Iris amarillo rojizo.

Macho. Cabeza gris. Parte dorsal castaña rojiza. Garganta blanquecina. Ventral gris rosácea.

Alas pardas oscuras. Cubiertas alares con puntos negros, cubiertas internas negras. Plumas centrales de la cola pardas, externas negras con punta castaña.

Hembra. Similar al macho, pero pardo oliváceo en la parte dorsal y pardo ocráceo ventralmente.

COMPORTAMIENTO

Anda generalmente en pareja. En invierno en grupos.

Alimentación

Ordano et al. (1999). Semillas.

Cintra et al. (1990). **Semillas:** *Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus viridis*, *Brassica nigra*, *Eleusine indica*, *Euphorbia hirta*, *Melinis minutiflora*, *Portulaca oleracea*, *Triticum aestivum*, *Oryza sativa*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Panicum maximun* y Gramíneas. **Frutos:** no determinados.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es similar a la de la Torcacita común, pero en lugar de tener dos sílabas tiene tres. Es un Uhu.hú..Uhu.hú..Uhu.hú..Uhu.hú.. repetido de 4 a 10 veces. Luego de un silencio vuelve a iniciar esta estrofa.

HÁBITAT

Sabanas, bosques, orillas de selvas, orillas de selvas en galería.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

En árboles, arbustos o enredaderas. A baja y mediana altura.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajitas y/o plumitas.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y enero. Nidos ubicados a baja o mediana altura, entre 1 a 3 m del suelo.

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

De la Peña (2013c). Puerto Rico, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 10-02-1973, nido en un arbusto a 2,00 m del suelo, 2 huevos, Santo Pipó, dpto. San Ignacio, Misiones, 2 nidos: 14-10-1981, en arbustos a 2,30 m del suelo, 2 huevos y 2,50 m de altura con 2 huevos, 27-11-1995, Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, en Tala (*Celtis* sp.). a 2,30 m del suelo, 2 pichones. Medidas: diámetro total: de 8 a 9 cm, alto: 2 a 3 cm.

Salvador y Bodrati (2013a). Misiones. Nido.

Nores e Yzurietta en Salvador (2016a). Arroyo Garupá, dpto. Capital, Misiones, 16-12-1984, nido con 2 huevos.

Salvador en De la Peña (2016a). Santo Tomé, dpto. Santo Tomé, Corrientes, 14-10-1984, nido en una

Bougainvillea sp. a 1,00 m de altura, 2 huevos. Apóstoles, dpto. Apóstoles, Misiones, 14-12-1988, nido en un arbusto a 1,50 m del suelo, 2 huevos, Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 05-12-1997, nido en una *Acacia* sp. a 1,90 m de altura, con 2 pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero y Misiones. Nidos.

Uranga, M. (2018). Oberá, dpto. Oberá, Misiones, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos u ovoidales. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 20,0 a 24,0 x 15,5 a 17,0

Di Giacomo (2005h): 21,5 a 23,7 x 16,0 a 18,0

De la Peña (2013c): 21,0 a 23,6 x 16,7 a 17,8

Salvador en De la Peña (2016a): 21,8 a 23,6 x 16,8 a 18,0

X= 22,4 x 16,7 (N= 10)

X= 22,0 x 17,1 (N= 6)

X= 22,7 x 17,4 (N= 4)

Pesos

Salvador en De la Peña (2016a): 3,4 a 3,8

Di Giacomo (2005h):

De la Peña (2013c): 2,6 a 3,0

De la Peña (2013c): cáscaras 0,190 a 0,235

X= 3,5

X= 3,4

X= 2,8

X= 0,222

(N= 4)

(N= 10)

(N= 4)

(N= 6)

Generalidades

De la Peña (1996). Período de incubación, 12 días. Los huevos son puestos en días alternos. Los pichones permanecen en el nido de 10 a 11 días.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Pichones

Observaciones

Bodrati et al. (2006). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Bodrati et al. (2001). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Pagano y Mérida (2009). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.



Depredadores

De adultos: *Accipiter striatus*. Sin datos, Seipke y Cabane (2008)

De huevos y pichones: *Didelphis albiventris* Bodrati (*in litt.* 2019)

Más información:

Hart et al. (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Coloración rojiza en la parte dorsal. Manchitas negras en las cubiertas alares. Cola corta.

La hembra se diferencia de la hembra de la Palomita azulada por tener puntos negros en las alas y en las tapadas internas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811) en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Rioja, norte y este de Santa Fe, La Pampa y noreste de Buenos Aires. Accidental hasta Chubut y en las Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Desde el norte de Méjico hasta este de Peru y Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2001b, 2006b); Bruno y Morici (2009); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky (1983b);

Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pagano et al. (2017a); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, 26-10-1973)

Chubut

Citas: Edelaar y Escudero (2006); Kovacs et al. (2005)

Córdoba

Citas: Di Giacomo et al. (2001); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos

Citas: De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Bruno y Morici (2009); Darrieu (1994); Darrieu et al (2011); De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja

Citas: Spinuzza (2014)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 21-09-1983)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Chebez et al. (1998); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009); Lucero (2013i)

Santa Fe

Citas: De la Peña et al. (2003b); De La Peña (2011f, 2013c); López-Lanús et al. (2013a);

Santiago del Estero

Citas: Nores et al. (1991); Salvador y Eroles (1994); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Barbosa (2014); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Mamaní et al. (2017); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

TORCACITA ESCAMADA *Columbina squammata* (Lesson, 1831)

Otros nombres: Palomita escamada. Palomita escamosa.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18-22 cm.

Coloración. Pico pardo oscuro. Patas rosadas. Iris pardo rojizo.

Cabeza y parte dorsal pardas claras con ápice de las plumas pardo oscuro. Ventral blanquecina con las puntas de las plumas pardas.

Primarias pardas con las barbas internas castañas. Secundarias pardas orilladas de blanquecino. Cubiertas pardas y blancas, teñidas de pardo oscuro. Parte ventral de las alas pardo oscuro y castaño.

Cola con las plumas centrales pardas, las laterales negras con el tercio terminal blanco.

HÁBITAT

Matorrales, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Nido en Misiones.



Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Dorso y parte ventral muy “escamados”. Cola larga.

En vuelo muestra castaño en las alas y las plumas externas de la cola blanco y negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina squammata squammata (Lesson, 1831) en Misiones, Corrientes, Chaco y este de Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies, con poblaciones separadas, una en el norte de Sud América que comprende Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa y Colombia. La otra subespecie se extiende más al sur comprendiendo Brasil, este de Paraguay, este de Bolivia y Argentina.



Isla El Cerrito, Chaco. Fotos: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina squammata squammata (Lesson, 1831)

Chaco

Citas: Bodrati (2016b); Gandoy et al. (2015)

Corrientes

Citas: Bodrati y Pagano (2018); Gandoy et al. (2015)

Formosa

Citas: Gandoy et al. (2015); Gorleri et al. (2011); López-Lanús y Mencia (2017)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Krauczuk (2009); Partridge (1961)

TORCACITA PICUÍ *Columbina picui* (Temminck, 1813)

Otros nombres: Cuyanita. Palomita. Palomita común. Palomita de la Virgen. Palomita de plaza. Palomita torcaza. Picuí. Picu-í. Torcacita. Torcacita chica. Tortolita. Tortolita de la Virgen. Tuku tuku. Ulpishita. Urpila. Urpillita.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 30 X= 47 g (Rango: 41 a 51)

Contreras (1979f): N= 2 (M) 47,5 y 56,4 g; N= 1 (H) 59,0 g

Salvador (1988): N= 9 (?) X= 55,2 g (Rango: 52,5 a 83,3)

Navas y Bó (1990): N= 2(M) 49,3 y 50,0 g

Camperi (1992c): N= 2 (M) 52,5 g; N= 1 (H) 400 g

Blendinger (1999): 45,0 g

Blendinger y Ojeda (2001): X= 46,7 g

Blendinger (2005): X= 46,3 g

Christie et al. (2004): N= 1 (H) 40,0 g

Camperi y Darrieu (2005): N= 7 (M) X= 51,4 g (Rango: 40,6 a 56,2), N= 2 (H) 45,0 y 49,5 g

Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 47,8 g (Rango: 42,7 a 53,7 g

Salvador (2014a): N= 19 (M) X= 49,8 g (Rango: 44,5 a 54,8). N= 17 (H) X= 46,4 g (Rango: 42,0 a 51,5)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 8 (M) X= 50 g (Rango: 45,2 a 56,0), N= 9 (H) X= 46,2 (Rango: 44,7 a 47,5);

N= 3 (?) X= 48,3 g (Rango: 45 a 54,5); N= 4 (H) X= 39,3 g (Rango: 37,7 a 41,0)

Pagano y Salvador (2017): N=2 (M) 42 y 45 g; N=3 (?) 40, 47 y 51 g

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris lila.

Macho. Cabeza gris plumiza. Dorso pardo grisáceo. Garganta blanca. Pecho grisáceo vinoso. Abdomen blanquecino.

Alas pardas grisáceas. Cubiertas alares superiores con manchitas negras azuladas formando una banda. Medianas pardas y blanquecinas. Secundarias negras. Cola parda con las plumas externas blancas.

Hembra. Semejante al macho pero más oscura en la zona dorsal. Más blanquecina ventralmente y sin azulino en la cabeza.

COMPORTAMIENTO

Anda en pareja o formando grupos.

Alimentación

Marelli (1919). Vegetales.

Aravena (1927). Semillas.

Zotta (1934). Semillas. Piedritas.

Olrog (1956a). Semillas. Piedritas.

Martínez et al. (1975). Semillas: *Dichondra repens*, *Erodium* sp.

Klimaitis (1993). Semillas. Vegetales. Piedritas.

Ordano et al. (1999). Semillas.

De la Peña y Pensiero (2003). Semilla de *Chenopodium album*.

Di Giacomo (2005h). Fruto de *Policarpon suffruticosum*.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Frutos de *Morus alba*. Semilla (partida de *Zea mays*). Pan migas o mojado

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Semilla *Amaranthus* sp. *Chenopodium* sp. Gramíneas *Panicum mileaceum*

De la Peña y Pensiero (2017): **Semillas:** Nabiza (*Brassica napus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Sorgo (*Sorghum bicolor*), Brachiaria (*Urochloa plantaginea*)

De la Peña (2019b). Semillas de Trigo (*Triticum aestivum*). Esperanza, 25-08-2018 y 04-09-2018, en un rastrojo.

De la Peña (2019b). Jesús María. Dpto. Colón. Córdoba. 25-02-2016 y 01-03-2016. Come en el suelo semillas de Yuyo blanco (*Urochloa panicoides*)

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto del macho es una voz de dos sílabas que emite de 4 a 10 veces: uhú..

uhú..uhú.. uhú.. uhú.. uhú.. luego de un silencio vuelve a iniciar esta estrofa. Canta durante todas las horas de luz.

HÁBITAT

Sabanas, montes, praderas, áreas rurales y periurbanas, parques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

A baja y mediana altura. Sostenido en ramas de árboles, arbustos, matorrales, enredaderas, cactáceas, sobre plataformas de barro o de palitos de nidos abandonados por otras aves, tirantes o ladrillos en construcciones o sobre postes u otros elementos.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de tallos de yuyos, gramíneas, raicillas. Internamente plumas.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.

Barrows (1884c). Concepción del Uruguay, Entre Ríos, nido desde noviembre a abril.

Holland (1892). Buenos Aires. Nido.

Gibson (1918). Buenos Aires. Nido.

Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos en 1895.

Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.

Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone 2 huevos, a veces 3.

Wilson (1924). Santa Fe. Nido.

Friedmann (1927). Tucumán. Nido.

Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires 18-10-1916 y Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 03-11-1921, 16-10-1922, 24-01-1925, 02-10-1926 y 17-10-1926, nidos con huevos.

Castellanos (1931). Valle de los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba, enero de 1917, nido con 2 pichones.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, anidaron varias parejas en una quinta, donde hasta entonces no las hubo.

Masramón (1977). Ubica el nido a baja altura.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.

Contino (1980). En el noroeste nidifica en primavera, ubica en nido en los árboles, pone 2 ó 3 huevos.

Contreras (1980o). Gustavo André, dpto. Lavalle, Mendoza, enero de 1978, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, se localizaron 15 nidos en el año 1992.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.

Mezquida (2000). Mendoza. Nido.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.

Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.

Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.

Pautasso (2002b). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 12 nidos entre el 23-11-1999 y el 05-11-2000, con huevos o con pichones.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 11 nidos entre octubre y febrero.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre mediados de agosto y marzo.

Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Antoniazzi et al. (2010). Santa Fe. Nido.

Fandiño y Pautasso (2012). Santa Fe. Nido.

De la Peña (2013c). Desde el 30-10-1970 hasta el 09-11-2004, se localizaron 256 nidos, de los cuales 247, estaban en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. El nido más bajo a 0,30 m del suelo y el más alto a 4,70 m. Ubicados en arbustos o en árboles, excepto uno en un tirante de una construcción, otro en poste de alambrado y el 11-12-1982, en Villa Elisa, dpto. Colón, Entre Ríos, en el asiento de un arado. Pone durante todo el año, con mayor cantidad de nidos entre setiembre y enero. Medidas: diámetro total: de 6 a 10 cm; profundidad: 0,50 cm y alto: 2 a 2,5 cm.

Salvador y Bodrati (2013a, 2013c). Córdoba. Nido.

Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 05-07-2014, un pichón muerto en el nido y un huevo en el suelo.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, tres nidos con 2 huevos cada uno.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.

Bodrati en Salvador (2016a). Nidos en *Ligustrum* sp. en calles de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro, Buenos Aires entre los años 1975 al 1990.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 315 nidos, posturas en todos los meses del año (con un pico entre octubre y enero), ubicados en todo tipo de árboles y arbustos y en construcciones humanas, entre 0,4 y 8 m de altura, (X= 2,8). Ponen 2 huevos.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

De la Peña (2019b). Esperanza. Dpto. Las Colonias, Santa Fe. 05-12-2016. Nido en Cardo del caballo (*Carduus thoermeri*) a 0,70 m del suelo. 2 huevos. 30-10-2017. Nido en Aromo (*Vachellia caven*) a 1,60 m. 2 huevos. 28-09-2018. Esperanza. 8 km al NO. Nido en Sauco (*Sambucus australis*), a 1,70 m. 2 huevos. Nació un pichón y a los pocos días desapareció.

Quiroga y Llugdar (2019c). Varios nidos en Santiago del Estero.

Huevos

Pone 2, raramente 3 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 21,0 a 26,0 x 16,5 a 18,5

Gibson (1920): 24,0 x 17,0

Serié y Smyth (1923): 23,0 a 26,5 x 18,0 a 19,0

Smyth (1927): 22,0 a 26,0 x 16,0 a 20,0

Castellanos (1931): 22,0 x 17,0

Contino (1980): 22,0 a 23,0 x 17,0 a 18,0

Alabarce y Antelo (1998): 22,3 x 18,0

Di Giacomo (2005h): 20,8 a 25,5 x 15,8 a 17,9

X= 23,6 x 17,2 (N= 34)

De la Peña (2013c): 21,6 a 26,6 x 16,6 a 19,0

X= 23,0 x 17,8 (N= 30)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 21,8 a 25,9 x 16,3 a 18,9

X= 23,6 x 17,6 (N= 82)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 3,2 a 4,8

X= 3,9 (N= 68)

Di Giacomo (2005h): 2,7 a 4,2

X= 3,6 (N= 34)

De la Peña (2013c): 3,3 a 4,7

X= 3,8 (N= 21)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,200 a 0,249

X= 0,222 (N= 6)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico claro con banda subapical negra y punta blanca.

Cavidad bucal rosada. Abundante plumón crema. Patas grises.

3 días. Ojos cerrados. Mandíbula gris. Maxilar claro. Anillo negro casi en la punta. Piel morada, ventralmente es amarillenta. Plumón crema.

6 días. Abre los ojos. Aparecen las láminas en alas y cola. Ventralmente plumas claras.

8 días. Cañones alares grises. Láminas de las plumas secundarias orilladas de ocráceo. Láminas de las plumas primarias oscuras. Cubiertas alares orilladas de blanquecino. Ventralmente blanquecina. Cubiertas menores marrones. Vainas y láminas de las plumas externas de la cola blancas.

Se nota más la punta del pico blanquecina. En la cola cañones chicos, los externos blancos. Plumón cremoso.

9 días. La base de la cola gris y la mitad terminal de las plumas externas, blanco.

11 días. Plumas externas de la cola blancas. Alas: primarias oscuras con blanco.

Si se lo molesta vuela.

Días de vida	Medidas						
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina			Pico
1						1,0	1,2
6	2		1,8		1	1,6	0,8
8	2,4	1,0-1,3	1,8	0,7	1,8	1,7	2,6

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 12 a 13 días. Los pichones permanecen en el nido de 13 a 14 días.

De la Peña (2013c). Demora en construir el nido de 4 a 6 días, pero puede ser variable. Pone los huevos en días alternos. El período de incubación es de 12 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido de 12 a 13 días.

Otros

Urcola (2011). Un ejemplar con Albinismo.

Pereyra (1937c). Un ejemplar con Leucismo total.

Pereyra (1937b). Un ejemplar Albino completo.

Dinelli (1941); Antoniazzi et al. (2011); Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Contreras (1980o). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredadores

De adultos: *Circus cinereus* en Buenos Aires, Bó et al. (2000c), en Córdoba, Salvador (2017a), *Accipiter striatus*. Sin datos, Seipke y Cabanne (2008), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Parabuteo unicinctus* en Córdoba, Salvador en De la Peña y Salvador (2010) y Salvador (2012), *Tyto alba* en Misiones, Massoia (1988k), en Buenos Aires, Morici (1990a, 2009e), en Chubut, García Esponda et al. (1998), *Megascops choliba* en Santa Fe, De la Peña en De la Peña y Salvador (2010), *Glaucidium brasilianum* en Buenos Aires, Pereyra, C. B. de (1927), en Chaco, Carrera et al. (2008), *Falco sparverius* en La Pampa, Sarasola et al. (2003), *Falco femoralis* en Buenos Aires, Bó (1999), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), Salvador (2012), en La Pampa, Liébana (2015), *Falco peregrinus* en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Glaucidium brasilianum* en Buenos Aires y Misiones, Bodrati (*in litt.* 2019), *Parabuteo unicinctus* y *Accipiter striatus* en Buenos Aires, Bodrati (*in litt.* 2019), Quiroga (2017b), *Rupornis magnirostris* en Tucumán.

De pichones: *Rupornis magnirostris* en Buenos Aires, Zotta (1934), en Buenos Aires, Pereyra (1938b), *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)

De huevos: *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b), *Pseudoseisura lophotes* en Córdoba, Salvador y Bodrati (2013c), *Pitangus sulphuratus* en Córdoba, Salvador y Bodrati (2013c)

Más información:

De la Peña (2019a)



Esperanza. Santa Fe. 12-12-2004
Nidos superpuestos



Esperanza. Santa Fe. 14-11-2007



Esperanza. Santa Fe. 17-01-2003



Esperanza. Santa Fe. 17-12-2007



Esperanza. Santa Fe. 15-01-1999



Esperanza. Santa Fe. 30-09-2007



Jesús María. Córdoba. 05-05-2007



Villa Elisa. Entre Ríos. 11-12-1982



Esperanza. Santa Fe. 15-01-1999
Nido en poste de alambrado



Esperanza. Santa Fe. 11-04-2008

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Una línea blanca y otra negra se notan cuando las alas están plegadas. Manchitas negro-azuladas en las cubiertas alares. Plumas externas de la cola blanca, visibles en vuelo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina picui picui (Temminck, 1813) desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Su área de distribución se extiende por el centro de Sud América al este de los Andes, hasta la Patagonia y al oeste de la cordillera al centro de Chile. Comprende: Brasil con poblaciones separadas en el este y el oeste, Bolivia, Paraguay, Uruguay, centro de Chile y Argentina. En invierno migra al norte alcanzando Perú.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina picui picui (Temminck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bó (1999); Bó et al. 2000c); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Llleveau (2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1932c, 1933b, 1938b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra, C. B. de (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1934); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Carrera et al. (2008); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut

Citas: Camperi (1998); García Esponda et al. (1998); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Nores y Yzurieta (1981); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Trelew, dpto. Rawson, 31-11-2000)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1931); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 2012, 2016b, 2017a); Salvador y Bodrati (2013a, 2013c); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990b); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Barrows (1884c), Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933); Mamaní et al. (2018)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937b); Sarasola et al. (2003); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia, 16-01-1982)

Mendoza

Citas: Blendinger (1999,2005); Blendinger y Ojeda (2001); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2001); Olivera et al. (2009); Reed (1921); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Massoia (1988k)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Gorgoglione (2005); Nores e Yzurieta (1982b); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Picún Leufú, dpto. Picún Leufú, 20-11-1998)

Río Negro

Citas: Camperi y Darrieu (2005); Contreras et al. (1980b); Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. General Roca, 28-11-1998)

Salta

Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Ordano et al. (1999); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Blendinger (2005); Blendinger y Ojeda (2001); Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Observaciones: De la Peña (San Agustín del Valle Fertil, dpto. Valle Fertil, 16-01-1982)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz

Citas: Chebez et al. (1998a)

Santa Fe

Citas: Antoniazzi et al. (2011); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaldo et al. (2019); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Quiroga y Llugdar (2019c); Trucco y Caziani (2008)

Observaciones: De la Peña (Malbrán, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo (1999); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán (2005); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández et al. (2018); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2020); Chani et al. (2000); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri y Chani (2005); Juri (2007); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Marigliano et al. (2005b, 2017); Ortiz et al. (2011b); Navarro et al. (2000); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Presti y Echevarría (2009); Salvador y Bodrati (2013a); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

PALOMITA AZULADA *Claravis pretiosa* (Ferrari-Pérez, 1886)

Otros nombres: Palomita azul. Palomita azul menor. Palomita azulada menor. Palomita elegante. Palomita plomiza. Picuhí. Pihení. Pihuí. Tórtola azul.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18-23 cm.

Peso: Oniki y Willis (1999): N= 48 (M) X= 71 g (Rango: 58 a 103); N= 52 (H) X= 65,6 g (Rango: 41 a 93)

Coloración. Pico amarillo. Patas rojizas. Iris rojo amarillento.

Macho. Dorso gris azulado. Garganta blanquecina. Parte ventral gris pálida.

Primarias pardas oscuras. Cubiertas alares grises plumizas con puntos negros.

Plumas centrales de la cola grises plumizas, externas negras.

Hembra. Dorso y pecho pardos. Garganta y vientre blanquecinos.

Alas pardas con grandes puntos castaños.

Cola con las plumas centrales castañas, externas negras.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria, en pareja o formando pequeños grupos

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una repetición de una suave y corta nota: Uup...uup...uup...uup...

HÁBITAT

Bosques y bordes de selvas, periferia de poblados, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997). Kala et al. (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. El macho gris plumizo con puntos negros en las alas. La hembra parda con puntos castaños en las alas y cola castaña y negra.

Diferenciarla de la Palomita morada y la hembra de la hembra de la Palomita colorada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886) en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Desde Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Bernini (2017)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Klavins (2004b)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Chaco, dptos Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, machos y hembras reiteradamente observados en enero de 2010 por A. Bodrati y L. G. Pagano.

Corrientes

Citas: Giraudo (1996)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Nores (1992)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Navas y Bo (1988a); Straneck (1990h)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Parque El Rey, dpto. Anta, 28-11-1978)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Quiroga et al. (2020a)

PALOMITA MORADA *Claravis geoffroyi* (Temminck, 1811)

Otros nombres: Paloma morada. Paloma plumiza. Paloma de Geoffroy. Palomita. Palomita ala barrada. Palomita azulada. Palomita gris azulada. Palomita plumiza. Pararú. Tórtola morada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19-23 cm.

Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (M) 85 g

Coloración. Pico negruzco. Patas rojas. Iris pardo oscuro.

Macho. Azulado grisáceo. Frente blanquecina. Abdomen y subcaudales blancos. Banda azul en las cobijas menores. Banda castaña rojiza sobre las cobijas medianas y las mayores. Estas bandas están orilladas de negro azulado.

Alas pardas. Las dos plumas centrales de la cola son grises azuladas, las restantes blancas con la base gris.

Hembra. Pardo rojiza, más clara en la frente, garganta y abdomen. Banda azul en las cobijas medianas y mayores. Remeras pardas con estrecho margen rojizo. Plumas centrales de la cola pardas rojizas, las externas grisáceas en la base, negras en el medio y rojizas en la punta.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Macho azulado con bandas rojizas en las alas y las plumas externas de la cola blancas. La hembra parda rojiza, con igual modelo de alas que el macho pero con las plumas externas de la cola con punta rojiza.

Se diferencia de la Palomita azulada por tener barras en las cubiertas alares (en lugar de puntos) y distinta coloración de cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Claravis geoffroyi (Temminck, 1811) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Endémica de la Selva Atlántica en el este Paraguay, sur este de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Areta et al. (2009); Bertoni (1913); Chebez (1996a); Chebez y Casañas (2000); Navas y Bó (1986c); Tarak y Christie en Olrog (1979)

PALOMITA MOTEADA *Metriopelia ceciliae* (Lesson, 1845)

Otros nombres: Palomita boliviana. Tortolita moteada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 16-17 cm.

Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris violáceo.

Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.

Región dorsal parda grisácea con la punta de las plumas del dorso y cubiertas alares bordeadas de blanco ocráceo.

Garganta blanquecina. Corona, cuello y superior del pecho vinosos. Resto de la parte ventral ocráceo.

Remeras pardas oscuras. Las secundarias con ápice blanco ocráceo. Plumas centrales de la cola pardas con tono castaño, las externas casi enteramente negras con punta blanca castaña y las más exteriores con la lámina externa blanca.

La **hembra** tiene el pecho grisáceo.

HÁBITAT

Estepas pedregosas arbustivas entre los 2500 y los 3500 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizó nido en Jujuy.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Plataforma de palitos.

Uranga en De la Peña (2019b). Yavi, dpto.Yavi, Jujuy, 08-02-2018. Nido entre la pared y las tejas de una construcción, a 5 m del suelo. El hueco presentaba una profundidad de 3 m aproximadamente. En el fondo se encontraba el nido con el ave.



Yavi. Jujuy. 12-03-2014 Foto: Cynthia Arenas



Yavi. Jujuy. 08-02-2018. Fotos: Máximo Uranga

Más información:

Baptista et al. (1997). Goodall, et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Alas oscuras jaspeadas de blanquecino, al igual que el dorso. Plumas externas de la cola negras con puntas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Metriopelia ceciliae zimmeri J. L. Peters, 1937 entre los 2500 y los 3500 m de altura en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Andes desde el extremo norte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina entre los 2000 y 4500 metros.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Metriopelia ceciliae zimmeri J. L. Peters, 1937

Jujuy

Citas: Abadie (1991); Areta y Monteleone (2011); Blendinger (1998); Bó (1961); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Mamaní et al. (2018); Mazar Barnett et al. (1998c); Moschione et al. (2011); Narosky (1988); Veiga et al. (2014)

Salta

Citas: Bó (1961); Moschione et al. (2013); Pearman (2001); Veiga et al. (2014)

PALOMITA DE OJOS DESNUDOS *Metriopelia morenoi* (Sharpe, 1902)

Otros nombres: Palomita de Moreno. Palomita ojos desnudos. Tortolita.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17 cm.

Peso: Camperi y Darrieu (2004): N= 2 (M) 55,3 y 60,7 g

Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris blanquecino amarillento.

Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.

Enteramente parda.

Alas pardas oscuras. Plumas centrales de la cola pardas; los dos pares siguientes pardos en la base y negros hacia el extremo; las más externas negras con las puntas blancas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1932). Piedritas. Semillas.

Olrog (1956). Semillas.

HÁBITAT

Estepas pedregosas arbustivas entre los 2000 y los 3200 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									

Casquete simple y poco elaborado, hecho de gramíneas.

Hartert y Venturi (1909). Nidifica en paredes arcillosas de las quebradas. (G. A. Baer)

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, un nido se hallaba en una barranca de tierra, sobre un lecho seco, en un hueco a 1,9 m de altura y de 15 cm de boca y a 30 cm de profundidad. Es un casquete simple y poco elaborado, hecho de gramíneas y de 11 cm de diámetro. Contenía un pichón de unos 5-6 días de nacido.

Salvador (2015). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 03-03-1983, dos nidos en barranca de tierra, sin postura.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Color general pardo con las alas oscuras. Cola oscura con punta blanca. Amarillo naranja alrededor de los ojos.

Diferenciarla de la Palomita dorada.

Depredadores

De adultos: *Falco femoralis* en Tucumán, Ortiz y Capllonch (2007)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Metriopelia morenoi (Sharpe, 1902) entre los 2500 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y noroeste de Mendoza.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Endémica del noroeste de Argentina en ambiente árido montañoso.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Hellmayr y Conover (1942); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Mamaní et al. (2018); Salvador (2015); Zotta (1932)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907); Koslowsky (1895b); Nores (1995)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019); Lucero (2012b); Martínez et al. (2009)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996a); Lucero (2013i); Ortiz et al. (2016)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Areta y Monteleone (2011); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch et al. (2011b,2020); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz y Capllonch (2007)

PALOMITA CORDILLERANA *Metriopelia melanoptera* (Molina, 1782)

Otros nombres: Cuyaca. Paloma serrana. Palomita alinegra. Palomita de alas negras. Palomita del cerro. Palomita de la sierra. Palomita serrana. Tórtola cordillerana. Tortolita alinegra.

DESCRIPCIÓN

Largo: 21-23 cm

Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 100 g

Navas y Bó (2001): N= 52 (M) X= 100,7 g (Rango: 89,1 a 114,1); N= 4 (H) X= 89,8 g (Rango: 86,0 a 96,1)

Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris blanco plateado.

Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.

Color general pardo grisáceo, más claro en el abdomen.

Remeras pardas oscuras. Cobijas alares menores pardas grisáceas con fino margen blanquecino. Borde anterior de las alas blanco. Subcaudales negras. Cola con las plumas centrales pardas; externas negras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1932). Semillas.

Reynolds en Humphrey et al. (1970). Semillas.

HÁBITAT

Estepas y quebradas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Tiene forma de casquete bien elaborado, construido con tallos e internamente unas pocas cerdas y plumas.

Reed (1921). Mendoza. Nido.

Peters (1923). Huanu-Luan, 25 de Mayo, Río Negro, 14-11-1920, nido con un huevo.

Wetmore (1926a). Río Negro. Nido.

Budin (1931). Jujuy. Nido.

Salvador (1992). El Infiernillo, dpto. Taquí del Valle, Tucumán, el 05-12-1987 un nido a 7 m del suelo en un arbusto, en una quebrada húmeda. El nido tiene forma de casquete bien elaborado, construido con tallos e internamente unas pocas cerdas y plumas. Mide 11 x 14 cm de diámetro externo, 7 cm en el interno, 5,5 cm de alto y 2,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.

Nores, M. y D. Yzurieta en Salvador (1992). En el Parque Nacional Laguna Blanca, dpto. Zapala, Neuquén, localizaron el 18-01-1982 un nido con 2 huevos y el 03-02-1982 otro con 2 pichones.

Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.

Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional El Leoncito, San Juan, 21 de enero se encontró un nido cerca del Puesto de Lata del Arroyo del Medio (3350 msnm): activo con 2 huevos blanco mate immaculados de 33 mm de largo y un polo más agudo, incubados. El nido estaba ubicado en una Adesmia a 1,60 m de altura del suelo. Realizado con ramitas secas y en el fondo plumas de la especie. El diámetro del nido era de 9,3 cm y una profundidad de 4 cm.

Quiroga et al. (2020a). Taquí del Valle, dpto. Taquí del Valle, Tucumán, el 24-02-2014, un nido con 2 huevos. El Infiernillo, dpto. Taquí del Valle, 03-12-2017, nido con pichón muerto.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Salvador (1992): 29,9 x 21,1 y 32,0 x 20,8

Bodrati (*in litt.* 2019): largo 33,0

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Alas oscuras con mancha blanca en la curvatura anterior, visible en reposo y en vuelo. Cola oscura. La mancha blanca en las alas la diferencia de la Palomita dorada y de la Palomita ojo desnudo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Metriopelia melanoptera melanoptera (Molina, 1782) por el oeste del país desde Jujuy a Tierra del Fuego.

Observada además en Córdoba, La Pampa y en las proximidades de Comodoro Rivadavia.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Metriopelia melanoptera melanoptera (Molina, 1782)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Kovacs et al. (2005); Petracci et al. (2004)

Observaciones: De la Peña (Leleque, dpto. Cushamen, 01-02-1976)

Córdoba

Citas: Casañas, H. a J. Heredia en Salvador et al. (2017); Frenzel (1891)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Fiora (1933); Mamani et al. (2018); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Chorrillos, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Pampa

Citas: Babarskas y Gil (1996); Chebez et al. (1998); Siegenthaler (2004)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Chebez (2005); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Barros (1930); Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Navas y Bó (2001); Olivera et al. (2009); Pereyra Lobos (2002); Pereyra (1942a); Sanzín (1918); Sosa (2005); Steullet y Deautier (1939); Roig (1965); Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Christie et al. (2004); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Salvador (1992); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (San Martín de los Andes, dpto. Lácar, 29-01-1976; Confluencia, dpto. Los Lagos, 20-11-1998)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Las Bayas, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976; Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cachipampa, dpto. Cachi, 30-11-1978)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996); Lucero (2013i); Navas y Bó (2001); Nores (1995); Ortiz et al. (2013, 2016)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2003, 2005e);

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Areta y Monteleone (2011); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b,2020); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Quiroga et al. (2020a); Salvador (1992)

PALOMITA DORADA *Metriopelia aymara* (Prévost, 1840)

Otros nombres: Palomita aymará. Palomita de alas doradas. Palomita de la sierra de alas manchadas. Tórtola dorada. Tortolina.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17-19 cm

Peso: Fiora (1933): N= 6 X= 61,0 g (Rango: 60,0 a 62,0)

Contino (1980): 63,0 g

Navas y Bó (2001): N= 3 (M) X= 63,5 g (Rango: 59,3 a 69,5); N= 2 (H) X= 57,2 y 58,9 g

Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris pardo.

Enteramente parda grisácea, con tinte rosado en la zona ventral. Garganta blanquecina. Centro del abdomen y subcaudales ocráceos.

Primarias pardas oscuras con base rojiza en la barba interna. Cubiertas alares con puntos dorados. Mancha canela en la parte ventral de las alas.

Cola con las plumas centrales grisáceas, laterales negras. Supracaudales muy largas, casi cubriendo la cola.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1932). Piedritas. Semillas.

Olrog (1956). Semillas.

HÁBITAT

Estepas y quebradas entre los 3000 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N		

Nido poco elaborado, oculto, en el suelo entre los arbustos.

Contino (1980). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, comienza a nidificar en octubre. Construye un nido rústico en el suelo entre los arbustos de tola. Pone 2 huevos.

Salvador (2015). Cuesta de Lipan, dpto. Tumbaya, Jujuy, 26-02-2007. Nido en el suelo oculto por una mata. Elaborado con tallitos, gramíneas y detritos vegetales. Mide 12 cm de diámetro y una profundidad de 2 cm. Contenía 2 pichones.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Contino (1980): 23,0 a 24,0 x 17,2 a 17,4

Peso

Contino (1980): 4 (N=2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Parda grisácea con las alas y la cola oscuras. Puntos dorados en las cubiertas alares. Mancha canela en la parte ventral de las alas. Cola corta.

Se diferencia de la Palomita ojo desnudo por carecer de blanco y tener puntos dorados y manchas canelas en las alas.

Ver además Palomita cordillerana.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Metriopelia aymara (Prévost, 1840) entre los 3000 y los 4000 m de altura, desde Jujuy hasta Neuquén.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995); Steullet y Deautier (1935-1946)

Observaciones: De la Peña (Minas Capillitas, dpto. Angalgala, 08-02-1977)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Mamaní et al. (2018); Salvador (2015); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Cieneguillas, dpto. Santa Catalina, 10-02-1983)

La Rioja

Citas: Koslowsky (1895b); Nores (1995)

Mendoza

Citas: Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Holmberg (1898); Navas y Bó (2001); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942); Roig (1965)

Neuquén

Citas: Veiga y Bianchini (2017)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995); Vides Almonacid (1990)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996); Lucero (2013i); Navas y Bó (2001); Ortiz et al. (2013, 2016)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995)

ORDEN: CUCULIFORMES

CUCULILLOS, ANÓES Y PIRINCHO

FAMILIA: CUCULIDAE

Aves de alas cortas y cola larga. Tienen dos dedos de las patas dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás.

Algunas especies son parásitas y en otras varias hembras ponen en un mismo nido.

Frecuentan praderas, arboledas, parques, montes y selvas.

Construyen el nido sostenido en matorrales, ramas en los árboles, arbustos, a veces cubiertos por enredaderas, construcciones. Una especie además en juncuales, espadañales, recipientes, molinos.

Emplean en la construcción palitos, pajitas, líquenes, tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas, hilos, flores.

La postura es de 3 ó 4 huevos, pero según la especie pueden ser más.

Algunas especies son parásitas y en otras varias hembras ponen en un mismo nido.

Se alimentan de insectos, gusanos, pequeños reptiles, anfibios, pichones de aves.

Frecuentan praderas, arboledas, parques, áreas rurales, poblaciones, montes y selvas.

Subfamilia: Cuculinae

CUCULILLO CHICO *Coccyua cinerea* Vieillot, 1817

Otros nombres: Ceniciento. Cuculillo ceniciento. Cuculillo de ojos colorados. Cuculillo gris. Pavita de monte. Pequeña urraquita. Urraca chica.

DESCRIPCIÓN

Largo: 23-25 cm.

Peso: Contreras (1979f): 1 (M) 34,8 g

Contreras (1983a) N= 1 (M) X= 47,5 g; N= 1 (?) 54,0 g

Blendinger (2005): X= 41,0 g

Salvador (2014a): N= 2 (M) X= 52,9 g (Rango: 51,6 a 54,3); N= 3 (H) X= 50,8 g (Rango: 49,8 a 51,8)

Coloración. Pico negro. Patas grises. Anillo ocular rojo. Iris rojo.

Cabeza gris plumiza. Dorso gris pardusco. Garganta y pecho grises parduscos claros. Abdomen blanquecino ocráceo. Vientre y subcaudales amarillentos.

Alas pardas. Cola gris pardusca oscura con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario. Se desplaza por la parte media de los árboles.

Alimentación

Aravena (1928). Coleópteros. Lepidópteros (larvas) (*Colias*). Piedritas. Vegetales.
 Zotta (1940). Oruga (Mariposa, *Hylesia nigricans*).
 De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Arácnidos. Orugas.
 Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Lepidoptera (orugas velludas y verdes). Mantodea (Mantidae). Othoptera (Acridiidae, Tettigonidae).
 Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un áspero: cherro.cherro.cherro.cherro. lo repite de 3 a 6 veces en forma esporádica.

HÁBITAT

Sabanas, montes.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

En arbustos o árboles, a veces cubiertos por enredaderas.

Expuesto o semioculto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas. Internamente pajitas, nervaduras y/u hojas.

Girard (IML). Leales, dpto. Leales, Tucumán, 05-11-1925, nido con 3 huevos. Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 24-02-1932, nido con 3 huevos.

Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, comienzan a criar a fines de octubre, hacen el nido en arbustos a unos 2,5 m del suelo, ponen huevos blancos.

Goodall (1923). Estancia La Ethel, Buena Esperanza, dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, diciembre de 1912, 3 nidos en chañares, con 2 o 3 huevos.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, a finales de diciembre se encuentran nidos, generalmente con 3 huevos.

Mezquida (2000). Mendoza. Nido.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en construcción a principios de noviembre, el 9 del mismo mes, un nido con un huevo y a fines del mes, otro con pichones.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y diciembre. Se localizaron 5 nidos, ubicados entre 1,70 y 3,50 m del suelo.

Salvador (2011). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 16 nidos, a una altura que varió de 1,40 a 3,10 m del suelo. Pone de noviembre a febrero, 2 ó 3 huevos por nido.

De la Peña (2013c). Se hallaron en total 19 nidos, 15 nidos en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, entre el 06-12-1979 a 29-10-2004, 2 en Grutly, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 16-12-1972 y 25-03-1972 y 2 el 01-11-1972 en Aguará, dpto. San Cristóbal, Santa Fe. Los nidos tenían de 1 a 4 huevos y hasta 3 pichones. Posturas desde octubre a marzo. Nido más bajo a 1,50 m, más alto a 5,00 m. Los nidos miden: diámetro total: de 10 a 15 cm, diámetro interno: 8 cm, alto: de 3 a 8,5 cm y profundidad: de 0,5 a 3,5 cm.

Salvador en De la Peña (2016c). Bell Ville, dpto. Unión, Córdoba, 01-12-1983, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 1,8 m de altura, con 2 pichones y un huevo infértil. Morrison, dpto. Unión, Córdoba, 17-12-1988, un nido en una *Acacia caven*, a 1,6 m de altura, con 3 huevos incubados. Villa Giardino, dpto. Punilla, Córdoba, 22-11-2005, un nido en un *Schinus* sp. a 1,4 m de altura, con 3 huevos frescos.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Bodrati (*in litt.* 2019). Dos nidos en la Reserva Natural e Histórica Vuelta de Obligado, San Pedro, Buenos Aires 19 octubre de 1995, nido a 2,2 m de altura en un tala (*Celtis ehrenbergiana*) apoyado y trabado en una enredadera (*Clematis* sp.), 3 huevos incubados por el adulto que al salir mostro la ubicación del nido. Dos horas después

regresó y continuó incubando. El 24 de noviembre de 1996, en un sector muy cercano al nido del año anterior, dos huevos frescos, sin incubar y postura incompleta, durante más de 2 horas no se acercaron adultos. Al día siguiente un adulto incubaba y al ser espantado había 3 huevos. Estaba en un renuevo de Tembetari (*Fagara rhoifolia*) a 1,7 m de altura en un sector de denso chilcal (*Baccharis* sp.)

Huevos

Pone 3 ó 4 huevos. Ovoidales o elípticos. De color blanco.



Medidas

Goodall (1923): 25,5 x 20,5

Pereyra (1937b): 29,0 x 22,0

Hartert y Venturi (1909): 23,0 a 25,0 x 17,5 a 20,0

Di Giacomo (2005h): 23,6 a 28,2 x 18,5 a 19,6

X= 24,7 x 19,0 (N= 8)

Salvador (2011): 25,1 a 27,7 x 18,6 a 21,6

X= 26,2 x 20,7 (N= 35)

De la Peña (2013c): 24,4 a 26,4 x 18,3 a 21,5

X= 25,4 x 19,4 (N= 10)

Salvador en De la Peña (2016c): 25,2 a 27,4 x 19,8 a 21,2

X= 26,3 x 20,3 (N= 4)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 4,0 a 5,4

X= 4,7 (N= 8)

Salvador (2011): 5,8 a 7,3

X= 6,7 (N= 24)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,389 a 0,531

X= 0,452 (N= 7)

PICHONES

Descripción

Salvador (2011). Nacen con los ojos entreabiertos. Piel negruzca con tinte verdoso, cubiertos con plumón, tipo cerda, de color ocráceo acanelado con puntas cremas. Pico gris, interior de la boca rojo pálido con puntos blancos en el paladar y en la base de la lengua. Patas grises.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos semiabiertos. Piel oscura, verdosa. Plumón largo, gris claro. Comisura y pico color natural. Paladar rosado con seis puntos blancos, cuatro grandes y dos chicos y dos en la lengua. El resto de la cavidad bucal y la lengua rosados.

3 días. Ojos abiertos, marrones. Patas oscuras. Gritan. Pico gris oscuro. Comisura más clara. Escaso plumón gris claro. Piel oscura. Pliegues verdosos. Vainas de primarias grises. Apenas se notan las láminas.

6 días. Aparecen las láminas de las plumas ventrales, blancas. Flancos ocráceos-canelas. Las láminas de las plumas de la cabeza y dorso, cubiertas alares y cola, pardas.

7 días. Mancha negra en la punta de la lengua y una mancha redonda y otra transversal en la parte superior y posterior.

Tiran la cabeza hacia atrás hasta tocar el dorso.

8 días. Emplumado. Pico negro. Dorsalmente gris pardusco. Garganta y pecho, gris claro. Abdomen blanquecino ocráceo. Alas pardas. Cola gris pardusca.

Si se los molesta se van del nido.

9 días. Plumaje de adulto (sin blanco en la cola).

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas									
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0,5	0,8	1,2							3,6
2	0,6	1,0	1,8							7,5
3	0,6	1,3	2,0	0,2						11,7
4	0,7	1,5	2,1	0,4						13,0
5	0,8	1,7	2,3	0,7		0,5		0,4		14,0
6	1,0	1,7	2,4	0,8				0,7		16,0

8	1,0	1,7	2,4	1,0	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	18,7

Peso al nacer

Salvador (2011): 4,9 a 5,8 X= 5,5 (N= 6)

Generalidades

Salvador (2011). El período de incubación es de 13 a 14 días y la permanencia de los pichones en el nido de 10 a 11 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 8 días. Pone los huevos en días corridos. El período de incubación es de 12 a 13 días y la permanencia de los pichones en el nido de 13 a 15 días.

De la Peña (2013c). El nido muy sucio por las materias fecales, a los 9 días de edad.

Los padres les traen orugas, insectos y arañas.

Observaciones

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Bodrati et al. (2006). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Más información:

De la Peña (2019a)



Esperanza. Santa Fe. 04-11-1999



Esperanza. Santa Fe. 04-11-1999



Esperanza. Santa Fe. 11-02-2008



Esperanza. Santa Fe. 12-11-2011

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico negro. Ojos rojos. Coloración general gris, más clara en la zona ventral. Flancos y abdomen ocráceos.

Diferenciarlo del Cuculillo de ojos colorados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coccyua cinerea Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en el sur Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En el invierno austral migra (migrador austral) a Bolivia, oeste de Brasil y sur de Perú.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Contreras (1983a); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1924); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999); White (1882)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Cabanis (1878); Castellanos (1932); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990c); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes

Citas: Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Marateo et al. (2009); Serié y Smyth (1923)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja

Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Blendinger (2005); Contreras (1983a); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); López de Casenave y Marone (1996); Marone (1991, 1992a, 1992b)

Neuquén

Citas: Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016); Salvador y Narosky (1987)

Salta

Citas: Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero

Citas: Codesido y Bilenca (2000); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

TINGAZÚ *Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Alma de gato. Anó colorado. Anó del monte. Cachó. Gallo del monte. Gato de monte. Güirá-payé. Pirincho marrón. Urraca colorada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 4 X= 112 g (Rango: 110 a 115)

Contreras (1979f): N= 3 (H) X= 115,2 g (Rango: 92 a 134)

Coloración. Pico amarillo verdoso. Patas grises. Iris rojo.

Frente y corona pardas grisáceas. Nuca y parte dorsal castañas. Garganta y zona anterior del cuello castaños con suave tono rosado. Resto de la parte ventral gris plomizo.

Alas castañas.

Cola castaña con la punta de las plumas externas blanca. Ventralmente es negra con blanco en el ápice de las plumas.

COMPORTAMIENTO

Salta y se desplaza entre las ramas de los árboles, en la parte media y alta.

Alimentación

Bodrati (2006b). *Plinia trunciflora* (Fruto)

Bodrati y Haene (2008). *Allophylus edulis* (Fruto)

Repenning et al. (2009). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae). Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera Cicadidae, Fulgoridae). Hymenoptera (Pergidae). Lepidoptera. Orthoptera (Acrididae, Tettigonidae). **Arácnidos:** Araneidae.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es una sucesión de cortos y silbados Juit.juit.juit.juit.juit.juit. Esporádicamente hace un fuerte y sonoro Juiit juee. También un Chrrrrrr de poco alcance.

HÁBITAT

Bosques y selvas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Salta, Catamarca, Formosa, Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Sostenido en árboles. Alto.

Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de semiesfera de ramitas finas y hojas en el interior.

Di Giacomo y López Lanús (2000). Lipeo, dpto. Santa Victoria, Salta, 25-01-1991, nido a 7 m de altura, entre el follaje de una enredadera. Nido en construcción, forma de semiesfera de ramitas finas y hojas en el interior. La pareja construía.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, el 11-11-2004, nido en construcción en un Ombú (*Phytolacca dioica*) a 12 m del suelo.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Uranga en De la Peña (2016c). San Ignacio, dpto. San Ignacio, Misiones, 05-11-2013, nido en una palmera con un huevo.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Huevos

Pone 2 ó 3 huevos. Grisáceo claro recubierto de material carcáreo.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Depredadores

De adultos: *Accipiter bicolor* y *Bubo virginianus* en Formosa, Di Giacomo (2005h)

De pichones: *Ramphastos dicolorus* en Misiones, Cockle et al. (2016), *Cyanocorax chrysops* en Chaco, Salvador y Bodrati (2013a)

Pichones

Observaciones

Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Adulto con pichones.

Más información:

Payne (1997). Fitzgerald et al. (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Dorsal castaña. Cola muy larga, escalonada con lunares blancos en la parte ventral.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Piaya cayana macroura Gambell, 1849 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa y de Chaco, norte y este de Santa Fe, este de Córdoba y noreste de Buenos Aires, y *Piaya cayana mogenseni* J. L. Peters, 1926 en Tucumán, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Catorce subespecies. Gran variedad de ambientes en un extenso Rango: de distribución desde Méjico a Uruguay y Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Piaya cayana macroura Gambell, 1849

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (1997, 2006b); Carman (1980); Cockle et al. (2016); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Klimaitis (1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Antequera, dpto. San Fernando, 25-11-1972)

Córdoba

Citas: Michelutti en Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b); Esteban (1953); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Ronchi Virgolini et al. (2008); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995)

Misiones

Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1950, 1951); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 06-02-1973)

Santa Fe

Citas: De la Peña et al. (2003); De la Peña (2011f)

Piaya cayana mogenseni J. L. Peters, 1926

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (2000); Fiora (1933); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Echevarría et al. (2008a); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro y Marigliano (2006); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2019a); Vides Almonacid (1993)

CUCLILLO CANELA *Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817

Otros nombres: Col-col. Cuculillo común. Cuculillo de pico negro. Horco paloma. Pavita de monte. Tuyá-cué. Urraca chica.

DESCRIPCIÓN

Largo: 28 cm.

Peso: Di Giacomo (2005h): N= 1 42,3 g

Blendinger (2005): X= 50,0 g

Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 51,0 g (Rango: 48,5 a 52,8); N= 3 (H) X= 53,1 g (Rango: 51,8 a 54,3); N= 2 (?) 53 y 54 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 61 g

Coloración. Pico negro. Círculo ocular oliva-naranja. Patas grises. Iris pardo oscuro.

Cabeza gris plumiza. Banda auricular negra. Dorso gris pardusco. Ventral ocrácea.

Alas grises parduscas.

Cola con las plumas centrales grises parduscas, laterales negras con puntas blancas. Ventralmente es negra con grandes manchas blancas.

COMPORTAMIENTO

Se desplaza solitario en la parte media de los árboles.

Alimentación

Friedmann (1927). **Insectos:** Coleoptera. Lepidoptera (orugas).

Zotta (1934). **Insectos:** Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*).

Pereyra (1937b). **Insectos:** Mariposas. Orugas vellosas. **Frutos.**

Moschione (1987). **Insectos:** Homóptero (Cercopidae, *Cephus siccifolius*) (larva). Lepidóptero (Hemileucidae, *Hylesia nigricans*) (oruga).

Klimaitis (1993). **Insectos:** Oruga verdosa (Lepidóptero).

Ordano et al. (1999). **Insectos:** Ortópteros.

Bodrati y Haene (2008). *Allophylus edulis* (fruto)

Beltzer y Quiroga (2008). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Lampyridae, Coccinellidae, Elateridae, Staphylinidae). Hemiptera (Belostomatidae: *Belostoma micantulum*, *Belostoma elongatum*). (Pentatomidae: *Nezara viridula*). Lepidoptera (Hemileucidae: *Hylesia nigricans*). Odonata (Zigoptera). Orthoptera (Pauliniidae: *Marellia*

sp. (Acridiidae: *Cornops aquaticum*, *Dichroplus conspersus*). (Gryllidae: *Gryllus domesticus*). **Arácnidos:** Araneae. **Semillas:** Leguminosae.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Morus alba*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Hemiptera (Pentatomidae). Lepidoptera (orugas, orugas velludas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). Homoptera (Cicadidae).

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Oruga peluda negra.

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Martinian, P. (2018). **Insectos:** Tucura rayada (*Chromacris speciosa*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Schlemmer, J. (2019). **Insectos:** *Stamatoptera hyaloptera*. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Voces


Straneck en De la Peña (2016c). La voz es una sucesión de 6 a 8 notas: Cou.cou.cou.cou.cou.cou.cou. Otra voz es un áspero y rápido charcharchaochurchurr y también Cherrrrroouuuu.

HÁBITAT

Montes, bosques, sabanas, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Mendoza, Formosa, Misiones, Chaco, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Sostenido en arbustos o en árboles, enredaderas, matorrales. A baja y mediana Altura.

Oculto, expuesto o semiexpuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas o tallos de yuyos en la base. Internamente nervaduras de hojas, líquenes.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.

White (1882). Buenos Aires. Nido.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 09-02-1925, 2 nidos con 2 y 3 huevos; 31-01-1928, 2 nidos con 2 y 3 huevos.

Barrows, W. (1884a). Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 16-02-1880, nido con 3 huevos.

Holland (1892). Estancia Espartillo, Buenos Aires, crían en noviembre, el nido es simple, ponen 3 huevos.

Goodall (1923). Estancia Los Alfalfares, Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 3 nidos hallados en 1907, nidos simple que recuerda al de las palomas, con 2 y 3 huevos.

Dabbene (1926). Los Talas, pdo. Berisso, Buenos Aires, 12 de diciembre, nido con 2 pichones.

Friedmann (1927). Río Gastona, dpto. Simoca, Tucumán, 15-12-1923, nido con 4 huevos. Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-01-1924, nido con 5 huevos.

Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-01-1924, huevos.

Pereyra (1933b). Arroyo Correa, Delta, Buenos Aires, 18-12-1932, nido con 4 huevos.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, a fines de diciembre se encuentran nidos con huevos y pichones, en caldenes, ponen 4 huevos.

Pereyra (1938b). Anida en los bosques ribereños, Buenos Aires.

Hudson (1974). El nido es una estructura frágil, pone 3 ó 4 huevos.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido en noviembre y otro con huevos en diciembre.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h), Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y enero. Se localizaron 15 nidos, desde 1,30 a 3,5 m del suelo.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Antoniazzi et al. (2010). Santa Fe. Nido.

Pérez, E. M. (2011). Reserva Natural Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 11-02-2011, nido con huevos.

EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Salvador (2011a). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 19 nidos, a una altura que varió de 1,1 a 3,8 m del suelo. Pone de noviembre a febrero, 2 ó 4 huevos por nido.

Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, 03-11-2009, nido con 2 huevos propios y 3 de *Molothrus bonariensis*.

De la Peña (2013c). Se hallaron en total 28 nidos: entre el 11-12-1976 y 08-11-2012 en Esperanza 20 nidos, Humboldt, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-12-1976, nido con un huevo y un pichón, Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 3 nidos: 26-11-1991, nido con 3 huevos, 29-01-1997 con 3 huevos y el 08-11-2012, 2 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 09-02-1996, nido con 2 huevos, El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-01-1991 nido con 3 huevos, Santa Fe, dpto. La Capital, el 27-01-1990, nido con un huevo, Grutly, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 05-01-1991 nido con 6 huevos. Medidas de nidos: diámetro total: de 11 a 15 cm, alto: de 4 a 8 cm y profundidad: de 0,5 a 1 cm.

Nido más bajo: 1,00 m, más alto: 4,00 m.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.

Schaaf et al. (2015b). Estancia Santo Domingo, cercana a Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, nidos el 14-01-2013 y 02-02-2013, con 2 huevos cada uno.

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 15-12-1982, un nido en un *Schinus* sp., a 1,7 m de altura, con 2 huevos, Santa Sylvina, dpto. Fray Justo Santa María de Oro, Chaco, 17-12-1982, un nido en un *Prosopis* sp., a 1,2 m de altura, con 2 huevos.

Salvador en De la Peña (2016c). Villa Rumipal, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1989, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 1,4 m de altura, con 4 huevos incubados. Embalse Río Tercero, dpto. Calamuchita, Córdoba, 07-02-1991, un nido en un *Geoffroea decorticans* a 1,7 m de altura, con 3 huevos incubados.

Contino, A. y F. Contino en WFVZ. en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nido

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Dinelli en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Girard en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Olrog en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 3, a veces hasta 4 ó 6 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. De color verde.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 27,0 a 31,5 x 21,0 a 24,0

Goodall (1923): 29,5 x 26,0

Smyth (1928): 29,5 a 31,0 x 22,5 a 25,0

Pereyra (1933b): 32,5 x 24,0

Pereyra (1937b): 30,5 x 24,5

Di Giacomo (2005h): 24,5 a 30,4 x 21,5 a 23,2

X= 28,6 x 22,2 (N= 13)

Salvador (2011): 28,1 a 32,8 x 21,4 a 24,9

X= 30,1 x 22,9 (N= 42)

De la Peña (2013c): 26,8 a 31,4 x 22 a 24,6

X= 29,8 x 23 (N= 18)

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 29,2 a 32,8 x 22,2 a 24,9

X= 31,1 x 23,5 (N= 7)

Pesos

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 8,2 a 9,2
 Di Giacomo (2005h): 6,6 a 8,4
 Salvador (2011): 7,1 a 11
 De la Peña (2013c): 7,2 a 8,9
 De la Peña (2013c): cáscaras 0,467 a 0,661

X= 8,6 (N= 4)
 X= 7,3 (N= 13)
 X= 9,2 (N= 31)
 X= 8,1 (N= 10)
 X= 0,561 (N= 16)

PICHONES

Descripción

Salvador (2011). Nacen con los ojos entreabiertos. Piel negruzca, están cubiertos por un plumón, tipo cerda, de color blanco con base canela, en el dorso, alas, cabeza y flancos. Pico gris, comisuras cremas, interior de la boca rojo pálido con papilas blancas. Patas gris oscuras.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos semiabiertos. Pico y patas grises. Interior de la cavidad bucal rosado con tres puntos blancos en el paladar y uno en la lengua.

4 días. Ojos abiertos marrones.

Lados del pecho y garganta, con vainas rígidas, blanquecinas. Dorsalmente blanquecinas.

Vainas de las alas oscuras.

Las materias fecales son líquidas, oscuras.

5 días. Pico gris. Comisura clara. Patas plumizas. Piel gris oscura, más clara ventralmente.

Tres puntos blancos en el paladar, dos del lado interno de la fosa y dos grandes externos y dos medialunas grandes en la base. Uno en la parte superior de la base de la lengua. Esta con punta negra.

Ventralmente y flancos, plumas blanquecinas. Cola con las plumas externas blanquecinas. Cañones grisáceos y láminas grises en la parte dorsal. El plumón que queda es blanco.

Alas, cañones oscuros en la mitad basal y grises en el resto.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina		
1	0,6-0,9	1,2-1,3	1,6-2,1						5,5-12,0
2	0,6-0,9	1,3-1,4	2,0-2,3						9,0-15,0
3	0,7-1,0	1,5-1,6	2,2-2,5	0,7	0,2	0,4	0,2		14,7-19,7
4	0,8-1,0	1,6-1,7	2,4-2,6	0,8-2,0	0,3	0,6	0,2	1,5	16,0-19,4
5	0,9-1,0	1,7-1,9	2,6-2,7	1,0-2,5	0,5	0,8	0,3	1,8	19,6-22,0

Peso al nacer

Salvador (2011): 6,0 a 9,1 X= 7,4 (N= 7)

Generalidades

Salvador (2011a). El período de incubación es de 12 a 14 días y la permanencia de los pichones en el nido de 9 a 11 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 6-8 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación, es de 14 días, pero en un nido demoró de 20-21 días, desconociéndose los motivos. Permanencia de los pichones en el nido, 13-15 días. Si los pichones son molestados, a los 8-9 días se desplazan por las ramas.

Depredadores

De adultos: *Glaucidium brasilianum* en Chaco, Carrera et al. (2008)

De adultos: *Micrastur ruficollis* en Chaco y Misiones, Bodrati (*in litt.* 2019)

Otros

Antoniazzi et al. (2011), Salvador (2011a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Bodrati (*in litt.* 2019). La especie crió con éxito un pichón de *Molothrus bonariensis* en San Pedro Misiones.

Más información:

De la Peña (2019a). Damon (2012). Schaaf et al. (2015b)

	
Esperanza. Santa Fe. 03-01-2005	Esperanza. Santa Fe. 20-02-2007
	
Esperanza. Santa Fe. 21-12-2004	Esperanza. Santa Fe. 11-12-1977

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico y banda auricular negros. Ventral ocre amarillenta. Cola larga con lunares blancos. Se parece al Cuculillo de pico amarillo pero carece de rojizo en las alas y ventralmente es ocráceo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y este de Chubut. Accidental en las Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Presenta un amplio Rango: de distribución que va desde el norte de Sud América hasta Uruguay y Argentina. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b) Cueto y López de Casenave (2000); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1979); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1933b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Carrera et al. (2008); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Chubut

Citas: Kovacs et al. (2005); Navas (1994)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Cabanis (1878); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a, 2011a); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador et al. (2017); Schaaf et al. (2015b); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 11-12-1990)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (1999)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los libres, 11-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Barrows, W. (1884a), Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Zotta (1937)

La Rioja

Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Blendinger (2005); Ferrer et al. (2013b, 2019); Ferrer (2016); Lucero (2013f); Sosa (2009b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2011)

Neuquén

Citas: Giai en Contreras (1977b); Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Nores (1986b); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. José de San Martín, 01-02-1977)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Nores y Salvador (1996); Ortiz et al. (2016)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: Beltzer y Quiroga (2008); De la Peña (1983e, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Esteban (1953); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2007, 2011b); Fanjul (2010); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007, 2011); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas.

Citas: Bennett (1937); Woods (2006)

CUCLILLO PICO AMARILLO *Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Ahogado. Cuclillo de alas rojizas. Tuyá-pucá.

DESCRIPCIÓN

Largo: 28-30 cm.

Peso: Haverschmidt (1968): N= (?) (M) de 37 a 47 g; N= 1 (H) 59 g

Coloración. Mandíbula amarilla. Maxilar superior negro. Anillo ocular amarillo. Patas grises. Iris pardo.

Dorso gris pardusco. Ventral blanca grisácea con tono ocre en el abdomen.

Primarias y secundarias pardas grisáceas con canela en las barbas internas.

Las plumas centrales de la cola son pardas, las externas negras con puntas blancas. Ventralmente es negra con grandes lunares blancos.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario.

Alimentación

Zotta (1934). Oruga. Lepidóptera (*Hylesia nigricans*).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Salvador et al. (2017). Insectos.

HÁBITAT

Bosques, sabanas, montes.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico amarillo y negro. Anillo ocular amarillo. Rojizo en las alas. Cola larga con grandes manchas blancas. Diferenciarlo del Cuclillo de ojos colorados, del Cuclillo ceniciento y del Cuclillo canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Accidental en las Islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Canadá, estado Unidos, Méjico e Islas del Caribe. Durante el invierno boreal migra a Sud América hasta Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Morici (2012b); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). En áreas de la provincia como Parque Nacional Chaco, dptos. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, se producen concentraciones de muchos individuos de esta especie en el mes de febrero, cuando abundan larvas de Lepidóptera.

Córdoba

Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes

Citas: Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos

Citas: Fernández Guaraz (2013)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f); De la Peña et al. (2003b); Gai (1950)

Santiago del Estero

Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2020a)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2011b); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1991, 1993)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

CUCLILLO CENICIENTO *Coccyzus euleri* Cabanis, 1873

Otros nombres: Cuclillo chico. Cuclillo gris grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 24-28 cm.

Peso: Haverschmidt (1968): N= 1 (M) 45 g; N= 1 (H) 48 g

Coloración. Mandíbula amarilla. Maxilar negro. Anillo periocular gris oscuro o rojizo. Patas grises. Iris pardo. Parte dorsal y alas grises parduscas. Garganta y superior del pecho grisáceos. Resto de la zona ventral blanquecino. Cola parda con las plumas externas negras con puntas blancas.

HÁBITAT

Selvas, bosques de transición.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Pearman en Bodrati et al. (2012). Misiones. Nido.

Bodrati et al. (2012). Misiones. Nido.

Cockle et al. (2016). Misiones. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Más información:

Payne (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico amarillo y negro. Gris pardusco, ventral blanquecina. Plumas externas de la cola negras.

Se diferencia del Cuclillo de pico amarillo por ser más pequeño y carecer del rojizo en las alas y del Cuclillo de ojos colorados por ser de menor tamaño, más gris en el pecho, más oscuro en la parte dorsal y tener la cola más corta y diferente color de pico.

Depredadores

De huevos: *Ramphastos dicolorus* en Misiones, Cockle et al. (2016)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coccyzus euleri Cabanis, 1873 observado en Misiones, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. En Sud América desde el norte, por el centro y este hasta norte de Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco

Citas: Bodrati (2005c)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h)

Misiones

Citas: Cockle et al. (2016); Bodrati (2005c); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Olrog (1979c); Partridge (1961b); Saibene et al. (1996)

Santiago del Estero

Citas: Caziani (1987)

CUCLILLO OJO COLORADO *Coccyzus erythrophthalmus* (A. Wilson, 1811)

Otros nombres: Cuclillo de cola listada. Cuclillo de pico negro.

DESCRIPCIÓN

Largo: 28-30 cm.

Coloración. Pico negro. Anillo periocular rojo. Patas grises parduscas. Iris pardo.

La parte dorsal y las alas son pardas. Ventral grisácea.

Cola parda con una banda subterminal oscura y punta blanca en las plumas más externas. Ventralmente es grisácea con lunares blancos.

HÁBITAT

Bosques, selvas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico negro. Anillo ocular rojo. Pardo en la zona dorsal, blanquecino en la ventral. Cola larga, con lunares blancos ventralmente.

Se parece al Cuculillo pico amarillo pero difieren en el color del pico y en el anillo ocular. Además no tiene canela en las alas y los lunares de la cola son menores.

Del Cuculillo chico se diferencia por ser de mayor tamaño, cola más larga y por tener la parte dorsal más parda.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coccyzus erythrophthalmus (A. Wilson, 1811) migratorio de Norteamérica. Observado en Misiones, Salta y Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Canadá y Estados Unidos. En el invierno boreal migra a Sud América llegando hasta Bolivia y norte de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Gerow en Olrog (1979)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Partridge (1961)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

Subfamilia: Crotophaginae

ANÓ GRANDE *Crotophaga major* J. F. Gmelin, 1788

Otros nombres: Anó-chirirí. Anó-guasú. Anó Paraná. Gran aní. Pirincho negro grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 179 g

Coloración. Pico negro con elevación filosa en la base del maxilar superior. Patas negras. Iris blanco. Negro con reflejos azulados y plumas orilladas de verde bronceado metálico. Cola azul purpúrea.

COMPORTAMIENTO

Anda en grupos en árboles bajos o en matorrales.

Alimentación

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Anfibios:** pequeñas ranas. **Insectos:** Odonata (libélulas).

Di Giacomo (2005h). Culebra.

Bodrati (*in litt.* 2019). **Insectos:** larvas grandes de Lepidóptera nocturnas. Libélulas. **Anfibios:** ranas (Hílidos).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un fuerte Cora...córa..crrón. Lo hacen dos o más individuos y finaliza con un sostenido y prolongado Shrrrrrrr, susurrante y soplado, similar a un fuerte hervor de aceite.

HÁBITAT

Selvas en galería, vegetación arbustiva marginal de lagunas, madrejones, esteros y ríos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Sostenido en árboles. Alto.

Expuesto. Elaborado. Semiesfera construida con palitos finos, líquenes o claveles del aire, tallos, fibras de hojas de palmeras. En el interior hojas. Agregan hojas durante la postura e incubación.

Hartert y Venturi (1909). Misiones. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y febrero. Se localizaron 11 nidos en árboles altos o en palmeras. En general ocultos o disimulados por el follaje o por enredaderas, entre los 6 y los 8,50 m del suelo. Un caso a 2,50 m del suelo. El número de huevos en los nidos varió entre 4 y 10.

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

Uraga en De la Peña (2016c). Capioví, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 15-10-2001, nido sin postura, en un árbol a 6,00 del suelo; Gral. Vedia, dpto. Bermejo, Chaco, 12-12-2009, nido en un Guayacán, a 4,00 m del suelo, 2 huevos. Este nido mide: diámetro total: 30 cm, diámetro interno: 15 cm, alto: 16 cm y profundidad: 7 cm.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco, Misiones. Nidos.

Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Chaco, Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral. Nido en la selva en galería del Río Negro, con 6 huevos, muy oculto a 7 metros del suelo en un Tembetrí (*Fagara* sp) tapado por enredaderas en noviembre de 1998. En la provincia de Chaco es habitual que los pichones de distintas nidadas se reúnan hacia fines del verano, formando con los adultos, grupos que pueden superar los 100 individuos.

Huevos

Varía entre 4 y 10. Celeste verdoso recubiertos por una espesa capa calcárea blanco y lisa, que en algunos casos cubre casi toda la superficie.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 38,0 x 28,0

Di Giacomo (2005h): 38,0 a 44,3 x 33,0 a 37,5 X= 42,5 x 35,7 (N= 21)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 20,5 a 31,6 X= 27,8 (N= 21)



Gral. Vedia. Chaco, 12-12-2009

Foto: Máximo Uranga

PICHONES

Observaciones

Salvador en De la Peña (2016c). Bañado ex aeropuerto, Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-12-1988, dos adultos alimentando un pichón.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Adulto con pichones.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). La permanencia de los pichones en el nido es de 12 ó 13 días. Un mismo sitio o sus cercanías pueden ser utilizados en distintas temporadas.

De la Peña (2013c). El 11-12-2002 en Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, Corrientes, cuatro ejemplares en un cortejo. Enfrentaban los picos y emitían un canto muy prolongado, semejante a un murmullo de agua que corre entre piedras. Dura 3-4 minutos, paran bruscamente y continúan.

Por momentos parecían las voces que hacen las garzas en las colonias. Se corrían entre las ramas de los árboles.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Más información:

Riehl (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con la cola azulada, muy larga. Pico negro con elevación en la parte superior.

Se parece al Anó chico, pero es de mayor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Crotophaga major J. F. Gmelin, 1788 en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Extensa área de distribución en Panamá y Sud América, desde el norte hasta Argentina.

Comprende: Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, norte de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Argerich (2010); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Pagano et al. (2017a); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Salvador y Bodrati (2013a)

Corrientes

Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Milat et al. (1985)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Grant (1911); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012)

La Pampa

Citas: Pereyra (1933b, 1937b)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2012b), Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 22-09-1971)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Lucero (2012h, 2013i)

San Luis

Citas: Masramón (1983)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f)

Santiago del Estero

Citas: Ménéguaux (1925)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011)

ANÓ CHICO *Crotophaga ani* Linnaeus, 1758

Otros nombres: Aní. Anó. Chasca negra. Pirincho negro común. Urraca negra. Viuda.

DESCRIPCIÓN

Largo: 33-35cm.

Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 127 g (Rango: 120 a 129)

Contreras (1979f): N= 2 (M) 93,0 y 120,0 g; N= 1 (H) 85,5 g

Contino (1980): 110,0 g

Di Giacomo (2005h): N= 4 X= 89 g (Rango: 86 a 95)

Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 106,2 g (Rango: 98,8 a 113,9). N= 1 (H) 98,0 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 97 y 109 g; N= 13 X= 78, 5 g (Rango: 66 a 104)

Coloración. Pico negro con elevación superior filosa. Patas negras. Iris pardo oscuro.

Negro con reflejos violáceos. Plumas de la cabeza, cuello, manto y pecho, orilladas de verde bronceado.

COMPORTAMIENTO

Anda en pareja o en grupos.

Alimentación

Friedmann (1927). Coleoptera.

Contino (1980). Insectos.

Klimaitis (1993). Saltamontes (Tettigonidae).

Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Ortópteros. Orugas de lepidópteros. Saltamontes (Tettigonidae). Termitas aladas.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Langosta (*Stagmatoptera hyaloptera*)

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Orthoptera (no determinada)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Cucurionidae, Elateridae, Sacarabaeidae). Coleoptera (no determinado). Hemiptera (Pentatomidae). Hemiptera (no determinado). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Anfibios:** Leptodactylidae (*Leptodactylus* sp.).

De la Peña (2011a). **Insectos:** Mamboretá (*Stagmatoptera hyaloptera*)

Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La vocalización es muy variada. En vuelo emite un Kioic..kioic..kioeic..

HÁBITAT

Matorrales, arbustos, cerca de cursos acuáticos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N							N	N



Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas o por follaje denso, o en matorrales. A baja y mediana Altura.

Expuesto o semioculto. Elaborado. Tazón de tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas o pajitas.

Smyth (1928). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 22-01-1923, huevos.

Contino (1980). Nido con forma de copa, pone 4 a 5 huevos.

Biancucci (1995). Jesús María, dpto. Colón, Córdoba, en diciembre de 1990, nido a 4,5 m de altura en un tala.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y abril. Se observaron más de 30 nidos, ubicados entre 1 y 3 m del suelo. La postura varió de 3 a 6 huevos, aunque en nidos comunales fue de 10 a 18 huevos.

Salvador (2011). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 2 nidos, uno a una altura de 1,6 y el otro a 2,1 m del suelo. Uno en noviembre y el otro en febrero, uno con 3 y el otro con 4 huevos.

De la Peña (2013c). Empalme San Carlos, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 26-02-1978, nido con 4 pichones, Pichanal, dpto. Orán, Salta, 2 nidos el 12-12-1979, uno con 2 y otro con 3 huevos, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 03-01-1991, nido con 5 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos el 09-02-1996, uno con 2 pichones y el otro con 3, Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 4 nidos: el 11-03-1996, con 3 huevos, 20-03-1996, con 3 huevos, 20-01-1997, en construcción y el 20-01-2003, 5 pichones. Los nidos miden: diámetro total: de 15 a 30 cm, diámetro interno: 9 a 15 cm, alto: de 6 a 15 cm, profundidad: de 3 a 7 cm. Nido más bajo: 1,40 m del suelo, nido más alto: 4,00 m.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", dos nidos con 6 huevos cada uno.

Contino, A. y F. Contino en WFFVZ. en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Sin datos, en WFFVZ. en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Contino en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

M. Norens en De la Peña (2016c). Halló en Villa del Totoral, dpto. Totoral, Córdoba, un nido con un huevo, el 14-12-1977.

Salvador en De la Peña (2016c). Jardín América, dpto. San Ignacio, Misiones, 21-12-1988, nido en un arbusto a 1,7 m de altura, a 10 m de un arroyo, con 7 huevos muy incubados.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco, Misiones. Nidos.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone hasta 13 ó más, generalmente 5 ó 6 huevos.

Elípticos. Color de base celeste, recubiertos de material calcáreo blanco.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 30,0 a 32,0 x 22,0 a 23,5

Smyth (1928): 33,0 a 35,0 x 23,5 a 26,0

Di Giacomo (2005h): 28,0 a 37,2 x 21,5 a 28,0

Salvador (2011): 32,9 a 34,6 x 23,7 a 24,9

De la Peña (2013c): 30,7 a 33,3 x 23,4 a 25,8

X= 31,5 x 23,4 (N= 91)

X= 34,1 x 24,1 (N= 7)

X= 32,2 x 24,9 (N= 10)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 8,0 a 14,5

Salvador (2011): 9,6 a 11

De la Peña (2013c): 11 a 11,7

De la Peña (2013c): cáscaras 0,872 a 1,100

X= 9,4

(N= 91)

X= 9,9

(N= 7)

X= 11,3

(N= 5)

X= 1,014

(N= 10)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel negra. Cubierto de plumón negro. 3 días. Abre los ojos.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). En algunos nidos la postura fue en días sucesivos, pero en otros se registraron intervalos de hasta tres días. El período de incubación es de 14 ó 15 días. Los pichones permanecen en el nido 10 ó 12 días. Las cáscaras de los huevos eclosionados quedan en el nido. Un mismo sitio fue utilizado durante al menos tres temporadas seguidas.

De la Peña (2013c). Período de incubación de 13 días. Permanencia de los pichones en el nido 11 días. Si se los molesta se desplazan por las ramas. Para pedir la comida, los pichones aletean y emiten un chillido. El adulto se va hasta 50 m. del lugar donde están los juveniles. Busca entre los yuyos, trae langostas y mamboretá. Se los da y el joven los traga enteros.

Observaciones

Bianchini y Arenas en De la Peña (2016c). Ruta Nac. 81. Cercano a Dragones. Departamento. Gral. José de San Martín. Salta, 18-03-2014, pareja con 3 o 4 juveniles (volantones).

Bodrati en Salvador 2016a. Misiones. Adulto con pichones.

Otros

Giai (1952-1953). Un ejemplar con Albinismo.

Di Giacomo (2005h). Un ejemplar con Albinismo parcial, (manchas blancas en las alas).

Más información:

De la Peña (2019a)



Ruta Nac. 81. Cercano a Dragones. Salta. 18-03-2014

Foto Cynthia Arenas (juveniles)



Empalme San Carlos. Santa Fe. 26-02-1978



Esperanza. Santa Fe. 03-01-1991



Villa Roda. Santa Fe. 12-12-2015



Saladillo. Santa Fe. 14-01-2016

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con cola larga. Notable elevación en el pico.

Se diferencia del Anó pico surcado, por ser de mayor tamaño, tener la cola más larga, porque su pico no es surcado y carece de reflejos morados en las alas y en la cola.

Diferenciarlo además del Anó grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 desde el norte del país hasta San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, noreste de Buenos Aires y La Pampa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Muy amplio Rango: de distribución desde Estados Unidos, Méjico, Costa Rica, continuando en Sudamérica hasta Uruguay y Argentina. También en islas del Caribe.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Barbetti et al. (1985); Bodrati (2001); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Morici (2013); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 05-10-1972)

Córdoba

Citas: Biancucci (1995); Cobos et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Salvador (2013e); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 27-08-1987)

Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gai (1952-1953); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005);

La Pampa

Citas: Cenizo et al. (2019)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza

Citas: C. Rodríguez Rivas en Ferrer et al. (2019)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Contreras (1979f); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 06-02-1976)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b) White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 01-02-1977)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Lucero (2013i)

San Luis

Citas: Blendinger en Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe

Citas: Beltzer et al. (2009); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Pinto, dpto. Aguirre, 06-02-1983)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. La Capital, 08-12-1977)

ANÓ PICO SURCADO *Crotophaga sulcirostris* Swainson, 1827

Otros nombres: Pirincho negro dentado. Pirincho negro de pico dentado.

DESCRIPCIÓN

Largo: 30-32 cm.

Coloración. Pico negro con elevación superior y surcos en los costados. Patas negras. Iris pardo.

Negro con las plumas orilladas de verde bronceado. Reflejos morados en las alas y en las plumas centrales de la cola.

HÁBITAT

Selva en galería, matorrales, orillas de selvas, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Payne (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con cola larga. Elevación en el pico, surcado a los costados.

Diferenciarlo del Anó chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson, 1827 en el norte de Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Amplio Rango: de distribución desde el sur de Texas, Estados Unidos, Centro América: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En el norte de Sud América y por el oeste: Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, norte de Chile, extremo noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson, 1827

Salta

Citas: Di Giacomo et al. (1998b); Moschione et al. (2013); Zotta (1937b)

PIRINCHO *Guira guira* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Andirá. Chasca. Chasquita. Chasquito. Chicharrera. Chiluca. Cuclillo rubio. Guira. Kirirú. Machila. Machilo. Macho-bocha. Macho macho. Pájaro loco. Pararí. Pilincho. Pinchiraca. Piojosa. Pichiraca. Pirigüá. Pirinche. Pirí-pirí. Piriré. Pireguá. Pirirí. Piririgüá. Piririta. Pirrincha. Quililo. Rubiala. Rubia loca. Sereré. Seresche. Urraca. Zirino.

DESCRIPCIÓN

Largo: 40 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 114 g (Rango: 100 a 127)

Contreras (1979f): N= 1 (M) 126,5 g; N= 1 (H) 182,0 g

Contino (1980): 125,0 g

Camperi (1992c): N= 2 (M) 180 y 200 g

Camperi y Darrieu (2005): N= 4 X= 159,2 g (Rango: 136,8 a 175,5), N= 3 (H) X= 144,6 g (Rango: 141,5 a 148,1)

Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 131,1 g (Rango: 120 a 140)

Darrieu et al. (2010): N= 53 (M) X= 152,7 g (Rango: 125 a 190); N= 39 (H) X= 148,9 g (Rango: 117 a 210)

Salvador (2014a): N= 11 (M) X= 144,9 g (Rango: 131 a 159); N= 8 (H) X= 164,7 g (Rango: 159 a 171). N= 4 (?) 152 g (Rango: 138 a 159)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 150 y 120 g

Pagano y Salvador (2017): N= 2 (H) 103 y 161g; N=1 (?) 130g; N= 2 (M) 131 y 143 g

Coloración. Pico amarillo. Patas grises azulinas. Iris naranja.

Cabeza ocre rojiza con los mástiles de las plumas pardos oscuros. Dorso pardo oscuro con los mástiles de las plumas blanquecinos. Lomo y rabadilla blancos. Ventral ocrácea con los mástiles de las plumas de la garganta y del pecho pardos oscuros.

Alas pardas y canelas.

Cola ocre amarillenta en la base, las plumas centrales pardas oscuras y las restantes negras con ancha punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Forma bandadas, es bullanguero y de vuelo lento. Reposa entreabriendo las alas y colocando el dorso hacia el sol. Terrícola y arborícola.

Se lo observó comiendo pichones de aves, anfibios, insectos. (De la Peña, 2001)

Alimentación

Marelli (1919). Langostas. (*Schistocerca paranensis*). Mosquitas.

Zotta (1940). **Insectos:** Hemípteros (Pentatomidae). Lepidóptero (larva) (*Colias lesbia*). Ortópteros (Acrididae, Gryllidae) (*Elaeochlora trilineata*). **Otros:** Huesos. Huevos (cáscaras).

Pereyra, C. B. (1927). **Aves:** *Passer domesticus* y *Tyrannus savana* (Pichones). Anfibios: Rana del zarzal (*Hyla*) Pichones de gorrión.

Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros (Carábido, Curculiónido, Elatérido). **Arácnidos.**

Pereyra, C. B. de. (1935). **Aves:** Pichones de picaflor.

Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae) (Cerambycidae, Chrysomelidae). Hemípteros. Mosquitas (*Schistocerca paranensis*). Ortóptero (Tucura, Locustidae, Acrididae). **Reptiles:** Culebra.

Liebermann (1935). Langostas.

Pereyra (1927d). **Anfibios:** Rana (*Hyla* sp.) **Aves:** *Tyrannus savana* (Pichón). **Reptiles.**

Contino (1980). Insectos.

Beltzer (1995). **Arácnidos. Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Dytiscidae, *Magadytes* sp.) (Coccinellidae, Elateridae, Cerambycidae) (Hydrophilidae). Noteridae, (*Suphis* sp., *Hydrocanthus* sp.) (Carabidae, *Diloboderus abderus*). Hemípteros (Pentatomidae, *Nezara viridula*) (*Piezodorus guildinii*) (Reduviidae, Belostomatidae, *Belostoma* sp.). Homópteros. Hymenópteros. Ortóptero (Paulinidae, *Marelia acuminata*, *Paulinia* sp.) (Acrididae, Leptismidae, *Cornops aquaticum*). Lepidópteros. **Anfibios:** *Hyla pulchella*, *Leptodactylus* sp. **Crustáceos. Moluscos.**

Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae: *Gonipterus* sp, Scarabaeidae). Diptera (Tachinidae). Hemiptera (Coreidae, Pentatomidae, Reduviidae). Homoptera (Cercopidae). Lepidoptera (larvas). Orthoptera (Acrididae: *Dichroplus elongatus*, *Rhammatocerus pictus*). (Mantidae). (Tettigonidae). **Reptiles:** Teiidae (*Pantodactylus schreibersi*). **Mamíferos:** Cricetidae: *Calomys* sp.

De la Peña (2001d). **Aves:** Pichón de *Fluvicola albiventer*. **Anfibios:** Rana.

Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Termitas aladas.

Soave et al. (2008). **Anfibios:** Amphibia (Leptodactylidae: Rana piadora (*Leptodactylus latinasus*), *Leptodactylus* sp.). Bufonidae (*Rhinella fernandezae*, *Rhinella arenarum*). (Hylidae: *Hypsiboas pulchellus*, *Hypsiboas* sp.) **Arácnidos:** Arachnida (Araneida: Lycisidae, Tetragnathidae, Salticidae). (Opilionida: Gonyleptidae: *Acanthopachylus aculeatus*). (Escoepionida: Escorpionidae). (Acarina). **Insectos:** Blattodea. Clitellata (Lumbricidae) Coleoptera (Carabidae: *Scarites melanarius*, *Scarites anthracinus*, *Trirammatus striatulus*, *Aspidoglossa intermedia*, *Apenes aenea*, *Scarites* sp., *Colossoma* sp.). (Curculionidae: *Calendra* sp., Driophthorinae, Calendrinae). (Scarabaeidae: *Dyscinetus* sp., *Lygirus* sp., *Stenocrates* sp., Dinastinae). (Tenebrionidae). (Aphodiidae). (Coccinellidae: *Cycloneda sanguinea*). (Elateridae). (Dytiscidae). (Chrysomelidae). Hydrophilidae). Dermestidae: *Dermestes* sp.). Hemiptera (Pentatomidae: *Nezara viridula*, *Edessa* sp.). (Coreidae: *Corecoris* sp.). (Belostomatidae: *Belostoma* sp.). (Cicadidae). (Membracidae) Hymenoptera (Vespidae). (Apidae: *Bombus atratus*). (Formicidae: *Solenopsis* sp., *Acromyrmex* sp., *Mycocepurus* sp., *Atta* sp.) Orthoptera (Acrididae: *Dichoplus* sp., *Allotruxalis* sp., Acridinae, Comphocorinae). (Gryllidae). (Proscopidae). (Tettigonidae). (Grillotalpidae). Trichoptera. Lepidoptera (Saturnidae: *Hylesia nigricans*, Hemileucinae). (Noctuidae). (Sphigidae). (Arctiidae). Mantodea (Mantidae). Odonata (Aeshnidae: *Aeshna* sp.). (Anisoptera). Diptera (Tabanidae). (Tachinidae). Stratyomyidae) (Muscidae: *Stomoxys calcitrans*). **Reptiles:** (Angüidae: *Ophiodes vertebralis*). (Colubridae: *Liophis poecilogyrus*). **Crustáceos:** (Isopoda). **Aves.**

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Anélidos:** (Oligoquetos). **Arácnidos:** (arañas). (Buthidae: *Tityus trivittatus*). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Elateridae, Scarabaeidae: larvas y adultos, Tenebrionidae: larvas). Dermaptera. Hemiptera (Coreidae, Pentatomidae). Homoptera (Cicadidae). Lepidoptera (orugas y crisálidas). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acrididae, Gryllidae, Tettigonidae). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*, *Bulimulus apodemetes*). **Mamíferos:** Cricetidae: *Calomys* sp. **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Aves:** Passeriformes (huevos y pichones). **Reptiles:** Teiidae (*Teius* sp.). **Moluscos:** Gastropoda (Veronicellidae). (Planorbidae). **Anfibios:** Bufonidae: *Bufo* sp.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Caracol (chico, alargado). Insectos. Víboras ciegas (*Amphisbaena* sp.)

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Passer domesticus* (huevos y pichones) *Tyrannus savana* (huevos y pichones)

La Grottería, J. (2010). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

De la Peña (2011a). **Insectos:** Mantidea (*Stagmatoptera hyaloptera*). Langostas. **Aves:** Pichones de *Passer domesticus*, *Tyrannus savana*. **Reptiles:** Culebra.

Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Schlemmer, J. (2015). **Anfibio:** Sapo común (*Rhinella arenarum*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Borrilo, S. G. (2016). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Sager, M. (2016). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Tolosa, H. (2016). **Anfibio:** Sapito cavador (*Rhinella fernandezae*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Collado, S. (2017). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Salvador et al. (2017). **Anfibios:** Sapo común (*Rhinella arenarum*), Ranita del zarzal (*Boana pulchella*), Rana criolla (*Leptodactylus latrans*), Rana de bigotes (*Leptodactylus mystacinus*), (*Leptodactylus* sp.). **Reptiles:** Geko norteño (*Homonota borelli*), Víbora de cristal castaña (*Ophiodes intermedius*), Lagartija verde (*Teius oculatus*), Culebra de líneas amarillas (*Lygophis anomalus*)

Quiroga (2017b). Insectos.

Salvador y Fariña (2018). **Anfibio:** Ranita enana (*Pseudopaludicola mystacalis*), Rana criolla (*Leptodactylus latrans*)

Ferrari, M. (2018). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

De la Peña (2019b). Esperanza. 31-10-2017. Un ejemplar comiendo una rana criolla (*Leptodactylus latrans*). 27-10-2018. Varios ejemplares comen Caracoles.

Tolosa, H. (2019). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 13/06/2019.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una sucesión de voces con modulación de frecuencia descendente: Kiei..kiei...kiee..kiorr..lior.kior.kior.. La voz de alarma es un estridente kirrrrrrrr y en vuelo emite un ieo..ieo..ieo... de poco alcance.

HÁBITAT

Sabanas, montes, praderas, áreas rurales y urbanas, parques, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas, en matorrales, juncuales, espadañales, recipientes, molinos, construcciones. A baja y mediana altura y alto.

Expuesto. Elaborado. Tazón de palitos, tallos de yuyos o de enredaderas, raíces. Internamente, hojas, pajitas, hilos, flores.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.

Hudson (1870e). Buenos Aires. Nido.

Gibson (1880). Buenos Aires. Nido.

White (1882). Buenos Aires. Nido.

Barrows, W. (1884a). Concepción del Uruguay, Entre Ríos, nido con huevos.

Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, son polígamos, se encuentran hasta 20 huevos en un nido.

Holland (1892). Estancia Espartillo, Buenos Aires, crían en diciembre, nidos en árboles a distintas alturas, ponen 4 huevos, se encuentran huevos en el suelo.

Hartert y Venturi (1909). Nidos con 5 a 21 huevos.

Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nido con hasta 19 huevos.

Serié (1923a). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 2 huevos en un nido de Chimango (*Milvago chimango*) que contenía 2 huevos propios.

Serié (1923d). P. Girard, en Río Colorado, Tucumán, el 5 de diciembre encontró un nido de *Phytotoma rutila* con la hembra que empollaba dos huevos propios y uno de *Guira guira*.

Goodall (1923). Estancia Los Alfalfares, Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 3 nidos hallados en octubre y diciembre de 1907, con 9, 11 y 20 huevos respectivamente.

Daguerre (1924a). Provincia de Buenos Aires, ponen muchos huevos en un nido. En tres ocasiones observó nidos con 8 huevos cada uno.

Wilson (1926). Santa Fe. Nido.

Friedmann (1927). Tucumán. Nido.

Smyth (1928). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 29-10-1920; 06-11-1921 y Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-10-1925, huevos.

Castellanos (1932). Córdoba. Nido.

Davis (1940b). Formosa, Corrientes, Entre Ríos. Nido.

Zapata y Cabrera (1969). Establecimiento El Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, un huevo en el suelo.

Hudson (1974). El nido es una estructura tosca, por lo general en árbol espinoso.

Azategui (1975). Santa Isabel, dpto. Calamuchita, Córdoba, 25-03-1973, nido con un huevo.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.

Contino (1980). Se encuentran nidos.

Salvador (1981b). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, nido a 3,3 m del suelo en una Acacia blanca (*Robinia pseudoacacia*). Entre los días 3 y 10 de enero de 1981, 25 huevos fueron puestos en el nido, por 4 ó 5 hembras.

Martella et al. (1985). Arroyito, dpto. San Justo, Córdoba, se hallaron 2 nidos dentro de nidos abandonados de Cotorras, las cámaras fueron forradas con hojas de eucaliptos.

Haro y Gutiérrez (1992). Córdoba. Nido.

Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido.

Jenny (1997). Wildermuth, dpto. San Martín, Santa Fe, el 20-12-1996, un nido de Tero (*Vanellus chilensis*) con 4 huevos propios, tenía uno de *Guira guira*.

Pautasso (2000). Santa Fe. Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y marzo. Se localizaron 20 nidos ubicados entre 1,7 a 3,0 m del suelo, con algunos casos a 5-6 m de altura. El número de huevos por nido varió entre 6 y 19.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.

Salvador (2011a). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 59 nidos, a una altura que varió de 1,1 a 6,5 m del suelo. Pone de octubre a marzo, 4 ó 28 huevos por nido.

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

De la Peña (2013c). Se hallaron 43 nidos, de los cuales 32 en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, uno en Pichanal, dpto. Orán, Salta, el 12-12-1979, con 3 huevos. El nido de Esperanza, del 31-12-1993, tenía 1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*. Otro de Esperanza, del 20-12-1976, contenía 30 huevos.

Medidas: diámetro total: de 15 a 40 cm, diámetro interno: 14 a 20 cm, alto: de 14 a 20 cm, profundidad: de 10 a 15 cm. Nido más bajo: 1,00 m. Nido más alto: 8,00 m.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 4 nidos con 6, 6, 10 y 10 huevos cada uno.

Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 7 nidos.

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 1-12-1982, un nido en un *Prosopis* sp., a 2,5 m de altura con 3 huevos frescos. Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 07-12-1987, un nido en una mata de *Bacharis* sp., a 2,2 m de altura, con 7 huevos incubados.

Salvador en De la Peña (2016c). Morrison, dpto. Unión, Córdoba, 2 nidos, 31-12-1982, un nido en un *Melia azedarach*, a 3 m de altura, con 5 huevos. 07-11-1983, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 2,7 m de altura, con 4 huevos y 6 pichones de 24-48 hs. Villa Rumipal, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1989, un nido en un *Prosopis nigra*, a 3,5 m de altura, con 8 huevos. Ongamira, dpto. Punilla, Córdoba, 22-11-2005, un nido en un *Schinus molle*, a 3,5 m de altura, con 9 huevos incubados.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Girard en MVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Girard en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Olrog en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Sin datos, WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
 Salvador en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
 Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
 Smyth en WFVZ, en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
 Mason en WFVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
 Sin datos, WFVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
 Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
 Canevari en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
 De la Peña (2019b). Esperanza. 24-11-2016. Nido en construcción en Álamo a 12 m de altura. 14-12-2016. Nido en una pérgola con una planta de Rosa, a 3,70 m del suelo con pichones.
 Quiroga y Llugdar (2019c). Varios nidos en Santiago del Estero.

Huevos

Pone hasta 30, generalmente 10 ó 12 huevos.

Elípticos, algunos ovoidales. Color de base celeste, recubiertos por líneas y manchas blancas de material calcáreo.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 38,0 a 43,0 x 28,0 a 33,0

Serié y Smyth (1923): 39,0 a 44,0 x 28,0 a 34,0

Smyth (1928): 36,5 a 42,0 x 28,0 a 32,0

Zapata y Cabrera (1969): 39,0 x 31,3

Salvador (1981): 36,7 a 44,2 x 31,3 a 33,1

Di Giacomo (2005h): 36,4 a 44,1 x 26,8 a 36,6

Salvador (2011a): 36,7 a 44,8 x 28,8 a 33,9

De la Peña (2013c): 39,7 a 46,0 x 28,7 a 33,0

X= 41,9 x 32,1 (N= 25)

X= 40,2 x 30,5 (N= 68)

X= 41,6 x 31,7 (N= 122)

X= 41,5 x 31 (N= 28)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 15,5 a 23,5

Salvador (2011a): 19,5 a 26,5

De la Peña (2013c): 19,7 a 22,4

De la Peña (2013c): cáscaras 1,60 a 2,01

X= 19,7 (N= 68)

X=23,2 (N= 84)

X= 20,8 (N= 6)

X= 1,85 (N= 28)

PICHONES

Descripción

Salvador (1981b). Los pichones nacen con los ojos abiertos, de color pardo oscuro. Piel negruzca con tinte violáceo y el cuerpo cubierto de canutos que parecen cerdas, de color blanco crema. La piel que rodea a los ojos es verdosa. Las patas de color gris oscuro. El pico anaranjado pálido, con una raya longitudinal negra en el culmen y dos en el maxilar inferior. El interior de la boca es rojo escarlata o rojo fuerte, con papilas blancas.

Tienen un desarrollo rápido y a partir de os 7-8 días de nacidos comienzan a cubrirse de plumas. Cuando tienen 10 días y son molestados, abandonan el nido trepando por las ramas ayudándose con las alas y el pico.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos abiertos. El pico es anaranjado con una línea negra longitudinal en el culmen. Ventralmente las ramas de la mandíbula, son oscuras.

El paladar es rojo, con papilas blancas. La piel es oscura. Alrededor de los ojos es verdosa. Plumón blanco crema, alargado semejando pelos. Patas gris oscuro.

2 días. Ojos marrones. La cavidad bucal, lengua y paladar, rojizos.

La lengua tiene en la base una medialuna blanca, lo mismo que la punta. Por detrás de ésta una banda transversal negra. A los costados, sobre la mucosa, dos manchas blancas.

El paladar tiene una medialuna blanca con una línea del mismo color hacia la fosa palatina. A los lados de la fosa palatina, presenta dos círculos incompletos grandes (parecen signos de pregunta) blancos.

Plumón, tipo filoplumas, blanco, por todas las zonas pteridas.

Emiten un grito fuerte y tiran picotazos.

5 días. Cola con cañones largos. Aparecen las láminas. En la cola las tres plumas externas blancas, las dos centrales oscuras. En el resto del cuerpo cañones oscuros con punta blanca.

El nido tiene olor por las materias fecales.

7 días. Las plumas de las alas y de la cola son oscuras. A los lados del pecho las láminas son blanco amarillentas. La cola mide 5 cm. Si son molestados se van del nido.

8 días de edad. Pueden estar fuera del nido.

10 días de edad. Pueden estar fuera del nido o esconderse en él al ver extraños. Trepan por las ramas ayudándose con el pico y las alas. Cola larga. Colores como en adulto.

Peso al nacer

Salvador (2011): 17 a 21 X= 19,2 (N= 14)

Observaciones

De la Peña (2013c). Un nido en Esperanza, el 12-01-1999, tenía 10 pichones.

Generalidades

Azategui (1975). El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecen en el nido 9 días.

Salvador (1981b). El período de incubación es de 15 días. Los pichones entre los 15 y 16 días abandonaron el nido.

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 15 días. La permanencia de los pichones en el nido es de 9 a 13 días.

De la Peña (2013c). Pone en días alternos. Período de incubación 15 días. Permanencia de los pichones en el nido 12-13 días.

Durante la incubación agregan materiales al nido, principalmente hojas o tallos frescos.

El nido del 06-02-1992, en Humboldt, estaba asentado sobre un rollo de cables. Entre otros elementos ocupó tallos de Cardo y una raíz de 1,35 m. de larga.

El nido del 18-11-1995, en Esperanza, fue construido dentro de un tarro, colocado en un Paraíso.

El 13-01-2001, en Esperanza, se encontró un huevo sobre una plataforma de palitos y algunas pajas, semioculto por una enredadera, a 2,30 m. del suelo.

Se suelen encontrar huevos en el suelo, donde están los nidos.

El nido tiene olor fuerte por las materias fecales.

Los pichones emiten un grito fuerte y tiran picotazos. Tienen ectoparásitos (piojos).

Los adultos emiten gritos de alarma y se acercan al observador.

Traen como alimentos a los pichones, ranitas, culebras, pichones de otras aves.

Los adultos en la época de cría, depredan sobre otras aves. Se los observó tomando pichones de Viudita blanca (*Fluvicola albiventer*). Tijereta (*Tyrannus savana*) y Gorrión (*Passer domesticus*).

De la Peña (2019b). 08-03-2015. Esperanza. Dos adultos con 14 juveniles. 29-01-2016. Villa Roda. Santa Fe.

Un pichón en medio del camino era picoteado por un adulto (de unos 3 días de edad). Fue rescatado y criado.

Otros

Antoniuzzi et al. (2011); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Salvador (2011a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredadores

De adultos: *Accipiter striatus*. Sin datos, Seipke y Cabanne (2008), *Tyto alba* en Misiones, Massoia (1988k), *Bubo virginianus* en Formosa, Di Giacomo (2005h), *Glaucidium brasilianum* en Chaco, Carrera et al. (2008), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), *Falco femoralis* en Córdoba, Salvador (2012h), en La Pampa. Liébana (2015)

De pichones: *Spizapteryx circumcincta* en Córdoba, Martella y Bucher (1984).

De huevos: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Córdoba, Salvador (2016b)

Más información:

Salvador (1981). De la Peña (2019a). Darrieu et al. (2010)



Esperanza. Santa Fe. 01-01-2008. 2 días de edad



Esperanza. Santa Fe. 03-03-1971. Nido con 21 huevos



Esperanza. Santa Fe. 05-03-2005. 1 día de edad



Esperanza. Santa Fe. 24-09-2006



Humboldt. Santa Fe. 06-02-1992. Nido en tirante de galpón



Esperanza. Santa Fe. 31-12-1993
Nido con huevos de *Molothrus bonariensis*.



Esperanza. Santa Fe. 05-03-2015. Juvenil




Esperanza. Santa Fe. 15-07-2007



Esperanza. Santa Fe. 15-01-2016



Esperanza. Santa Fe. 10-01-2016



Saladillo. Santa Fe. 14-01-2016

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete. Manto y cubiertas alares estriadas de blanco. Cola larga con ancha banda negra y punta blanca. Lomo y rabadilla blancos. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Guira guira (J. F. Gmelin, 1788) desde el norte del país hasta Chubut.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución abarca desde el noreste de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina hasta Chubut.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1918b, 1923f); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Vargas et al. (2007); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco

Citas: Carrera et al. (2008); Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut

Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Nores y Yzurieta (1981); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Gaiman, dpto. Gaiman, 30-11-2000)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1932); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Haro y Gutierrez (1992); Haro (1998); Heredia (2006); Martella y Bucher (1984); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c.); Salvador (1981a, 1983, 2012h, 2013e, 2016b); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990b); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Barrows, W. (1884a), Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Davis (1940b); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Davis (1940b); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005);

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 10-02-1983)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler et al. (1990); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Adela, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

La Rioja

Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Gosse (1899); Lucero (2013f); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Steullet y Deautier (1945)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Massoia (1988k)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 2-10-1981)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Gazari (1967); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1978); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Camperi y Darrieu (2005); Dabbene (1921c); Gazari (1967); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Observaciones: De la Peña (Matagusanos, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Pagano y Salvador (2017); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986, 1995); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Quiroga y Llugdar (2019c)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Selva, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2000, 2006, 2013); Antelo et al. (2013); Brandán et al. (2006); Brandán (2005); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2020); Echevarría et al. (1998, 2007, 2008c, 2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Fanjul (2010); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Subfamilia: Neomorphinae

CRESPÍN *Tapera naevia* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chochi. Choschín. Crispín. Yasy.

DESCRIPCIÓN

Largo: 26-29 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 1 50 g

Contreras (1979f): N= 1 (M) 44,0 g

Contreras (1983a) N= 1 (M) 52,2 g

Di Giacomo (2005h): N= 1 56,0 g

Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 52,4 g (Rango: 51,3 a 53,2); N= 1 (H) 56,5 g

Coloración. Mandíbula amarillenta. Maxilar superior negro. Patas grises parduscas. Iris pardo.

Cabeza parda con las plumas ribeteadas de castaño formando un copete. Cejas blanquecinas. Línea malar oscura.

Parte dorsal gris pardusca con grandes estrías pardas oscuras. Supracaudales largas hasta la mitad de la cola pardas oscuras orilladas de gris. Ventral blanca ocrácea.

Alas grises parduscas. Cubiertas grises parduscas con manchas oscuras y canelas.

Cola larga, escalonada, parda grisácea con punta y márgenes ocráceos.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario. Se oculta en el follaje de las plantas. El canto se escucha tanto de día como de noche.

Alimentación

Friedmann (1927). Coleoptera. Lepidoptera (larvas).

Klimaitis (1993). Insectos (Tettigonidae).

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae). Hemiptera (Cicadidae, Pentatomidae). Lepidoptera (orugas). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acrididae, Gryllidae, Tettigonidae).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un silbido bisilábico: Fie fii...fie fii...fie fii...
 Bodrati (*in liit.* 2019). Otra voz es una serie de cuatro a veces cinco notas fie fie fie fie fie

HÁBITAT

Sabanas, montes, arboledas, selvas, campos arbustivos, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos parasitados y/o pichones en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Especie parásita.

Dinelli en Hartert y Venturi (1909). Tucumán. Nido parasitado.

Hartert y Venturi (1909). Santa Fe. Nido parasitado.

Mogensen (1927). Observó un pichón en un nido de *Phacellodomus rufifrons* y una pareja de *Phacellodomus ruber* alimentando a un pichón.

Smyth (1928). Monteagudo, dpto. Simoca, Tucumán, 14-01-1923, huevo.

Pereyra (1938). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, P. Girard el 11 de noviembre localizó un huevo en un nido de *Synallaxis frontalis*.

Giai (1950). Noroeste de Santa Fe, en 1937, un pichón en nido de *Schoeniophylax phryganophila*

Höy (1968c). Salta, diciembre y enero parasitando a *Synallaxis frontalis*.

Contino (1980). No construye nido, pone un huevo por nido.

Salvador (1982). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, en la temporada 1980-81 se localizaron 8 nidos parasitados, 4 con huevos y 4 con pichones (11-11-1980, 04-01-1981, 04-01-1981, 11-01-1981, 24-01-1981, 02-02-1981, 02-02-1981, 10-02-1981) y 2 nidos parasitados, con un huevo (10-12-1980 y 11-12-1980) en Mar Chiquita, dpto. San Justo, Córdoba. Las especies parasitadas fueron: *Synallaxis albescens*, *Synallaxis frontalis* y *Schoeniophylax phryganophila*. Las posturas ocurrieron desde el 11 de noviembre al 10 de febrero.

Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. (1983). Chaco. Nido parasitado.

López Lanús (1997). Formosa. Nido parasitado.

Pautasso (2002). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos parasitados: el 18-11-1999, un huevo en nido de *Synallaxis albescens* y el 20-12-1999, un pichón en nido de *Phacellodomus striaticollis*.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, A. Bodrati observó un pichón alimentado por un adulto de Curutié rojizo (*Certhiaxis cinnamomea*) en enero de 2000.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, se registraron posturas entre noviembre y febrero. Las especies parasitadas fueron el Curutié rojizo (*Certhiaxis cinnamomea*) y el Pijú de frente gris (*Synallaxis frontalis*).

Salvador (2011a). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 21 nidos parasitados. Pone de noviembre a febrero, un solo huevo por nido, solamente uno tenía dos. Las especies parasitadas fueron *Synallaxis albescens*, *Synallaxis frontalis* y *Schoeniophylax phryganophila*.

Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido parasitado.

Bodrati y Salvador (2013a). Chaco. Nido parasitado.

Salvador (2013a). Gral. San Martín, Córdoba, un pichón en un nido de Espinero chico (*Phacellodomus sibiletrix*).

De la Peña (2013c). Desde el 29-11-1976 hasta 06-02-2004, se encontraron 15 nidos parasitados, 11 nidos en Esperanza, 1 en Manucho, dpto. La Capital, Santa Fe y 3 en Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe. Las especies parasitadas fueron 8: *Synallaxis frontalis*, *Synallaxis albescens*, *Synallaxis spixi*, *Phacellodomus striaticollis*, *Schoeniophylax phryganophila*, *Leptasthenura platensis*, *Certhiaxis cinnamomea*, *Asthenes baeri*.

Tres nidos tenían 2 huevos de la especie parásita, los restantes uno.

Bodrati y Salvador (2015b). Parque Nacional Chaco, dpto. Sargento Cabral, Chaco, 27-11-1998, un pichón en un nido de *Craniroleuca pyrrhophia* y el 23-10-1997, un pichón en un nido de *Tolmomyias sulphurescens*. Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 14-11-2011, un pichón en un nido de *Synallaxis ruficapilla*. Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 4 huevos.
 Bodrati y Salvador (2015b). Misiones. Nido parasitado.
 Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido parasitado.
 Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido parasitado.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido parasitado.

Huevos

Pone 1 ó 2 huevos por nido parasitado.
 Elípticos, algunos ovoidales o cilíndricos. Blancos.



Medidas

Smyth (1928): 21,5 x 16,0		
Pereyra (1938b): 21,0 x 16,0		
Contino (1980): 20,0 x 15,0		
Salvador (1982): 21, 4 a 22,8 x 15,8 a 17,1	X= 22,0 x 16,5	(N= 5)
Di Giacomo (2005h): 19,4 a 22,5 x 15,3 a 17,1	X= 21,0 x 16,1	(N= 16)
Salvador (2011a): 21,1 a 22,9 x 15,8 a 17,4	X= 21,8 x 16,6	(N= 18)
De la Peña (2013c). 18,2 a 24,3 x 12,8 a 17,9	X= 21,4 x 15,6	(N= 14)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 2,3 a 3,2	X= 2,6	(N= 16)
Salvador (2011a): 3,0 a 3,8	X= 3,4	(N= 11)
De la Peña (2013c): 1,8 a 2,8	X= 2,16	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,97 a 2,68	X= 0,205	(N= 14)

PICHONES

Descripción

Salvador (1982). Nacen desnudos y con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico crema amarillento, parte interna de la boca amarilla-anaranjada. Al 5º día comienza a abrir los ojos. Tiene canutos en la cabeza, en el cuello, en el dorso, alas y costados del pecho. El 8º día ojos abiertos, pardo oscuros. Plumitas en el dorso, cabeza, alas y parte del pecho. El día 12º prácticamente todo el cuerpo cubierto de plumas. La cabeza, cuello dorsal, alas, dorso y cola están cubiertos de plumas pardo oscuras con la punta acanelada. La garganta, cuello ventral y parte superior del pecho están cubiertas de plumas acaneladas, con una barra transversal pardo oscura. Las plumas de la zona ventral son amarillentas.

De la Peña (2013c). Nacen implumes. Ojos cerrados. Piel rosada. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillentos.

1 día. Implume. Ojos cerrados. Tira la cabeza hacia atrás.

3 días. Materias fecales líquidas, de color marrón.

5 días. Escasas vainas (sin plumón). Apenas se notan las vainas de las plumas de la cola.

Vivaracho. Eleva el cuello y la cabeza. Eriza las plumas de la cabeza y dorso.

Materias fecales líquidas, marrones (como los pichones de *Coccyzus melacoryphus*)

6 días. Abre los ojos marrones. Tira picotazos.

8 días. Plumitas en la cabeza y dorsalmente caneladas. Lados del pecho acanelado.

Flancos blanquecinos. Aparecen las láminas en las plumas primarias. Las láminas de las secundarias son más grandes.

12 días. Grita fuerte. El plumaje se parece al del adulto.

13 días. Comisura amarillenta. Mandíbula clara. Maxilar oscuro.

Plumas males oscuras. Garganta acanelada.

15-16 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas						
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Lámina	Total
1	0,3	0,7-1,1	1,1-1,6				
3	0,5	1,1-1,4	1,5-2,0				
5				0,3			0,2
6	0,6	1,7	2,0	0,5			0,3
8				1,0	0,1-0,2	0,3-0,4	0,7
10				1,2	0,5		2,0
12				1,4	1,1		2,0
13							3,0

Observaciones

Hartert y Venturi (1909). Dos pichones en nido de *Certhiaxis cinnamomea*.

López Lanús (1997). Parque Nacional Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, 09-02-1992, pichón en nido de *Certhiaxis cinnamomea*.

Generalidades

Salvador (1982). El período de incubación es de 15-16 días. Los pichones abandonan el nido a los 16-18 días.

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 15 ó 16 días. El pichón permanece en el nido entre 16 y 18 días.

De la Peña (2013c). Período de incubación 15-16 días. Permanencia de los pichones en el nido 16-17 días.

En dos nidos estudiados, Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*) y Chotoy (*Schoeniophylax prhyganophila*) dejaron el nido por la boca de entrada. Esta medía unos 4 cm. de diámetro.

Más información:

Salvador (1982). De la Peña (2019a). Lowther (2010)

Otros

Antoniazzi et al. (2011); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.



Esperanza. Santa Fe. 15-01-2012

Esperanza. Santa Fe. 05-01-2003. Pichón de 10 días



Esperanza. Santa Fe. 30-01-2006. Pichón de 10 días



Esperanza. Santa Fe. 24-11-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete. Cejas blanquecinas. Cubiertas alares con manchas oscuras y canelas. Cola larga. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Tapera naevia naevia (Linnaeus, 1766) desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extenso Rango: de distribución desde el sur de Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tapera naevia naevia (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Dean (1971); Gasparri et al. (2018); Klimaitis (1975, 1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015b); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); Frenzel (1891); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1982, 1983, 2013d); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b, 1983a); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá 19-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

La Rioja

Citas: Capurro y Bucher (1986); Harward (1967)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Mezquida (2001b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Gai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1968); Malizia et al. (2005); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1994); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Mogensen (1927); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

YASIYATERÉ GRANDE *Dromococcyx phasianellus* (Spix, 1824)

Otros nombres: Cuclillo faisán. Cuco faisán. Yasiyateré faisán.

DESCRIPCIÓN

Largo: 35-36 cm.

Coloración. Mandíbula grisácea, maxilar superior pardo. Anillo ocular amarillo-verdoso. Patas pardo-grisáceas. Iris pardo.

Corona y cresta castañas. Línea posocular blanquecina. Parte dorsal parda oscura con reflejos purpúreos, con las plumas orilladas de ocre. Garganta, cuello y pecho ocráceos moteados de pardo oscuro. Resto de la zona ventral blanco.

Alas pardas con lunares blancos en las primarias. Cubiertas alares y secundarias pardas orilladas de ocráceo.

Supracaudales pardas con ápice blanco, muy largas.

Cola parda oscura con ápice y margen blancos. Ventralmente es parda grisácea con manchas blancas.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario en la parte baja o media de la vegetación.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto se parece al del Crespín pero completado con un trino final: Fie fii prrrrí fie fii prrrrí.

HÁBITAT

Selvas, capueras, selvas riparias.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Ihering (1924). Payne (1997). Sick (1953). Lowther (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete castaño. Línea ocular blanquecina. Cuello y pecho con puntos oscuros. Cola larga, ancha y escalonada. Ventralmente, la cola con manchas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) en Misiones y este de Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Extensa área de distribución en Centro América y Sud América, llegando hasta el noreste de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011); López-Lanús y Mencia (2017)

Misiones

Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1992e, 1994, 1996a); Dabbene (1910); Navas y Bó (1993)

YASIYATERÉ CHICO *Dromococcyx pavoninus* Pelzel, 1870

Otros nombres: Cuclillo pavón. Cuco pavón. Yasiyateré pavón.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25-28 cm.

Coloración. Mandíbula amarillenta, maxilar superior pardo. Patas grises. Iris pardo.

Corona y copete, pardos. Línea postocular ocrácea. Parte dorsal parda oscura, con las plumas orilladas de blanco.

Garganta blanquecina. Cuello y pecho grises con tinte ocráceo. Resto de la parte ventral blanco.

Alas pardas con mancha blanca en la barba interna de las primarias y ápice blanco. Cubiertas alares pardas oscuras orilladas de blanquecino.

Cola parda con punta blanca. Ventralmente es parda grisácea con lunares blancos.

COMPORTAMIENTO

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es parecido al del Crespín, pero con tres notas más al final: Fie fii fififi...fie fii fififi.

HÁBITAT

Selvas, capueras, remanentes de bosque, bordes de selva.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Observaciones

Bodrati et al. (2010). Misiones. Juvenil

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Juvenil

Más información:

Neunteufel (1951). Payne (1997). Lowther (2009)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete castaño. Línea ocular ocrácea. Cuello y pecho uniformes. Cola larga, ventralmente tiene manchas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Dromococcyx pavoninus Pelzel, 1870 en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se encuentra en Sud América con varias poblaciones separadas que comprenden: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Darrieu y Martínez (1984); Franzoy (2017a); Giraudo et al. (2006)

Misiones

Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1992, 1996a); Dabbene (1910); Giai (1950, 1951); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Straneck (1990h)

ORDEN: STRIGIFORMES

LECHUZA DE CAMPANARIO

FAMILIA: TYTONIDAE

Aves de hábitos nocturnos.

El pico es curvo, ganchudo. Se alimentan de reptiles, roedores, pequeños mamíferos e insectos.

Las patas son largas, cubiertas de plumas hasta los dedos. La uña del dedo medio tiene un borde que semeja un peine.

Frecuentan principalmente construcciones en áreas rurales y poblaciones humanas.

Se alimenta de ratones, ratas, lauchas, anfibios, aves, murciélagos.

Frecuentan principalmente construcciones en áreas rurales, huecos en árboles y poblaciones humanas.

LECHUZA DE CAMPANARIO *Tyto furcata* (Temminck, 1827)

Sinonimia: *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Otros nombres: Búho. Búho blanco. Búho de los graneros. Búho dormilón. Búho fantasma. Campanario. Col-col. Dormilón. Lechuza. Lechuza blanca. Lechuza bodeguera. Lechuza común. Lechuza de galpón. Lechuza de iglesia. Lechuza de las torres. Lechuza de los campanarios. Lechuza del galpón. Lechuza pericoter. Lechuzón. Lechuzón blanco. Lechuzón de las parvas. Lechuzón de los galpones. Lechuzón de pozo. Lechuzón galponero. Pericote. Pericoter. Rata. Suindá. Suindará.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45 cm.

Peso: Contreras (1975): N= 2 (M y H) 275 y 341 g

Contino (1980): 320,0 g

Salvador (1988): N= 1 (?) 360,0 g

Christie et al. (2004): N=1 (H) 275 g

Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 327,8 g (Rango: 318 a 341); N= 7 (H) X= 374,1 g (Rango: 338 a 418)

Pagano y Salvador (2017): N= 2 (?) 463 y 390 g; N= 4 (H) 370, 400, 420 y 376 g; N= 2 (M) 280 y 332 g

Coloración. Tarsos emplumados. Iris pardo.

Dorso gris ocráceo, moteado de blanco. Cara blanca con margen oscuro en la parte inferior y ocre intenso en la superior. Castaño alrededor de los ojos. Garganta blanca. Ventral ocrácea blanquecina con motas pardas. Las alas y la cola son color ocre intenso con bandas y salpicaduras pardas oscuras. Cubiertas alares igual al dorso. La cola es como la parte dorsal, pero con barras angostas oscuras. Se conoce una fase rojiza.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos. Puede andar solitaria o en pareja. Durante el día permanece inmóvil en lugares sombríos. Al ser molestada balancea el cuerpo lateralmente o realiza movimientos con la cabeza inclinándola hacia abajo.

Alimentación

Zotta (1934). Roedores.

Humphrey et al. (1970). Coleópteros.

Contino (1980). Murciélagos, marmosas. Aves.

Justo y De Santis (1982). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Thylamys pusilla*, *Graomys griseoflavus*, *Eligmodontia typus*, *Calomys* sp., *Reithrodon auritus*. **Aves:** *Zonotrichia capensis*, *Sicalis flaveola*, *Pseudoleistes* sp.

Massoia (1983). **Mamíferos:** *Scapteromys aquaticus*, *Olygoryzomys flavescens*, *Deltamys kempi*, *Marmosa agilis*, *Olygoryzomys delticola*, *Holochilus brasiliensis*, *Akodon azarae*, *Oxymycterus rufus*, *Molossus major*, *Tadarida brasiliensis*, *Bibimys torresi*, *Cavia aperea*, *Lutreolina crassicaudata*, *Calomys* sp., *Cabreramys temchuki*, *Mus musculus*, *Bibimys* sp., *Rattus rattus*. **Aves:** *Nothura maculosa*, otras no determinadas.

Montalvo et al. (1985). **Mamíferos:** *Akodon molinae*, *Graomys griseoflavus*, *Galea musteloides*, *Eligmodontia typus*, *Ctenomys* sp., *Reithrodon auritus*, *Thylamys pusilla*, *Tadarida brasiliensis*, *Microcavia australis*. **Aves:** no determinadas.

Soncini et al. (1985). **Mamíferos:** *Calomys* sp., *Olygoryzomys longicaudatus*, *Olygoryzomys flavescens*, *Holochilus brasiliensis*, *Akodon varius*, *Akodon boliviensis*, *Mus musculus*, *Ctenomys* sp., *Cavia tschudii*, *Sturnira lilium*. **Anfibios:** *Rana chaqueña* (*Leptodactylus chaqueensis*)

Massoia (1987). **Mamíferos:** *Calomys callosus*, *Akodon* sp., *Graomys griseoflavus*, *Thylamys* sp., *Calomys musculus*, *Galea musteloide*, *Ctenomys* sp.

Massoia y Vetrano (1988a). **Mamíferos:** *Akodon molinae*, *Graomys griseoflavus*, *Eligmodontia typus*, *Ctenomys mendocinus*, *Calomys musculus*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys* sp., *Rattus rattus*, *Olygoryzomys longicaudatus*, *Mus* sp. **Insectos:** Acridiidae (*Dichroplus* sp.). Batrachia, Blattidae, Gryllidae, Mantidae, Rutilidae (*Pelidnora* sp.). Scarabaeidae, (*Scaptophilus* sp.). (*Botrymus* sp.). (*Ligyris* sp.). Cicadidae, Carabidae, Coccinellidae (*Coccinella ancoralis*). Coleoptera. **Arácnidos.**

Massoia y Vetrano (1988b). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Reithrodon auritus*, *Olygoryzomys flavescens*, *Mus* sp., *Calomys* sp. **Insectos:** Orthoptera (Acridiidae). Coleoptera (Curculionidae). Homoptera (Cicadidae). Orthoptera (Phasmidae) (Proscopidae). **Moluscos:** Gasteropoda. **Aves:** no determinadas.

Massoia (1988b). **Mamíferos:** *Akodon cursor*, *Euryzygomatomys spinosus*, *Calomys tener*, *Cavia aperea*, *Nectomys squamipes*, *Necomys* sp., *Monodelphis sorex*, *Micoureus paraguayanus*, *Holochilus brasiliensis*, *Sooretamys angouya*, *Rattus rattus*, *Olygoryzomys nigripes*, *Olygoryzomys flavescens*, *Oxymycterus misionalis*, *Thaptomys nigrita*. **Insectos:** Scarabaeidae, Proscopidae, Elateridae (*Pyroporus* sp.). Coleoptera. **Aves:** indeterminadas. **Anfibios:** indeterminados.

Massoia et al. (1988c). **Mamíferos:** *Necomys temchuki*, *Olygoryzomys nigripes*, *Rattus rattus*, *Akodon cursor*, *Olygoryzomys flavescens*, *Mus musculus*, *Cryptonanus chacoensis*, *Holochilus brasiliensis*, *Calomys laucha*.

Massoia (1988f). **Mamíferos:** *Calomys callosus*, *Calomys musculus*, *Galea musteloides*, *Graomys griseoflavus*, *Holochilus chacarius*, *Necomys lactens*, *Necomys temchuki*, *Rattus* sp., *Thylamys* sp., *Olygoryzomys* sp. **Aves:** indeterminadas.

Massoia (1988g). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Holochilus brasiliensis*, *Rattus norvegicus*, *Reithrodon auritus*, *Calomys musculus*, *Cavia aperea*, *Ctenomys talarum*, *Mus musculus*, *Olygoryzomys flavescens*, *Lepus europaeus*. **Aves:** indeterminadas.

Massoia (1988k). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Holochilus brasiliensis*, *Felis catus*, *Cavia aperea*, *Calomys musculus*, *Rattus rattus*, *Olygoryzomys flavescens*. **Aves:** *Columbina picui*, *Guira guira*, *Zenaida auriculata*. **Anfibios:** *Leptodactylus* sp.

Massoia & Pardiñas (1988d). **Mamíferos:** *Akodon molinae*, *Calomys musculus*, *Ctenomys talarum*, *Eligmodontia typus*, *Galea musteloides*, *Graomys griseoflavus*, *Thylamys* sp. **Aves:** indeterminadas.

Massoia et al. (1988a). **Mamíferos:** *Calomys callosus*, *Eumops bonariensis*, *Holochilus brasiliensis*, *Molossus ater*, *Necomys temchuki*, *Olygoryzomys flavescens*, *Oxymycterus rufus*, *Scapteromys aquaticus*, *Thylamys* sp. **Aves:** indeterminadas.

Titanti (1988). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Calomys* sp., *Eligmodontia typus*, *Galea musteloides*, *Graomys griseoflavus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys elegans*. **Insectos.**

Massoia (1989). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Molossus molossus*, *Lutreolina crassicaudata*, *Lasiurus* sp., *Holochilus brasiliensis*, *Cavia aperea*, *Calomys* sp., *Rattus rattus*, *Oligoryzomys flavescens*. **Aves:** *Columba livia*, otras no determinadas.

De Santis y Pagnoni (1989). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus*, *Graomys griseoflavus*, *Reithrodon auritus*, *Akodon molinae*, *Akodon iniscatus*, *Akodon nucus*, *Microcavia australi*, *Ctenomys* sp., *Thylamys pusilla*, *Marmosa pusilla*. **Aves:** Mimidae, Emberizidae, Icteridae, Tyrannidae, Furnariidae. **Reptiles:** Iguanidae.

Massoia et al. (1989b). **Mamíferos:** *Akodon cursor*, *Calomys laucha*, *Holochilus brasiliensis*, *Eumops bonariensis*, *Diaemus youngii*, *Cavia aperea*, *Euryzygomatomys spinosus*, *Oligoryzomys* sp., *Monodelphis* sp., *Necromys temchuki*, *Molossus ater*, *Lasiurus borealis*, *Sooretamys angouya*, *Rattus rattus*, *Thylamys* sp. **Aves:** Passeriformes no determinados.

Massoia et al. (1989a). **Mamíferos:** *Akodon cursor*, *Holochilus brasiliensis*, *Euryzygomatomys spinosus*, *Cavia aperea*, *Lasiurus borealis*, *Lutreolina crassicaudata*, *Molossus ater*, *Necromys temchuki*, *Micoureus paraguayanus*, *Oligoryzomys chacoensis*, *Nectomys squamipes*, *Nyctinomops laticaudatus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Oligoryzomys nigripes*, *Rattus rattus*, *Sylvilagus brasiliensis*, *Sooretamys angouya*, *Thylamys* sp.

Massoia et al. (1989c). **Mamíferos:** *Akodon cursor*, *Lutreolina crassicaudata*, *Lasiurus borealis*, *Holochilus brasiliensis*, *Cryptonanus chacoensis*, *Cavia aperea*, *Necromys temchuki*, *Myotis nigricans*, *Mus musculus*, *Monodelphis sorex*, *Molossus molossus*, *Molossus ater*, *Oligoryzomys nigripes*, *Oxymycter misionalis*, *Oligoryzomys flavescens*, *Nectomys squamipes*, *Sturnira lilium*, *Rattus rattus*.

Massoia et al. (1989d). **Mamíferos:** *Oligoryzomys flavescens*, *Oligoryzomys nigripes*, *Holochilus brasiliensis*, *Akodon azarae*, *Cryptonanus chacoensis*, *Scapteromys aquaticus*, *Deltamys kempii*, *Bibimys torresi*, *Oxymycter rufus*, *Dasypterus ega*, *Eumops bonariensis*, *Rattus rattus*.

Massoia et al. (1988e). **Mamíferos:** *Calomys laucha*, *Mus musculus*, *Oligoryzomys* sp., *Rattus rattus*, *Holochilus brasiliensis*, *Necromys temchuki*, *Cavia aperea*, *Molossus ater*, *Bibimys labiosus*, *Monodelphis* sp., *Oryzomys ratticeps*, *Lutreolina crassicaudata*, *Sturnira lilium*.

Massoia y Pardiñas (1989). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys laucha*, *Calomys musculus*, *Holochilus brasiliensis*, *Tadarida brasiliensis*, *Lutreolina crassicaudata*, *Cavia aperea*. **Anfibios y aves** no determinadas.

Massoia (1990b). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Reithrodon auritus*, *Oxymycter rufus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Holochilus brasiliensis*, *Ctenomys talarum*, *Cavia aperea*, *Calomys laucha*. **Aves:** Furnariidae.

Massoia et al. (1990). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Lutreolina crassicaudata*, *Holochilus brasiliensis*, *Eumops perotis*, *Cryptonanus chacoensis*, *Cavia aperea*, *Calomys callosus*, *Rattus rattus*, *Oxymycter rufus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Necromys temchuki*, *Molossus molossus*, *Molossus ater*, *Scapteromys aquaticus*, *Rattus* sp. **Anfibios y aves:** no determinados.

Nores y Gutiérrez (1990). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Microcavia australis*.

Morici (1990a). **Aves:** *Agelaioides badius*, *Annumbius annumbi*, *Carduelis magellanica*, *Columbina picui*, *Mimus saturninus*, *Sicalis flaveola*, *Sturnella superciliaris*, *Troglodytes aedon*, *Zenaida auriculata*, *Zonotrichia capensis*, *Columba livia*.

Morici (1990b). **Aves:** *Nothura maculosa*, *Sicalis flaveola*, *Agelaioides badius*, *Carduelis magellanica*, *Zonotrichia capensis*, *Molothrus rufoaxillaris*.

Belloq (1990). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Rattus* sp., *Oligoryzomys flavescens*, *Cavia aperea*, *Calomys laucha*, *Calomys musculus*, *Reithrodon* sp. **Reptiles. Aves. Insectos.**

Noriega et al. (1990). **Aves:** *Agriornis microptera*, *Diuca diuca*, *Geositta cunicularia*, *Mimus patagonicus*, *Molothrus bonariensis*, *Zonotrichia capensis*, *Phrygilus gayi*, *Phrygilus fruticeti*.

De Santis et al. (1991). **Mamíferos:** Ratón oliváceo (*Abrothrix olivace*), Ratón peludo (*Abrothrix hirta*), Ratón colilargo (*Oligoryzomys longicaudatus*), Laucha sedosa (*Eligmodontia typus*), Rata conejo (*Reithrodon auritus*), Rata orejuda patagónica (*Loxodontomys micropus*), Ratón topo pardo (*Geoxus valdivianus*), Ratón común (*Mus musculus*). **Aves:** *Sturnella loyca*. **Anfibio:** *Rana esteparia* (*Pleurodema bufoninum*)

Tiranti (1992). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Eptesicus furinalis*, *Eligmodontia typus*, *Ctenomys* sp., *Calomys* sp., *Oligoryzomys flavescens*, *Graomys griseoflavus*, *Galea musteloides*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys pusilla*. **Reptiles:** Lagartija verde (*Teius oculatus*). **Insectos. Aves.**

Noriega et al. (1993). **Aves:** *Zonotrichia capensis*, *Diuca diuca*, *Phrygilus fruticeti*, *Mimus patagonicus*, *Cinclodes fuscus*, *Synallaxis albescens*, *Leptasthenura* sp., *Zenaida auriculata*, *Upucerthia dumetaria*, *Progne elegans*, *Pseudoseisura lophotes*.

De Santis et al. (1993). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*, *Chelemys macronyx*, *Reithrodon auritus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Mus musculus*, *Geoxus valdivianus*, *Eligmodontia typus*. **Aves:** *Sturnella loyca*, *Zonotrichia capensis*.

Massoia et al. (1994c). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Holochilus brasiliensis*, *Histiotus montanus*, *Galea musteloides*, *Didelphis albiventris*, *Ctenomys* sp., *Calomys musculus*, *Necomys benefactus*, *Mus musculus*, *Monodelphis dimidiata*, *Lepus europaeus*, *Lagostomus maximus*, *Thylamys* sp., *Tadarida brasiliensis*, *Rattus rattus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Oxymycterus rufus*, *Oligoryzomys flavescens*.

Massoia y Pardiñas (1994). **Mamíferos:** *Euneomys chinchilloides*, *Reithrodon auritus*, *Loxodontomys micropus*, *Chelemys macronyx*, *Phyllotis darwini*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Akodon olivaceus*, *Geoxus valdivianus*, *Calomys musculus*, *Eligmodontia typus*.

Massoia et al. (1995a). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Pseudoryzomys simplex*, *Necomys temchuki*, *Cavia aperea*, *Oligoryzomys microtis*. Aves. Anfíbios. Insectos.

Massoia et al. (1995b). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Akodon varius*, *Oligoryzomys* sp., *Holochilus brasiliensis*, *Pseudoryzomys simplex*, *Cavia aperea*, *Lutreolina crassicaudata*, *Necomys temchuki*. Anfíbios, aves.

Massoia y Lartigau (1995). **Mamíferos:** *Reithrodon auritus*, *Loxodontomys micropus*, *Ctenomys* sp., *Oligoryzomys darwini*, *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Lama guanicoe*, *Euneomys chinchilloides*, *Lepus capensis*, *Chelemys macronyx*, *Geoxus valdivianus*, *Dusicyon culpaes*, *Didelphis albiventris*, *Eligmodontia typus*, *Irenomys tarsalis*.

Massoia et al. (1997c). **Mamíferos:** *Akodon molinae*, *Calomys* sp., *Ctenomys talarum*, *Chlamyphorus truncatus*, *Eligmodontia typus*, *Oligoryzomys* sp., *Lepus europaeus*, *Graomys griseoflavus*, *Rattus rattus*, *Thylamys* sp. **Anfíbios:** indeterminados.

Diéguez y Corbella (1997). **Aves:** *Patagioenas picazuro*, *Pitangus sulphuratus*, *Sicalis flaveola*, *Zonotrichia capensis*.

Diéguez y Méndez (1997). **Aves:** *Molothrus bonariensis*, *Progne* sp., *Columba* sp., *Emberizidae*, *Furnariidae*.

Travaini et al. (1997). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Euneomys* sp., *Eligmodontia typus*, *Chelemys macronyx*, *Ctenomys haigi*, *Calomys musculus*, *Microcavia australis*, *Loxodontomys micropus*, *Irenomys tarsalis*, *Geoxus valdivianus*, *Galea musteloides*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys pusilla*, *Phyllotis xanthopygus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Oryctolagus cuniculus*. Aves. Anfíbios. Insectos.

Massoia et al. (1997a). **Mamíferos:** *Holochilus chacarius*, *Akodon cursor*, *Pseudoryzomys simplex*, *Oligoryzomys microtis*, *Calomys callosus*, *Akodon azarae*, *Eumops perotis*, *Oligoryzomys chacoensis*, *Scapteromys aquaticus*, *Gracilinanus agilis*, *Tonatia* sp.

Massoia et al. (1997b). **Mamíferos:** *Akodon varius*, *Graomys griseoflavus*, *Calomys musculus*, *Ctenomys lujanensis*, *Reithrodon auritus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys laucha*. Aves.

Pardiñas y Galliari (1998). **Mamíferos:** *Notiomys edwardsii*

García Esponda et al. (1998). **Mamíferos:** *Graomys griseoflavus*, *Reithrodon auritus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Akodon* sp., *Rattus rattus*, *Microcavia australis*, *Ctenomys* sp., *Lepus capensis*, *Histiotus montanus*, *Thylamys pusilla*. **Aves:** *Zonotrichia capensis*, *Molothrus bonariensis*, *Agelaioides badius*, *Sturnella loyca*, *Passer domesticus*, *Hymenops perspicillata*, *Zenaida auriculata*, *Anthus* sp. **Anfíbios:** *Rana esteparia* (*Pleurodema bufoninum*). **Reptiles:** Matuasto de Bell (*Leiosaurus belli*), *Liolaemus* sp. **Insectos:** Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera. **Crustáceo :** Isopoda.

Massoia et al. (1999b). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Holochilus chacarius*, *Chrotopterus auritus*, *Cryptonanus chacoensis*, *Cavia aperea*, *Calomys callosus*, *Bibimys chacoensis*, *Scapteromys aquaticus*, *Pseudoryzomys simplex*, *Oligoryzomys fornesi*. **Aves:** no determinadas.

Massoia et al. (1999a). **Mamíferos:** *Graomys griseoflavus*, *Oligoryzomys chacoensis*, *Calomys musculus*, *Thylamys elegans*, *Akodon varius*, *Necomys* sp., *Galea musteloides*, *Eligmodontia typus*, *Ctenomys* sp.

Pillado y Trejo (2000). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*, *Lepus europaeus*, *Irenomys tarsalis*, *Euneomys chinchilloides*, *Eligmodontia morgani*, *Ctenomys haigi*, *Loxodontomys micropus*, *Oligoryzomys longicaudatus*. **Insectos:** Coleopteros.

De la Peña (2001). **Mamíferos:** *Laucha*. **Aves:** *Pitangus sulphuratus*

Teta y Andrade (2002). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Notiomys edwardsii*, *Microcavia australis*, *Histiotus montanus*, *Euneomys chinchilloides*, *Eligmodontia* sp., *Chelemys macronyx*, *Ctenomys* sp., *Lestodelphys halli*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*.

Trejo y Ojeda (2004). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis*, *Akodon olivaceus*, *Chelemys macronyx*, *Eligmodontia morgani*, *Euneomys* sp., *Geoxus valdivianus*, *Loxodontomys micropus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*. **Aves:** *Aphrastura spinicauda*.

Christie et al. (2004) Roedores

Trejo y Lambertucci (2007). **Mamíferos:** *Lestodelphys halli*, *Thylamys* sp., *Dromiciops gliroides*, *Histiotus montanus*, *Tadarida brasiliensis*, *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Akodon* sp., *Akodon iniscatus*, *Akodon molinae*, *Chelemys macronyx*, *Geoxus valdivianus*, *Notiomys edwardsii*, *Calomys musculus*, *Eligmodontia* sp., *Euneomys* sp., *Graomys griseoflavus*, *Irenomys tarsalis*, *Loxodontomys micropus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Galea musteloides*, *Microcavia australis*, *Ctenomys* sp., *Lepus*

europaeus, *Oryctolagus cuniculus*. **Aves:** Columbidae, Mimidae, Emberizidae, Icteridae, Tyrannidae, Furnariidae. Reptiles. Anfibios. Insectos.

Fernández et al. (2009). **Mamíferos:** *Calomys* cf. *C. laucha*-*C. musculus*, *Holochilus brasiliensis*, *Oligoryzomys flavescens*, *Akodon azarae*, *Rattus rattus*, *Mus musculus*. **Aves:** *Zonotrichia capensis*, *Sicalis* sp., *Molothrus bonariensis*, Charadriidae indeterminados. **Anfibios:** *Leptodactylus latrans*, *Leptodactylus* cf. *L. latinasus*, *Hypsiboas pulchellus*. **Insectos:** Coleoptera, *Heterogomphus pauson*, *Cyclocephala* sp., *Nezara viridula*. Gómez et al. (2012). **Mamíferos:** *Thylamys* sp., *Akodon caenosus*, *Akodon dolores*, *Akodon simulator*, *Akodon spegazzinii*, *Calomys* cf. *C. fecundus/venustus*, *Calomys* cf. *C. laucha/musculus*, *Graomys centralis*, *Holochilus chacarius*, *Necromys lasiurus*, *Oligoryzomys* cf. *O. flavescens*, *Oligoryzomys* sp., *Rattus* sp., *Ctenomys* sp., *Galea leucoblephara*, *Microcavia australis*.

Nanni et al. (2012). **Mamíferos:** *Akodon dolores*, *Necromys lasiurus*, *Oligoryzomys* sp., *Oligoryzomys* cf. *O. flavescens*, *Calomys* cf. *C. laucha/musculus*, *Calomys* cf. *C. fecundus/venustus*, *Graomys chacoensis*, *Ctenomys* sp., *Galea leucoblephara*, *Thylamys* sp. **Aves.** **Insectos:** Hemiptera. Coleoptera. Hymenoptera.

Solaro et al. (2012). **Mamíferos:** *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys* sp., *Eligmodontia* sp., *Ctenomys* sp. (juveniles). *Ctenomys* sp. (adultos), *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Necromys benefactus*, *Graomys griseoflavus*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys* sp. **Aves:** *Molothrus* sp. **Insectos:** Mantidae. Scarabaeidae.

Torregiani et al. (2015). **Mamíferos:** *Cavia aperea*, *Akodon azarae*, *Oligoryzomys flavescens*, *Rattus* spp. **Aves:** Icteridae.

Osses et al. (2017). **Mamíferos:** *Cavia aperea*, *Akodon azarae*, *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys laucha*, *Holochinus brasiliensis*, *Oxymycterus rufus*, *Reithrodon typicus*, *Lepus europeus*, *Rattus* spp. **Anfibios:** *Leptodactylus* sp. **Aves.**

D'Hiriart et al. (2017). Información para la región de las Yungas.

De la Peña (2019b). **Mamíferos:** Ratón de pastizal pampeano (*Akodon azarae*), Rata colorada o rata nutria, (*Holochinus brasiliensis*), Laucha chica o de campo (*Calomys laucha*), *Rattus* sp.

Más información:

Amela García et al. (1990), Bellocq and Kravetz (1994), D'Hiriart et al. (2017), De Santis et al. (1983, 1991), García Esponda et al. (1998), Leveau et al. (2006), Leveau y Leveau (2004), Massoia (1979, 1987, 1990b), Massoia et al. (1989e), Massoia y Fornés (1966), Massoia y Pardiñas (1988d, 1989), Pardiñas et al. (2005a, 2005b), Quintana (2015), Romano et al. (2002), Sahores y Trejo (2004), Salvador et al. (2017), Soncini et al. (1985), Sosa et al. (1993), Trejo et al. (2005a), Tiranti (1994).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un fuerte chistido: Tchshhht, que repite esporádicamente. En el período de reproducción suele repetir un agudo Clicliclicli.

HÁBITAT

Arboledas, palmares, áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Islas Malvinas.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En huecos en edificios (cubrerías, cielorrasos), plataformas, oquedades, grietas, cajones, tarros, caños, muebles abandonados, huecos en árboles o sobre el piso de torres, balcones, galpones, en silos (sobre comida de animales o granos). Barrancas.

Oculto. Poco elaborado o rudimentario. Plataforma de palitos. También huevos puestos directamente sobre ladrillos y tierra.

Pereyra (1931, 1937, 1938). Buenos Aires. Nido

Pereyra (1931a). San Rafael, dpto. San Rafael, Mendoza, abril, 2 pichones nacidos en un hueco en una bodega.

Harper (1935). Buenos Aires. Nido.

Pereyra (1937b). Nidos en mayo y en julio en Mendoza y en Buenos Aires.

Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.

Fraga (1984c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, 4 nidos: 25-02-1973, dentro de una torre en la casa, nido con 9 huevos; 01-06-1973, cavidad natural en la parte superior de una palmera, 4 pichones; 24-05-1976, en el mismo lugar del primer nido, 4 huevos y el 14-05-1979, en el mismo lugar del segundo nido, 3 pichones.

Fraga (1984c). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, (Narosky y Zelich, com. pers.). 03-08-1969, nido con 5 pichones, otro en octubre con huevos y otro en diciembre con pichones.

Nores y Gutiérrez (1986). 6 km al suroeste de la ciudad de Córdoba, observaciones de nidos en los años 1981-82-83-84-85, realiza dos períodos de nidificación en el año, uno en otoño y otro en primavera. Estudiaron 7 nidos, 6 en galpones y uno en una palmera. Las posturas variaron de 2 a 6 huevos. Fechas de postura en marzo-abril y octubre-noviembre.

Nores y Gutiérrez (1986). En el Río Segundo, Córdoba, M. Nores y D. Yzurieta, observaron el 26-11-1975, entre 8 y 10 nidos.

Nellar Ramonella (1993). Nidifica en barrancas y edificios.

Belloq y Kravetz (1993). Diego Gaynor, pdo. San Andrés de Giles, Buenos Aires, 1985 y 1986, nidos en un tanque de un molino en desuso. En 1987 a 1989, 5 nidos en nidos artificiales.

Tallade et al. (1998). Reserva Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, diciembre 1997 a julio 1998, nido en una casilla rural abandonada.

Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.

Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido con huevos en abril y otro con pichones en marzo.

Woods (2006). Islas Malvinas. Nido.

Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.

Cockle et al. (2011). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nido en hueco de árbol.

De la Peña (2013c). Desde el 05-07-1970 a 20-06-13 se localizaron 17 nidos. El 06-02-2010, en Humboldt, dpto. Las Colonias, Santa Fe, un nido con 11 huevos, en un silo con alimentos para gallinas. El diámetro de los nidos es de 15 a 22 cm. Nido más bajo a 0,60 cm y el más alto a 20 m.

Liebana et al. (2013). La Pampa. Nido.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.

Sainz-Trápaga en De la Peña (2016c). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 30-12-2014, nido en una cueva sobre un cañadón que baja a la costa, a 100 m del agua en pleamar. Altura 4 m. Pichones.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 10 nidos, posturas entre febrero y noviembre, ubicados en huecos en barrancas sobre el Río Tercero, sobre tirantes en galpones, entre fardos de alfalfa o en casas abandonadas, entre 3 y 6,5 m de altura ($X = 4,1$). Ponen de 3 a 6 huevos ($X = 4,6$).

Salvador en De la Peña (2016c). Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 25-04-1996, nido en un hueco en un viejo pozo de agua, a un metro por debajo del nivel del suelo, con 4 huevos.

Ruggera et al. (2016). Jujuy. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador (2016a). Salta. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nidos. Bodrati (*in litt.* 2019), 20 de mayo de 1997, nido en el tanque de agua de un molino con 5 pichones con diferente desarrollo. Antigua estación de tren de Capitán Solari, dpto. Sargento Cabral, Chaco, 19 de agosto de 1998, nido con tres pichones grandes, en el altillo en galpón del área operativa del Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

De la Peña (2019b). Esperanza. 15-04-2013. Nido en una tabla colgante de 3,50 m del suelo, en un galpón en el campo. Galpón abierto. 6 pichones. 26-05-2013. Rafaela, Santa Fe. Nido en un hueco en una Tipa a 3 m del suelo, 5 pichones con mediano desarrollo. 20-06-2013. Rincón de Ávila, Santa Fe. Nido en un hueco en un Paraíso, en el campo a 3,50 m del suelo. 5 huevos. 01-06-2015. Humboldt, Santa Fe. Nido en un techo debajo de un tanque de agua, a 4,50 m del suelo. 3 pichones. 09-06-2015. J. Arauz. Dpto. Las Colonias. Santa Fe. Nido en el suelo en un baño (Escusado, retrete) abandonado en una casa del campo. 8 pichones. Entra por al agujero de la ventanita. 10-06-2015. Progreso, Santa Fe. Nido en el suelo en un galpón abandonado. 4 pichones. 07-04-2016. Rafaela. Dpto.

Castellanos. Santa Fe. Nido en el interior de una secadora de semillas que estaba en un galpón. Tenía 6 huevos. 15-04-2018. Esperanza. 7 km al Sur. Nido en un hueco en Eucalipto seco, a 2,50 m del suelo. El adulto entra por un agujero a 5 m de altura. Tenía 5 pichones con mediano desarrollo.

En este mismo hueco el 28-12-2018 estaba un adulto con 5 pichones chicos. En el mismo lugar el 18-05-2019 había nidificado nuevamente, tenía 2 huevos y 2 pichones recién nacidos.

Esperanza, 8 km al este, 10-05-2019, nido en el cielo raso de una habitación de una casa de campo, a 4 metros del suelo, 4 pichones chicos.

Merlino, V. (*in litt.* 2019). Elisa, dpto. Las Colonias, Santa Fe. Dos nidos, uno el 28-04-2019, en una tolva de una maquinaria en el interior de un galpón con 6 huevos. Otro el 02-05-2019, en un tarro grande también en un galpón con 4 huevos.

Bodrati (*in litt.* 2019). Establecimiento “Los Alamos”, Fundación Figueroa Salas, Baradero, dpto. Homónimo, Buenos Aires, nido con pichones en tanque de agua abandonado, 19 enero de 1997.

HUEVOS

Pone 4 ó 5 huevos. A veces más. Un nido con 11.
Ovoidales. De color blanquecino o grisáceo.

Medidas

De la Peña (2013c): 39,2 a 41,5 x 29,0 a 33,2	X= 40,2 x 31,3	(N= 10)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 38,6 a 45,4 x 31,8 a 34,1	X= 42,36 x 32,98	(N= 21)
Salvador en De la Peña (2016c): 38,6 a 39,6 x 32,6 a 33,2	X= 38,98 x 33,10	(N= 4)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 22 a 25,5 gr	X= 23,2	(N= 18)
Salvador en De la Peña (2016c): 21 a 22 gr	X= 21,5	(N= 4)
De la Peña (2013c): 22,2 a 23,2	X= 22,7	(N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,250 a 2,040	X= 1,300	(N= 10)

PICHONES

Descripción

Nores y Gutiérrez (1986). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Al final de la segunda semana comienza a marcarse el disco facial, formado por plumas blancas que se disponen de una manera más compacta. En la tercera semana el pico y las garras se endurecen y la piel del rostro presenta un color violáceo oscuro alrededor de los ojos. El disco facial está marcado pero aún incompleto y hacia el final de la tercera semana aparecen plumas color canela, ubicadas detrás de las blancas. El cuerpo está totalmente cubierto por un largo y espeso plumón. En la cuarta semana, el disco facial se completa y las plumas canela se hacen más evidentes. Poco a poco va desapareciendo el plumón, quedando en la novena semana en la cabeza y en la parte ventral y las remeras están muy desarrolladas. En la décima semana de vida hay una pérdida total del plumón. En la onceava semana, el plumaje es similar al del adulto. En las semanas 12-14 abandonan definitivamente el nido.

De la Peña (2013c). Nacen con el cuerpo cubierto de plumón blanco.

Generalidades

Nores y Gutiérrez (1986). El período de incubación es de 32 a 34 días. Los pichones permanecen en el nido entre 60 y 68 días.

Fraga (1984c). Pone los huevos en días alternos.

De la Peña (2019b). A los 35 días de edad mueven la cabeza de un lado para el otro, con el pico hacia abajo. A los 55 días comienzan a abandonar el nido a la noche, salían por un agujero a 5 metros de altura y regresaban al amanecer al nido.

Hicieron esto unos 10-12 días, hasta que cumplieron 65-67 días de edad y lo abandonaron definitivamente.

Depredadores

De adultos: *Bubo magellanicus* en Córdoba, Miatello et al. (1999), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Buenos Aires, Idoeta y Roesler (2012), *Caracara plancus* en provincia de Buenos Aires, Argerich, E. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

De pichones: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Córdoba, Salvador (2016b)

Otros

Chiale y Pagano (2014). Un ejemplar con Leucismo parcial.

Más información:
Nores y Gutiérrez (1986). Bellocq y Kravetz (1993). De la Peña (2019a)



Colonia Belgrano. Santa Fe. 23-07-2007



Esperanza. Santa Fe. 15-04-2013



Esperanza. Santa Fe. 14-04-2008
Ubicación de nido en silo



Esperanza. Santa Fe. 31-03-2008



Humboldt. Santa Fe. 06-02-2010. Incubando



Humboldt. Santa Fe. 06-02-2010
Ubicación de nido en silo



Esperanza. Santa Fe. 31-03-2008. Egagrópilas



Esperanza. Santa Fe. 09-04-2008



Esperanza. 29-12-2018. Adulto con 5 pichones



Esperanza. 29-12-2018. Ubicación del nido



Esperanza. 18-02-2019. Pichones de 55 días de edad



Esperanza. 18-02-2019. Ratón que traían a los pichones



Humboldt. Santa Fe. 16-03-2010. Incubando 11 huevos



Elisa. Santa Fe. 02-05-2019. Foto: V. Merlino



Elisa. Santa Fe. 28-04-2019. Foto: V. Merlino



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Nocturna. Chillido fuerte. Ventral blanca. Discos faciales blancos que semejan un corazón. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Tyto furcata (Temminck, 1827) en todo el país, incluso islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Veintiocho subespecies. En todo el mundo. Nidifica en muchas islas y en los 5 continentes.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Amela García et al. (1990); Babarskas et al. (2003); Bellocq (1990, 1993); Bellocq y Kravetz (1983, 1994); Bodrati et al. (2006b); Castro y Cicchino (1992); Cavicchia y García (2012); Chiale y Pagano (2014); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Diéguez y Méndez (1997); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fernández et al. (2009); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Idoeta y Roesler (2012); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau et al. (2004, 2006); Lucero (1982); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Massoia (1988g, 1988k, 1989, 1990b); Massoia y Pardiñas (1989); Massoia et al. (1994c, 1989d); Mérida y Bodrati (2006); Morici (1990a, 2012); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Torregiani et al. (2015); Vargas et al. (2007); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Massoia et al. (1995b, 1999b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut

Citas: De Santis et al. (1991, 1993); De Santis y Pagnoni (1989); García Esponda et al. (1998); Sainz-Trápaga (2014); Teta y Andrade (2002); Vidoz (1995)

Córdoba

Citas: Baldo y Ordano (1993); Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Diéguez y Corbella (1997); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a, 2016b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 15-11-1990)

Corrientes

Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Massoia et al. (1988a, 1990); Morici (1990); Pardiñas et al. (2005)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Massoia (1983); Osses et al. (2017); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Massoia et al. (1997a); Pagano y Salvador (2017)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); D'Hiriart et al. (2017); Mamani et al. (2018); Salvador (1988); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); De Santi et al. (1983, 1988); Fracassi et al. (2004); Gorordo et al. (2005); Justo y De Santis (1982); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Massoia (1988a); Massoia et al. (1997b); Massoia y Vetrano (1988b); Montalvo et al. (1985); Navas y Bó (1986); Noriega et al. (1993); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Solaro et al. (2012); Sosa y Sarasola (1998); Sosa et al. (1993); Tallade et al. (1998b, 1998a); Tejerina et al. (2006); Tiranti (1988, 1992, 1993, 1994)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923); Massoia et al. (1999a)

Mendoza

Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Dieguez (1999); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Marone (1992a); Massoia et al. (1989b, 1996, 1997c, 1997a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1931a); Sanzín (1918); Roig (1965); Sosa (1995d, 2005); Wetmore (1926)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Massoia et al. (1988c, 1988e, 1989, 1989a, 1989b, 1989c); Massoia (1983, 1988b, 1988e); White (1882)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Doering (1881); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Massoia et al. (1988c); Pereyra (1945); Trejo y Lambertucci (2007); Veiga et al. (2005); Veiga y Dupuy (2009); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro

Citas: Andrade et al. (2004); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Massoia y Vetrano (1988a); Massoia y Pardiñas (1988e); Massoia y Lartigau (1995); Paz (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Trejo et al. (2005a); Trejo y Ojeda (2002, 2004); Trejo y Seijas (2003); Trejo y Grigera (1998); Trejo y Lambertucci (2007)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Gómez et al. (2012); Hartert y Venturi (1909); Massoia (1988f); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Massoia y Pardiñas (1988d); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Massoia y Pardiñas (1994); Scott y Sharpe (1915)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Massoia et al. (1995a); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Gómez et al. (2012); Massoia (1987); Nanni et al. (2012); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); D'Hiriart et al. (2017); Echevarría et al. (2011b); Gianini (2000); Gómez et al. (2012); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b, 2018c); Quiroga (2017b); Soncini et al. (1985); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

LECHUZAS Y LECHUZONES

FAMILIA: STRIGIDAE

Aves rapaces, generalmente de hábitos nocturnos.

La cabeza es grande. Los ojos son grandes y están dirigidos hacia adelante. El cuello tiene una gran movilidad, lo que les permite tener un gran campo visual.

Algunas especies presentan plumas alargadas en la cabeza (“orejas”).

El pico es corto, curvo y filoso, semioculto por filoplumas.

Las patas son fuertes, con los tarsos y los dedos cubiertos generalmente de plumas. Las uñas son filosas. El dedo externo es reversible.

Las alas son anchas y redondeadas.

Carecen de buche. Los ciegos son largos y anchos. En los posaderos se localizan los materiales no digeridos (pelos, huesos) en forma de bolos (egagrópilas).

Nidifican en huecos, en nidos abandonados por otras aves, en cuevas en el suelo con un túnel que lleva a la cámara, en grutas, en plataformas, o sobre nidos abandonados de águilas o de Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra. Algunas especies ocupan nidos abandonados de Carpinteros o de Horneros y en huecos naturales.

También entre ramas secas en cañas, tacuaras o entre matas pastos y ramas en arboledas.

Ponen de 3 a 6 huevos blancos.

Los pichones nacen cubiertos de plumón, blanquecino, crema, castaño rojizo o crema rojizo. Permanecen varios días en el nido.

Se alimentan de aves, mamíferos, insectos, peces, reptiles.

Frecuentan bosques, selvas, áreas rurales, sabanas, plantaciones, parques, arboledas, palmares, serranías, montañas, estepas, praderas.

ALILICUCU COMÚN *Megascops choliba* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Achuita. Alilicuco. Araracucú. Búho chico. Caburé real. Col-col chico. Corujae. Choliba. Lechucita común. Lechucita orejuda. Ñacurutú. Ñacurutú-i. Ñacurutucito. Surumucuco. Tamborcito.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20-23 cm. (macho), 24 cm. (hembra).

Peso: Fiora (1933): N= 4 X= 152 g (Rango: 120 a 169)

Contreras (1983a): N= 1 (M) X= 131,09 g; N= 2 (H) 122,3 y 131,85 g

Salvador (1988): N= 1 (H) 135,0 g; N= 1 (M) 115,0 g

Camperi (1992a): N= 1 (M) 135,8 g

Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 132,0 g (Rango: 126,0 a 138,0)

Salvador (2014a): N= 1 (H) 122,5 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X= 111, 4 g (Rango: 108 a 116)

Pagano y Salvador (2017): N=2 (M) 140 y 156 g

Coloración. Pico verdoso-grisáceo o con punta gris. Patas grises parduscas. Iris amarillo.

Parte dorsal parda con rayas oscuras y puntos blancos y ocre. Cara gris. “Orejas” cortas. Garganta y superior del pecho grise con barras transversales oscuras. Resto de la zona ventral blanquecino, con rayas gruesas verticales y finas transversales pardas oscuras. Línea blanca a los lados del dorso superior.

Alas y cola ocre con bandas pardas y blanquecinas.

Fase rojiza. Color general castaño rayado de pardo oscuro en el dorso. Cara castaño y blanquecina con franja parda oscura a los costados. Cuello y zona superior del pecho castaños claros rayados de pardo oscuro. Abdomen blanquecino con rayas verticales y transversales pardas oscuras. Banda blanca a los lados del dorso superior.

Alas y cola castañas con bandas pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO

De hábitos crepusculares y nocturnos.

Alimentación

Contino (1980). **Mamíferos:** Murciélagos. Roedores (indeterminados). **Aves:** indeterminadas. **Insectos.**

Gallardo y Gallardo (1984). **Insectos:** Mariposas crepusculares. *Diloboderus abderus*.
 Carman (1987c). **Insectos:** Grillos (*Gryllus argentinus*). Orthoptera (Tettigonidae).
 Klimaitis (1993). **Insectos :** Coleópteros. **Mamíferos:** Laucha.
 Morici y Massoia (1998). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys laucha*, *Eumops bonariensis*. **Insectos:** Coleóptero (Scarabaeidae). Mantidae, Orthoptera (Coccinellidae) (Acrididae). **Aves:** *Zonotrichia capensis*.
 De la Peña (2001d). **Insectos:** Mariposa nocturna (*Erubus* sp.).
 Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Coleópteros. Polillas.
 Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Elateridae, Scarabaeidae). Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Gryllidae).
 Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Lepidoptera (Sphingidae)
 De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Colombina picui*.
 Borrillo, S. G. (2015). **Mamíferos:** Ratón de pastizal pampeano (*Akodon pampeano*). EcoRegistros. 2019.
 Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.
 Salvador et al. (2017). **Anfibio:** Ranita del zarzal (*Boana pulchella*)

Voces


Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un Juurrrr kú...JuurrrKukú.

HÁBITAT

Bosques, selvas en galería, montes, sabanas, parques, plantaciones, áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N		N		N	N		N	N	N	N	N

En huecos naturales en árboles, huecos en paredes o en nidos de *Colaptes melanochloros* y de *Colaptes campestris*. También nidos de otras aves.

Oculto. Rudimentario.

Hartert y Venturi (1909). Nido en huecos en árboles en Chaco.

Girard (1933). Nidifica en huecos en Tucumán y en Santiago del Estero.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, anida en huecos en los árboles o en nidos viejos.

Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. M. Lillo, Leales, dpto. Leales, Tucumán, 22-03-1922, 4 huevos.

Haro y Gutiérrez (1992). Córdoba. Nido.

Nores y Nores (1994). Córdoba, nido en uno de Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*)

Capllonch (1997). Tucumán. Nido.

Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y noviembre. Se localizaron 6 nidos en huecos, desde 1,7 a 4 m del suelo.

Berkunsky y Reboreda (2009). Chaco. Nido.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Cockle et al. (2011). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nidos en huecos de árboles.

Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005, se hallaron 3 nidos, uno en nido abandonado de Cotorra (*Myiopsitta monacha*), otro en uno abandonado de Carpintero (*Colaptes* sp.) y el otro en un hueco natural de un Sauce criollo.

De la Peña (2013c). Entre el 15-11-1971 y 25-10-2110 se localizaron 12 nidos, ubicados en huecos en árboles, en nido de *Colaptes melanochloros* y de *Colaptes campestris*, uno el 27-10-1999, con 2 pichones, en un nido de Benteveo *Pitangus sulphuratus*. Nido más bajo a 1,60 m, nido más alto a 4,50 m.
 Bodrati en Salvador (2016a). Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos. Nido.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 3 ó 4 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 34,0 a 36,0 x 28,0 a 29,0

Girard (1933): 36,0 a 37,0 x 27,0 a 30,0

Pereyra (1938b): 35,0 x 28,0

Di Giacomo (2005h): 34,4 a 35,8 x 29,6 a 30,5 X= 34,9 x 29,9 (N= 4)

De la Peña (2013c): 33,3 x 27,4 (N= 1)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 15,5 a 16,8 X= 16,3 (N= 4)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,9 (N= 1)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Pico y patas grises. Cuerpo cubierto de plumón blanquecino.

A los pocos días, dorsalmente rayado de pardo oscuro. Ventralmente gris con rayas transversales pardo oscuro.

Observaciones

Klimaitis(1975). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, 2 pichones en un hueco en un sauce.

Gallardo y Gallardo (1984). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Piacentini y Acerbo (1998). Río Negro. Adulto con pichones.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Adulto con pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Adulto con pichones.

Salvador en Salvador (2016a). Chaco, Entre Ríos. Adultos con pichones.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Generalidades

De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 05-11-1989 se encontró un pichón chico en el suelo. Aparentemente caído de un nido después de una tormenta, el 10-11-1990, una pareja estaba en un Ombú con 2 juveniles, 17-12-2001, pareja con 2 juveniles, 11-11-2004, pareja con 3 juveniles, 05-11-2008, pareja con 2 juveniles, 12-10-2012, pichón caído en el suelo. Un adulto en un árbol próximo, 05-12-2012, pichón caído en el suelo. Dos adultos en un árbol próximo. El 13-12-1991, en Malabrigo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, adulto con 3 juveniles, 13-12-1991, Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, adulto con 2 juveniles.

Un nido el 27-10-1999 en Rincón Potrero, dpto. La Capital, Santa Fe, la pareja alimentaba a los pichones con Mariposas nocturnas y grillos. Un nido el 15-11-2008 en Elisa, dpto. Las Colonias, Santa Fe, un adulto llevó a los pichones una Torcacita común (*Columbina picui*).

Más información:

De la Peña (2019a)

Depredadores

De pichones: *Rupornis magnirostris* en Formosa, Di Giacomo (2005h)

Mamíferos: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Córdoba, Salvador (2016b)



Cayastá. Santa Fe. 25-10-2010




Esperanza. Santa Fe. 12-10-2012. Pichón



Esperanza. Santa Fe. 18-09-2007



Cayastá. Santa Fe. 02-11-2010. Incubando



Cayastá. Santa Fe. 02-11-2010
Ubicación de un nido



Esperanza. Santa Fe. 18-09-2007



Esperanza. Santa Fe. 30-06-2007

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. “Penachos auriculares” cortos. Línea blanca a los lados del lomo. Discos faciales claros orillados por una línea negra notable. Ventral con gruesas rayas verticales oscuras cortadas por otras finas. Diferenciarlo del Alilicucu grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Megascops choliba wetmorei (Brodkorb, 1937) desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Río Negro y *Megascops choliba uruguayensis* (Hekstra, 1982) en el noreste.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Nueve subespecies. Su área de distribución es amplia y se extiende desde el sur de Centro América hasta Argentina. Comprende: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Megascops choliba wetmorei (Brodkorb, 1937)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Gallardo y Gallardo (1984); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b, 2016); Morici y Massoia (1998); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca

Citas: Carma (2009); Torres et al. (2006)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (2012c, 2016b); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1983a); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ortiz et al. (2018c)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Ortiz et al. (2018c)

La Pampa

Citas: Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda (1989); Tejerina et al. (2006)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza

Citas: P. Isola en Ferrer et al. (2019); Roig (1965)

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Acerbo (2000); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez et al. (2006); Piacentini y Acerbo (1998); Povedano (2016)

Salta

Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Ortiz et al. (2018c); Salvador y Di Giacomo (2014)

San Juan

Citas: Fava et al. (2013, 2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Ortiz et al. (2018c)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Capllonch et al. (2020); Gianini (2000); Girard (1933); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2018c); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

Megacops choliba uruguiensis (Hekstra, 1982)

D.G. En el noreste.

Corrientes

Citas: Ortiz et al. (2018c)

ALILICUCU YUNGUEÑO *Megascops hoyi* (C. König & Straneck, 1989)

DESCRIPCIÓN

Largo: 24 cm

Peso: König y Straneck (1989): N= 1 (M) 115 g; Marks et al. (1999): 115-145 g

Coloración. Pico amarillo verdoso. Tarsos emplumados, grises parduscos. Iris pardo amarillento. Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardo oscuro en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas. Alas pardo oscuro con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Ortiz et al. (2009). **Anfibios:** Rana trepadora andina (*Hypsiboas andinus*). **Insectos:** langostas (*Neoconocephalus* sp.)

HÁBITAT

Selvas y bosques montanos (Yungas) entre 1000 y 2800 metros de altura.

NIDIFICACIÓN

Nido en Tucumán.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Ortiz y Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

Más información:

Marks et al. (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Megascops hoyi (C. König & Straneck, 1989) en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Ortiz et al. (2009); Fontanarrosa et al. (2009)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); König y Straneck 1989; Moschione y Segovia (2005); Veiga et al. (2014)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995) (*Otus guatemalae*); Chebez et al (1998); Coconier et al. (2007); Fontanarrosa et al. (2009); König y Straneck 1989; Moschione et al. (2013); Ortiz et al. (2009); Straneck (1990f)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Fontanarrosa et al. (2008); König y Straneck 1989; Moschione (2005); Ortiz et al. (2009, 2011); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Ferro (2005); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2009, 2018b, 2018c); Terán y Ortiz (2005)

ALILICUCU GRANDE *Megascops atricapilla* (Temminck, 1822)

Otros nombres: Búho chico de corona negra. Lechucita colorada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 23-24 cm.

Peso: Marks et al. (1999): 115-140 g

Coloración. Iris pardo amarillento.

Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardas oscuras en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas.

Alas pardas oscuras con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Su canto es un prolongado Juurrrrrrrr que comienza con una ligera modulación de frecuencia ascendente y luego descendente.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de información.

Más información:

Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. “Plumas auriculares” cortas. Coloración general rojiza con grueso jaspeado oscuro ventralmente. Se parece a la fase rojiza del Alilicucu común pero es de mayor tamaño. Con la fase normal difiere en la coloración y en el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Megascops atricapilla en Misiones y norte de Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Especie selvática de la Selva Atlántica en sureste de Brasil, sureste de Paraguay y extremo noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005); Mauriño et al. (2017); Ortiz et al. (2018c)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Gai (1950); Olrog (1985); Straneck (1990h)

ALILICUCU OREJUDO *Megascops sanctaecatarinae* (Salvin, 1897)

DESCRIPCIÓN

Largo: 24-27 cm

Peso: Marks et al. (1999): (M) 115-194 g; (H) 174-211 g

Coloración. Iris rojizo apagado, a veces amarillento.

Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardo oscuro en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas. Alas pardo oscuro con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Comprende desde Santa Catarina, Brasil hacia el sur hasta el norte de Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Gai (1951)

Dos pieles en el MACN de W. H. Partridge y una de Andrés Gai, Bodrati en De la Peña (2016c)

LECHUZÓN MOCHO GRANDE *Pulsatrix perspicillata* (Latham, 1790)

Otros nombres: Lechuzón. Lechuzón de anteojos grandes. Lechuzón grande de collar. Mocho malteiro. Urucureá grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45-52 cm.

Peso: Contino (1980): 720 g

Coloración. Pico crema amarillento. Tarsos y dedos emplumados. Iris amarillento.

Cabeza y dorso pardos. Cejas blancas. Collar blanquecino. Superior del pecho pardo, inferior y abdomen ocráceos. Alas y cola pardas oscuras con tenues barras más claras.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una sucesión de 5 a 7 sílabas: Puhpuhpuhpuhpuh golpedas y emitidas rápidamente con modulación de amplitud descendente.

HÁBITAT

Bosques, arboledas, selvas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. S. Pierotti, Río del Valle, Salta, 12-12-1955, un pichón.

Quiroga et al. (2020a). Dos pichones encontrados debajo de una palmera en San Salvador de Jujuy, en 2018.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Notables cejas y collar blancos que contrastan con ancha banda pectoral parda.
Diferenciarlo del Lechuzón mocho chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Pulsatrix perspicillata perspicillata (Latham, 1790) en este de Formosa y Chaco; *Pulsatrix perspicillata boliviana* L. Kelso, 1933 en Jujuy, Salta, Tucumán y noroeste de Catamarca y *Pulsatrix perspicillata pulsatrix* (Wied-Neuwied, 1820) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Desde Méjico al norte de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pulsatrix perspicillata perspicillata (Latham, 1790)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1999)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014); López-Lanús y Mencia (2017); Ramírez Llorens y Bellocq (2007); White (2001b)

Pulsatrix perspicillata boliviana L. Kelso, 1933

Catamarca

Observaciones: Salvador, S. (La Merced, dpto. Paclín, Julio de 1999, Balcozna de Afuera, dpto. Paclín, Mayo de 2005)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1985); Quiroga et al. (2020a)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Moschione y Segovia (2004); Moschione et al. (2013); Olrog (1985)

Tucumán

Citas: Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Olrog (1985); Quiroga (2018b)

Pulsatrix perspicillata pulsatrix (Wied-Neuwied, 1820)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); König y Weick (2008); Moresco (2019c)

LECHUZÓN MOCHO CHICO *Pulsatrix koenigswaldiana* (M. Bertoni y W. Bertoni, 1901)

Otros nombres: Lechuza anteojuda. Lechuzón chico de collar. Lechuzón de anteojos. Lechuzón de dedos emplumados. Lechuzón de dedos desnudos. Lechuzón del alto Paraná. Lechuzón pardo menor. Urucureá chico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 38-44 cm.

Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (H) 550 g

Coloración. Pico grisáceo-amarillento. Dedos grises. Iris pardo.

Dorso pardo oscuro. Cara parda y blanquecina con cejas color ocre intenso. Garganta parda oscura. Semicollar blanco en el cuello. Pecho pardo con tono ocre. Resto de la parte ventral ocre.

Alas pardas con finas bandas más claras. Cola parda con punta y finas bandas blancas.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos. Se alimenta de mamíferos, aves, insectos.

Alimentación

Bodrati (*in litt.* 2019), se alimentaba de pichones de distintas edades de una colonia de Boyero Cacique (*Cacicus haemorrhous*) en octubre y noviembre de 2017 y 2018, en el Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones.

En un dormidero, en el mismo Parque, se encontraron restos de *Turdus leucomelas* y *Leptotila rufaxilla*.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una sucesión de 4 a 6 sílabas: Hu.hu.hu.hu.. También emite esporádicamente un fuerte y sonoro Jurrtrr.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Nido en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N									N	

Cockle y Bodrati (2005a). Un pichón dependiente fue observado durante varias noches en junio de 2004, en el parquizado de la Reserva Privada Yaguaroundi, dpto, Guaraní, Misiones.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019), noviembre de 2014, Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, un pichón no volador fue encontrado junto al nido, aparentemente acababa de emerger, los dos adultos defendían el sector ante la presencia de los observadores vocalizando incesantemente durante horas de la mañana.

Pichones

Observaciones

Bodrati et al. (2010). Misiones. Adulto con pichón.

Más información:

Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Notable ceja ocre. Semicollar blanco en el cuello y ancha banda parda-ocre en el pecho. Se diferencia del Lechuzón mocho grande por el color de la ceja, de la cola y por el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Pulsatrix koenigswaldiana (M. Bertoni y W. Bertoni, 1901) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Selva Atlántica o Paranaense en el este de Paraguay, extremo noreste de Argentina y sureste de Brasil (Espírito Santo a Santa Catarina)

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Cockle y Bodrati (2005a); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1994); Chebez y Rolón (1989); Contreras et al. (1994b); Giraudo et al. (1993); Köning en Mazar Barnett y Pearman (2001); Kraciuk (2006); Olrog (1974, 1985); Partridge (1954); Pereyra (1950); Saibene et al (1996); Wioneczak et al. (2020b)

ÑACURUTÚ *Bubo virginianus* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Búho. Búho cornudo. Búho de orejas. Búho grande. Búho virginiano. Lechuza de la sierra. Lechuzón grande. Ñuco. Ñucu. Quitilipe. Quitilipi. Titilipe. Virginia.

DESCRIPCIÓN

Largo: 51 cm. (macho). 60 cm. (hembra).

Peso: Di Giacomo (2005): N= 1 (?) 990 g

Coloración. Pico gris. Iris amarillo.

Plumas alargadas, grandes en la cabeza (“auriculares”). Corona, cuello posterior, dorso superior ocre manchados de pardo oscuro. Resto de la parte dorsal y cubiertas alares pardos y ocre, vermiculados de blanquecino. Cara ocre blanquecina con banda oscura a los lados. Inferior de la garganta blanco. Resto de la zona ventral blanquecino ondulado de pardo oscuro.

Alas y cola ocre oscuras con bandas pardas.

COMPORTAMIENTO

Durante el día está posado en la parte media y alta de los árboles.

Alimentación

Massoia (1988a). **Mamíferos:** *Akodon molinae*, *Calomys musculus*, *Ctenomys* sp., *Eligmodontia typus*, *Graomys griseoflavus*, *Lagostomus maximus*, *Microcavia australis*, *Reithrodon auritus*. **Aves:** Reptiles. Insectos.

De la Peña (2001d). Ratón.

Di Giacomo (2005h). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys callosus*, *Cryptomys chacoensis*, *Eumops perotis*, *Graomys griseoflavus*, *Holochilus chacarius*, *Holochilus brasiliensis*, *Necomys temchuki*, *Oecomys* sp., *Oligoryzomys fornesi*, *Pseudoryzomys simplex*, *Thylamys pusillus*. **Aves:** *Aramus guarauna*, *Guiraca guiraca*, *Jacana jacana*, *Nothura maculosa*, *Ortalis canicollis*, *Piaya cayana*, *Rhynchotus rufescens*. **Insectos:** Coleópteros.

Teta et al. (2006). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Bibimys torresi*, *Cryptomys chacoensis*, *Deltamys kempi*, *Lasiurus* sp., *Oligoryzomys flavescens*, *Oligoryzomys nigripes*, *Oxymycterus rufus*, *Rattus rattus*, *Scapteromys aquaticus*. **Amphibia.** **Aves.**

Osses et al. (2017). **Mamíferos:** *Cavia aperea*, *Lagostomus maximus*, *Calomys laucha*, *Holochinus brasiliensis*, *Lepus europeus*, *Rattus* spp. **Anfibios:** *Leptodactylus* sp. **Aves:** *Myiopsitta monachus*, *Aramides* sp.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un potente y grave Hu.Hu..HUUhh.

HÁBITAT

Bosques, montes, sabanas, arboledas en praderas, estepas, palmares, montañas, plantaciones, selvas ribereñas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N	N	N	N			



Construye el nido en grutas, huecos en árboles, en el suelo, sobre nidos abandonados de águilas o de Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra.

Plataforma de palitos. Puede colocar alguna paja o plumas.

Girard (1933). En Tucumán, para criar se instala en nidos viejos de águilas.

Pereyra (1937). Telén, dpto. Loventué, La Pampa, un nido con huevos.

Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. P. Girard, Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 05-07-1933, 2 huevos, Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 27-09-1944, un pichón; J. Esteban, Monte Lindo, dpto. Formosa, Formosa, 29-11-1944, un pichón.

Miatello et al. (2003). Cerro Colorado, dpto. Tulumba, Córdoba, 26-11-1984, nido; 08-12-1992, nido con 2 pichones.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida desde fines de junio a setiembre. Se localizaron 6 nidos, ubicados entre 6 y 13 m de altura.

Ortiz y Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

La Grotteria, J. (2010c). Pre delta, Entre Ríos, 13-11-2010, nido con pichones

Lorenzo, L. E. (2011). Entre Ríos. Nido.

De la Peña (2013c). 20-07-1978, Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, nido en *Eucaliptus*, a 15,00 m de altura, construido sobre nido de Cotorra, *Myiopsitta monachus* en actividad contenía 2 huevos, 20-10-1986, Saladero Cabal, dpto. Garay, Santa Fe, nido en *Eucaliptus*, a 10,00 m de altura, construido sobre nido de Cotorra, *Myiopsitta monachus* en actividad con un pichón, 29-09-1989, Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, en Quebracho colorado, a 14,00 m, no observado, 10-08-2001, La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, construido sobre nido de Cotorra, *Myiopsitta monachus* en actividad, a 15,00 m del suelo, con 2 pichones, 15-07-1991, Calchaquí, construido en un abandonado de Carancho, *Caracara plancus*, a 11 m, contenía 3 huevos.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, un nido con 2 huevos.

Carus, D. (2014b). Entre Ríos. Nido.

Segura, F. A. (2015). Entre Ríos. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nido

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Pagano y Chiale (2016b). Nido en Buenos Aires.

Uranga en De la Peña (2019b). Islas Rosario-Victoria, Entre Ríos, 07-10-2018. Nido en un Sauce seco a 5-6 m de altura. Estaba sobre un nido viejo de Garza Mora. Tenía 2 pichones de unos 10-12 días de edad. En el nido había restos de un Burrito común, una Gallineta overa y una Gallareta no identificada.

De la Peña (2020). 08-11-2018. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido arriba de un nido de Cotorra, en un *Eucaliptus* sp., a 18 m de altura. Crió 3 pichones. Elisa, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 14-08-2017, nido con un pichón en una Palmera a 10 m. del suelo.

Huevos

Pone 2 ó 3 huevos. Elípticos, algunos ovoidales. Blancos.

Medidas

Girard (1933): 57,0 a 61,0 x 49,0 a 53,0

Di Giacomo (2005h): 52,4 a 55,4 x 42,7 a 49,5

X= 53,9 x 45,4 (M= 6)

De la Peña (2013c): 54 a 59,8 x 45 a 46,6

X= 56,6 x 45,6 (N= 5)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 52,0 a 73,0

X= 59,8 (N= 6)

De la Peña (2013c): 57,8 a 63,2

X= 60,2 (N= 3)

De la Peña (2013c): cáscaras 4,8 a 5,8

X= 5,35 (N= 5)

PICHONES

Observaciones

Girard (1933). Tucumán, 1930, nido con 2 pichones.

De la Peña (2013c). El 27-10-1972, en Cayastacito, un adulto con 2 juveniles.

Pereyra (1942). Entre Ríos. Adulto con pichones.

La Grottería (2010). Entre Ríos. Adulto con pichones.

Lorenzo (2011). Entre Ríos. Adulto con pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Entre Ríos. Adulto con pichones.

Bodrati et al. (2006). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Carus (2014). Buenos Aires. Adulto con pichones.

De la Peña (2020). 07-12-2018. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, una pareja de adultos con un juvenil. Una egagrópila contenía huesos.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 31 ó 32 días. Los pichones permanecen en el nido entre 50 y 53 días.

Más información

López-Lanús (2015)



Calchaquí. Santa Fe. 15-07-1991



Colonia Belgrano. Santa Fe. 23-06-2007



Esperanza. Santa Fe. 22-06-1999



Esperanza. Santa Fe. 22-06-1999



Elisa.14-08-2017. Nido en Palmera




Esperanza.05-12-2018. Juvenil



Esperanza.08-11-2016. Juvenil



Esperanza.08-12-2018. Huesos de una egagrópila



Nido y Pichones. Islas Rosario-Victoria. Entre Ríos. 07-10-2018. Fotos Máximo Uranga



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “penachos auriculares” grandes. Semicollar blanco en la parte superior del pecho y barrado por debajo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Bubo virginianus nacurutu (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta San Luis, La Pampa y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Doce subespecies. Se distribuye por toda América desde Canadá hasta Argentina a excepción de la Amazonia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Bubo virginianus nacurutu (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); GORA (1991); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Chiale (2016b); Teta et al. (2006); Zapata (1998)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994, 2003); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador y Salvador (2012); Salvador et al. (2017); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chatellenaz (2004); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Osses et al. (2017)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa

Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Massoia (1988a); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004)

La Rioja

Citas: Chebez (2005b)

Misiones

Citas : Wioneczak y Pavese (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009); Straneck (1990e)

Santiago del Estero

Citas: Heredia (2011); Ménéguaux (1925); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2017)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Girard (1933); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007)

TUCÚQUERE *Bubo magellanicus* (Lesson, 1828)

Otros nombres: Búho. Ñacurutú magallánico. Ñacurutú magallánico. Tucúcaro.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45-50 cm.

Peso: Contreras (1975): N= 4 X= 788,7 g (Rango: 654 a 898)

Christie et al. (2004): N= 4 (3 H y 1 M) X= 760 g (Rango: 640 a 890)

Coloración. Similar a *Bubo virginianus* pero de menor tamaño.

COMPORTAMIENTO

Se alimenta de mamíferos (conejos, liebres, ratones), aves, reptiles, invertebrados.

Alimentación

Massoia (1983). **Mamíferos:** *Abrothrix* sp., *Eligmodontia typus*, *Phyllotis darwini*, *Reithrodon auritus*, *Ctenomys* sp., *Loxodontomys micropus*, *Notiomys macronyx*.

Massoia (1988j). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus*, *Calomys musculinus*, *Chelemys macronyx*, *Reithrodon auritus*.

Massoia y Pardiñas (1988e). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp., *Eligmodontia typus*, *Galea musteloides*, *Lestodelphys halli*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*.

Massoia y Pardiñas (1988c). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis*, *Akodon iniscatus*, *Akodon neocenus*, *Calomys musculinus*, *Conepatus* sp., *Chelemys macronyx*, *Eligmodontia typus*, *Euneomys chinchilloides*, *Lepus europaeus*, *Lestodelphys halli*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*, *Zaedyus pichy*.

Massoia y Pardiñas (1988b). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus*, *Reithrodon auritus*, *Ctenomys mendocinus*, *Calomys* sp., *Akodon* sp., *Olgoryzomys longicaudatus*, *Abrothrix olivaceus*, *Lagidium viscacia*, *Phyllotis xanthopygus*.

Massoia et al. (1991). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Abrothrix longipili*, *Abrothrix olivaceus*, *Ctenomys* sp., *Eligmodontia typus*, *Euneomys chinchilloides*, *Geoxus valdivianus*, *Irenomys tarsalis*, *Loxodontomys micropus*, *Octodon bridgesi*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*.

Heinonen Fortabat y Haene (1994). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*.

Massoia (1994). **Mamíferos:** *Phyllotis* sp., *Thylamys* sp., *Calomys* sp., *Octodontomys gliroides*, *Eligmodontia* sp., *Galea musteloides*, *Lagidium viscacia*.

Massoia et al. (1994b). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp., *Euneomys chinchilloides*, *Phyllotis xanthopygus*, *Eligmodontia typus*, *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Chelemys macronyx*, *Lepus europaeus*.

Massoia et al. (1994a). **Mamíferos:** *Euneomys chinchilloides*, *Phyllotis xanthopygus*, *Abrothrix longipilis*, *Eligmodontia typus*, *Abrothrix olivaceus*, *Reithrodon auritus*, *Ctenomys* sp., *Loxodontomys micropus*, *Microcavia australis*, *Calomys* sp., *Galictis cuja*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Histiopus montanus*.

Massoia y Pardiñas (1994). **Mamíferos:** *Euneomys chinchilloides*, *Reithrodon auritus*, *Loxodontomys micropus*, *Chelemys macronyx*, *Phyllotis darwini*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Akodon olivaceus*, *Geoxus valdivianus*, *Calomys musculinus*, *Eligmodontia typus*, *Abrothrix longipilis*, *Lepus capensis*, *Ctenomys magellanicus*, *Abrothrix xanthorhinus*.

Massoia y Pastore (1997b). **Mamíferos:** *Reithrodon auritus*, *Ctenomys* sp., *Lepus europaeus*, *Eligmodontia typus*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Abrothrix olivaceus*, *Abrothrix longipilis*, *Geoxus valdivianus*, *Euneomys chinchilloides*.

Donazar et al. (1997). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Calomys musculinus*, *Ctenomys haigi*, *Chelemys macronyx*, *Eligmodontia typus*, *Euneomys* sp., *Galea musteloides*, *Geoxus valdivianus*, *Lepus europaeus*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Microcavia australis*, *Oryctolagus cuniculus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Rattus norvegicus*, *Reithrodon auritus*, *Thylamys pusilla*. **Aves:** *Anas* sp., *Callipepla californica*, *Caprimulgus longirostris*, *Falco sparverius*, *Milvago chimango*, *Sturnella loyca*, *Vanellus chilensis*, *Zenaidura macroura*. Crustáceos. Arácnidos. Coleópteros. Serpientes. Iguanidae.

Trejo and Grigera (1998). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*.

Miatello et al. (1999). **Mamíferos:** *Conepatus* sp., *Galea* sp., *Ctenomys* sp., *Lepus europaeus*, *Oxymycterus* sp., *Phyllotis* sp., *Thylamys* sp. **Aves:** *Anas* sp., *Theristicus* sp., *Tyto alba*, *Vanellus chilensis*.

Teta et al. (2001). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix olivaceus*, *Akodon neocenus*, *Calomys musculinus*, *Ctenomys haigi*, *Ctenomys* sp., *Eligmodontia morgani*, *Eligmodontia typus*, *Euneomys chinchilloides*, *Galea musteloides*, *Geoxus valdivianus*, *Irenomys tarsalis*, *Lagidium viscacia*, *Lepus europaeus*, *Lestodelphys halli*, *Loxodontomys micropus*, *Octodon bridgesi*, *Microcavia australis*, *Lyncodon patagonicus*, *Olgoryzomys longicaudatus*, *Oryctolagus cuniculus*, *Microcavia australis*, *Phyllotis xanthopygus*, *Rattus norvegicus*, *Reithrodon auritus*. **Aves:** *Anas* sp., *Anthus* sp., *Callipepla californica*, *Caprimulgus longirostris*, *Milvago chimango*, *Falco sparverius*, *Sicalis luteola*, *Sturnella loyca*, *Tachycineta leucopyga*, *Troglodytes aedon*, *Vanellus*

chilensis, *Zenaida auriculata*, *Zonotrichia capensis*. Crustáceos. Arácnidos. Escorpiones. **Reptiles:** *Liolaemus* sp., Iguanidae.

Galende y Trejo (2003). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*, *Ctenomys haigi*, *Eligmodontia morgani*, *Lagidium viscacia*, *Lepus europaeus*, *Loxodontomys micropus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*. Coleópteros. Escorpiones.

Christie et al. (2004). Mamíferos. Aves.

Trejo et al. (2005). **Mamíferos:** *Lepus europaeus*, *Abrothrix longipilis*, *Abrothrix xanthorhinus*, *Chelemys macronyx*, *Geoxus valdivianus*, *Oligoryzomys longicaudatus*, *Eligmodontia morgani*, *Euneomys* sp., *Irenomys tarsalis*, *Loxodontomys micropus*, *Phyllotis xanthopygus*, *Reithrodon auritus*, *Ctenomys haigi*. **Aves:** *Callipepla californica*, *Chloephaga* sp., *Phytotoma rara*, *Vanellus chilensis*, *Zenaida auriculata*, *Upucerthia dumetaria*, *Elaenia albiceps*, *Turdus falcklandii*, *Phrygilus* sp., *Diuca diuca*. **Insectos:** Carabidae. Coleópteros. Curculionidae. Tenebrionidae. **Arácnidos.**

Nabte et al. (2006). **Mamíferos:** *Akodon iniscatus*, *Lestodelphys halli*, *Phyllotis xanthopygus*. **Crustáceos:** (*Aegla* sp.) **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae). (Tenebrionidae, Curculionidae). **Arácnidos:** Escorpiones. **Reptiles. Aves.**

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Vocalización diferente a *Bubo virginianus*.

HÁBITAT

Bosques, estepas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Córdoba, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N	N					N	N	N	N

Construye el nido en el suelo al reparo de matas, huecos en los árboles, sobre nidos abandonados de águilas u otras rapaces, en acantilados o en árboles.

Plataforma de palitos. Puede colocar alguna paja o plumas.

Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.

Pereyra (1937). Telén, dpto. Loventué, La Pampa, un nido con huevos.

Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y diciembre.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.

Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica en primavera, en nido poco elaborado, en general en el suelo, al reparo de matas. Ocasionalmente reacondiciona nidos abandonados de otras rapaces, en árboles o en acantilados.

Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en huecos en los árboles, en bardas rocosas o en depresiones en el suelo. Pichones en diciembre.

Imberti (2005e). Parque Nacional los Glaciares, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidifica entre setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nidifica en el suelo, protegido por alguna mata o en nidos abandonados de otras rapaces, en acantilados o árboles.

Sainz-Trápaga, S. (2015). Pto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 19-03-2015, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Sympson en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.

Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.

Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.

Huevos

Pone 2 ó 3 huevos. Elípticos, algunos ovoidales. Blancos.

Anónimo (1933): 3 huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES**Observaciones**

Castellanos (1932). Córdoba. Adulto con pichones.

Salvador y Salvador (2012). Córdoba. Adulto con pichones.

Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 21-10-1999, un pichón entre unas matas de pastos.

Segura (2015). Santa Cruz. Adulto con pichones.

Salvador en Salvador (2016a). Chubut. Adulto con pichones.

Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.

Sainz-Trápaga, S. en De la Peña (2016c). El Doradillo, Pto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 20-12-2014, pichón.

Depredadores

De pichones: Mamíferos: Zorro pampa ó gris (*Lycalopex gymnocercus*) en Chubut, Salvador (2016b)



Puerto Deseado. Santa Cruz. 03-02-2016

Foto: Cynthia Arenas



Est. La Angostura. Santa Cruz. 07-02-2013



El Doradillo. Pto. Madryn. Chubut. 20-12-2014



Foto: Santiago Sainz-Trápaga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “Penachos auriculares” grandes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Bubo magellanicus (Lesson, 1828) entre los 2000 y los 3000 m de altura por la cordillera, desde Jujuy hasta Mendoza y desde Neuquén y Río Negro por el llano hasta Tierra del Fuego. También sierras de Córdoba. Citado para las islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Por los Andes entre 2000 y 3000 metros de altura en Perú, Bolivia y Argentina hasta Tierra del Fuego e Islas del Cabo de Hornos.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Ordano (1996); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); White (1883a)

Observaciones: Salvador, S. (Pampa de Achala)

Chubut

Citas: Harris (2008); Massoia y Pardiñas (1988a); Olrog (1979a); Sainz-Trápaga (2014); Salvador (2016b); Vidoz (1995)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Chebez et al. (1998); Mamani et al. (2018); Massoia (1994); Moschione y Segovia (2005)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Gosee (1899); Lucero (2013f); Massoia et al. (1994); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942a); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Wolffhuegel (1929)

Neuquén

Citas: Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1968); Del Valle et al. (1989); Donázar et al. (1997); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Massoia (1988j); Massoia y Pastore (1997b); Massoia y Pardiñas (1988, 1988c); Massoia et al. (1991a); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1945); Veiga et al. (2005); Yepes (1939)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Canevari et al. (1991); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Daciuk (1977, 1978c); Gelain (1984a., 2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Massoia (1983); Massoia y Pardiñas (1988e, 1988b); Paz Barreto (1997b); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Teta et al. (2001); Trejo et al. (2001, 2005, 2005a); Trejo y Ojeda (2002)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004)

Santa Cruz

Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Massoia y Pardiñas (1994); Massoia et al. (1994a); Oustalet (1891); Peri (2013); Scott y Sharpe (1915); Serié (1926)

Tierra del Fuego

Citas: Castellanos (1937); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Ripley (1950)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

LECHUZA LISTADA *Strix hylophila* Temminck, 1825

Otros nombres: Lechucita de cuerpo rayado. Lechuza. Lechuza rayada. Suindá-caagüí.

DESCRIPCIÓN

Largo: 34-35 cm.

Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 285 y 320 g; N= 1 (H) 395 g; Contreras et al. (1994): N= 1 (H) 290 g; Marks et al. (1999): (Macho): 285-340 g, (Hembra): 345-395 g

Coloración. Pico gris con punta amarilla. Dedos amarillentos. Iris pardusco.

Cabeza y partes dorsales castañas barradas de pardo oscuro. Collar blanco. Ventral castaña y blanquecina barrada de pardo oscuro.

Alas castañas con anchas barras pardas oscuras. Cola parda oscura con barras castañas y punta ocrácea.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es potente y ásper: Burr...de una sola sílaba. Otra voz es una sucesión de cortos Burrrburrrburrrburrrburrr de 6 a 10 sílabas repetidas rápidamente, con una curva de amplitud ascendente y luego descendente.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N			

Pichones

Observaciones

Bodrati et al. (2010). Misiones. Adulto con pichón. Bodrati (*in litt.* 2019) un adulto con un juvenil dependiente en selva del Parque Provincial Moconá, dpto. San Pedro, Misiones en octubre de 2005. El adulto alimentó al juvenil que emitía agudos llamados lastimeros constantes.

Más información:

Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño de mediano a grande. Collar blanco. Dorso, alas y cola muy barrados de castaño y pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Strix hylophila Temminck, 1825 en el norte de Corrientes y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Endémica de la Selva Atlántica en sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Contreras y Contreras (1984)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2006a, 2006b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1996a); Gai (1950, 1951); Giraudo et al. (1993); Olrog (1985); Straneck (1990g)

LECHUZA CHAQUEÑA *Strix chacoensis* Cherrie y Reichenberger, 1921

DESCRIPCIÓN

Largo: 33-38 cm.

Peso: Kratter et al. (1993): N= 1 (M) 350 g; N= 1 (H) 375 g; Marks et al. (1999): (Macho): 360-435 g, (Hembra): 420-500 g

Coloración. Pico amarillento. Tarsos y dedos ocráceos. Iris pardo.

Disco facial blanco con la orilla del anillo oscura. Corona blanca con banda central parda.

Dorso pardo barrado y punteado de blanco. Ventral blanquecina densamente barrada de pardo.

Alas y cola muy barradas de rojizo.

El juvenil es pálido, difusamente barrado.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares y nocturnos.

Alimentación

Kratter et al. (1993). Arañas. Escorpiones. Ciempiés. Escarabajos. Ofidios (*Leptotyphlops* sp.)

Contino (1980). Aves. Insectos. Murciélagos.

Pereyra Lobos et al. (2008b). Roedores. Escorpiones. Coleópteros. Aves. Reptiles.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un áspero y grave Burr...Burr...

HÁBITAT

Sabanas, montes, áreas de cactáceas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Mendoza, La Pampa.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Nidifica en huecos, o sobre plataformas de nidos abandonados de otras especies.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, noviembre de 1931, criaron en un viejo nido de Accipitridae, en un caldén, con 3 pichones. En diciembre de 1933, en el mismo lugar, pichones.

Contino (1980). Nidifica en huecos en los árboles.

Pereyra Lobos y Jara (2013b). Reserva de la Biósfera Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, 29-09-2012, nido sobre una estructura de palitos en un árbol a 5,20 m de altura, contenía 2 pichones.

Contino en Salvador (2016a). Salta. Nido.

Huevos

Pone 2 ó 3 huevos. Blancos.

Más información:
Santander et al. (2013)

Depredadores

Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*) en Mendoza, Montero, R. (2019). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Disco facial blanco. Ventral barrada de blanco y pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Strix chacoensis Cherrie y Reichenberger, 1921 desde Formosa, Salta y Jujuy por el centro-oeste del país hasta Mendoza y La Pampa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Endémica de la región del Chaco de sur de Bolivia (Santa Cruz). Suroeste de Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Ortiz et al. (2018c)

Chaco

Citas: Bodrati (2005); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes

Observaciones: Bodrati, A. en De la Peña (2016c)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011); Vandecaveye et al. (2015)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Chebez et al. (1998); Dabbene (1926); Darrieu et al. (2011b); Pereyra (1927e, 1931a); Siegenthaler (2004)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza

Citas: Contreras y Fernández (1980); Ferrer et al. (2019); Pereyra Lobos et al. (2008b); Pereyra Lobos y Jara (2013b); Sosa (2009)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1926d); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Fava et al. (2013a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: Gai (1950); Martinez Achenbach (1957); Pautasso (2002a)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Dabbene (1926d); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007)

LECHUZA BATARAZ *Strix rufipes* King, 1827

Otros nombres: Chucho. Chuncho. Colcón. Col-col. Cuscungo. Lechuza. Lechuza de monte. Lechuza rojiza. Tecolote.

DESCRIPCIÓN

Largo: 33-38 cm.

Peso: Contreras (1975): N= 4 (?) X= 368,5 g (Rango: 345 a 390)

Christie et al. (2004): N= 6 (H) X= 375 g (Rango: 280 a 430); N= 1 (?) 400 g

Coloración. Pico amarillento. Iris pardo.

Coloración general parda barrada de blanco con tono canela, más notori en la zona ventral. Lorum y collar blancos. Disco facial canela.

Alas pardas oscuras barradas de canela. Cola parda oscura con barras canelas, punta ocrácea.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos.

Alimentación

Martínez (1993). **Mamíferos:** *Akodon longipilis*, *Akodon olivaceus*, *Auliscomys micropus*, *Dromiciops australis*, *Irenomys tarsalis*, *Phyllotis darwini*, *Rattus rattus*. **Insectos:** Acridiidae. Blattidae. Carabidae. Cerambycidae. Curculionidae. Lucanidae. Scarabaeidae. Silphidae. Stenopelmatidae. **Aves:** *Aphrastura spinicauda*, Furnariidae.

Anfibios: Leptodactylidae.

Udrizar Sauthier et al. (2005). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*, *Akodon longipilis*, *Chelemys macronyx*, *Geoxus valdivianus*, *Irenomys tarsalis*, *Loxodontomys micropus*, *Oligoryzomys longicaudatus*.

Christie et al. (2004). **Anfibio:** Rana de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*). Arácnidos. Insectos. Frutos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c).

El canto se oye como una serie de Juou...juo...juo...jol...col...col...jol...juou..

HÁBITAT

Bosques, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chubut, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N		



Nidifica en huecos en árboles.

Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. A. Kovacs, El Bolsón, dpto. Bariloche, Río Negro, 15-01-1962, un pichón.

Wallace (2010). Parque Nacional Lago Puelo, dpto. Cushamen, Chubut, nido en octubre con 2 pichones en un hueco en un Cohihue, a 5,9 m de altura.

Beaudoin y Ojeda (2011). Lago Mascaridi, dpto. Bariloche, Río Negro, 4 nidos en huecos en árboles (*Nothofagus*)

Huevos

Pone 2 ó 3 huevos blancos.

Medidas

Goodall et al. (1951): 41,9 a 43,0 x 31,5 a 31,0

PICHONES

Peso

Wallace (2010): 325 g

Observaciones

Costa, M. (2012). Chubut. Adulto con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Abundantes rayas pardas y blancas-canela. Semicollar blanco. Alas con barras anchas pardas y canelas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Strix rufipes rufipes King, 1827 por el oeste, desde Mendoza y Neuquén hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego. También Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Bosque araucano de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut

Citas: Straneck y Vidoz (1995); Vidoz (1995); Wallace (2010.)

Neuquén

Citas: Christie et al. (1988); Contreras (1975); Dabbene (1926d); Daciuk (1978); Del Valle et al. (1989); Girini et al. (2016); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Ortiz et al. (2018c); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Beaudoin y Ojeda (2011); Camperi (1998); Contreras (1975); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016); Trejo y Ojeda (2002); Trejo y Seijas (2003); Trejo et al. (2011)

Santa Cruz

Citas: Burmeister (1890); Imberti (2005e); Darrieu et al. (2008); Peri (2013); Scott y Sharpe (1915)

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Johansen (1966); Schallow (1898)

Islas Malvinas

Citas: Wace (1921)

LECHUZA ESTRIADA *Ciccaba virgata* (Cassin, 1849)

Otros nombres: Kavuré guasú. Lechucita de dedos desnudos. Lechuza de cola larga. Lechuza moteada. Suindá kaaguí.

DESCRIPCIÓN

Largo: 29-35 cm.

Peso: Marks et al. (1999): 175-320 g

Coloración. Pico amarillento grisáceo. Dedos grises amarillentos. Iris pardo.

Cejas ocráceas. Cara y parte dorsal pardas oscuras finamente barradas de castaño. Ventral ocrácea jaspeada de canela. Muslos y plumas de los tarsos canelas.

Alas barradas de canela y pardo oscuro. Cola parda oscura con barras finas canelas y punta ocrácea

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos. Se alimenta de insectos (escarabajos, langostas). Pequeños mamíferos (murciélagos). Reptiles, anfibios, aves.

HÁBITAT

Bosques, selvas, monte fuerte, selvas en galería de arroyos.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones.

Partridge (1954). Misiones. Juvenil.

Más información:

Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano a grande. Ceja ocrácea. Disco facial oscuro. Ventral jaspeada de ocráceo y canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Ciccaba virgata borrelliana (W. Bertoni, 1901) en Misiones, Corrientes y Chaco.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Su distribución abarca Centro América y Sud América hasta noreste de Argentina.

Comprende: México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ciccaba virgata borrelliana (W. Bertoni, 1901)

Chaco

Citas: Bodrati et al. (2012c); Cowper Coles et al. (2012b)

Corrientes

Citas: Roesler en Bodrati et al. (2012c)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1994, 1996a, 2009); Olrog (1985); Partridge (1954); Straneck (1990h); Wioneczak et al. (2020a)

LECHUZA NEGRA *Ciccaba huhula* (Daudin, 1800)

DESCRIPCIÓN

Largo: 35-40 cm.

Peso: Contino (1980): N= 1 (?) 500 g

Willis y Oniki (2002): N= 1 (H) 470 g

Coloración. Pico y dedos naranjas-amarillentos. Iris naranja a pardo.

Cabeza y parte ventral negras barradas de blanco. Partes dorsales y alas pardo oscuro barradas de blanco. Cola negra con cuatro barras finas y punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un potente y grave HOUuuu...emitido esporádicamente. También hace una sucesión de Hu.hu.hu.huHou, con ligera modulación de amplitud ascendente.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Plataforma de palitos y epífitas.

Bodrati y Cockle (2013). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, nido en una horqueta de un Anchico (*Parapiptadenia rigida*) a 12,5 m de altura, protegido por epífitas y tres ramas verticales grandes. En Octubre-noviembre de 2010 tenía un pichón y en setiembre-noviembre de 2012 un huevo.

Huevos

Pone 1. Blanco.

Medidas

Bodrati y Cockle (2013): 47,2 x 39,4

Peso

Bodrati y Cockle (2013): 23,4

Observaciones

Bodrati et al. (2010). Misiones. Adulto con pichones.

Más información:

Bodrati y Cockle (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Toda negra con barras blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Ciccaba huhula huhula (Daudin, 1800) en Salta y Jujuy, y *Ciccaba huhula albomarginata* (Spix, 1824) en Corrientes y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Presenta dos poblaciones bien separadas, una en el norte de Sudamérica, que comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. La otra población se encuentra en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy

Citas: Olrog (1985)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Calilegua, Ledesma, Jujuy, un individuo oído y observado en cercanías de la seccional Mesada de las colmenas en agosto de 1996 (A, Bodrati y G. Bodrati)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Ciccaba huhula albomarginata (Spix, 1824)

Corrientes

Citas: Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2013); Chebez (1996a); Olrog (1985); Partridge (1956); Straneck (1990h); Wioneczek y Pradier (2020)

Subfamilia: Surniinae

CABURÉ YUNGUEÑO *Glaucidium bolivianum* C. König, 1991

DESCRIPCIÓN

Largo: 16 cm.

Peso: Marks et al. (1999): 55 g

Coloración. Iris amarillo.

Coloración general rojiza canela con manchitas blanquecinas redondeadas en la cabeza. Puntos ocráceos en el dorso. Dos puntos oscuros en la parte posterior de la cabeza. Corta ceja blanquecina. Cola con cuatro bandas oscuras.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos diurnos y nocturnos.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Rojizo con manchitas redondas en la cabeza.

Se parece al Caburé chico pero tienen diferente canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Glaucidium bolivianum C. König, 1991 en Jujuy, Salta y Tucumán.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Yungas (nuboselva) de Perú, Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Straneck et al. (1987b) (*jardini*)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán

Citas: Brandán y Navarro (2009)

Observaciones: Capllonch, P. (Sierra de San Javier)

CABURÉ CHICO *Glaucidium brasilianum* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Caburé. Caburé-í. Chunchu. Lechucita. Lechucita chica. Lechuza enana. Llamador de pajaritos. Rey de los pajaritos. Rey de los pájaros.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17 cm. (macho), 18,5 cm. (hembra).

Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 59 g (Rango: 55 a 62)

Blendinger (2005): X= 66,0 g

Salvador (2014a): N= 1 (M) 58,4 g; N= 1 (H) 63,8 g; N= 2 (?) 53,0 y 62,5 g

Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 68 g

Coloración. Pico y dedos verde-amarillentos. Iris amarillo.

Cabeza parda con estrías ocráceas. Fina ceja blanquecina. Parte dorsal parda oscura. En la parte posterior del cuello tiene manchitas blancas y negras. Ventral blanca jaspeada de pardo oscuro.

Alas pardas con motas blancas ocráceas. Cubiertas alares con motas blancas. Cola parda oscura con cinco, a veces seis, barras angostas blancas (en realidad con dos motas blancas, una en cada lámina de la pluma).

La forma rufa o herrumbrosa tiene coloración general rojiza, las estrías de la cabeza más largas, cola con varias barras pardas oscuras y rojizas alternadas, a veces poco notables.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos diurnos y nocturnos. Solitario.

Alimentación

Pereyra C. B. (1927). **Aves:** *Columbina picui*, *Furnarius rufus*, *Sicalis* sp., *Zonotrichia capensis*.

Contino (1980). **Aves.**

De la Peña (2001d). **Mamíferos:** Laucha. **Aves:** *Poliptila dumicola*.

Di Giacomo (2005h). **Aves:** *Parula pitiayumi*, *Thraupis sayaca*.

Carrera et al. (2008). **Aves:** *Caprimulgus parvulus*, *Coccyzus melacoryphus*, *Columbina picui*, *Coryphospingus cucullatus*, *Guirra guirra*, *Nystalus maculatus*, *Saltator aurantirostris*, *Turdus amaurochalinus*, *Vireo olivaceus*, *Zonotrichia capensis*, *Furnariidae*. **Mamíferos:** *Galea musteloides*, *Graomys griseoflavus*, *Molossus molossus*, *Thylamys pusillus*. **Reptiles:** *Polychrus acutirostris*, *Teius teioi*, *Tropidurus spinulosus*. **Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae: Lamiinae, Scarabaeidae: *Coelosis bicornis*, *Megathopa* sp., *Epichalcoplethis sanctijacobi*.

Lepidoptera Odonata. *Quesada gigas*.

Santillán et al. (2008a). **Anfibio:** *Rhinella* sp. **Reptiles:** Lagartija verde (*Teius oculatus*)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Synallaxis* sp. **Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae, Scarabaeidae). Orthoptera (Acrididae).

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Thraupis bonariensis*, *Troglodytes aedon*.

Tejo, L. C. (2012). **Aves:** Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 25/05/2019.

Di Sallo et al. (2016). Fruto de Cancharana.
 Salvador et al. (2017). **Reptiles:** Lagartija verde (*Teius oculatus*)
 Dalinger, G. (2018). **Aves:** Caburé (*Glaucidium brasilianum*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 26/05/2019.
 Bodrati (*in litt.* 2019). En Misiones. **Aves:** *Parula pitiayumi*, *Tachyphonus coronatus*, *Thraupis sayaca*, *Dacnis cayana*, *Trichothraupis melanops*, *Hemithraupis guira*, *Columbina talpacoti*, *Camptostoma obsoletum*, *Turdus amaurochalinus*, *Turdus leucomelas*, *Euphonia pectoralis*.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una sucesión de suaves y silbadas notas, Jüjüjüjüjüjüjüjüjü, que suele combinar con un agudo juitjuitjuitjuit.chierchierchier.

HÁBITAT

Sabanas, montes, bosques, arboledas, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires,



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Construye el nido en nidos abandonados de Carpinteros o en huecos naturales. También en nidos de Hornero (*Furnarius rufus*)
 Oculto. Rudimentario.

Hartert y Venturi (1909). Santa Fe. Nido.
 Pereyra (1938b). Cría en nidos de Hornero (*Furnarius rufus*).
 Plotnick (1956a). José C. Paz, pdo. José C. Paz, Buenos Aires, nido en uno de Hornero (*Furnarius rufus*). el 27-10-1952, tenía 4 huevos.
 Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. M. Lillo, Tucumán, 17-11-1917, un huevo.
 Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
 Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, A. Bodrati localizó un nido en uno de *Colaptes* sp., un adulto acarreaaba insectos.
 Cabrera et al. (2008). Impenetrable, Chaco, 2004-2006, 2 nidos en huecos en quebrachos.
 Cockle et al. (2008, 2011, 2012). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nidos en huecos de árboles.
 Berkunsky y Reboreda (2009). Chaco. Nido.
 Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005, se halló un nido en uno abandonado de Carpintero (*Colaptes* sp.). Otro nido en Ascochinga, dpto. Colón, estaba en uno abandonado de Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*)
 De la Peña (2013c). La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, 17-10-1989, un nido en uno de *Colaptes melanochloros*, a 2,0 m del suelo, 4 huevos, Villa Georgina, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 21-10-1999, nido en un hueco en un tronco, a 0,60 m de altura, 4 pichones y un huevo, 14-11-2006, Providencia, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido en un hueco, en Paraíso a 3,50 m del suelo, 4 pichones.
 Liebana et al. (2013). La Pampa. Nido.
 Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Chaco, Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, noviembre de 2000, nido en viejo hueco de *Colaptes melanochloros*, con un huevo incubado.
 Pagano en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido. La Lonja, partido de Pilar, Bodrati (*in litt.* 2019), nidos en distintas temporadas entre 1982 y 1991 en huecos de *Colaptes campestris* en postes de palmera del tendido eléctrico.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 5 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Salvador (1990): Miguel Lillo: 26,4 x 20,2

De la Peña (2013c): 28,2 a 29 x 24,1 a 24,6 X= 28,4 x 24,3 (N= 4)

Peso

De la Peña (2013c): cáscaras 0,80 X= 0,80 (N= 4)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Cuerpo cubierto de plumón blanquecino, hasta los 9-10 días. Luego comienza a notarse un jaspeado pardo en ventral y pardo más uniforme dorsalmente.

A los 20 días las alas son pardas con manchas blanquecinas en las cubiertas.

Los pichones a los 28-30 días dejan el nido.

Observaciones

Pereyra (1938b). Escobar, pdo. Escobar, Buenos Aires, pichones en un nido de Hornero.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, S. Krapovickas y A. Yanosky (com. pers.) en diciembre de 1994, hallaron un pichón no volador, en el interior de un bosque.

Krapovickas y Yanosky en Di Giacomo (2001). Formosa. Adulto con pichones.

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Depredadores

De adultos: *Caracara plancus* en Salta, Areta en Salvador (2017a)

Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) en La Pampa, Santillán et al. (2014)

Más información:

Larsen (2012)



La Camila. Santa Fe. 17-10-1998



Santa Catalina. Córdoba. 20-07-2007



Villa Georgina. Santa Fe. 05-12-1999. 45 días de edad



Villa Georgina. Santa Fe. 18-11-1999. 28 días de edad



Santa Catalina. Córdoba. 20-07-2007

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño. Movimientos “acompañados” de la cola. Ventral jaspeada. Puntos blancos en las alas. Mancha blanca y negra en la parte posterior del cuello (no siempre bien visible)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Glaucidium brasilianum brasilianum (J. F. Gmelin, 1788) (por el noreste), Misiones, Corrientes y Entre Ríos; *Glaucidium brasilianum pallens* Brodkorb, 1988, Formosa, Chaco y Santa Fe; *Glaucidium brasilianum stranecki* König & Wink, 1995, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y *Glaucidium brasilianum tucumanum* Chapman, 1927, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Doce subespecies. Muy extenso Rango: de distribución que va desde el sur de Estados Unidos al norte y centro de Argentina. En gran variedad de habitats. Comprende: Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Subespecies consideradas por algunos autores:

Glaucidium brasilianum brasilianum (J. F. Gmelin, 1788)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Serié y Smyth (1923)

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Di Sallo et al. (2016); Gai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h); Wioneczek et al. (2020c)

Glaucidium brasilianum pallens Brodkord, 1938

Chaco

Citas: Carrera et al. (2008); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Ortiz et al. (2018c)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Glaucidium brasilianum stranecki Köning & Wink, 1995

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Maceda (1988); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b, 2014); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ortiz et al. (2018c); Pereyra (1923a); Salvador (1983a, 2012c); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurietta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Catalina, dpto. Totoral, Córdoba, 21-07-2007)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Ortiz et al. (2018c); Santillán et al. (2014); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Glaucidium brasilianum tucumanum Chapman, 1927

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Jujuy

Citas: Fiora (1933); Ortiz et al. (2018c); Straneck et al. (1987)

La Rioja

Citas: Hayward (1967)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), 2 individuos observados en un Camping Privado (Complejo el Edén) en el borde del poblado de Chamical, dpto. Chamical, La Rioja, 23 de febrero de 2012.

Mendoza

Citas: Blendinger (2005); Ferrer et al. (2019); Ortiz et al. (2018c)

Salta

Citas: Alabarce y Lucero (1977); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013); Ortiz et al. (2018c); Areta en Salvador (2017a)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i, 2013f)

San Luis

Citas: Bó (1965b); Maceda et al. (2001); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Ortiz et al. (2018c)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004) (*tucumanun*); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2007, 2011b); Esteban (1953) (*tucumanun*); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Köning (1991) (*tucumanun*); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b, 2018c); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

Los límites de distribución del Caburé y Caburé austral no están bien definidos.

CABURÉ AUSTRAL *Glaucidium nana* (King, 1827)

Otro nombre: Caburé grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17 cm. (macho), 18,5 cm. (hembra).

Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 71,7 y 71,7g; N= 2 (H) 61,2 y 82,2 g

Navas y Bó (1986): N= 1 (M) 73,2 g; N= 1 (H) 107 g

Camperi (1992a): N= 1 (M) 68,3 g
 Christie et al. (2004): N= 1 (H) 79 g; N= 1 (M) 58 g
 Salvador (2014a): N= 1 (M) 79,7 g; N= 1 (?) 84,5 g

Coloración. Tarsos crema-amarillentos. Iris amarillo.

Cabeza parda con estrías ocráceas. Fina ceja blanquecina. Parte dorsal pardo oscuro. En la parte posterior del cuello manchitas blancas y negras. Ventral blanco jaspeado de pardo oscuro. Alas pardas con motas blanco ocráceas. Cubiertas alares con motas blancas.

Cola parda oscura con cinco, a veces seis, barras angostas blancas (en realidad con dos motas blancas, una en cada lámina de la pluma).

Forma rufa o herrumbrosa

Coloración general rojiza, las estrías de la cabeza más largas, cola con varias barras pardas oscuras y rojizas alternadas, a veces poco notables.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario.

Alimentación

Fernández, J. (2014). **Aves:** Comesebo patagónico (*Phrygilus patagonicus*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Salvador et al. (2017). Mamíferos, Insectos.

Cusano, E. (2018). **Aves:** Coludito de cola negra (*Leptasthenura a. pallida*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

HÁBITAT

Bosque araucano. En la migración otros ambientes.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Cruz



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nidifica en huecos.

Imberti (2005e). Parque Nacional los Glaciares, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidifica en octubre-noviembre. Santillán et al. (2010). Monumento Natural Bosque Petrificado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 2000-2006 varios nidos en huecos.

Huevos

Pone 3-4 huevos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 28,0 x 21,5 a 23,0

Santillán et al. (2010): 30,2 a 31,5 x 25,1 a 26,8 X= 30,6 x 25,8 (N= 8)

Peso

Santillán et al. (2010): 4 a 6 X= 4,8

Observaciones

Reynolds (1934). Tierra del Fuego. Adulto con pichones

Depredadores

De adultos: *Buteo albigula* en Río Negro, Trejo et al. (2006b)

Otros

Comisso (2012). Un ejemplar con Leucismo.

Más información:

Santillán et al. (2010). Norambuena (2013)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Glaucidium nana (King, 1827) por el oeste de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, oeste y este de Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

Parte de la población en invierno migra al norte.



Valdivia. Chile. 24-10-2017
Foto: Cynthia Arenas



Zona rural Trelew. Chubut. 12-07-2014
Foto: Santiago Sainz-Trápaga

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Camperi (1992c); D'Orbigny (1835/44); Darrieu y Camperi (2001a); Hudson (1872); Morici (2014); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1927d, 1938b); Steullet y Deutier (1945)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Pereyra (1923a); Salvador et al. (2017); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurieta (1995)

Entre Ríos

Citas: Camperi (1992a)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014)

La Pampa

Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Navas y Bó (1986); Tejerina et al. (2006)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza

Citas: Elías en Ferrer et al. (2019); López de Casenave (2001); Roig (1965)

Neuquén

Citas: Castellanos (1932); Contreras (1976, 1977b); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Johnson (1967); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Peters (1923b); Steullet y Deautier (1945); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Parque Lanín, dpto. Huiliches, 27-01-76)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016); Trejo et al. (2006b)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2005e); Köning, (1991); Peri (2013); Santillán et al. (2010); Scott y Sharpe (1915)

San Luis

Citas: Bó (1965b); Masramón (1983)

Santa Fe

Citas: Giai (1950)

Observaciones: Elisa, dpto. Las Colonias, Victor Merlino (29-06-2016); Santuce, dpto. San Cristóbal, Pablo Capivilla (16-06-2017)

Santiago del Estero

Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego

Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bosso (1992); Clark (1986; Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

LECHUCITA VIZCACHERA *Athene cunicularia* (Molina, 1782)

Otros nombres: Caruja. Catelalac. Lechucita. Lechucita de campo. Lechucita de las cuevas. Lechucita pampa. Lechuza. Lechuza chica. Lechuza de campo. Lechuza de las cuevas. Lechuza de las vizcacheras. Lechuza de rozado. Lechuza pampa. Pejpirá. Pezipira. Urucureá.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19-26 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 8 X= 200 g (Rango: 160 a 220)
 Contreras (1979f): N= 1 (M) 122,0 g; N= 1 (H) 168,0 g
 Contino (1980): 170 g
 Camperi (1992a): N= 1 (M) 59,4 g; N= 2 (H) 164,9 y 178,4 g
 Camperi (1992c): N= 1 (H) 200,0 g
 Navas y Bó (2001): N= 1 (H) X= 185,9 g
 Camperi y Darrieu (2005): N= 1 191,1 g
 Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 201 g (Rango: 188 a 212); N= 6 (H) X= 191,2 g (Rango: 158 a 211)
 Pagano y Salvador (2017): N= 3 (M) 162,3, 200 y 200 g; N=1 (H) 220 g

Coloración. Pico crema. Patas largas con plumas blancas o beige. Iris amarillo.
 Parte dorsal parda con lunares blanquecinos y algunos canelas. Cara y garganta blancas. Cuello y pecho blanquecinos con barras pardas y ocre. Abdomen blanco.
 Alas pardas con lunares blanquecinos. Cola parda con barras blanquecinas.

COMPORTAMIENTO

De hábitos diurnos y nocturnos.
 Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, anfibios, reptiles.

Alimentación

Cunningham (1871). Roedores.
 Crawshay (1907). Insectos.
 Mata (1927). **Mamíferos:** Ratones. **Anfibios:** *Bufo marinus*, *Hyla pulchela*. **Insectos:** Coleópteros (*Phanaeus splendidulus*) (*Gromphas lacordairei*) (*Dyscinetus rugifrons*) (*Acaptophilus dasypleurus*) (*Cyclocephala signaticollis*) (*Anisodactylus cupripennis*, Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*). Scarabaeidae (*Phileurus vervex*). **Reptiles.** Culebra verde y negra (*Erythrolamprus poecilogyrus*)
 Aravena (1928). **Anfibios:** *Bufo arenarum*, *Leptodactylus* sp. **Reptiles:** Culebra verde y negra (*Erythrolamprus poecilogyrus*). **Insectos:** Lepidópteros, Coleópteros (*Phanaeus splendidulus*) (*Gromphas lacordairei*) (*Dyscinetus rugifrons*) (*Acaptophilus dasypleurus*) (*Cyclocephala signaticollis*) (*Anisodactylus cupripennis*). Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*). Ortóptero (*Cephalochaema calamus*). Scarabaeidae. Tucura. Tenebriónido. Arácnidos. Huesos. Vegetales.
 Zotta (1934). **Insectos:** Coleóptero (Scarabaeidae, *Phanaeus* sp.)
 Liebermann (1935). **Insectos:** Acrididae.
 Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros (Scarabidae)
 Olrog (1956a). **Insectos:** (Coleópteros).
 Pearson et al. (1968). **Mamíferos:** *Ctenomys talarum*.
 Massoia (1983). Mamíferos: *Calomys* sp.
 Bellocq y Kravetz (1983). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys musculus*, *Calomys laucha*, *Oligoryzomys flavescens*.
 Salvador (1984a). Ratones
 Bellocq (1987c). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys musculus*, *Calomys laucha*, *Mus musculus*, *Oligoryzomys flavescens*.
 Massoia (1987). **Mamíferos:** *Lagostomus maximus*, *Didelphis albiventris*, *Tolypeutes matacus*
 Bellocq y Kravetz (1994). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys musculus*, *Calomys laucha*, *Mus musculus*, *Oligoryzomys flavescens*.
 De Santis et al. (1997). **Mamíferos.**
 Diéguez (1997b). **Aves:** *Sturnella loyca*.
 Bellocq (1997b). **Mamíferos:** *Calomys musculus*, *Calomys laucha*, *Oligoryzomys flavescens*.
 Tiranti et al. (1998). **Mamíferos:** *Thylamys pusillus*, *Eptesicus furinalis*, *Tadarida brasiliensis*, *Reithrodon auritus*, *Akodon molinae*, *Akodon azarae*, *Ctenomys* sp., *Calomys* sp., *Eligmodontia typus*. **Reptiles:** *Leptotyphlops* sp.
 Sauria. **Anfibios:** *Bufo arenarum*. **Aves:** Passeriformes. **Insectos:** Coleópteros. **Arácnidos.** **Moluscos:** Gasterópodos.
 Abril et al. (1998). **Mamíferos:** Muridae, Cavidae. **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae, Curculionidae, Bruchidae). **Arácnidos:** (Chelicerata, Araneae). Escorpiones (Chelicerata, Scorpionida). Aves. Reptiles.
 Mero y Serracín (1998). **Insectos:** Coleópteros. Roedores (Ratones de campo).
 Andrade et al. (2004). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*, *Ctenomys* sp., *Eligmodontia* sp., *Lepus europaeus*, *Euneomys chinchilloides*, *Reithrodon auritus*. **Reptiles:** Liolaemini, Leiosaurae. **Aves:** no identificadas.
 Pessino et al. (2005). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp., *Eptesicus furinalis*. **Insectos.**

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Anfibios: *Bufo arenarum*, *Leptodactylus* sp. **Arácnidos:** Arañas.

Nabte, M. J., U. F. J. Pardiñas y S. L. Saba y 2008. **Mamíferos:** *Akodon iniscatus*, *Akodon molinae*, *Calomys musculinus*, *Eligmodontia typus*, *Graomys griseoflavus*, *Microcavia australis*, *Reithrodon auritus*. Reptiles . Insectos.

Sánchez et al. (2008). **Chelicerata:** *Lycosa* sp., *Acanthopachylus aculeatus*. **Malacostraca:** *Armadillidium* sp. *Chasmagnatus granulata*. **Insectos:** *Calosoma retusum*, *Cynthia planodisca*, *Scarites melanarius*, *Trirammatus striatulus*, *Argutorides bonariensis*, *Megacephala distinguenda*, *Megadytes glaucus*, *Conoderus* sp., *Dbolocelus palpalis*, *Diloboderus abderus*, *Heterogomphus pauson*, *Sulcophanaeus menelas*, *Cyclocephala signaticollis*, *Lethocerus annulipes*, *Tropisternus* sp. *Dyscinetus rugifrons*, (Lepidoptera y Libellulidae no identificadas), *Phileurus* sp. , *Gryllus* sp., *Scapterideus* sp. *Neoconocephalus* sp. **Anfibios:** Sapito de jardín (*Rhinella dorbignyi*), Ranita del zarzal (*Boana pulchella*), Sapo común (*Rhinella arenarum*). **Reptiles:** Serpiente de cristal (*Ophiodes vertebralis*). **Aves:** *Furnarius rufus*, *Molothrus bonariensis*, *Hymenops perspicillata*, *Passer domesticus*. **Mamíferos:** *Monodelphis dimidiata*, *Tadarida brasiliensis*, *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys* sp., *Reithrodon auritus*, *Akodon azarae*, *Oxymycterus rufus*, *Rattus* sp. *Cavia aperea*, *Ctenomys talarum*.

De Tommaso et al. (2009). **Anfibios:** *Rhinella arenarum*. **Mamíferos:** *Thylamys pallidor*, *Akodon molinae*, *Calomys musculinus*, *Ctenomys azarae*, *Eligmodontia typus*, *Galea musteloides*, *Graomys griseoflavus*, *Microcavia australis*, *Reithrodon auritus*. **Reptiles:** Squamata. **Insectos:** Coleoptera. Orthoptera. **Arácnidos:** Escorpiones.

Andrade y Nabtea (2010). **Anfibio:** *Rana esteparia* (*Pleurodema bufoninum*)

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Passer domesticus*. **Insectos:** Isoptera (termitas aladas)

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Laucha.

Solaro et al. (2012). **Mamíferos:** *Galea musteloides*, *Oligoryzomys flavescens*, *Calomys* sp., *Eligmodontia* sp., *Ctenomys* sp. (juveniles). *Ctenomys* sp. (adultos). *Akodon azarae*, *Akodon molinae*, *Thylamys* sp. **Reptiles:** *Teius oculatus*. **Anfibios:** *Bufo* sp. **Aves:** Passeriformes. **Insectos:** Acrididae. Gryllidae. Mantidae. Carabidae. Scarabaeidae. Cerambycidae. Curculionidae. Tenebrionidae. Coleoptera no identificado. Formicidae. **Arácnidos:** Arachnida. Scorpionida. Bothriuridae. Araneae.

Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Schlemmer, J. (2017). **Mamíferos:** Murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Montero, R. (2017). **Mamíferos:** Tuco-tuco de los talaes (*Ctenomys talarum*). EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Salvador et al. (2017). **Anfibios:** Sapo común (*Rhinella arenarum*), Ranita del zarzal (*Boana pulchella*), Rana criolla (*Leptodactylus latrans*)

Guerrero et al. (2017). **Insectos:** Coleópteros, *Conoderus scalaris* y *Diloboderus abderus*. **Arácnidos:** Escorpiones y Opiliones. **Reptiles:** *Amphisbaena cf darwinii*. **Anfibios:** Sapito de jardín (*Rhinella fernandezae*), *Rhinella arenarum*. **Mamíferos:** *Calomys* sp., *Ctenomys talarum*. **Aves:** *Furnarius rufus*, *Zenaida auriculata*.

Pagnoni y Carribero (2018). Ciudad de Puerto Madryn, Chubut. **Mamíferos:** Murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*)

Salvador y Fariña (2018). **Anfibios:** *Rhinella* sp., Rana criolla (*Leptodactylus latrans*), Sapito panza amarilla (*Elachistocleis bicolor*)

De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. 05-11-2018. **Ave:** Cachilo ceja amarilla (*Ammodramus humeralis*). 18-10-2018. **Reptil:** Fasa yarará (*Lystrophis dorbignyi*). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe. 03-12-2018. **Insecto:** Tucura quebrachera (*Tropidacris collaris*)

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Emite una voz de alarma áspera: Chieeee...chichichi, repetida tanto de día como de noche. Otro canto escuchado generalmente en horas nocturnas es un suave Ju juHUUuuu.ju juHUUuuu.

HÁBITAT

Estepas, praderas, sabanas, áreas rurales y periurbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o juveniles en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego.



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Nidifica en cuevas en el suelo. Raro posturas fuera de ellas.

Expuesto. Elaborado. Las cuevas tienen un túnel que lleva a la cámara. Ésta es un poco más ancha. Los huevos son puestos sobre la tierra o sobre pocos pastos.

Alrededor de la boca de entrada puede colocar materias fecales de animales y otros elementos.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.

Hudson (1874b). Buenos Aires. Nido.

Durnford (1877a). Chubut. Nido.

Gibson (1879). Buenos Aires. Nido.

Withington (1888). Buenos Aires. Nido.

Holland (1892). Buenos Aires. Nido.

Lönnberg (1903). Jujuy. Nido.

Crawshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.

Hartert y Venturi (1909). Santa Fe, Buenos Aires. Nidos.

Grant (1911). Buenos Aires. Nido.

Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.

Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone de 5 a 8 huevos.

Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 11-10-1920 y 14-11-1921, Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 03-12-1925, nidos.

Mata (1927). Buenos Aires. Nido.

Pereyra (1931). Buenos Aires. Nido.

Castellanos (1932). Córdoba. Nido.

Pereyra (1937). La Pampa. Nido.

Zuberbühler (1971). Buenos Aires. Nido.

Zapata (1977). Entre Ríos. Nido.

Belloco (1993). Diego Gaynor, pdo. San Andrés de Giles, Buenos Aires, nidos con posturas entre octubre y noviembre. El 29-11-1988, se encontró un nido superficial a nivel del piso. Tenía 3 huevos ubicados en una depresión a modo de plato hondo.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.

Di Giacomo (2005). Formosa. Nido.

Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.

De la Peña (2013c). Ataliva, dpto. Castellanos, Santa Fe, 18-10-1970, 2 nidos, con 1 huevo y 4 huevos, Sarmiento, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 20-10-1979, 3 huevos, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 30-10-1995, nido en el suelo (no en cueva) en un campo. Completó 4 huevos, pero fue abandono luego de grandes lluvias, Fortín Chilca, dpto. Vera, Santa Fe, 04-02-1997, nido en un hormiguero (tacurú). La boca de entrada estaba a 40 cm. del suelo.

Medidas: largo del túnel: de 1,20 a 1,50 m, diámetro: de 18 a 20 cm.

Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 3 nidos con 4, 4 y 2 huevos cada uno.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 2 nidos.

Salvador (2016a). Corrientes. Nido.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos, posturas en octubre y noviembre, uno de los nidos estaba en una barranca, ponen 4 huevos.

Salvador en De la Peña (2016c). Parque Nacional El Palmar, dpto. Colón, Entre Ríos, 14-11-1984, un nido en una pequeña barranca a 0,40 m de altura, con 4 huevos incubados.

Bodrati en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

De la Peña (2016c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 06-11-2014, nido en el interior de una columna de la luz, de cemento que estaba en el suelo. Materias fecales de equinos en el interior y en la boca de entrada.
 Borsellino (2017b). Buenos Aires. Nido.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
 Borsellino (2017a). Ciudad de Buenos Aires, nido en cueva artificial.
 De la Peña (2019b). Esperanza. 7 km al NO. 05-11-2018. Nido con 2 ejemplares. Uno capturó un Cachilo de cejas amarillas (*Ammodramus humeralis*) y un trozo de Falsa yarará (*Lystrophis dorbignyi*). Cayasta, dpto. Garay, Santa Fe, 03-12-2018, nido con pichones, les traen Tucura quebrachera (*Tropidacris collaris*)
 Quiroga y Llugdar (2019c). Varios nidos en Santiago del Estero.

Huevos

Pone de 4 a 6 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 31,0 a 37,0 x 26,0 a 28,0

Serié y Smyth (1923): 33,0 a 37,0 x 27,0 a 29,0

Smyth (1927): 33,0 a 38,0 x 26,0 a 28,0

Zapata y Cabrera (1969): 34,2 x 28,4

De la Peña (2013c): 33,5 a 35,5 x 27,4 a 28,8

X= 34,3 x 28 (N= 8)

Salvador en De la Peña (2016c): 35,8 a 37,1 x 29,2 a 29,6

X= 36,7 x 29,1 (N= 4)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 34,7 a 37,8 x 26,3 a 29,8

X= 36,3 x 28,5 (N= 12)

Peso

De la Peña (2013c): cáscaras 0,930 a 1,014

X= 0,947 (N= 8)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 14 a 17,5

X= 15,4 (N= 12)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen cubiertos de plumón blanquecino.

Peso al nacer

Belloq (1993): 9, 5

Observaciones

Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22-11-1973, adulto con 3 juveniles.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, pichones en noviembre y diciembre.

De la Peña (2013c). Esperanza, 28-11-2003, varias parejas con pichones: dos con 3 y otra con 4; 05-12-2005, varias parejas con pichones: cinco con 3 y otra con 4 pichones, 16-11-2012. Rincón de Ávila, dpto. La capital, Santa Fe, pareja con 5 pichones.

Salvador (2015). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido en una barranca de tierra a 20 cm del suelo, 4 pichones.

Salvador en Salvador (2016a). Salta. Adulto con pichones.

De la Peña (2016c). Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe, 03-12-2015, adultos con 3 pichones; Esperanza, dpto.

Las Colonias, Santa Fe, 07-12-2015, adultos con un pichón.

Generalidades

Belloq (1993). El periodo de incubación duró aproximadamente 27 días. Alcanzan la edad de volar entre los 40 y 50 días.

Más información:

Belloq (1993)

Otros

Urcola (2011). Dos ejemplares Albinos.

Pereyra (1937c). Un ejemplar con Leucismo parcial.

De la Peña, M. Esperanza. Santa Fe. 19-12-2008. Un ejemplar con Leucismo.

Depredadores

De adultos: *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Buenos Aires, Idoeta y Roesler (2012)



Esperanza. Santa Fe. 19-12-2008. Leucístico



Esperanza. Santa Fe. 02-05-2008



Esperanza. Santa Fe. 11-11-2014
Ubicación nido en columna de cemento



Esperanza. Santa Fe. 11-11-2014
Entrando al nido



Fortín Chilcas. Santa Fe. 04-02-1997. Nido en tacurú



Esperanza. Santa Fe. 30-10-1995. Nido fuera de la cueva



Esperanza. Santa Fe. 10-12-2008

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Garganta y abdomen blancos. Pecho con barras pardas. Alas y parte dorsal con muchos lunares blancos. Grito fuerte.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Athene cunicularia juninensis (Berlepsch y Stolzmann, 1902) en el altiplano de Jujuy y Salta; *Athene cunicularia cunicularia* (Molina, 1782) en noreste de Corrientes y Misiones y *Athene cunicularia partridgei* Olrog, 1976 desde el norte del país, excepto el norte de Misiones y el altiplano, de Jujuy y Salta hasta Santa Cruz. Citada para las islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Diecinueve subespecies. Muy extenso Rango: de distribución por toda América. En Estados Unidos y Canadá residen únicamente en la primavera-verano boreal migrando luego. Se halla ausente en Centro América y en Amazonia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Athene cunicularia juninensis (Berlepsch y Stolzmann, 1902)

Jujuy

Citas: Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

Athene cunicularia cunicularia (Molina, 1782)

Corrientes

Citas: Contreras (1977, 1979f, 1981b)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Krauczuk (2009); Navas y Bó (1993)

Athene cunicularia partridgei Olrog, 1976

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bellocq (1987c, 1993); Bellocq y Kravetz (1983, 1994); Bodrati et al. (2006b); Borsellino (2017a, 2017b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Cavalli et al. (2013); Cavicchia y García (2012); Codesido et al. (2011, 2013); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiñy Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Grant (1911); Guerrero et al. (2017); Hartert y Venturi (1909); Idoeta y Roesler (2012); Klimaitis (1975b); Leveau y Leveau (2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Morici (2012b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Sánchez et al. (2008); Vargas et al. (2007); White (1882); Zapata (1998); Zuberhübler (1971)

Observaciones: De la Peña (Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca 05-02-1976)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Contreras (1977); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut

Citas: Bo (1958); De Santis et al. (1997); Harris (2008); Massoia et al. (1988); Nabte et al. (2008); Navas y Bó (1997a); Pagnoni y Carribero (2018); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979a); Partridge (1953c); Salvador (1983, 2013e, 2016b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990b); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (Jujuy, dpto. Capital, 05-02-1977)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Callicó Fortunato et al. (2008); Chebez et al. (1998); Contreras (1977); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); De Tommaso et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Mero y Serracín (1998); Olrog (1979a); Pessino et al. (2005); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2005, 2006); Tejerina y Montalvo (2005); Tirante et al. (1998); Villareal et al. (2005); Wetmore (1926b)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Lobo Allende y Bortnyk (2018);

Mendoza

Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1977, 1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2002); Navas y Bó (2001); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (1945);

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); White (1882)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas y Bó (1997a); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Río Negro

Citas: Andrade et al. (2004); Camperi y Darrieu (2005); Castello et al. (1982); Dacuik (1978c); Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina, 03-11-1979)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Höy (1969a); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2001); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Observaciones: De la Peña (Talacasto, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); Navas y Bó (1997); Scott y Sharpe (1915)

Santa Fe

Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Saggese et al. (2007); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Massoia (1987); Nores et al. (1991); Ortiz et al. (2018c); Quiroga y Llugdar (2019c)

Observaciones: De la Peña (Santiago del Estero, dpto. Capital, 29-01-1977)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b, 2020); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998, 2008c); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b, 2018c); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

LECHUCITA CANELA *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849)

Otros nombres: Kavuré. Lechucita. Lechucita acanelada. Lechucita caburé.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20-22 cm.

Peso: Marks et al. (1999): 104-150 g

Coloración. Pico grisáceo amarillento. Tarsos emplumados crema amarillentos. Dedos amarillentos. Iris gris amarillento.

Alrededor de los ojos negro. Superior del pico y cejas canelas. Cabeza parda oscura. Cara canela circundada por una línea negra. Partes ventrales canelas, más claras en el abdomen. Dorso pardo con banda canela en el manto. Dorso inferior castaño.

Alas pardas con lunares blancos. Cubiertas alares castañas con lunares blancos. Cola negra con tres hileras de lunares blancos.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Bodrati et al. (2019a). Insectos, caracoles, roedores.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Su canto es un suave y prolongado jurrrrrr con tenues modulaciones de amplitud, dando la impresión de que se aleja y se acerca.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta y Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N				N						N	N

Nidifica en huecos naturales en árboles o en nidos de Carpinteros.

Rodríguez (2013). Camino de Cornisa, ruta Nacional 9, Salta, Claus König (com. pers. 2013) encontró una familia con 3 pichones, que recién habían salido del nido. Este era una cavidad en el tronco de un árbol a 4 m del suelo. A mediados de noviembre de 1995, la misma cavidad estaba ocupada por una hembra.

Rodríguez (2013). Valle al este de la ciudad de Salta, 27-05-2012, nido en una cavidad realizada por Carpintero lomo blanco (*Campephilus leucopogon*) a unos 4 m del suelo.

Bodrati et al. (2019a). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, el 5 de diciembre de 2018, nido en un hueco, con tres huevos blancos.

Huevos

Pone 3 huevos blancos.

Pichones

Bodrati et al. (2019a). Nacen cubiertos de plumón gris oscuro.

Más información:

Bodrati et al. (2019a).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño tamaño. Zona ventral color canela intenso. Ceja canela. Alas y cola con muchos lunares blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Aegolius harrisii iheringi (Sharpe, 1899) en (*) Formosa, (*) Chaco, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe y *Aegolius harrisii dabbenei* Olrog, 1979 en Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

(*) Sin determinación segura de la subespecie presente en estas provincias.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Poblaciones separadas. Por un lado en la Selva Atlántica de sureste de Brasil, este de Paraguay, Bolivia y noreste de Argentina. Por otra parte con poblaciones separadas localmente en los Andes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aegolius harrisii iheringi (Sharpe, 1899)

Chaco

Citas: Bodrati et al. (2016a)

Corrientes

Citas: Bodrati et al. (2016a); Pereyra (1950)

Formosa

Citas: Bodrati et al. (2016a)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2019a); Bodrati y Cockle (2006); Castillo et al. (2020); Chebez (1996a); Dabbene (1913,1914); Navas y Bó (1991a); Saibene et al. (1996); Stranck en Olrog (1985)

Santa Fe

Aegolius harrisii dabbenei Olrog, 1979

Catamarca

Citas: Barrionuevo et al. (2008); Carma (2009); Fontanarrosa et al. (2009); Ortiz et al. (2018c)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Di Giacomo et al. (1995); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1979)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Barrionuevo et al. (2008); Coconier et al. (2007); Fontanarrosa et al. (2009); Moschione et al. (2013); Olrog (1985); Rodríguez (2012b, 2013)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Barrionuevo et al. (2008); Blendinger et al. (2004); Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Dabbene (1926a); Fontanarrosa et al. (2009); Gianini (2000); Lillo (1902); Lucero (1983); Olrog (1979); Ortiz et al. (2011b, 2018b, 2018c); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

Subfamilia: Asioninae

LECHUZÓN OREJUDO *Asio clamator* (Vieillot, 1808)

Otros nombres: Búho de orejas. Búho de los pantanos. Búho orejudo. Búho real. Lechuzón de cuernos. Lechuzón de las islas. Lechuzón de los pantanos. Lechuzón de monte. Lechuzón de orejas. Lechuzón de orejas largas. Ñacurutú. Ñacurutú de monte. Ñacurutú-í.

DESCRIPCIÓN

Largo: 30-38 cm.

Peso: Contino (1980): 480 g

Salvador (1988): N= 1 (M) 485 g

Salvador (2014a): N= 1 (H) 468 g

Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 670 g

Coloración. Pico gris. Iris pardo.

Penachos auriculares largos, negros. Corona, cuello posterior y dorso superior ocre con listado grueso de pardo oscuro. Resto de la zona dorsal ocre listado y salpicado intenso de pardo oscuro. Cara blanquecina. Mejillas castañas. Alrededor de los ojos oscuro. Bordea toda la cara una línea oscura, con castaño en la garganta. Pecho blanquecino y ocráceo con grandes listones pardos oscuros.

Alas y cola ocre con bandas pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Contino (1980). Ratones.

Massoia (1988h). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Oligoryzomys flavescens*, *Reithrodon auritus*, *Cavia aperea*, *Calomys musculinus*, *Lepus capensis*, *Eumops bonariensis*, *Lasiurus borealis*, *Lutreolina crassicaudata*. **Aves:** Icteteridae.

Klimaitis (1993). **Aves:** Passeriformes.

Martínez et al. (1996a). **Mamíferos:** *Calomys* sp. *Holochilus brasiliensis*, *Reithrodon auritus*. **Aves:** *Carduelis magellanica*.

Martínez et al. (1998). **Mamíferos:** *Rattus* sp. **Aves:** *Zenaida auriculata*, *Zonotrichia capensis*.

Isacch et al. (2000). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys musculinus*, *Oligoryzomys flavescens*, *Rattus* sp. **Aves:** *Zonotrichia capensis*.

Di Giacomo (2005h). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys callosus*, *Graomys griseoflavus*, *Holochilus brasiliensis*, *Holochilus chacarius*, *Necomys temchuki*, *Oligoryzomys fornesi*, *Pseudoryzomys simplex*, *Oecomys* sp.

Pautasso (2006a). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Holochilus chacarius*, *Lutreolina crassicaudata*, *Oligoryzomys flavescens*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Mamíferos:** *Cricetidae*.

Torregiani et al. (2015). **Mamíferos:** *Cavia aperea*, *Akodon azarae*, *Oligoryzomys flavescens*, *Mus musculus*, *Rattus* spp. **Aves:** *Columbidae*, *Icteridae*, *Emberizidae*, *Tyrannidae*, *Ploceidae*. **Anfibio:** *Rana*.

HÁBITAT

Sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidosy/o pichones en Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

En el suelo, entre pastos. También entre ramas secas en cañas, tacuaras o entre pastos y ramas en arboledas o debajo de matas de *Cortaderia selloana* y matas de *Stipa* sp.

Oculto o semiexpuesto. Rudimentario. Depresión con pastos en la base.

Pereyra (1931a). En el delta anida en el invierno, pone 3 ó 4 huevos.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en los pajonales, pone 3 huevos.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos, sobre un nido de *Anumbius annumbi*.

Fraga (1984). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, 20-10-1973, un pichón en el suelo. El 30-07-1978, 3 pichones

Blendinger et al. (1987). Bernal, pdo. Quilmes, Buenos Aires, 25-05-1986, nido en la trifurcación del tronco de un Sauce a 43 cm del agua. Tenía un huevo. El 17 de agosto, dos parejas con pichones. Reserva Costanera Sur, Capital Federal, D. Gallegos Luque (com. pers.) localizó el 29 de mayo un nido con 3 pichones.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el suelo, entre pajonales o zarzamoral.

Martínez et al. (1996a). Reserva Municipal Laguna de los Padres, pdo. Gral. Pueyrredón, Buenos Aires, 14-09-1991, nido con 3 pichones

López Lanús (1997). Parque Nacional Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, julio de 1988, dos pichones en pastizal, observados por H. Rodríguez Moulín.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.

Pautasso y De la Peña (2001). Rincón Potrero, dpto. La Capial, Santa Fe, el 16-03-2000, A. Pautasso localizó un nido con 5 huevos; De la Peña, localizó 4 nidos: el 20-04-1998 y 21-04-1998, en Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, con 2 pichones cada uno y en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-08-1998 y 19-06-1999, con un pichón cada uno.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en agosto de 2002, observado por M. Zanello y L. Juber.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nido con 2 pichones, en setiembre de 1996.

Tittarelli y Villareal (2009a). Reserva Provincial Paqrué Luro, dpto. Toay, La Pampa, agosto de 2004, nido en el suelo con tres volantones.

De la Peña (2013c). Esperanza, 3 nidos: 18-07-1983, un huevo, 19-06-1984, 2 huevos y 16-06-2002, 2 huevos.

Medidas: diámetro total: de 19 a 22 cm, profundidad: de 3 a 10 cm.

Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 3 nidos, uno en febrero y 2 en abril, bajo matas de *Cortaderia selloana* y matas de *Stipa* sp., postura 4 huevos.

Contino en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Bodrati (*in litt.* 2019). Nido con 3 pichones grandes en pajonal del borde de la Laguna Panza de Cabra, Parque Nacional Chaco, Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, mayo de 1997.

Morici en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Entre Ríos. Bodrati (*in litt.* 2019). Nido encontrado en abril de 1995 en Médanos, Gualeguay, Entre Ríos, 3 huevos incubados, en pajonal.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
 Petracci et al. (2018b). Buenos Aires. Nido.

Huevos

Pone hasta 5 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medidas

Salvador y Salvador (en prep.): 43,6 a 46,1 x 34,9 a 37,2	X= 44,74 x 36,43	(N= 8)
Blendinger et al. (1987): 46,9 x 40,6		
De la Peña (2013c): 43,9 a 47,8 x 38 a 38,7	X= 44,6 x 38,3	(N= 3)

Pesos

Salvador y Salvador (en prep.): 29 a 33 gr	X= 31,4 (N= 8)
De la Peña (2013c): 41	(N= 1)
De la Peña (2013c): cáscaras 2,6 a 3,5	X= 2,90 (N= 3)

PICHONES

Descripción

Pereyra (1938b). Pichón de 45 días más o menos, tiene plumón crema rojizo con el disco facial castaño rojizo y el lado del pico blanco; cubiertas de las alas con algunas plumas muy sedosas y barras transvesales castaño claro; primarias y rectrices aun cortas son del color del adulto.
 De la Peña (2013c). Plumón ocráceo amarillento. Disco facial castaño-rojizo. Al lado del pico blanco.
 A medidas que se desarrollan las plumas son ocre amarillentas y las alas de ese color y barras pardas oscuras.

Observaciones

Pereyra (1931a). Isla en Escobar, pdo. Escobar, Buenos Aires, agosto de 1927, un pichón de un mes de edad.
 Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, pichones nacidos a fines de junio.
 Quiroga et al. (2016). Santiago del Estero. Pichón.
 Bodrati en Salvador (2016a). Misiones, Buenos Aires. Adultos con pichones.
 Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Más información:
 Thurber et al. (2009)





Esperanza. Santa Fe. 19-06-1984



Esperanza. Santa Fe. 01-08-1998. Pichón



Esperanza. Santa Fe. 01-08-1998



Esperanza. Santa Fe. 25-10-1998



Esperanza. Santa Fe. 25-10-1998



Esperanza. Santa Fe. 01-07-1999. Juvenil



Neuquén Capital. Neuquén. 28-08-2017
Foto: Cynthia Arenas

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “Penachos auriculares” largos. Mejillas castañas. Penachos, alrededor de los ojos y línea que bordea la cara negros. Ventral blanquecino con jaspeado grueso de oscuro. Alas barradas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asio clamator midas (Schlegel, 1862) desde el norte del país hasta Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Ambientes abiertos con amplio Rango: de distribución que va desde Méjico al centro de Argentina y Uruguay, excluyendo la Amazonia. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Blendinger et al. (1987); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fraga (1984); Gasparri et al. (2018); Isacch et al. (2000); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2001); Martinez et al. (1996, 1998); Massoia (1988h); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1927d, 1938b); Petracci et al. (2018b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2003b); Soave et al. (1999); Torregiani et al. (2015)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Chaco (presencia regular entre 1997 y 2010), Parque Provincial Pampa del Indio (presencia regular entre 1999-2011), Isla del Cerrito (mayo de 1999), Resistencia (noviembre de 1999).

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Cobos et al. (1999); De la Peña (2013c); Esteban (1953); Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Wilson (1977)

Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Mancini (2011); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Tittarelli y Villareal (2009)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994b); Dabbene (1910); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1991a)

Neuquén

Citas: Bianchini (2018b)

Rio Negro

Citas: Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); Luna y Manassero (2008b); Pautasso (2006); Straneck (1990e)

Santiago del Estero

Citas: Moschione y Bishels (2005); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016); Torres y Michelutti (2001a)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b, 2018c)

LECHUZÓN NEGRUZCO *Asio stygius* (Wagler, 1832)

Otros nombres: Lechuza negruzca. Mocho diablo. Ñacurutú-hú. Quitilipi.

DESCRIPCIÓN

Largo: 38-46 cm.

Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 525 g

Coloración. Pico negro. Tarsos desnudos canelas. Iris amarillo-naranja.

Dorso pardo oscuro con manchas canelas en la nuca y en la espalda. Cara parda oscura. Región auricular moteada de ocráceo. “Penachos auriculares” negros. Ventral canela manchada de pardo.

Alas pardas con algunas manchas canelas. Cola parda con barras canelas y punta ocrácea.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Motta Junior (2006). **Mamíferos:** Chiroptera. Rodentia. **Aves:** Columbiformes. Cuculiformes. Gruiformes.

Passeriformes. Piciformes. Tinamiformes. **Insectos:** Coleoptera. Orthoptera. **Anura.**

Martínez y Echevarría (2018). **Aves.**

HÁBITAT

Sabanas, bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Observaciones

La Grotteria, J. (2014b). San Pedro, Misiones, 23-11-2014, pichón.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones. Un pichón dependiente observado durante el día en un eucaliptal del sector de acceso al Parque Provincial Piñalito. Dpto San Pedro, Misiones en marzo de 2002.

Bodrati et al. (2012). Juveniles observados en diferentes temporadas, en sectores del poblado de San Pedro, dpto. Homónimo, Misiones, entre 2005 y 2017.

Más información:

Esteves López et al. (2004). Arizmendi et al. (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “Penachos auriculares” medianos. Parte dorsal parda oscura. Ventral jaspeada de pardo y canela. Tarsos canelas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asio stygius stygius (Wagler, 1832) en Misiones y Corrientes y *Asio stygius barberoi* W. Bertoni, 1930 en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Amplio Rango: de distribución en el norte de Centro América e Islas del Caribe. En Sud América desde el norte, por el oeste hasta Argentina, excluyendo la Amazonia. Comprende: Cuba, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asio stygius stygius (Wagler, 1832)

Corrientes

Citas: Bodrati (2004d); Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati (2004d); Chebez (1994, 1996a, 2009); Chebez et al. (1998); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954)

Asio stygius barberoi W. Bertoni, 1930

Chaco

Citas: Bodrati (2004d); Bodrati et al. (2006a); Chebez et al. (1999); Zotta (1944)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); López Lanús (1997)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Olrog (1985); Salvador (1988)

Santiago del Estero

Citas: Moschione y Bishels (2005); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Girard (1933); Hartert y Venturi (1909); Lillo (1902); Lucero (1983); Martínez y Echevarría (2018); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz (2016); Ortiz et al. (2018a); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

LECHUZÓN DEL CAMPO *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

Otros nombres: Búho. Búho de campo. Búho del rastrojo. Búho de orejas cortas. Col-col grande. Lechuza. Lechuza campestre. Lechuza de las pajas. Lechuza de los campos. Lechuza pantanera. Lechuzón. Lechuzón campestre. Lechuzón de campo. Lechuzón de las pajas. Lechuzón de los pajonales. Lechuzón de los pastos. Lechuzón pajero. Nico. Quitilipi. Suindá.

DESCRIPCIÓN

Largo: 37-38 cm.

Peso: Contino (1980): 350 g

Salvador (2014a): N= 2 (M) 376,0 y 389,0 g; N= 4 (H) X= 405,7 g (Rango: 392 a 416)

Coloración. Pico negro. Dedos blanquecinos. Iris amarillo.

Dorso ocre y pardo oscuro, con algunas manchas blanquecinas en mayor cantidad en las cubiertas alares. Cara blanquecina con oscuro alrededor de los ojos. Ventral blanquecina con tono ocráceo, jaspeada de pardo, más fino en la región abdominal.

Alas y cola ocre con tono canela claro, con franjas y puntillado pardos oscuros.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos diurnos, crepusculares y nocturnos. Se posa en el suelo o en postes. Vuela a baja altura sobre los campos.

Alimentación

Pozzi (1918). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp.

Aravena (1928). **Mamíferos:** Ratas. Ratones. **Insectos:** Escarabideos (*Gromphas*).

Zotta (1932). **Mamíferos:** Roedores.

Zotta (1940). **Mamíferos:** *Mus musculus*, *Rattus rattus*.

Contino (1980). Aves. Mamíferos.

Handford (1983). **Mamíferos:** *Andinomys edax*.

Salvador (1984). **Mamíferos:** Roedores.

Rau et al. (1992). **Mamíferos:** *Phyllotis xanthopygus*.

Diéguez (1996a). **Aves:** *Agelaioides badius*, *Sicalis flaveola*, *Troglodytes aedon*, *Turdus rufiventris*, *Zenaida auriculata*, *Nothura maculosa*.

Cirignoli et al. (2001). **Mamíferos:** *Akodon albiventer*, *Auliscomys sublimis*, *Calomys lepidus*, *Cavia* sp., *Eligmodontia puerulus*, *Phyllotis* sp. *Thylamys* sp. **Insectos:** Coleopteros. **Aves.**

Christie et al. (2004). Roedores. Anfibios. Reptiles.

Maugeri (2006a). **Aves:** *Rallus maculatus*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Calomys* sp., Cricetidae *Mus musculus*. **Insectos:** Coleoptera (Scarabaeidae).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Emite varias voces, un agudo y áspero Kiec..kieec. ó Chaec..chaei..cheii.. entre otros.

HÁBITAT

Sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Islas Malvinas.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N			N		N	N

En el suelo, entre pastos.

Oculto. Rudimentario. Ligera depresión con pastos en la base.

Wilson (1926). Santa Fe. Nido.

Hudson (1870f). Buenos Aires. Nido.
 Whittington (1888). Lomas de Zamora, Buenos Aires, nidos entre los pastos, ponen 4 a 5 huevos.
 Grant (1911). Provincia de Buenos Aires, nidos con huevos en diciembre y en enero, observados por Miss Runnacles.
 Gibson (1918 y 1920). Provincia de Buenos Aires, nidos con huevos desde noviembre a febrero.
 Peters (1923). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, diciembre de 1920, nido con pichones.
 Pereyra (1931a). Las Marianas, pdo. Navarro, Buenos Aires, nido con 3 huevos a mediados de mayo. Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, 25-05-1930, en un alfalfar, nido con 6 huevos, el 14-04-1930, nido con 2 pichones y 2 huevovos
 Pereyra (1937). Buenos Aires. Nido.
 Pereyra (1937b). La Pampa. Nido.
 Laterra (1977). Isla N° 7, ciudad deportiva de Boca, Capital Federal, Buenos Aires, 02-11-1975, nido con 4 huevos.
 Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.
 Salvador (1981b). Córdoba. Nido.
 Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
 Daciuk (1983c). Nidifica en Malvinas.
 Aprile (1987). Buenos Aires. Nido.
 Salvador y Salvador (2012). Córdoba. Nido.
 Salvador (2012d). Se localizaron Otlej et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
 14 nidos en Villa María, dpto. Gral. San Martín, uno en Morrison, dpto. Unión y otro en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba. Los nidos son construidos en el suelo al abrigo de una mata, generalmente bien ocultos. Tiene forma circular, con un diámetro que varía entre los 16 y 19 cm y una profundidad de 3 a 4,5 cm, están forrados de gramíneas, tallos y en algunos casos plumas del mismo ave. Se localizaron 2 nidos en marzo, 7 en abril y 5 en mayo. Las posturas variaron de 3 a 6 huevos.
 Ojeda et al (2013). Parque Municipal Llao Llao, dpto. Bariloche, Río Negro, 30-09-2011, nido con 3 huevos, localizado por R. Sage.
 De la Peña (2013c). Galvez, dpto. San Jerónimo, Santa Fe, 29-04-1980, nido con un huevo, López, dpto. San Jerónimo, Santa Fe, 02-05-1980, un huevo, Wildermuth, dpto. San Martín, 05-05-1993, 3 huevos, Logroño, dpto. 9 de Julio, Santa Fe, 22-06-1999, 3 pichones. Medidas: diámetro total: de 16 a 22 cm.
 Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 4 huevos.
 Segura et al (2014b). Gral. Lavalle y Tandil, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 5 nidos.
 Shipton en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
 Girard en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone hasta 6 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 41,5 x 33,0	
Salvador (2012d): 40,6 a 46,1 x 32,2 a 37,2	X= 43,3 x 34,3 (N= 49)
Ojeda et al (2013): 42,0 a 43,2 x 33,3 a 34,8	X= 42,0 x 33,8 (N= 3)
De la Peña (2013c): 43,2 a 47 x 35,6 a 38,2	X= 45,1 x 36,9 (N= 2)

Pesos

Salvador (2012d): 27,0 a 33,5	X= 31,6 (N= 26)
Ojeda et al (2013): 23 a 24	X= 23,6 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 2,053 a 3,157	X= 2,605 (N= 2)

PICHONES

Descripción

Salvador (2012d). Los pichones nacen con los ojos cerrados, cubiertos, incluso los dedos y tarsos, de un suave plumón color crema, con leve tinte acanelado en el dorso. Pico pardo oscuro, interior de la boca rosa.
 Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 25-11-2002, nido bien oculto, al pie de una mata de *Festuca* sp., contenía 2 pichones.

Peso al nacer

Salvador (2012d): 20,5 a 26 X= 22,2 (N= 12)

Alimentación

Salvador (2012d). En el área central de Córdoba la alimentación de los pichones estuvo compuesta solo por pequeños roedores. En el nido de Pampa de Achala con dos pichones se hallaron restos de aves, como un adulto de Loica común (*Stunella loyca*) y una Cachirla (*Anthus* sp.)

Observaciones

Pereyra (1931a). Conhelo La Pampa, pichón en abril.

Motti (1941). Camino de Balcarce a Mar del Plata, Buenos Aires, nido con 2 pichones.

Generalidades

Salvador (2012d). Los huevos fueron puestos en días alternos. La incubación estuvo a cargo de la hembra. El período de incubación es de 27 a 28 días.

Depredadores

De adultos: Mamíferos: Visón (*Neovison vison*) en Patagonia, Girini et al. (2015)



Esperanza. Santa Fe. 29-06-2011



Esperanza. Santa Fe. 29-06-2011



Wildermuth. Santa Fe. 05-05-1993



San Eduardo. Santa Fe. 01-07-92



Puerto Varas. Chile. 25-10-2017 Foto: Cynthia Arenas

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Cara blanquecina con negro alrededor de los ojos. Ventral jaspeada. Alas y cola con barras canelas y pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asio flammeus suinda (Vieillot, 1817) en todo el país y *Asio flammeus sanfordi* Bang, 1919 en islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Diez subespecies. Amplia distribución cosmopolita. Norte América, Eurasia y pastizales de Sud América, hasta Tierra del Fuego. Islas del Caribe, Galápagos, Malvinas y muchas otras.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asio flammeus suinda (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Codesido et al. (2011); Darrieu y Camperi (2001a); Diéguez (1996); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 11-02-1976)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1981, 1983); Salvador y Salvador (2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Brandolín et al. (2007); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Serié y Smyth (1923)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Wetmore (1926)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Cirignoli et al. (2001)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1931, 1937); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

La Rioja

Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019); Darrieu (2014); Marone (1992a); Roig (1965)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a)

Neuquén

Citas: Christie et al. (1988); Contreras (1977b); Gorgoglione (2005); Navas (1978); Steullet y Deautier (1945); Matarasso (2007); Sympson en Veiga et al. (2005); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977, 1978c); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Ojeda et al. (2013); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta

Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i, 2019c); Ortiz et al. (2016)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz

Citas: Imberti (2005e)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Santa Fe

Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Menegaux (1925); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego

Citas: Blaauw (1912); Chebez y Gómez (1988); Clark (1984, 1986); Crawshaw (1907); Cunningham (1871); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Schalow (1898)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Asio flammeus sanfordi Bang, 1919

Islas Malvinas

Citas: Dacuik (1983c); Olrog (1948); Wace (1921); Woods (1988, 2006)

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES

URUTAÚES

FAMILIA: NYCTIBIIDAE

Aves de hábitos crepusculares y nocturnos. La cabeza y los ojos son grandes. La boca es ancha y el pico es chico y curvo.

Los tarsos son cortos. En la base de las patas presentan una almohadilla.

Durante el día están posados sobre troncos, adoptan una postura erguida, se confunden con el mismo. No se posan en el suelo.

Emiten voces muy sonoras, llamativas.

Anidan sobre los troncos, en postes, ramas, en montes. No ponen materiales.

El nido es expuesto y rudimentario.

La postura es de un huevo. Blanquecino con manchitas y pintas pardas y grises.

Los pichones nacen cubiertos de plumón y permanecen varios días en el nido.

Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.

Frecuentan bosques, montes y selvas.

URUTAÚ COLUDO *Nyctibius aethereus* (Wied-Neuwied, 1820)

Otro nombre: Urutaú grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 46-58 cm.

Peso: Cohn-Haft (1999): 280-447 g

Coloración. Iris amarillo.

Pardo rojizo. Las plumas están “marmoladas” de negro. Puntos negros en las cubiertas alares y en la parte inferior del pecho.

Cola larga, ligeramente graduada con las plumas centrales puntiagudas.

COMPORTAMIENTO

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un lastimero y resonante Uohúu que repite esporádicamente, con preferencia en noches de luna.

HÁBITAT

Selvas, selvas en galería. Ocasionalmente en áreas abiertas en orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Cohn-Haft (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pardo rojizo. Cola larga.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nyctibius aethereus aethereus (Wied-Neuwied, 1820) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Distribución separada, una localmente en Colombia, otra en Amazonia y la tercera en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctibius aethereus aethereus (Wied-Neuwied, 1820)

Misiones

Citas: Bertoni (1913, 1939); Chebez (1996a); Mazar Barnett y Pearman (2001); Straneck y Johnson (1990); Straneck (1990h)

URUTAÚ *Nyctibius griseus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Bacuí. Cacuí. Cacuy. Guaimí-cué. Guaimingué. La vieja. Pacuí. Pájaro la vieja. Turay. Urutauguá. Vieja. Vieja cagaú.

DESCRIPCIÓN

Largo: 33-38 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 180 g
Cohn-Haft (1999): 145-202 g

Coloración. Iris amarillo.

Coloración general grisácea manchada y estriada de negro, con canela en el pecho y en las cubiertas alares. Garganta blanquecina.

Alas pardas grisáceas con manchitas ocráceas en la lámina externa de las primarias. Borde anterior de las alas negro. Cola con bandas pardas y grises.

COMPORTAMIENTO

Se posa en el extremo de ramas verticales. Por su plumaje críptico es difícil de ver. Anda solitario.

Alimentación

Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Elateridae, Lamellicorneae, Carabidae) (Parandra). Hemípteros (Lepidópteros) (Colias).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una potente sucesión de 5 a 8 lastimeras notas: Juoooo..juo..juo..ju..ju..jur con una marcada modulación de frecuencia descendente.

HÁBITAT

Sabanas, montes, capueras, orillas de selvas, palmares.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

En postes, ramas, en montes.

Expuesto. Rudimentario.

Contino (1980). Pone un huevo en el extremo de una rama quebrada.

Saibene (1987). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 14-12-1985, nido con un huevo, en el extremo de un tronco seco a 2,50 m del suelo.

Daher y Spagarino (2011). Parque Nacional Río Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, en enero de 2011, nido en una rama a 5 m de altura. El 11 de febrero se observó un pichón.

De la Peña (2013c). Jacinto Arauz, Dpto. Las Colonias, Santa Fe, 05-12-2007, nido a 1,50 m del suelo en Poste de alambrado, que cruza un monte, con un huevo (nido localizado junto a Víctor Merlino y Francisco Junkers). 29-12-2010, San Jerónimo del Sauce, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido a 1,70 m del suelo, en una rama rota de Chañar, en el interior de un monte ralo y el 15-01-2013, Jacinto Arauz, nido en el mismo poste del primer nido, con un pichón. .

Germain (2013). Misiones. Nido.

Fernández (2014). Misiones. Nido.

Milittello (2015e). Misiones. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, nido en una rama seca de un Cedro (*Cedrella fissilis*) en un bajo inundado, huevo incubado por el adulto, octubre de 2013.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco. Nidos. Dos nidos en temporadas consecutivas en un eucalipto del área de acampe del Parque Nacional Chaco, Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, en una horqueta rota, se observaron la incubación y cria del pichón en ambos ciclos en octubre y noviembre de 1998 y 1999.

Uringa en De la Peña (2019b). Nido en Obera, Misiones, 16-11-2018, en una rama a 6-7 m de altura, un pichón.

Campo Ramón, Misiones, 16-11-2018, nido con un pichón en una rama quebrada a 5 m del suelo.

Quiroga y Llugdar (2019b). Nidos en Santiago del Estero.

Moresco (2019d). Parque Nacional Iguazú, Misiones, diciembre de 2018, nido con un huevo.

De la Peña, M. (2020). Villa Georgina, dpto. Las Colonias, 11-12-2020, nido con un huevo, en una rama quebrada de Eucalipto, a 4 metros del suelo.

Merlino, V. (*in litt.* 2020). 14 km. al NO de Elisa, dpto. San Cristóbal, 14-12-2020, nido con un huevo a 2,30 metros del suelo, en una rama quebrada de un Paraíso.

Huevo

Pone 1 huevo.

Ovoidal. Blanquecino con manchitas y pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas

Saibene (1987): 38,7 x 27,6

De la Peña (2013c): 39,0 x 27,5

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). 1 día. Todo el cuerpo cubierto de plumón blanquecino. Patas grisáceas. Pico negro. Ojos amarillentos.

14 días. Está con la misma postura del adulto. La cabeza hacia arriba, con el lomo adosado a la parte ventral del que lo cuidaba. Plumaje blanquecino, notándose el raquis oscuro de las plumas, lo que le daba un aspecto jaspeado. Se notan bastante largas las vainas de las plumas alares.

Los ojos cerrados o entreabiertos.

20 días. Se notan las plumas de cobertura del ala, oscuras. De noche los ojos están abiertos.

25 días. Tiene las cubiertas alares oscuras. La cola de 3,4-4 cm. Dorsalmente más gris. Mástiles oscuros.

Plumas de las cejas ligeramente elevadas. Primarias oscuras.

El adulto más vivaracho. Ubicado al lado. Entreabre los ojos.

26 días. El pichón queda solo.

Todas las noches a la misma hora (20,40) cuando comenzaba a oscurecer un adulto alimentaba al pichón. El pichón aletea cuando ve al adulto.

30 días. Mueve la cabeza levemente al aproximarse una persona. Ojos entreabiertos. Amarillos.

Plumaje como adulto pero más claro. Cola de unos 7 cm.

39 días. Color claro. Cola de 10 cm. Dos líneas oscuras por debajo del pico. Algunas manchas en el pecho.

41 días. Deja el nido.

Observaciones

Contino (1980). Se encuentran pichones crecidos en el Chaco salteño en el mes de febrero.

Generalidades

Saibene (1987). La permanencia del pichón en el nido es de 52 días.

De la Peña (2013c). El poste tenía la superficie irregular, con un hueco de 1 a 2 cm. de diámetro x 5 cm. de largo y 5 cm. de profundidad.

El huevo estaba ubicado en forma transversal en la parte más angosta del hueco. Por lo tanto una parte quedaba sin tocar el poste.

El adulto que incubaba no cubría totalmente al huevo.

Se puede parar una persona al lado, a pocos centímetros sin que se inmuten, en el nido de J. Arauz, en el otro era más arisco y volaba al acercase una persona.



J. Arauz. Santa Fe. 07-01-2008



J. Arauz. Santa Fe. 15-01-2013



J. Arauz. Santa Fe. 02-01-2008



J. Arauz. Santa Fe. 02-01-2008. 20 días de edad



J. Arauz. Santa Fe. 12-12-2007



J. Arauz. Santa Fe. 17-12-2007. 4 días de edad



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 01-02-2011
Ubicación del nido



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 20-01-2011. 14 día de edad



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010



J. Arauz. Santa Fe. 15-01-2013



J. Arauz. Santa Fe. 07-01-2008. 25 días de edad



J. Arauz. Santa Fe. 12-12-2007



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 20-01-2011.
Ambiente



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pardo grisáceo con manchas y estrías negras en el pecho. Negro en el borde de las alas. Alas y cola largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nyctibius griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789) desde el norte del país hasta San Luis, centro de Santa Fe y norte de Entre Ríos.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Desde el sur de Centro América, norte y centro de Sudamérica llegando hasta Argentina. Comprende: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctibius griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789)

Buenos Aires

Citas: Pereyra (1932a, 1938b)

Catamarca

Citas: Carma (2009); Straneck en Nores y Yzurieta (1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Salvador et al. (2017); Ordano y Miatello (2001); Robledo en Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chatellenaz (2004); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 31-10-1991)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Chebez et al. (1990); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Stranck en Nore y Yzurieta (1981)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017);

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Moresco (2019d); Saibene (1987); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Santo Pipó, dpto. San Ignacio, 10-10-1981)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011b, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Ménégau (1925); Nore et al. (1991); Quiroga y Llugdar (2019b); Serié (1935)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2018b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS**FAMILIA: CAPRIMULGIDAE**

Algunas especies de esta familia son aves de hábitos crepusculares y otras de nocturnos. Tienen la boca grande con vibras a los lados. El pico es pequeño. Los ojos son grandes y reflejan la luz cuando son iluminados de noche. El cuello y las patas son cortos.

Las alas son largas. Algunas especies tienen plumas muy largas en la cola.

Varias especies se identifican por el canto.

No construyen nido. Depositán los huevos en el suelo o sobre ramas.

Ponen 1 ó 2 huevos.

Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.

Frecuentan praderas, estepas, serranías, pastizales, áreas rurales, montes, bosques, selvas, orillas de bañados.

Subfamilia: Chordelinae

ÑACUNDÁ *Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817)

Otros Nombres: Bocón. Chotacabras. Dormilón de vientre blanco. Dormilón grande. Duerme-duerme. Gallina ciega. Pájaro ateí. Perezoso. Tarpuí. Tucutucu.

DESCRIPCIÓN

Largo: 27,5-32 cm.

Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 160,0 g

Di Giacomo (2005h): N=1 (M) 185,0 g; N=1 (H) 160,0 g

Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 188,0 g (Rango: 182 a 193); N= 3 (H) X= 173,3 g (Rango: 169 a 178)

Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 173 g

Coloración. Pico pardo. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.

Parte dorsal parda profusamente punteada y vermiculada de ocráceo y canela y manchas negras. Garganta blanca; por debajo semicollar canela. Pecho pardo moteado de blanquecino. Resto de la parte ventral blanco.

Alas negras con franja en diagonal blanca. Cola como el dorso, con bandas oscuras en las plumas centrales; las restantes con banda subterminal negra y ancha punta blanca.

La hembra carece de blanco en la punta de la cola.

COMPORTAMIENTO

De hábitos crepusculares y nocturnos. Puede andar solitario, en parejas o en pequeñas bandadas. Vuela sobre poblaciones, en grupos dispersos. Se posa en el suelo.

Salvador y Bodrati (2017). El Ñacundá es activo principalmente al crepúsculo y de noche, pero tiene mayor actividad diurna que los otros caprimúlgidos que habitan la Argentina. Frecuenta pastizales, sabanas, parquizados, campos de pastoreo, arenales, palmares y áreas urbanas. Pasa el día en campos de pasto muy corto, asociado al ganado doméstico. Aprovecha el alumbrado artificial en áreas urbanas y rurales para capturar insectos. Es migratorio pero sus movimientos son complejos y se desconoce cómo se comportan sus poblaciones, posiblemente distintas dentro del país y la región.

Alimentación

Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Scarabaeidae) (*Chalipus gagates*). Hemípteros. Lepidópteros.

Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae). Himenópteros (*Nezara viridula*). Orthópteros.

Semillas.

Beltzer et al. (1988). **Insectos:** Coleópteros (Cerambycidae, *Cyllene* sp.) (Elateridae, Dystiscidae, Lampiridae, *Photinus* sp.) (Carabidae, *Diloboderus abderus*, *Lygirus* sp.), Dermáptera (Forficulidae, *Doru lineare*), Hemípteros (Pentatomidae, *Nezara viridula*, *Piezodorus guildinii*) (Belostomidae, *Belostoma micantulum*). Homópteros (Cicadidae, *Quesada gigas*, *Proarna rufo*). Lepidoptera (Noctuidae, *Faronta albilinea*). Odonata (Anisoptera). Orthoptera (Tettigonidae, *Gramadera clara*) (Acrididae, *Dichroplus conspersus*) (Grillidae, *Grillus* sp.).

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Elateridae, Scarabaeidae). Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera. Lepidoptera (polillas).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un suave y gutural Jurr...jourrrr...jourrrr.

HÁBITAT

Sabanas, bosques abiertos, praderas, áreas rurales, poblaciones.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



En el suelo, entre pastos.

Oculto. Rudimentario. Ligera depresión con pastos en la base.

Lillo (IML). Tucumán, 14 nov. 1922, 2 huevos.

Barrows (1884). Entre Ríos, nidos con 2 huevos en noviembre.

Pereyra (1932a). Nidos desde noviembre a febrero. Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, nidos con huevos y con pichones.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica desde noviembre a febrero.

Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.

Ilincheta, A (2011). Reserva Natural del Pilar, pdo. Pilar, Buenos Aires, 01-11-2011, nido con un huevo y un pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

De la Peña (2013c). Villa San José, dpto. Colón, Entre Ríos, 25-10-1976, 2 huevos; Progreso, Dpto.

Las Colonias, Santa Fe, 28-10-1976, 2 huevos. Los nidos miden: diámetro total, de 16 a 22 cm.

Narosky e Yzurieta en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.

Puente, G. (2016). Gualaguaychú, dpto. Gualaguaychú, Entre Ríos, 07-11-2016, nido don pichones. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Passafaro, S. (2017). Ceibas, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos, 08-01-2017, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 22/05/2019.

Salvador y Bodrati (2017). Estancia Laguna Cora, dpto. 1° de Mayo, Chaco, 09-12-1999, nido con 2 huevos, localizado por A. Bodrati, Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 25-11-1997, 2 pichones, 17-12-2003, 2 huevos, 08-02-2008, 2 huevos, 11-11-2008, 2 huevos, Loreto, dpto. Loreto, Santiago del Estero, 23-10-2007, 2 huevos, 22-11-2009, 2 pichones, localizados por S. Salvador.

Huevos

Pone 2 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color ocre rosado, profusamente manchados e castaño claro. Cáscara brillante.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 35,0 a 35,5 x 25 a 25,5

Pereyra (1938b): 34,0 x 26,0

De la Peña (2013c): 35,4 a 38,4 x 25,7 a 26,8

X= 36,7 x 26 (N= 4)

Salvador y Bodrati (2017): 34,7 a 38,2 x 25,2 a 26,7

(N= 10)

Peso

De la Peña (2013c): cáscaras 0,881 a 1,152

X= 1,045 (N= 4)

Salvador y Bodrati (2017): 12,9 a 15,1

X= 13,8 (N= 6)

PICHONES

Descripción

Pereyra (1938b). Los pichones nacen revestidos de un plumón crema oscuro.

Observaciones

Salvador y Bodrati (2017). Período de incubación 18 días.

La incubación y protección de los pichones estuvo a cargo de la hembra.

Más información:
Pereyra (1932a). Salvador y Bodrati (2017). Shogren (2011)

	
Progreso. Santa Fe. 28-10-1976	Campo Andino. Santa Fe. 11-12-2007
	
Esperanza. Santa Fe. 13-11-2011. Juvenil	

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Ventral blanca, excepto el pecho. Franja alar blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chordeiles nacunda nacunda (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Santa Cruz.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extenso Rango: de distribución por Sud América (excepto por el oeste), hasta Argentina. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles nacunda nacunda (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932a, 1938b); Roesler (2001a); Salvador y Bodrati (2017); Zotta (1932)

Catamarca:

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2017)

Chubut

Citas: Bodrati (2005c)

Córdoba

Citas: Frenzel (1891); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador y Bodrati (2017); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (1988, 2006); De la Peña (2011f, 2013c); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Salvador (1988)

La Pampa

Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (2004)

Mendoza

Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980a); Reed (1916); Roig (1965)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005)

Neuquén

Citas: Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

Santa Cruz

Citas: Imberti (2001a)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Pagano y Salvador (2017); Salvador y Bodrati (2017)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

AÑAPERO MENUDO *Chordeiles pusillus* Gould, 1861

Otros nombres: Añapero chico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15-19 cm.

Peso: Krauczuk (2000): N= 1 (H) 33,4 g

Coloración. Pico neguzco. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Dorso pardo grisáceo vermiculado de negruzco y punteado de ocráceo. Garganta blanca.

Pecho pardo grisáceo. Abdomen vermiculado de blanco y pardo oscuro. Subcaudales blancas.

Alas pardas con franja blanca en las cuatro primarias externas. Las secundarias con puntas ocráceas.

Cubiertas alares pardas con puntos ocráceos. Cola parda oscura, las plumas centrales con franja grisácea y las otras ocráceas. Todas las plumas menos las centrales y los pares más externos, con punta blanca.

La hembra tiene la cola moteada de pardo.

HÁBITAT

Orillas de selvas, desmontes, sabanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nido en el suelo.

Krauczuk (2000). Campo San Juan, Santa Ana, dpto. Candelaria, Misiones, 23-10-1995, nido en la parte alta de una loma, al borde de una saliente rocosa, a 100 m de la selva costera del río Paraná. Tenía un huevo.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019), nido con un huevo incubado, sobre placas de basalto achatado en Campo Prate, Barra Concepción, dpto. Concepción de la Sierra el 15 de noviembre de 2003. (Krauczuk y Bodrati obs. pers, Krauczuk 2013).

Huevos

Pone 1 huevo.

Color crema, con pintas marrones de distintos tamaños y algunas pintas gris oliváceas.



Medidas

Krauczuk (2000): 27,0 x 20,0

Peso

Krauczuk (2000): 6,0

Más información:

Krauczuk (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Garganta blanca. Franja blanca en las alas, visible cuando vuela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Posible raza *Chordeiles pusillus pusillus* Gould, 1861 en Misiones, Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Dos poblaciones bien separadas, una en el norte de Sud América, en Colombia, Venezuela, Guayanas y norte de Brasil. La otra población se localiza en el centro de Brasil, llegando al este de Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles pusillus pusillus Gould, 1861

Corrientes

Citas: Krauczuk (2013); Pagano et al. (2017b)

Misiones

Citas: Bodrati (2005d); Krauczuk (1996, 2000, 2013)

AÑAPERO CHICO *Chordeiles acutipennis* (Hermann, 1783)

Otros nombres: Añapero de alas finas. Añapero ala corta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19-23 cm

Peso: Cleere (1999): (M) 34-62; (H) 34-64 g

Coloración. Pico pardo. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.

Parecido al Añapero boreal pero de menor tamaño. Ventralmente ocráceo barrado de pardo grisáceo. Banda blanca en la parte media de las primarias.

HÁBITAT

Sabanas, campos, desiertos, áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Cleere (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chordeiles acutipennis acutipennis (Hermann, 1783) en Chaco, Formosa, Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Desde el sur de Estados Unidos, América Central y Sudamérica hasta Perú, norte de Chile y Argentina.

Chaco

Citas: Bodrati y Areta (2010); Moschione y Bishels (2004)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010)

Salta

Citas: Bodrati y Areta (2010). Moschione et al. (2013)

AÑAPERO BOREAL *Chordeiles minor* (J. R. Forster, 1771)

Otro nombre: Añapero.

DESCRIPCIÓN

Largo: 22-25 cm.

Peso: Contreras (1983a) N= 1 (M) X= 67,5 g; N= 1 (H) 62,6 g

Salvador (2014a): N= 1 (M) 59,8 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Parte dorsal parda oscura estriada, manchada y punteada de canela y blanquecino. Garganta blanca. Pecho pardo oscuro moteado de canela, resto de la parte ventral blanquecino barrado de pardo oscuro.

Alas pardas con mancha blanca en mitad de las primarias. Cola parda con finas bandas blanquecinas.

La hembra tiene la garganta y bandas de la cola ocráceas.

COMPORTAMIENTO

De hábitos diurnos y crepusculares. Forma bandadas. Vuela relativamente alto y errático, seguido de cortos planeos. Se posa en las ramas de los árboles.

Alimentación

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera. Lepidoptera (polillas).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). La voz es áspera, de una sola sílaba, emitida en vuelo, Biin o Bein.

HÁBITAT

Montes, áreas rurales, poblaciones, praderas, sabanas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Garganta y mancha ala blancas. Dorsal pardo, manchado de canela y blanquecino. Ventral barrada. Cola furcada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chordeiles minor minor (J. R. Forster, 1771) migratorio de Norteamérica llega hasta La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y *Chordeiles minor chapmani* Coues, 1888 llega hasta Santiago del Estero y Entre Ríos.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Nueve subespecies. Nidifica en Canadá y Estados Unidos. En invierno boreal migra a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles minor minor (J. R. Forster, 1771)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1987, 1994); Hartert y Venturi (1909); Maugeri (2002a); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2017a); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco

Citas: Bodrati (2005); Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Ferrari, C. en Salvador et al. (2017); Miatelo et al. (1991); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983a); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos

Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa

Citas: De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja

Citas: Nores y Salvador (1985)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993)

San Juan

Citas: Lucero (2019a)

Santa Fe

Citas: De la Peña (1988c, 2011f); López-Lanús et al. (2013a); Manassero et al. (2006); Pautasso (2002)

Santiago del Estero

Citas: Oberholser en Steullet y Deautier (1935-1946)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Chordeiles minor chapmani Coues, 1888

Corrientes

Citas: Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Navas y Bo (1988a)

Santiago del Estero

Citas: Oberholser en Steullet y Deautier (1935-1946)

AÑAPERO CASTAÑO *Lurocalis semitorquatus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Atajacaminos castaño. Dormilón castaño. Dormilón de abdomen castaño. Dormilón de vientre castaño.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25 (19-29) cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 82-89 g; (H) 79-81 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.

Dorso pardo oscuro con pintas castañas en la cabeza, el resto moteado de blanquecino y castaño. Garganta blanca.

Pecho pardo oscuro manchado de castaño y ocre, abdomen barrado de pardo oscuro.

Alas casi negras con pequeños anillos y lunares castaños. Escapulares blancas estriadas y manchadas de pardo oscuro. Cola parda oscura con barras grises y ocráceas.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares. Se posa en las ramas de los árboles. Sobrevuela poblaciones. Canta sobrevolando la copa de los árboles selváticos y zonas abiertas cercanas a las selvas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Su voz en un silbido Juit.jouit.. emitido esporádicamente.

HÁBITAT

Sabanas, pastizales, bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

En ramas horizontales. Altos.

Straneck et al. (1987a). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 06-12-1982, nido en una rama horizontal de una Mora blanca (*Alchornea iricurana*) a 10 m del suelo. El nido estaba en una rajadura cicatrizada en la corteza, de 20 cm de largo, 5 cm de ancho y 1 cm de profundidad. Tenía un huevo.

Straneck et al. (1987a). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, Rumboll localizó en enero de 1984 un nido en una rama horizontal a 10 m del suelo y otro en Libertad, 30 km al sur del anterior a 18 m de altura. En ambos se sospecha que estaban con pichones.

Bodrati (*in litt.* 2019), un pichón en el nido, incubado durante el día por un adulto, sobre una bifurcación de una Mora (*Alchornea triplinervia*), en Parque Provincial Cruce Caballero, dpto San Pedro, Misiones, 29 noviembre de 2011.

Huevo

Pone 1 huevo.

Blanco opaco con manchas pardas y grises, más intensas en la zona ecuatorial y en uno de los polos.

Medidas

Straneck et al. (1987a): 37,0 x 25,0

Peso

Straneck et al. (1987a): 10,3

Pichones

Observaciones

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con un pichón.

Más información:

Arizmendi et al. (2012)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración oscura. Garganta blanca. Alas puntiagudas y largas que sobresalen de la cola estando plegadas, sin banda blanca. Cola corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Lurocalis semitorquatus nattereri (Temminck, 1822) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Se lo encuentra desde el sur de Méjico al norte de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Por lo menos las poblaciones más sureñas de *L. s. nattereri* se piensa que son migratorias hacia el norte, hasta Venezuela.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lurocalis semitorquatus nattereri (Temminck, 1822)

Buenos Aires

Citas: Coconier (2005); Jaramillo (2000)

Chaco

Citas: Bodrati y Klavins (2004a)

Corrientes

Citas: Contreras (1981b)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), observado reiteradamente en Ituzanigo, dpto homónimo, Corrientes, en enero de 2016, 2017, 2018, noviembre de 2018.

Bodrati (*in litt.* 2019), un individuo en vuelo sobre sectores de campo próximos a las selvas costeras del río Uruguay, en la localidad de Garruchos, dpto. Santo Tomé, Corrientes.

Entre Ríos

Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); López-Lanús y Mencia (2017)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck et al. (1987a); Straneck (1990g)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Pagano et al. (2016)

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA *Systellura longirostris* (Bonaparte, 1825)

Otros nombres: Atajacaminos común. Bocón nocturno bigotudo. Dormilón común. Golondrina nocturna. Nictibio. Nocturno de collar. Pájaro bocón de la noche. Pájaro murciélago. Pastilla. Tarpuí. Zoncito.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20-27 cm.

Peso: Camperi (1992a): N= 1 (M) 58,9 g; N= 3 (H) X= 60,8 g (Rango: 55,6 a 69,2)

Salvador (2014a): N= 2 (M) 52,6 y 53,0 g; N= 2 (H) 57,3 y 58,2 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 59 g

Pagano y Salvador (2017): N=2 (M) 59,8 y 53 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.

Dorso negro moteado de gris y canela. Semicollar nual canela. Garganta parda oscura y ocrácea, finamente barrada de blanco ocráceo. En la parte superior del pecho banda blanca y canela. Abdomen ocráceo barrado de pardo oscuro.

Alas negras con mancha en diagonal blanca. Cubiertas moteadas de canela. Cola con las plumas centrales como el dorso, restantes negras con mancha basal y mitad terminal blanca, con borde canela puntillado de pardo.

Ventralmente es blanca con ancha banda negra.

La hembra tiene banda alar fina, canela. Collar del pecho ocráceo. La cola ventralmente es barrada y no tiene blanco.

COMPORTAMIENTO

De hábitos crepusculares y nocturnos. Se posa en el suelo o en ramas bajas.

Alimentación

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Carabidae, Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Homoptera (Cercopidae, Membracidae). Orthoptera (Gryllidae).

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo y áspero silbido con modulación de amplitud ascendente y descendente: Fiiouhiii repetido frecuentemente.

HÁBITAT

Estepas, orillas de selvas, montes, sabanas, serranías, áreas rurales, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro. Chubut, Santa Cruz.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

En el suelo.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

Durnford (1877a). Chubut. Nido.

Pereyra (1932a). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, nidos con huevos.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, ponen a principios de noviembre, en el suelo limpio debajo de caldenes, ponen 2 huevos.

Zapata (1969). Santa Cruz. Nido.

Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.

Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.

De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Nido.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.

Casañas (2007). Córdoba. Nido.

De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 25-10-1970, 2 pichones, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 02-12-1977, un huevo.

Salvador y Bodrati (2013b). Córdoba. Nido.

Schaaf et al. (2015a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, entre octubre de 2012 a enero de 2014, 14 nidos.

Bodrati en Salvador (2016a). San Juan. Nido.

Nores, M.y D. Yzurieta en De la Peña (2016c). Hallaron un nido en el Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén, con 2 pichones, el 25-01-1980.

Salvador en De la Peña (2016c). Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 24-11-1995, un nido en una pequeña depresión, con 2 huevos incubados, Caleta Valdés, dpto. Biedma, Península Valdés, Chubut, 27-11-1995, un nido en una pequeña depresión bajo un arbusto, con 2 huevos incubados.
 Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron dos nidos en noviembre y diciembre, uno entre matas de *Cynodon* sp. en un bosque ralo y el otro sobre hojas secas en una plantación de eucaliptos, ponen 2 huevos.
 Salvador en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
 Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos.
 Ovoidales. De color ocre con pintitas grises y pardas claras.



Medidas

Pereyra (1937b): 29,0 x 21,5	
De la Peña (2013c): 27,0 x 19,5	
Schaaf et al. (2015a):	X= 25,6 x 19,8
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 29,1 a 29,9 x 20,2 a 21,8	X= 29,57 x 21,12 (N= 4)
Salvador en De la Peña (2016c): 28,8 a 29,8 x 20,3 a 22,1	X= 28,0 x 21,3 (N= 4)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 6,8 a 7,3	X= 7,1 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,351	(N= 1)
Schaaf et al. (2015a):	X= 4,9

Depredadores

De adultos: *Bubo magellanicus* en Neuquén, Donázar et al. (1997), en Neuquén y Río Negro, Teta et al. (2001), *Falco peregrinus* en Patagonia, Ellis et al. (2002)

Más información:
 Schaaf et al. (2015a)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Alas negras con banda blanca y las cubiertas con puntos canelas. Cola negra con mancha blanca en el macho. Diferenciar a la hembra de las hembras del *Atajacaminos colorado*, del *Curiango* y del *Atajacaminos chico*.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Systellura longirostris atripunctatus (Chapman, 1923) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy y Salta; *Systellura longirostris bifasciatus* Gould, 1837 entre los 1000 y los 2000 m de altura desde Salta y Tucumán, por el oeste hasta Neuquén, Río Negro y Chubut; *Systellura longirostris longirostris* Bonaparte, 1825 en las provincias del noreste, y *Systellura longirostris patagonicus* Olrog, 1962 desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa hasta Santa Cruz. En invierno migra al norte. Accidental en las Islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Por todo el oeste de Sud América, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta Santa Cruz. Además este de Brasil y Uruguay. En invierno migran poblaciones sureñas a provincias del norte de Argentina, Paraguay y este de Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Systellura longirostris atripunctatus (Chapman, 1923)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005)

Systellura longirostris bifasciatus Gould, 1837

Catamarca

Citas: Alabarce (1987a); Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), individuos observados en Parque Nacional Chaco, dpto Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, en mayo y julio de 1997, agosto de 1998 y junio de 2003.

Chubut

Citas: Camperi (1998); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Córdoba

Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Copina, dpto. Punilla, 25-11-1990)

Formosa

Citas: Conteras (1987b); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h) ¿?

Jujuy

Citas: Colina (2015)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1927e, 1937); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza

Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Burmeister (1861); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Marone (1992); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Bianchini (2017a); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Donázar et al. (1997); Funes y Sheridan en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1978); Teta et al. (2001); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Teta et al. (2001); Trejo y Seijas (2003)

Salta

Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Cajal (1998); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz et al. (2016)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2015a); Coria et al. (2017); Pagano y Salvador (2017)

Tucumán

Citas: Antelo (1999); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2015a); Esteban (1953); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1993)

¿?. En las poblaciones de Chaco y Formosa no están bien determinadas las subespecies presentes.

Systellura longirostris longirostris Bonaparte, 1825

Corrientes

Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010) (*)

Santa Fe

Citas: Giai (1950)

Systellura longirostris patagonicus Olrog, 1962

Buenos Aires

Citas: Carrizo et al. (2001); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Zapata (1998)

Córdoba

Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Schaaf et al. (2015a); Stempelmann y Schulz (1890); Zotta (1944a)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

¿?. En las poblaciones de Chaco y Formosa no están bien determinadas las subespecies presentes.

Corrientes

Citas: Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Contreras (1987c)

¿?. En las poblaciones de Chaco y Formosa no están bien determinadas las subespecies presentes.

La Pampa

Citas: Bruno et al. (2007); Pereyra (1923a, 1927e)

Neuquén

Citas: Bianchini (2017a); Christie et al. (2004); Contreras (1977b); Couve y Vidal (2003); Olrog (1979b)

San Luis

Citas: Nellar Romanella (1993)

Río Negro

Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Olrog (1962); Zapata (1969)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2015); Ménégau (1925); Nores et al. (1991)

Islas Malvinas

Citas: Woods (2006)

CURIANGO *Nyctidromus albicollis* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Acuraná. Atajacaminos de collar blanco. Cuieyo. Curiau. Dormilón de collar blanco. Ibiyáu. Pauraque.

DESCRIPCIÓN

Largo: 22-30 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 44-87 g; (H) 43-90 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grises. Iris pardo.

Cabeza puntillada de gris con notables manchas negras, principalmente en la corona.. Lados de la cara y cuello castaños moteados de pardo oscuro. Dorso gris ocráceo vermiculado de pardo.

Escapulares grisáceas con tono ocráceo y manchas pardas oscuras ribeteadas de canela y algunas plumas con tono castaño. En la parte superior del pecho semicollar blanco, resto de la zona ventral ocráceo vermiculado de pardo oscuro.

Alas pardas oscuras con mancha en diagonal blanca. Plumas externas de la cola negras con banda interna blanca, las siguientes enteramente blancas con punta parda y las centrales como el dorso. Ventralmente es blanca y parda. La hembra ventralmente es ocrácea barrada de pardo claro. Mancha ocrácea canela en el ala. Cola como el dorso, ventralmente es barrada.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares y nocturnos. Anda solitario o en pareja.
Se posa en el suelo. Entre la vegetación o en zonas abiertas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto está formado por 4 sílabas emitidas rápidamente en modulación ascendente de frecuencia y luego marcadamente descendente hacia el final. Es un silbido: Juhihahou.. repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Sabanas, orillas de selvas, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chaco, Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

En el suelo.

Expuesto. Rudimentario. Puede colocar hojas en la base.

Bodrati (2004b). Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, dos nidos: 30-10-1997, 2 huevos, el 9 de noviembre tenía 2 pichones y el 24-11-1998, el otro tenía 2 huevos.

Uranga en De la Peña (2013c). Capioví, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 15-10-2001, nido en una plantación de *Eucalyptus*. Con 2 huevos.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido. Un nido predado por *Cerdocyon thous* en el Parque Provincial Cruce Caballero, noviembre de 2009 (Cockle et al. 2016).

Krauczuk (2013). Misiones. Nido.

Wioneczak, M. J. (2014). Aristóbulo del Valle, dpto. Cainguás, Misiones, 28-10-2014, nido con un huevo.

EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Wioneczak, M. J. (2014). Posadas, dpto. Capital, Misiones, 09-09-2014, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Cusano, E. (2017). Reserva Privada Surucú, dpto. Gral. M. Belgrano, Misiones, 31-10-2017, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Longo, E. (2018). Reserva Privada Surucú, dpto. Gral. M. Belgrano, Misiones, 10-09-2018, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Uranga, M. (2018). Saltos del Moconá, dpto. San Pedro, Misiones, 30-10-2018, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Capovilla, P. (2018). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 22-10-2018, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Moresco (2018a). Parque Nacional Iguazú, Misiones. 16-11-2018, nido con 2 huevos. El 19 tenía 2 pichones.

Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional Iguazú, dpto Iguazú, Misiones, un nido con dos pichones cubiertos por la hembra, el 30 de noviembre de 2007, en el borde del camino que conduce a la seccional Apepú.

Huevos

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color crema rosado con manchas grises y pardas rojizas. Cáscara brillante.

Medidas

Bodrati (2004b). 32,2 a 32,6 x 22,1 a 22,5

X= 32,4 x 22,3 (N= 4)



Capioví. Misiones. 15-10-2001

PICHONES

Descripción

Bodrati (2004b). Los pichones están cubiertos de un profuso plumón de color salmón oscuro con la punta negra. Presentan manchas parduscas poco conspicuas, concentradas en la parte superior de la cabeza y el lomo.

Observaciones

Allende, M. (2011). Posadas, Misiones, 25-11-2010, pichón

Depredadores

De adulto: *Caiman latirostris* (Bodrati obs. pers), en Corrientes.

De pichones: Zorro de monte (*Cerdocyon thous*) en Misiones, Cockle et al. (2016), Coatí (*Nasua nasua*), Lagarto overo (*Salvator merinae*) en Misiones, Bodrati (*in litt.* 2019)

De pichones: Hormiga tigre (*Dinoponera australis*). Moresco (2018a), Tatú negro (*Dasypus novemcinctus*) en Corrientes, (N. Fariña y O. Villalba, obs. pers.), Bodrati (*in litt.* 2019)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Notables manchas negras en la corona. Manchas pardas oscuras ribeteadas de canela en las escapulares. Cola relativamente larga, con las plumas externas blancas, en el macho. Notable banda alar blanca, visible en vuelo.

Diferenciar a la hembra de las hembras del Atajacaminos ñañarca y del Atajacaminos colorado. Ver parte ventral de las colas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nyctidromus albicollis derbyanus Gould, 1838 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y noroeste de Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Su amplio Rango: de distribución abarca desde Texas, Estados Unidos hacia el sur hasta Argentina. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa

Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctidromus albicollis derbyanus Gould, 1838

Chaco

Citas: Bodrati (2004b)

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Marateo et al. (2009)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), dos individuos oídos en montes abiertos al sur del río Mocoretá, Entre Ríos, el 20 de octubre de 2011.

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López-Lanús y Mencia (2017); Nores (1992), Nores y Yzurieta (1986)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Cockle et al. (2016); Contreras et al. (1994b); De la Peña (2013c); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009, 2013); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990e)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: Giai (1950); Manassero y Luna (2009b); Pautasso (2002a)

ATAJACAMINOS ALAS NEGRAS *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838)

Otros nombres: Atajacaminos de los pantanos. Atajacaminos pantanero. Dormilón de los pantanos. Dormiloncito. Tapita. Zoncito.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18-20 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 43,5 g

Coloración. Pico pardo oscuro. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Coloración general grisácea manchada de negro. Cuello rojizo. Ventral parda ocrácea.

Cobijas y secundarias (éstas son muy cortas) pardas grisáceas manchadas de negro. Primarias curvadas, negras con punta blanca. Cola corta parda ocrácea barrada de negruzco. Punta blanquecina.

Hembra similar pero con manchas rojizas en el ala y sin punta blanca. Las remeras secundarias son de largo normal.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Pereyra (1939). Coleópteros. Hormigas. Lepidópteros.

HÁBITAT

Orillas de bañados, esteros y lagunas. Sabanas, palmares, pastizales húmedos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

En el suelo. Expuesto. Rudimentario.

Hartert y Venturi (1909). Nido en Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe.

Pereyra (1950a). Colonia Dora, dpto. Avellaneda, Santiago del Estero, mediados de noviembre, un huevo colectado por J. Abalos.

Krauczuk (2013). Corrientes. Nido.

Bodrati et al. (2019b). Dos nidos encontrados en la Reserva Natural Rincón Santa María, Ituzaingó, Corrientes, 20 de octubre de 2018, con 1 huevo y 2 de noviembre de 2018 con 2 huevos.

Huevo

Pone 2 huevos, de color cremoso claro, cubierto con manchas marrón-rojizas y grises en toda la superficie.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 26,5 a 29,8 x 20,6 a 21,4

Bodrati et al. (2019b): 25,8 a 27,3 x 20,8 a 21,9 X= 26,5 x 21,3 (N= 3)

Peso

Bodrati et al. (2019b): 6,2 a 7,2 X= 6,5 (N= 3)

Observaciones

Krauczuk (2013). Rincón Ombú, dpto. Ituzaingó, Corrientes, volantón en el nido.

Fariña et al. (2018). Vocalizaciones, sonidos mecánicos y despliegues del Atajacaminos ala negra (*Eleothreptus anomalus*) en Argentina.

Depredadores

De adultos: *Athene cunicularia* en Corrientes, Fariña et al. (2014)

Más información

Bodrati et al. (2019b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño tamaño. Cola corta. Grisáceo manchado de negro. Primarias negras. Punta de las alas blancas, visible en vuelo, en el macho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Eleothreptus anomalus (Gould, 1838) en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución comprende el sureste de Brasil, este de Paraguay norte de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Durnford (1878); Holmberg (1939); Isacch et al. (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Short (1975)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Olrog (1979); Short (1975); Lynch Arribalzaga (1920)

Córdoba

Citas: Miatello et al. (1991, 1994); Straneck y Viñas (1994)

Corrientes

Citas: Bodrati et al. (2019b); Chatellenaz et al. (2010); Chebez (1996a); Darrieu y Martínez (1984); Fariña et al. (2014, 2018); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b)

Entre Ríos

Citas: Nores y Yzurieta (1981); Pearman y Abadie (1995a)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez (2009); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); López Lanús (1997); Moschione y San Cristóbal en Collar et al (1992); Paerman y Casañas en Di Giacomo (2005h); Olrog (1979)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones

Citas: Bodrati (2005d); Chebez (1996a); Fariña et al. (2018)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); Luna et al. (2011); Olrog (1979); Pereyra (1939); Short (1975)

Santiago del Estero

Citas: Nores et al. (1991); Nores y Yzurieta (1981); Pereyra (1950a); Straneck y Viñas (1994)

ATAJACAMINOS LIRA *Uropsalis lyra* (Bonaparte, 1850)

Otro nombre: Dormilón lira.

DESCRIPCIÓN

Largo: 80 cm. (macho), 25 cm. (hembra).

Peso: Cleere (1999): (M) 68,5 g, (H) 74-79 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Cabeza gris moteada de negro. Collar rojizo sobre el cuello. Dorsal rojiza manchado de negro. Ventral ocrácea moteada de negro.

Alas negras con barras rojizas. Cola rojiza con barras negras; las plumas externas son muy largas (66 cm.) y negras, y disminuye al ancho de ese color hasta llegar a la punta blanca.

La hembra tiene corona negra con puntos rojizos. Primarias negras con manchas rojizas en las barbas externas.

Cola negruzca con barras rojas. No tiene plumas alargadas.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos nocturnos. Se posa en ramas bajas.

HÁBITAT

Orillas de áreas selváticas de montañas (nuboselva).

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Colina et al. (2015); Greeny y Wetherwax (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración oscura. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola. Collar rojizo sobre el cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Uropsalis lyra argentina Olrog, 1975 en Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Por el oeste de Sud América en la cordillera hasta 3000 metros, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Uropsalis lyra argentina Olrog, 1975

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez (2009); Colina et al. (2015); Mazar Barnett et al. (1998c); Olrog (1975a)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

ATAJACAMINOS CHICO *Setopagis parvula* Gould, 1837

Otro nombre: Cuchigüigüi. Dormilón. Dormilón chico. Dormiloncito. Golondrina nocturna. Ñañaarca. Tarpui chico. Tres-cuatro-cueros.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19-21 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 1 (H) 34,0 g

Contreras et al. (1994b): N=2 (M) 31,5 y 39,3 g

Di Giacomo (2005h): N=1 (M) 42,0 g; N=2 (H) X= 39,0 (Rango 33,0 a 45,0)

Salvador (2014a): N= (M) X= 36,3 g (Rango: 34,1 a 37,8); N= 6 (H) X= 33,3 g (Rango: 31,8 a 36,6)

Pagano y Salvador (2017): N=4 (M) 40, 41, 31,3 y 37 g; N=1 (H) 30,6 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos o grises oliváceos. Iris pardo.

Cabeza puntillada de gris con franja central desde la frente a la nuca negra. Semicollar nual canela puntillado de gris y negro. Resto de la zona dorsal pardo grisáceo puntillado de blanquecino.

Garganta blanca. Pecho pardo grisáceo moteado de blanquecino. Abdomen ocráceo barrado de pardo con tono castaño.

Alas pardas con lunares y banda blancos. Escapulares negras con margen ocráceo. Cola parda grisácea manchada de canela y con la punta blanca. Ventralmente gran mancha blanca en el extremo.

La hembra tiene la garganta ocrácea y mancha alar canela. Sin blanco en la cola.

COMPORTAMIENTO

Se posa en el suelo o en ramas bajas.

La cópula de la pareja se produce en el suelo.

Alimentación

Zotta (1934). Coleóptero (Scarabaeidae, Chrysomelidae). Ortópteros. Semillas.

Alabarce (1987a). Coleóptero (Scarabaeidae, Carabidae). Himenópteros. Homópteros. Lepidópteros. Odonata.

Klimaitis (1993). Coleóptero (Scarabaeidae).

Ordano et al. (1999). Coleóptero (Scarabaeidae, Coccinellidae). Ortópteros.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Elateridae, Meloidae, Prionidae, Scarabaeidae). Ephemeroptera. Hemiptera (Pentatomidae, Reduviidae). Homoptera (Cercopidae, Membracidae). Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Tettigonidae).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un ascendente Churiii.glugluglugluglu.. repetido frecuentemente.

HÁBITAT

Palmares, bosques, montes, sabanas, arboledas, áreas rurales, sembrados.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

En el suelo.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

Lillo (Instituto Miguel Lillo). Tucumán, 25-11-1927, 2 huevos.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 17-12-1933, 2 huevos.

Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 27-11-1925 y 26-10-1926, huevos.

Pereyra (1932a). Tigre, pdo. Tigre, Buenos Aires, nidos en diciembre y pichones en enero.

Pereyra (1935a). Isla del río Luján, Buenos Aires, nido con huevos.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en diciembre y enero. En una isla del Tigre y Zelaya, nidos en el suelo con huevos.
Klimaitis (1975c). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, noviembre de 1972, nido con huevos.
Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nido con 2 huevos, el 09-12-1998.
Salvador y Bodrati (2013). En la provincia de Córdoba entre 1980 y 2005 se hallaron 12 nidos, 8 en Villa María, dpto. Gral. San Martín, 3 en Miramar, dpto. San Justo y uno en Ballesteros, dpto. Unión. En la provincia del Chaco se hallaron 4 nidos en el Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza.
De la Peña (2013c). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 25-11-1978, nido con 2 huevos, Esperanza, 14-12-1990, 2 huevos, Villa Guillermina, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 28-11-1995, 2 huevos.
Krauczuk (2013). Misiones. Nido.
Segura et al (2014b). Daireaux, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.
Girard en Segura et al. (2014). Tucumán. Nido.
Schaaf et al. (2015a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, entre octubre de 2012 a enero de 2014, 17 nidos.
Pagano en Salvador (2016a). Salta. Nido.

Huevo

Pone 2 huevos.

Elípticos. De color ocre con pintas grises o sin ellas.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 25,0 a 28,0 x 19,0 a 20,0

Smyth (1928): 24, 5 a 26,0 x 19,0 a 20,0

Di Giacomo (2005h): 25,5 x 18,6 y 27,0 x 18,6

Salvador y Bodrati (2013): 25,6 a 28,3 x 18,7 a 20,1 X= 27,0 x 19,3 (N= 14)

De la Peña (2013c): 25,5 a 26,9 x 19,7 a 20,8 X= 26,1 x 20,3 (N= 4)

Schaaf et al. (2015a): X= 26,7 x 19,9

Pesos

Di Giacomo (2005h): 4,7 y 5,1

Salvador y Bodrati (2013): 5,3 a 6,2 X= 5,7 (N= 12)

De la Peña (2013c): 5,5 X= 5,5 (N= 2)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,400 a 0,474 X= 0,419 (N= 4)

Schaaf et al. (2015a): X= 5,24

PICHONES

Descripción

Salvador y Bodrati (2013). Los pichones nacen con los ojos abiertos. Están cubiertos de denso plumón, en la región dorsal color crema y canela grisáceo claro, con abundantes manchas pardas y pardo oscuras, y color crema en la región ventral. Pico y patas son de color pardo oscuras.

Peso al nacer

Salvador y Bodrati (2013): 4,3 a 4,8 X= 4,5 (N= 6)

Generalidades

Salvador y Bodrati (2013). El período de incubación es de 17-18 días. La incubación estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.

Depredadores

De adultos: *Glaucidium brasilianum* en Chaco, Carrera et al. (2008)

Más información:
Salvador y Bodrati (2013). Schaaf et al. (2015a)

	
Esperanza. Santa Fe. 14-12-1990	Cayastá. Santa Fe. 25-11-1978
	
Cayastá. Santa Fe. 25-11-1978	Esperanza. Santa Fe. 01-12-1990

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Garganta, lunares en las cubiertas alares y banda en las alas blancos, ocráceos en la hembra. La hembra se parece a la hembra del Atajacaminos ñañarca, pero es de menor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Setopagis parvula parvula Gould, 1837 desde el norte del país hasta Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Este de Perú, Brasil (al sur de Amazonia), Bolivia, Paraguay, norte de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Setopagis parvula parvula Gould, 1837

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Gavio (1939); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975a, 1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1937b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Alabarce (1987a); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Pagano y Salvador (2017)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Carrera et al. (2008); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Ordano et al. (1999); Salvador y Bodrati (2013b)

Córdoba

Citas: Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador y Bodrati (2013b); Salvador et al. (2017); Schaaf et al. (2015a); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes

Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biolo (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Straneck (1990b)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pagano y Salvador (2017)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa

Citas: Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja

Citas: Giacomelli (1923)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994b); Krauczuk (2009)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Pagano et al. (2016); Pagano y Salvador (2017)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pagano y Salvador (2017); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Salvador y Bodrati (2013b); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS CEJAS BLANCAS *Hydropsalis maculicaudus* (Lawrence, 1862)

DESCRIPCIÓN

Largo: 19,5-22 cm

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grisáceos. Iris pardo.

Corona y cara negruzcas, largas cejas blanquecinas. Semicollar nuczal rojizo- canela. Dorsalmente pardo oscuro con manchas bien visibles en las alas. Garganta pardo claro, pecho oscuro manchado de pardo. Cola corta y cuadrada, las timoneras laterales barradas con banda subapical negruzca y ápice blanco. Cola ventral negro pardusca con tres pares de manchas blancas difíciles de ver, a no ser en vuelo. La hembra tiene la cola totalmente barrada, sin blanco.

HÁBITAT

Sabanas, orillas de bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Cleere (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hydropsalis maculicaudus (Lawrence, 1862) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Distribución discontinua desde el sur de México por Centro América y Sudamérica hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010)

ATAJACAMINOS TIJERA *Hydropsalis torquata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Ataja-camino. Atajacaminos coludo chico. Atajacaminos tijereta. Ateí-yetapá. Chumuluco. Chumulucuco. Dormilón. Dormilón cola de tijera. Dormilón coludo. Dormilón de cola larga. Ibiyaú cola de tixera. Ñañarca. Yanarca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 50 cm. (macho). 30 cm. (hembra).

Peso: Fiora (1933): N= 7 X= 47 g (Rango: 45 a 49)

Camperi (1992a): N= 2 (M) 63,8 y 76,4 g; N= 1 (H) 60,2 g

Navas y Bó (2001): N= 1 (H) 51,3 g

Di Giacomo (2005h): N=1 (M) 65,0 g

Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 65,1 g; (Rango: 62,5 a 68,2). N= 4 (H) X= 57,9 g (Rango: 53,2 a 62,8)

Pagano y Salvador (2017): N=2 (H) 56 y 56 g

Coloración. Pico pardusco con punta negra. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Dorso pardo grisáceo moteado de blanquecino. En la cabeza tiene manchas negras. Ventralmente es blanquecino con manchas canelas en la garganta y barras pardas oscuras. En el abdomen son más gruesas.

Alas pardas con barras ocráceas. Cola grisácea con barras pardas oscuras. Dos plumas externas alargadas pardas oscuras y blancas.

La hembra tiene en general tonos más ocráceos, es ventralmente más barrada.

Carece de las plumas alargadas de la cola.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares y nocturnos. Se posa generalmente en el suelo, a veces en ramas bajas. Anda solitario o en pareja. Tiene un vuelo errático. La hembra realiza ceremonias de distracción cuando está en el nido. Aparenta estar herida y agranda la zona gular.

Alimentación

Alabarce (1987a). Insectos

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Cermbycidae, Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Ephemeroptera. Hemiptera (Belostomatidae, Pentatomidae). Diptera. Lepidoptera (polillas).

Orthoptera (Gryllidae).

Voces


Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo y corto silbo, repetido insistentemente: Zip...zip...zip...zip..

HÁBITAT

Bosques, sabanas, montes, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

En el suelo, en praderas o claros en montes.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la tierra o sobre hojas.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 20-12-1929, 2 huevos.

Lillo (Instituto Miguel Lillo). Tucumán, 16-12-1932, 2 huevos.

Holland (1897). Estancia Santa Elena, Buenos Aires, un nido hallado a fines de noviembre, en el suelo desnudo, en una arboleda de sauces, con 2 huevos.

Hartert y Venturi (1909). Nido en Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, con 2 huevos.

Pereyra (1932a). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, nidos en noviembre.
Pereyra (1937b). Recao Chico, dpto. Conhelo, La Pampa, se hallaron nidos con huevos y pichones, en bosques de caldenes, a orilla de caminos, ponen 2 huevos.
Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.
López Lanús en Narosky y Di Giacomo (1993). Buenos Aires. Nido.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.
Pautasso y Cazenave (2002). Reserva “El Pozo”, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos, el 02-11-1999 y el 02-12-1999, con 2 huevos cada uno y Colastiné Norte, dpto. La Capital, Santa Fe, 05-11-1999 con 2 huevos y 03-12-1999 con 2 pichones.
Rodríguez (2012b). Dpto. La Caldera, Salta, 08-10-2011, nido con dos huevos.
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nidifica.
Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido.
De la Peña (2013c). 7 nidos en Esperanza, desde el 24-11-1977 a 22-11-2003, pone de setiembre a diciembre, Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 04-12-1988, 2 huevos y 14-10-1986, 2 pichones, Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 04-10-1989, 2 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-12-2002, 2 huevos.
Girard en Segura et al. (2014). Tucumán. Nido.
Krauczuk (2013). Misiones. Nido.
Oscar, D. y Santiago, S. M. (2015). Ceibas, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos, 04-10-2015, nido con un huevo.
EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.
Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña (2016c). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, en una plantación de eucaliptos, 10-12-1980, un nido en una mata de *Cynodon* sp., con 2 huevos, 11-12-1980, 2 nidos, uno con 2 huevos incubados y otro con un pichón recién nacido y un huevo.
Salvador y Nores en De la Peña (2016c). Huaycama, dpto. Ambato, Catamarca, 31-10-1985, un nido entre hojarascas, con 2 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 7 nidos hallados entre noviembre y febrero, en bosques ralos, plantaciones de eucaliptos y costas del Río Tercero, ponen 2 huevos.
Straneck en Salvador (2016a). Córdoba. Nido
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido
Bodrati (*in litt.* 2019). Nido con dos huevos incubados por la hembra en la Fundación Figueroa, Salas, 11 km al sur de la ciudad de Baradero, partido homónimo, Buenos Aires.
Quiroga y Navarro (2020). Los Corbalanes, dpto. Banda, Santiago del Estero, 10-11-2019, nido con 2 huevos.
De la Peña (2020). Esperanza. 08-10-2018. Nido en la base de un Espartillo. 2 huevos.

Huevos

Pone 2 huevos.

Ovoidales o elípticos. De color ocre o crema con pintas y finas líneas grises y pardas.



Medidas

Hartert y Venturi (1909): 27,5 a 30 x 21 a 22,5

Pereyra (1937b): 32,0 x 22,5

Pautasso y Cazenave (2002): 27,4 a 28,9 x 20,7 a 22,1

De la Peña (2013c): 29,2 a 30,4 x 20,8 a 21,4

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 27,6 a 28,7 x 20,1 a 21,5

Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña (2016c): 28,3 a 28,6 x 20,5 x 21, 0

Salvador y Nores en De la Peña (2016c): 28,1 a 28,6 x 20,3 a 20,4

Quiroga y Navarro (2020): 27,3 a 28,5 x 20,5 a 21,0

X= 27,9 x 21,0 (N= 6)

X= 29,6 x 21 (N= 4)

X= 28,21 x 20,64 (N= 10)

X= 28,4 x 29,7 (N= 3)

X= 28,3 x 20,1 (N= 2)

X= 27,9 x 20,2 (N= 2)

Peso

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 6,4 a 7,0
 Salvador y Norens en De la Peña (2016c): 6,5 y 6,6
 De la Peña (2013c): cáscaras 0,543 a 0,568
 Quiroga y Navarro (2020): 5,66 y 6,58

X= 6,7 (N= 8)

X= 0,552 (N= 4)

PICHONES

Descripción

Pautasso y Cazenave (2002). Pico negro, interior de la boca y paladar de color rosa, iris pardo oscuro y las patas negruzcas. Cuerpo cubierto de plumón pardo acanelado con sectores grisáceos y negruzcos. A los 4 días de vida vainas en primarias y secundarias, pardo canela

De la Peña (2013c). Nace con los ojos abiertos. Pico negro. Cavidad bucal rosada. Plumón por todo el cuerpo pardo grisáceo, jaspeado de pardo oscuro. Ventralmente pardo.

1 día. Largo de la cabeza, 2 cm. Largo del cuerpo, 4,9 cm. Dedos, 1 cm. Patas pardo oscuro. Píán.

4 días. Aparecen los cañones de las plumas primarias y secundarias.

6 días. Largo de la cabeza, 2,8 cm. Largo del cuerpo, 6,6 cm.

Ojos marrones. Patas grises. Gritan. Se van del nido caminando con las alas hacia arriba.

8 días. Coloración de adulto.

12-13 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	
1	0,7	0,9						
6	1.4	1.8	2.5	1.7	0.3	1.5	0.15	0.4

Observaciones

La Grotteria, J. (2010d). Ceibas, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos, 31-10-2010, pichones.

Generalidades

De la Peña (2013c). Período de incubación 18-19 días. Permanencia de los pichones en el nido 12-13 días.

Los pichones tienen un desarrollo rápido. Al segundo día si son molestados se corren por el suelo.

La hembra, como aptitud de agresividad, vuela cerca y abre las alas y la boca. Emite un grito ronco, áspero. Se puede posar en troncos o ramas bajas, mueve la cabeza hacia arriba y abajo y realiza movimientos acompasados de la cola.

Más información:

Pautasso y Cazenave (2002). De la Peña (2019a)



Colastiné. Santa Fe. 11-11-1999. Hembra



Esperanza. Santa Fe. 26-10-2005



Colastiné. Santa Fe. 26-11-1999



Esperanza. Santa Fe. 26-10-2005



Esperanza. Santa Fe. 31-10-2001



Esperanza. Santa Fe. 12- 12-2001



Dique El Chañar. Neuquén.15-12-2014 Foto: Cynthia Arenas

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Barras ocráceas en las alas. Cola gris con barras pardas oscuras. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola. La hembra es ventralmente más barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hydropsalis torquata furcifera (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extensa área de distribución desde el centro y sur de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Hydropsalis torquata furcifera (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Holland (1896); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Rodríguez Goñi (1984); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Alabarce (1987a); Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Capllonch et al. (2015); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Capllonch et al. (2015a); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Capllonch et al. (2015a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Grant (1911c); López Lanús (1997); Pagano y Salvador (2017)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Fiora (1933)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1927e, 1937); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza

Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2001); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1991a); Zotta (1939)

Neuquén

Citas: Bianchini (2016a); Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1987a); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Ortiz et al. (2016)

San Luis

Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2015a); Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Quiroga y Navarro (2020)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2015a); Hartert y Venturi (1909); Lucero, M. M. (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS COLUDO *Macropsalis forcipata* (Nitzsch, 1840)

Otros nombres: Atajacaminos coludo grande. Dormilón tijereta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 76 cm. (macho), 34 cm. (hembra)

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.

Ocráceo manchado de negro. Cabeza parda oscura. Collar rojizo sobre el cuello. Garganta blanca.

Plumas externas de la cola alargadas (62 cm) negras, con la lámina interna y la punta blancas.

La hembra tiene cola corta, gris con plumas externas ocráceas manchadas de negro.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares. Vuela a baja altura. Se posa en las ramas de los árboles.

Alimentación**HÁBITAT**

Selvas abiertas, bosques, sabanas, capueras.

NIDIFICACIÓN



Bodrati (*in litt.* 2019). En el sector de acceso a Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, se han observado en distintas temporadas (2003-2018) individuos juveniles, incluso un volantón fue capturado y liberado en noviembre de 2010.

Más información:

Moraes y Krul (1995). Pichorín (2002a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración oscura con collar rojizo y garganta blanca. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Área de distribución restringida al sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2012); Heredia y de la Fourniere (2008)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Cockle (2012); Chebez (1996a); Foster en Chebez (2009); Krauczuk y Castía (2009); Norez e Yzurieta (1982); Olrog (1973a)

ATAJACAMINOS OCELADO *Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi, 1844)

Otros nombres: Dormilón ocelado. Dormilón querebebé. Querebebé. Zoncito.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20-21 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 35-43 g; (H) 29-44 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.

Coloración general parda rojiza, finamente vermiculada de negro. Cabeza grisácea con manchas negras. Garganta blanca. Pecho grisáceo oscuro. Puntos blancos en el vientre y en las cubiertas alares. Puntos negros en las alas y en las escapulares. Cola con franjas negras y plumas externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Se posa en ramas de árboles o en cañaverales.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una repetición de un lastimero Wierrrr....wierrrr....wierrrr... comparable con un maullido de gato.

HÁBITAT

Selvas y capueras en sectores quebrados.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

En el suelo, sobre lecho de hojas.

Bodrati y Baigorria (2013). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 21-10-2010 y 05-11-2012, nidos con 2 huevos cada uno. Bio Reserva Karadya, dpto. Gral. Belgrano, Misiones, 05-11-2011, nido con un huevo.

Huevos

Pone 1 ó 2 huevos. Blancuzcos rosados o salmón tenue con manchas castañas.

Medidas

Bodrati y Baigorria (2013): 26,9 a 28,3 x 18,6 a 18,8 X= 27,6 x 18,7 (N= 4)

PICHONES

Descripción

Bodrati y Baigorria (2013). Pico pardo. Paladar rosado intenso. Patas rosadas y parduzcas. Plumón natal canela suave.

Generalidades

Bodrati y Baigorria (2013). Período de incubación, 17-18 días.

Más información:

Bodrati y Baigorria (2013). Krauczuk (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración parda rojiza con la garganta blanca. Puntos blancos en el vientre y en las cubiertas alares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nyctiphrynus ocellatus ocellatus (Tschudi, 1844) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se encuentra en Centro y Sud América con poblaciones separadas. Comprende: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

Nyctiphrynus ocellatus ocellatus (Tschudi, 1844)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Baigorria (2013); Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014); Saibene et al. (1996); Straneck (1990h)

ATAJACAMINOS OSCURO *Antrostomus sericocaudatus* Cassin, 1849

Otros nombres: Atajacaminos ahumado. Dormilón rojizo de cola listada.

DESCRIPCIÓN

Largo: 24-30 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 24-30 g; (H) 62-83 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardo oscuro. Iris pardo.

Coloración general parda oscura, moteada de ocráceo. Collar ocráceo. Franja nugal castaña. Garganta y pecho con puntos claros. Resto de la parte ventral barrado.

Primarias pardas oscuras con manchas rojizas en la lámina externa. Cola redondeada con franjas angostas castañas. Las plumas más externas con banda diagonal blanca. Punta blanca en el macho, rojiza en la hembra.

COMPORTAMIENTO

Se posa a mediana altura en las ramas de los árboles o en cañaverales.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es una rápida repetición de 5 sílabas: Jiujuiojuiouu con dos picos de amplitud ascendente y dos de descendente.

HÁBITAT

Selvas, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Ligera depresión en el suelo, cubierta con hojas.

Partridge (1956). Arroyo Uruguái, km 30. dpto. Iguazú, Misiones, 15-11-1953, dos nidos.

Chebez et al. (1988b). Bernardo de Irigoyen, dpto. Belgrano, Misiones, el 17-11-1986 se localizó un nido en el suelo, en inmediaciones de un cañaveral y a 10 m de una picada. Estaba en una depresión del suelo de 15 cm de diámetro, cubierta de hojas secas. Tenía 2 huevos.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Salvador y Bodrati (2013a). Misiones. Nido.

Bodrati y Cockle (2018). Reserva Guaraní, dpto. Guaraní, Misiones, 29-09-2005, nido con 2 huevos. A° Alegría, dpto. San Pedro, Misiones, 19-09 a 11-10-2013, 2 huevos. Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, 03-09-2005, 03-09 a 12-10-2007, 09-09 a 03-10-2007, 01-09-2008, 29-09 a 08-2008, 09 a 29-10-2008, 11 a 28-2012, 7 nidos con 2 huevos cada uno.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Chebez et al. (1988b): 32 x 19

Bodrati y Cockle (2018): X= 28,3 x 19,9 (Rango: 27,0 a 30,0 x 18,0 a 23,0) (N= 14)

Peso

Bodrati y Cockle (2018): 5,1 y 5,6

PICHONES

Observaciones

Bodrati y Cockle (2018). Período de incubación 19 días

Bodrati y Cockle (2018). Los pichones nacen cubiertos de plumón marrón rosado.

Más información:

Bodrati y Cockle (2018)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración general parda. Cola con franjas castañas y punta blanca en el macho. Rojiza en la hembra. Sin manchas alares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Antrostomus sericocaudatus sericocaudatus Cassin, 1849 en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Una en Amazonia en Perú, noroeste de Bolivia y norte de Brasil y otra en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Antrostomus sericocaudatus sericocaudatus Cassin, 1849

Misiones

Citas: Bertoni (1919); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2018); Chebez (1996a); Chebez et al. (1988b); Contreras et al. (1994b); Partridge (1956a); Hardy y Straneck (1989); Straneck (1990h)

ATAJACAMINOS COLORADO *Antrastomus rufus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Ateí tres cuatro cueros. Cacuí. Dormilón rojizo. Dormilón rubio. Pitanguá. Tarpuí. Tarpuí rubio. Tres cuatro cueros.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25-31 cm.

Peso: Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 87,4 g

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.

Cabeza con fino puntillado castaño y ocráceo con estrías negras. Dorso pardo oscuro finamente puntillado de canela y ocráceo. Garganta parda oscura barrada de castaño y con un fino collar blanco. Resto de la zona ventral pardo oscuro puntillado de castaño y ocráceo.

Alas negras con lunares y manchitas castañas. Cola como el dorso, con la mitad terminal de las plumas externas blanca con borde canela. Ventralmente, la mitad terminal con gran mancha canela clara.

La hembra tiene el collar ocráceo y la cola sin blanco.

COMPORTAMIENTO

Se posa en el suelo y en las ramas de los árboles.

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto está compuesto por 4 sílabas Chiuc.chuc.chuc.chiurrrr, es repetido insistentemente.

HÁBITAT

Selvas, bosques y selvas semiabiertas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Catamarca, Chaco, Santa Fe.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	

Ligera depresión en el suelo.

Hartert y Venturi (1909). Ocampo, Dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 16-11-1905, nido con 2 huevos.

Cracogna en De la Peña (1996b). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, el 01-11-1991, nido con 2 huevos y el 03-11-1990, A. Caradonna, localizó un nido con 2 huevos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Libertador General San Martín, dpto. Ledesma, Jujuy, el 26-11-1992, nido con 2 huevos, estaba en un área de selva, en un lugar sombrío, leve depresión entre hojarascas, el mismo día, otro nido con un huevo y un pichón y el 27-11-1992, nido con 2 pichones de unas 48 horas de edad.

Salvador et al. (2014). Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, 07-11-1991, nido con 2 huevos, 09-11-1991, un pichón; Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, 24-10-1997, 2 huevos; Embarcación, dpto. Gral. San Martín, Salta, 08-11-2004, 2 huevos; Balcosna, dpto. Paclín, Catamarca, 15-02-2008, 2 pichones.

Temporetti en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos con leve tinte rosado, con manchas, puntos y líneas castañas y grises violáceas.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 33,0 a 33,7 x 24,0

Di Giacomo y López Lanús (1998): 32,5 x 24,2 y 32,4 x 24,1

Salvador et al. (2014): 31,8 a 33,6 x 22,6 a 23,9

X= 32,8 x 23,5 (N= 7) (*saltarius*)

Salvador et al. (2014): 32,7 x 23,9 y 32,3 x 24,2 (*rutilus*)

Pesos

Di Giacomo y López Lanús (1998): 10,0 y 10,2

Salvador et al. (2014): 9,7 a 10,1 X= 9,9 (N= 4) (*saltarius*)

PICHONES

Descripción

Di Giacomo y López Lanús (1998). Los pichones están cubiertos con denso plumón canela intenso, más oscuro en la cabeza y lomo.

Salvador et al. (2014). Ojos semiabiertos, de color pardo oscuro. Cubiertos por denso plumón canela con tinte castaño, amarillento sobre la cabeza. Pico pardo claro. Interior de la boca rosado. Patas crema con tinte rosado.

Más información:

Salvador et al. (2014)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración general rojiza. Collar angosto y plumas externas de la cola blancos en el macho, ocráceos en la hembra. Diferenciar a la hembra de la hembra de Atajacaminos ñañarca y de la del Curiango.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Antrostomus rufus rutilus Burmeister, 1856 Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, noreste de Santa Fe y de Córdoba, y *Antrostomus rufus saltarius* (Olrog, 1979) en el norte de Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Extenso territorio de distribución geográfica en el sur de Centro América, norte de Sudamérica y en el este, al este de los Andes, hasta Argentina. Comprende: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Salvador et al. (2014)

Córdoba

Citas: Cobos et al. (1999)

Chaco

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador et al. (2014)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Formosa

Citas: Bodrati y Areta (2010); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); López-Lanús y Mencia (2017)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador et al. (2014); Straneck (1990f)

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2018); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Militello y Chebez (2009)

Salta

Citas: Camperi (1990); Moschione et al. (2013); Pagano et al. (2016); Salvador et al. (2014)

Santa Fe

Citas: De la Peña (1996b); Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2006)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Lucero (1983); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

Antrostomus rufus saltarius (Olrog, 1979)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Nores e Yzurieta (1984b); Pagano y Salvador (2017)

ORDEN: APODIFORMES

VENCEJOS

FAMILIA: APODIDAE

Los Vencejos son aves de distribución casi mundial, pero son más abundantes en los climas cálidos.

Son aves de alas largas y estrechas. Sobrepasan la punta de la cola cuando están plegadas.

Los mástiles de las rectrices (siempre en número de 10) son rígidos y en los géneros *Chaetura* y *Streptoprocne* están más o menos desprovistos de barbas en la extremidad.

Las patas son cortas. El género *Aeronautes* tiene 2 falanges en el primer dedo (hallux) y 3 en los demás. Además, en algunas especies el hallux está situado lateralmente (en lugar de posteriormente) y puede ser dirigido hacia adelante (pies pamprodáctilos). El tarso es corto, a veces emplumado, así como los dedos.

El pico es corto, arqueado (parecido al de las Golondrinas).

Andan solitarios, pero en general en grupos o bandadas de pocos a muchos ejemplares.

Son de vuelo rápido y pasan gran parte del día volando. Se posan colgándose con las uñas en las paredes rocosas o en huecos en los árboles.
 Emiten gritos chillones. Se parecen a las golondrinas, pero a diferencia de éstas no se posan en árboles, alambres o edificios.
 Nidifican en huecos en los árboles, grietas o cuevas en rocas, barrancas, o en salientes (repisas) en laderas rocosas o debajo de caídas de agua (cataratas).
 Las especies de los géneros *Chaetura* y *Cypseloides* son difíciles de diferenciar en las observaciones de campo.
 Nidifican en huecos en los árboles, grietas o cuevas en rocas, barrancas, o en salientes (repisas) en laderas rocosas o debajo de caídas de agua (cataratas).
 Los nidos están en general en lugares inaccesibles. Emplean en la construcción, tierra en la base, fibras vegetales, musgos, helechos y líquenes.
 Ponen 1 ó 2 huevos blancos.
 Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.
 Frecuentan bosques, selvas, praderas y montañas.

VENCEJO NEGRUZCO *Cypseloides rothschildi* Zimmer, 1945

Otros nombres: Vencejo pardo. Vencejo pardusco.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15 cm.

Coloración. Enteramente pardo.

HÁBITAT

Sabanas, montes, bosques y yungas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Catamarca.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

En paredes rocosas. Altos.

Expuesto. Elaborado. Forma de cono. Construido con musgos y tierra.

Girard (1918). Tucumán. Nido.

Girard en Segura et al. (2014). Tucumán. Nido.

Lillo (Instituto Miguel Lillo). Taficillo, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 25-01-1911, nido con un huevo.

Dabbene (1918b). Tucumán, P. Girard localizó nidos contra las paredes verticales de los cerros.

Smyth (1928). Taficillo, 20-12-1915 y Tafí Viejo, 15-12-1923, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, un huevo en cada lugar.

Acosta, N. en De la Peña (2013c). Río Las Cañas, dpto. Andalgalá, Catamarca, 04-12-2002, nido en una pared rocosa, a 15,00 m de altura.

Huevo

Pone 1 huevo. Ovoidal. Blanco.

Medidas

Dabbene (1918b): 24 a 26 x 17 a 19

Smyth (1928): 26, 5 a 28,5 x 18,5

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración general parda.

Diferencial del Vencejo de cascada y del Vencejo ahumado chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cypseloides rothschildi Zimmer, 1945 en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco y Córdoba.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Noroeste de Argentina y sur de Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009); De la Peña (2013c); Ferrari et al. (2004b); Moschione (2005pp); Nores e Yzurieta (1982a)

Chaco

Citas: Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Miatello et al. (1991-1994); Salvador et al. (2017)

Formosa

Citas: Nores et al. (1996)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja

Citas: Nores y Salvador (1985)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Di Giacomo et al. (1998); Moschione et al. (2013)

Santiago del Estero

Citas: Coria y Heredia (2012); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1918g); Lucero (1983); Lucero e Izasa (2015); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

VENCEJO AHUMADO CHICO *Cypseloides fumigatus* (Streubel, 1848)

Otros nombres: Vencejillo negro. Vencejo fuliginoso. Vencejo negruzco. Vencejo pardo chico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15 cm.

Peso: Chantler (1999): 44 g

Coloración. Tarsos y pico negros. Iris pardo.

Coloración general parda negruzca.
La cola es corta, cuadrada. Las alas son largas.

COMPORTAMIENTO

Anda en grupos de pocos ejemplares. Se asocia a *Chaetura* y *Streptoprocne* formando bandadas de hasta un centenar de individuos.

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT

Frecuenta selvas entre los 700 y los 2100 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Pearman et al. (2010). varios nidos en Misiones: Salto Encantado, dpto. Cainguás, 01-12-2004, 13-11-2007 y 02-11-2009; Salto Krysiuk, dpto. Oberá, 11-01-2005; Reserva Natural Privada Valle de Cuña Pirú, dpto. Cainguás, 13-01-2005; Salto Golondrina, dpto. Guaraní, 19-11-2008. Los 8 nidos estaban desde 2,50 a 40 m del suelo. La mayoría de los nidos estaban expuestos al spray de las cascadas.

Más información

Pearman et al. (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración oscura.

Diferenciarlo del Vencejo de cascada (es más pequeño, más oscuro y con la cola más larga) y del Vencejo negruzco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Área de distribución circumscripita al este de Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Krauczuk y Baldo (2004); Pearman et al. (2010); Saibene et al. (1996)

VENCEJO DE CASCADA *Cypseloides senex* (Temminck, 1826)

Otros nombres: Golondrina del Iguazú. Golondrina murciélago grande. Mbiyuí-mbopí guazú. Vencejo ahumado grande. Vencejo de anteojos grande. Vencejo de las cataratas. Vencejo ligero. Vencejo pardo. Vencejo pardo grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18 cm.

Peso: Chantler (1999): 60-98 g

Coloración. Pardo uniforme. La cabeza es más clara. Frente blanquecina. Cola cuadrada o ligeramente redondeada, corta.

COMPORTAMIENTO

Forma bandadas de muchos ejemplares. Se mete detrás de las cascadas.

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite un áspero y prolongado Chierrrrr...chierrrrr...

HÁBITAT

Selvas, cataratas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

En repisas o salientes rocosas. Bajos, a mediana altura y altos.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de tierra en la base, fibras vegetales, musgos y líquenes en el resto, con forma de cono truncado chato.

De la Peña (2013c). Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, 2 nidos a 2,30 m de altura, uno con un huevo y otro sin postura. Medidas: diámetro, de 8 a 12 cm, profundidad, 0,5 cm y alto, 3 cm.

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-10-1984, Salto Dos Hermanas, en una pared de roca de unos 19 m de altura, con un alero natural, a alturas de entre 3 y 5 m, se observaron 5 nidos, todos apoyados en pequeñas repisas, con forma de cono truncado muy chato, hechos con líquenes, musgo y otros vegetales, al menos en 3 nidos había 2 huevos.

Uranga, M. (2018). El Soberbio, dpto. Guaraní, Misiones, 30-10-2018, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Capovilla, P. (*in litt.* 2020). Cataratas del Iguazú, Misiones, 13-10-2018, nido con un huevo.

Huevos

Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. Blancos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Grande. Coloración general parda, con la cabeza más clara.
Se diferencia del Vencejo negruzco por tener la cabeza más clara, ser de mayor tamaño y diferente distribución geográfica. Del Vencejo ahumado chico, por ser más grande, tener la cara más clara y la cola más corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cypseloides senex (Temminck, 1826) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. En ríos cerca de cascadas en el este de Bolivia, centro y sur de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.



P. N. Iguazú. Misiones. 13-10-2018 Fotos: Pablo Capovilla



Cataratas del Iguazú. Misiones. 12-10-1981 Foto: Martín R. de la Peña

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Dabbene (1917b); De la Peña (1982b, 2013c); Raymundi y Borsini (1997a); Saibene et al. (1996)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 06-02-1973)

VENCEJO DE COLLAR *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)

Otros nombres: Aguacil. Chirrí. Golondrina collareja. Vencejo de collar blanco.

DESCRIPCIÓN

Largo: 22 cm.

Peso: Chantler (1999): 104 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.

Pardo oscuro con un collar blanco. La cola es ligeramente ahorquillada con los raquis sobresalientes. El juvenil carece de collar o es reducido.

COMPORTAMIENTO

Anda en bandadas. Se posa en paredes rocosas, en grutas.

Alimentación

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Efemeroptera.

Olson y Alvarenga (2006). Isoptera (Termitas).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite una aguda y potente voz, Chiriii...chiriii....chiriii....

HÁBITAT

Praderas y montañas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, Córdoba.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Asentado en salientes rocosos o repisas, en grutas. Altos.

Expuesto. Elaborado. Plataforma de musgos, helechos y tierra. Perfil triangular.

Dabbene (1918b). Tucumán, P. Girard localizó nidos contra las paredes verticales de los cerros.

Da Forno, en Reed (1919). La Cueva, dpto. Las Heras, Mendoza, encontró varios nidos.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en grietas, paredones rocosos y detrás de cascadas.

Capllonch et al. (2001). Tucumán. Nido.

Passeggi (2005). Tanti, dpto. Punilla, Córdoba, octubre de 2001 a marzo de 2002, 6 nidos.

De la Peña (2013c). Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 28-11-1982, 2 nidos con 2 huevos cada uno.

Medidas: ancho, 22 cm, alto externo, 8 a 9 cm, alto interno, 2 a 3 cm, profundidad, 2 a 3 cm.

Salvador y Fraga en De la Peña (2016c). Mallín, dpto. Punilla, Córdoba, 07-11-1984, 3 nidos, 2 estaban en una caverna angosta de grandes rocas y de unos 15 m de altura, con un arroyo que cruza al fondo, ambos nidos estaban en una repisa de unos 14 cm de ancho, a 2 m uno del otro, tienen forma de cono truncado muy chato, elaborado de musgos verdes y húmedos, un nido medía 13 cm de diámetro externo, 10 cm de diámetro interno, 3,5 cm de alto y 2 cm de profundidad, ambos con 2 huevos incubados. El tercero estaba a 8 m de altura, en una grieta longitudinal de 2 m de largo, 12 cm de alto y 15 cm de profundidad, en una pared de roca en una garganta formada por un arroyo, con 2 huevos.



Foto: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Grande. Negro con collar blanco. Grito fuerte.

Diferenciarlo del Vencejo nuca blanca. (es de mayor tamaño y el collar blanco es completo)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Probablemente *Streptoprocne zonaris kuenzeli* Niethammer, 1953 desde Jujuy a Mendoza, San Luis y Córdoba. En invierno en llanuras de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe y de Entre Ríos, y *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw, 1796) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Nueve subespecies. Amplia distribución en Centro América, Islas del Caribe y Sud América (excluida la Amazonia), en general en ambiente montano, desde Méjico hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Streptoprocne zonaris kuenzeli Niethammer, 1953

Catamarca

Citas: Carma (2009); Lucero e Izasa (2015)

Observaciones: De la Peña (Agua de las Palomas, dpto. Andalgalá, 11-03-1981)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Córdoba

Citas: Biancucci (1995); Castellanos (1932); De la Peña (1982b, 2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky (1976); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al. (1983); Passeggi (2011); Pergolani (1944b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Rosa de Calamuchita, dpro. Calamuchita, 18-01-1979)

Entre Ríos

Citas: Barrow (1884)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al (2005); Malizia et al. (2005)

La Rioja

Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Arámburu (1983); Diéguez y Reboledo (1997); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Ordano y Bosio (2001); Reed (1916, 1919); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b)

San Luis

Citas: De Lucca (1989); Di Giacomo et al. (2001); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Quebrada de Cautana, dpto. Junín, 19-11-1997)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Alemania, dpto. Guachipas, 08-12-1977)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Santa Fe

Citas: Gai (1950)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016); Toledo (2016); Ubiría (2016)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b, 2020); Dabbene (1917b); Echevarría et al. (1998); Gianini (2000); Handford (1983); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

Streptoprocne zonaris zonaris (Shaw, 1796)

Corrientes

Citas: Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Dabbene (1918g); Krauczuk y Baldo (2004); Militello y Chebez (2009); Saibene et al. (1996)

VENCEJO NUCA BLANCA *Streptoprocne biscutata* (P. L. Sclater, 1866)

DESCRIPCIÓN

Largo: 20,5 cm

Peso: Chantler (1999): 85-100 g

Coloración. Tarsos y pico negros. Iris pardo.
Pardo oscuro con blanco en la nuca y en el pecho.
Cola cuadrada.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT

Selvas de serranías.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Pearman et al. (2012). Parque Provincial Salto Encantado, dpto. Cainguás, Misiones. Dormidero debajo de una cascada.

Más información:

Pichorim (2002b). Pearman et al. (2012). Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración oscura con blanco en la nuca y en el pecho.

Se diferencia del Vencejo de collar por ser de menor tamaño y tener el collar blanco interrumpido a los lados del cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Streptoprocne biscutata biscutata (P. L. Sclater, 1866) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Su área de distribución se halla limitada a una franja del este de Brasil, adyacente de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Streptoprocne biscutata biscutata (P.L. Sclater, 1866)

Misiones

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Nores e Yzurieta (1985); Olrog (1979); Pearman et al. (2012); M. Rumboll y J. Warne en Mazar Barnett y Pearman (2001); Saibene et al (1996)

Subfamilia: Apodinae

VENCEJO CHICO *Chaetura cinereiventris* P. L. Sclater, 1862

Otros nombres: Vencejo ceniciento. Vencejo de panza gris. Vencejo de vientre gris.

DESCRIPCIÓN

Largo: 10,5-11 cm.

Peso: Chantler (1999): 19 g

Coloración. Corona, manto y alas azulados lustrosos. Parte inferior del lomo, rabadilla y supracaudales grises. Lorum y subcaudales negros. Garganta blanquecina. Ventral gris. Cola negra, corta, cuadrada, de la que sobresalen los mástiles.

COMPORTAMIENTO

Vuela en grupos sobre áreas abiertas de ríos y arroyos selváticos.

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT

Selvas.

NIDIFICACIÓN

Nidos en Misiones.



Bodrati (*in litt.* 2019). Nidos en una chimenea de una vivienda en la Reserva Tingazú, El Alcazar, dpto. Libertador San Martín, Misiones.

Más información:

Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Parte ventral y rabadilla grises. Resto negro.

Diferenciarlo del Vencejo de tormenta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chaetura cinereiventris cinereiventris P. L. Sclater, 1862 en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Áreas separadas de distribución extensa en Centro América y Sudamérica. Comprende: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaetura cinereiventris cinereiventris P. L. Sclater, 1862

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1992a, 1996a); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Partridge (1961b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 24-09-1993)

VENCEJO DE TORMENTA *Chaetura meridionalis* Hellmayr, 1907

Otros nombres: Vencejo chico. Vencejo de cuello ceniciento. Vencejo de garganta blanca. Vencejo gargantiblanco. Vencejo menor. Vencejo oscuro chico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 12-13,5 cm.

Peso: Chantler (1999): 21,5g

Coloración. Dorso y alas pardas oscuras. Rabadilla y supracaudales grises. Garganta blanquecina; el resto de la zona ventral pardusco. Cola cenicienta con los mástiles oscuros, es corta, cuadrada con las rectrices sobresalientes.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite agudos tip..tip..tli..bip..tip..tlip..

HÁBITAT

Sabanas, bosques, selvas, quebradas y montes.

NIDIFICACIÓN

Nidos en Salta, Córdoba, Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Nidifica en huecos en árboles.

Coconier et al. (2007). Salta. Nido.

Sferco (2017). Reserva Provincial Chancaní, Córdoba, entre el 3 y 6 de diciembre de 2015, dos nidos. Tenían 3 y 5 pichones.

Bodrati (*in litt.* 2019). Nidos en el tronco ahuecado de una palmera pindó (*Syagrus* sp.), en el Parque Provincial Caá Yará, Misiones.

Pichones

Sferco (2017). Plumón negruzco. Pico amarillo anaranjado.

Más información:
Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Garganta clara que contrasta con el resto de la parte ventral, que es más oscura.
Se parece al Vencejo chico pero tiene el dorso pardo, no negro, y es más oscuro en la parte ventral.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Nidifica en Bolivia, centro y sur de Brasil, Paraguay y Argentina. Migra en el invierno austral a Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Jaramillo (2000)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Chebez (1996a); Contreras et al. (1990b); Dabbene (1917b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Miatello et al. (1991, 1994); Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1981); Rumboll y Hilty en Jaramillo (2000); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Sferco (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Esteban (1953); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Dabbene (1917b); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988a); Straneck (1990g)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1917b); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 08-12-1977)

Santa Fe

Citas: Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2004); Manassero y Luna (2009b)

Santiago del Estero

Citas: Dabbene (1917b); Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016); Salvador y Eroles (1994)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1917b); Echevarría et al. (1998, 2008a); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

VENCEJO MONTAÑÉS *Aeronautes montivagus* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

DESCRIPCIÓN

Largo: 13 cm.

Peso: Chantler (1999): 20 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.

Dorso pardo negruzco brillante con reflejos verdosos. Garganta, pecho y flancos blancos. Alas y cola parduscas oscuras con punta blanca en las terciarias. Cola ligeramente furcada, con blanco en las rectrices externas y en la punta.

COMPORTAMIENTO

Anda en bandadas.

HÁBITAT

Frecuenta selvas en montañas, cerros boscosos, acantilados, poblaciones y áreas áridas, hasta los 2600 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pardo negruzco con blanco en la garganta, pecho y flancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Aeronautes montivagus montivagus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Desde Venezuela, Guayanas y extremo norte de Brasil y por los Andes a altas elevaciones comprendiendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aeronautes montivagus montivagus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione (1993)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

VENCEJO BLANCO *Aeronautes andecolus* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Golondrina de alas largas. Vencejo de alas largas. Vencejo serrano.

DESCRIPCIÓN

Largo: 13,5 -14 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 20 g

Navas y Bó (2001): N= 6 (M) X= 22,00 g (Rango: 20,0 a 24,9); N= 1 (H) X= 22,0

Coloración. Dorso pardo. Rabadilla, lados del cuello y ventral, blancos. Alas y cola pardas. La cola es larga, furcada.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Salvador et al. (2017). Insectos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite un agudo Tsirrr...tsirrr...trirrr.

HÁBITAT

Estepas, quebradas y montañas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

En huecos o grietas, en laderas de montañas. Altos.

Oculto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la piedra o sobre plumas.

Pereyra (1927e). Anida en las barrancas de piedra. En el río Atuel, San Rafael, Mendoza.

Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 08-01-1983, colonia con 15-20 nidos, en un paredón de piedra, con pichones, 17-12-1983 y 19-12-1987, de 30-35 nidos, en grietas de rocas, entre 12 y 20 m de altura, probablemente con huevos.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en grietas en paredones acantilados.

Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, en localizaron 5 colonias, en noviembre, diciembre y febrero. Todas en grietas delgadas y profundas, en grandes paredones de rocas, entre 12 y 20 m de altura. En ellas anidaban entre 15 y 35 parejas.

Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.

De la Peña (2013c). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 05-12-1981, varios nidos en grietas en paredones, a 15-20 m de altura, Pampa de Achala, 27-11-1989, 18 m de altura, un huevo, Pampa de Achala, 25-11-1990, nidos a 18-50 m de altos, Huaco, dpto. Jachal, San Juan, 16-01-1982, nidos a 25 m de altura.

Huevos

Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medida

De la Peña (2013c): 22,1 x 15



Pampa de Achala. Córdoba. 27-11-1982. Nidos en grietas

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Dorsal parda. Ventral y rabadilla blancas.

Cola larga, furcada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Aeronautes andecolus andecolus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837) por la Cordillera de los Andes y precordilleras desde Jujuy y Salta hasta Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut y Río Negro.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. En la cordillera de los Andes y en la precordillera en Perú, Bolivia y Argentina. Además en Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aeronautes andecolus andecolus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Chubut

Citas: Straneck (1990d)

Observaciones : Sain-Trápaga en De la Peña (2016c)

Córdoba

Citas: De la Peña (1982, 2005); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Olrog (1979); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Dabbene (1917b); Fiora (1933); Hartert y Venturi (1909); Mamaní et al. (2018)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1917b); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Navas y Bó (2001); Pereyra (1927e, 1942a); Roig (1965); Sosa (2005); Wetmore (1926b)

Neuquén

Citas: Chebez et al. (1998); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (1997); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016); Seewald y Pérez (2009)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, dpto. Cafayate, 07-02-1977)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); De la Peña (1982b, 2013c); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Nores (1995); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Gil et al. (1995); Nellar Romanella (1993)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Antelo (2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b, 2020); Dabbene (1917b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Nores (1995)

COLIBRÍES Y PICAFLORES**FAMILIA: TROCHILIDAE**

Aves pequeñas, de colores brillantes. Exclusivamente americanas, habitan desde Alaska a

Tierra del Fuego.

Los colores estructurales, metálicos, de las plumas cambian según el ángulo de incidencia de la luz. Los machos en general tienen colores más llamativos que las hembras, y varias especies presentan crestas, plumas alargadas a los lados de la cabeza y cola larga.

Las patas son muy cortas, no pueden caminar. Son de vuelo ágil y lo realizan en todas las direcciones. El batimiento de las alas es muy rápido y producen un zumbido audible desde cierta distancia.

Pico largo y angosto, en algunas especies es curvo.

Los nidos pueden estar colgando o asentados en ramas, hojas, raíces, techos de grutas, hilos o alambres colgantes de construcciones. La hembra construye el nido, incuba y cría a los pichones.

Son aves muy agresivas, defienden tanto el territorio de alimentación como el de nidificación. Atacan a sus congéneres como a otras aves o a las personas.

Les gusta mojarse, ya sea en cascadas o en lluvias artificiales en parques y jardines.

Los nidos pueden estar colgando o asentados en ramas, hojas, raíces, techos de grutas, hilos o alambres colgantes de construcciones. La hembra construye el nido, incuba y cría a los pichones.

El nido tiene forma de tacita, cono invertido o cilíndricos.

Emplea en la construcción Externamente trocitos de hojas o de, musgos.

Emplean en la construcción musgos, líquenes, detritus, tallos, cortezas de árboles, hojas secas, liados con telas de arañas. Internamente tapizado con materia algodonosa, pelos, cerdas, lanas, materiales vegetales suaves,

Ponen 2 huevos blancos.

Los pichones nacen con los ojos cerrados y escaso plumón.

Son aves muy agresivas, defienden tanto el territorio de alimentación como el de nidificación. Atacan a sus congéneres como a otras aves o a las personas.

Se alimentan del néctar de las flores, de pequeños insectos, arácnidos e invertebrados.

Frecuentan bosques, selvas, sabanas, montañas, serranías, parques, jardines, áreas urbanas.

Subfamilia: Florisuginae

PICAFLO DE NUCA BLANCA *Florisuga mellivora* (Linnaeus, 1758)

Observaciones

Ferroni et al. (2017). Delta del río Paraná.

PICAFLO NEGRO *Florisuga fusca* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Colibrí cola blanca. Picaflor blanquinegro.

DESCRIPCIÓN

Largo: 11-13 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 9 g; (H) 7 g

Coloración. Pico recto, negro.

Negro, excepto el lomo, supracaudales y cubiertas alares, que son verdes bronceadas. Flancos blanquecinos. Alas pardas verdosas. Las plumas centrales de la cola son negras, el resto blanco con punta negra.

Juvenil. Negro con ancha banda castaña a cada lado de la garganta. Plumas externas de la cola blancas.

COMPORTAMIENTO

Se alimenta de insectos y de néctar de flores.

HÁBITAT

Praderas arbustivas, matorrales, plantaciones, parques, orillas de selvas, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con plumas blancas en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) en Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución es una estrecha franja boscosa en el sureste de Brasil, este de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Fangauf en Narosky y Di Giacomo (1993); Gasparri et al. (2018); Narosky y Di Giacomo (1993); Restivo y Rego (2015); Savigny (2001c)

Corrientes

Citas: Chebez (1994)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), individuo macho visitando flores de un parquizado en Yapeyú, dpto. San Martín, el 29 junio de 2017.

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Chebez (1994); Narosky (1980); Raffo et al. (2008); Torrano (1987)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Klavins (2014); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1994, 1996a); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Saibene et al. (1996)

Santa Fe

Citas: Giraudo et al. (2008)

ERMITAÑO CANELA *Phaethornis pretrei* (Lesson y Delattre, 1839)

Otros nombres: Ermitaño frentinegra. Picaflor cola blanca garganta negra. Picaflor ermitaño chico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 14-15 cm.

Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 5,0 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 14 X= 5,1 (Rango: 4,5 a 5,8)

Coloración. Pico curvado. Mandíbula roja. Mide 3,3 cm.

Dorso verde bronceado más oscuro en la corona y rojizo en la rabadilla. Banda ocular oscura entre dos líneas blanquecinas amarillentas. Garganta ocrácea. Resto de la zona ventral ocráceo rojizo.

Alas pardas. Cola con las plumas centrales alargadas, con dos tercios verdes bronceados y el resto blanco. Las demás rectrices con un tercio en la base verde bronceado, seguido por una ancha banda negra y punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto está compuesto por 3 sílabas agudas y silbadas: Tsi.siepsiep..tsie.siepsiap.. tsiep.siapsiep, repetido insistentemente.

HÁBITAT

Orillas de selvas, selvas en galería, selvas, yungas, parques, entre los 400 y los 2100 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N			

El nido tenía forma más o menos cilíndrica. Construido con musgos, raicillas, tallos y algunas hojas secas liadas con telas de arañas. Internamente tapizado con materias algodonosas, inflorescencias.

Fraga et al. (1984). 15 km al oeste de Tartagal, en Sierra de Tartagal, dpto. Gral. San Martín, Salta, el 13-09-1983 se localizó un nido dentro de un caño de alcantarilla de chapa corrugada que atraviesa el camino. Colgaba de una raíz. Era una estructura cilíndrica de unos 15 cm de alto y 6 cm de diámetro. La cavidad o lecho tenía 3,5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad. Construido con musgos, detritus, tallos y algunas hojas secas. Internamente tapizado con materia algodonosa de color ocre acanelado. Contenía 2 pichones.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, setiembre de 1987, A. Caradonna, localizó un nido sin postura, debajo del alero en la ventana de una vivienda, a 1,20 m del suelo.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Angosto del Río Pescado, Parque Nacional Baritú, dpto. San Victoria, Salta, dos nidos, uno el 16-08-1992 en construcción en unas raíces que colgaban entre piedras y el otro el 19-08-1992, con 2 huevos, colgaba de dos raíces en una pared rocosa. El nido tenía forma más o menos cilíndrica de unos 18 cm de altura. En el extremo superior, presenta una cavidad de 3,5 cm de profundidad, 6 cm de diámetro externo y 3 cm en el interno. La parte superior revestida externamente con musgos verdes y raicillas muy finas, unidas con telarañas. El lecho acolchado con materiales de aspecto algodonoso e inflorescencias. El 23-08-1993 un nido sin postura colgaba de varias raíces que asomaban de una barranca a 60 cm del agua de un arroyo.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Di Giacomo y López Lanús (1998): 14,1 x 9,7 y 14,6 x 9,3

Pesos

Di Giacomo y López Lanús (1998): 0,7 y 0,7

PICHONES

Descripción

Fraga et al. (1984). Piel rosada, vainas de las plumas gris oscuro. Pico anaranjado

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico curvado. Mandíbula roja. Mancha oscura en la cara, bordeada por dos líneas claras. Plumas centrales de la cola alargadas. Ventral ocrácea rojiza.

Se diferencia del Ermitaño escamado por tener la mandíbula roja (no amarilla), la garganta sin negro y por ser ventralmente ocrácea rojizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phaethornis pretrei (Lesson y Delattre, 1839) en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución comprende: este de Brasil, este de Bolivia, este de Paraguay y extremo Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Bernasconi (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005); Nores y Yzurieta (1981); Straneck (1990f)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Castelino y Moreyra (1989)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (1998); Fraga et al. (1984); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Santiago del Estero

Citas: Caziani (1987)

ERMITAÑO ESCAMADO *Phaethornis eurynome* (Lesson, 1832)

Otros nombres: Ermitaño bayo. Ermitaño manchado. Mainumbí. Picaflor de cola blanca. Picaflor de pico curvo.

DESCRIPCIÓN

Largo: 14-16 cm.

Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 5,0 y 5,6 g

Capllonch et al. (2015b): N=1 (H) 5 g

Coloración. Pico curvado, negro. Base de la mandíbula amarilla. Mide 3,8 cm.

Dorso verde. Corona más oscura. Rabadilla y supracaudales con tono amarillo rojizo. Cejas superciliares amarillas canelas. Franja ocular negra. Garganta con plumas negras orilladas de blanco. Banda blanquecina desde la base del pico a los lados de la garganta.

Ventral gris clara con tinte ocráceo en el abdomen. Subcaudales amarillas canelas claras.

Alas pardas. Cola verde con franja subterminal oscura y punta blanca, color que disminuye hacia las plumas externas. Plumas centrales alargadas, blancas.

COMPORTAMIENTO

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto está compuesto por 4 sílabas agudas y silbadas: Tiutitilti...tiutitilti... repetido insistentemente.

HÁBITAT

Estrato bajo (sotobosques) y medio, orillas y claros de selvas, entre los 100 y los 2200 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Nido en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Tejo, L. C. (2018). Chacra Mariposa, Campo Ramón, dpto. Oberá, Misiones, 01-12-2018, nido. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Más información:

Schuchmann (1999); Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo, curvado. Mandíbula amarilla. Banda ocular oscura, bordeada por una línea superciliar y otra infraocular, claras. Las plumas centrales de la cola son largas, blancas.

Diferenciarlo del Ermitaño canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phaethornis eurynome paraguayensis M. Bertoni y W. Bertoni, 1901 en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phaethornis eurynome paraguayensis M. Bertoni y W. Bertoni, 1901

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capllonch et al. (2015b, 2018a); Chebez (1996a); Dabbene (1919a.); Gai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990g)

Subfamilia: Trochilinae

COLIBRÍ GRANDE *Colibri coruscans* (Gould, 1846)

Otros nombres: Colibrí verde mayor. Picaflor de cara azul. Picaflor de mejillas azuladas. Picaflor de vientre azul. Picaflor ventriazul.

DESCRIPCIÓN

Largo: 13-14 cm.

Peso: Contreras y Fernandez (1978): N= 1 (H) 7,2 g

Salvador (1988): N= 1 (H) 8,0 g

Capllonch et al. (2018a): N= 6 X= 8,83 (Rango: 6,5 a 12,0)

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Verde brillante. Barbilla, garganta, auriculares y centro del abdomen azules purpúreos. Cuello anterior y pecho con plumas con el centro oscuro, dando el aspecto de “escamado”.

Alas pardas. Plumaz centrales de la cola verdes azuladas, laterales verdes. Banda subterminal azul

COMPORTAMIENTO

Durante el cortejo realiza vuelos verticales, de varios metros de altura, emitiendo chillidos y silbidos fuertes para luego posarse en el mismo lugar donde inició el vuelo.

Alimentación

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis*, *Nicotinia glauca*, *Tristerix verticillatus*.

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva en los cerros entre los 1500 y los 2000 m de altura, yungas, parques, jardines, plantaciones. También subpáramos y páramos entre los 1700 y los 4500 m

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Catamarca.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N							N		

Adherido y semiapoyado a ramitas de arbustos o de árboles. A baja Altura

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita (semiesfera) de musgos y algunos líquenes.

Salvador y Narosky (1984). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, el 27-02-1983 se localizó un nido apoyado y adherido a una horqueta de un *Prosopis ferox* a 2,20 m del suelo. Tiene forma de semiesfera, construido con lana de oveja, por fuera cubierto de líquenes, unido con telas de araña. Mide 5 x 5,5 cm de diámetro externo, 4 cm en el interno, 3,5 cm de alto y 2 cm de profundidad. Tenía 2 pichones. El 02-03-1983 a 50 m del nido anterior se localizó otro en el mismo tipo de planta, a 3,40 m del suelo, sin postura.

De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-10-1999, nido en arbusto a 1,80 m con 2 pichones. Medidas: diámetro total: 6 cm, diámetro interno: 4 cm, profundidad: 2 cm, alto: 4 cm.

Salvador (2015). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, nido con 2 pichones.

Uranga en De la Peña (2016c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 12-02-2012, nido con 2 pichones.



Cuesta del Clavillo. Catamarca. 18-12-1999

PICHONES

Salvador (2015). Pichones de uno o dos días de nacidos. Ojos cerrados, piel dorsal de color carne violácea oscura, plumón pardo acanelado, en la zona ventral la piel es de color carne naranja.

Más información:

Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Verde con azul en la garganta, auriculares y abdomen. Cola con franja oscura subterminal. Se parece al Colibrí chico, pero es de mayor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Colibrí coruscans coruscans (Gould, 1846) en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Su área de distribución se halla en Sud América en Venezuela, Guyana y n Brasil y luego por el oeste en los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Bertelli et al. (1997); Carma (2009); De la Peña (2001a); Nores (1995)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Capllonch et al. (2018a); Hartert y Venturi (1909); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988, 2015); Salvador y Narosky (1984)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Rioja

Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Lobo Allende y Bortnyk (2018); Nores (1995); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza

Citas: Contreras y Fernández (1978); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, 05-12-1977; 29-11-1978)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i, 2020b)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b, 2018a, 2020); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Olrog (1952); Ortiz y Aráoz (2014)

COLIBRÍ MEDIANO *Colibri serrirostris* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Colibrí de vientre verde. Picaflor de penacho purpúreo. Picaflor de vientre verde.

DESCRIPCIÓN

Largo: 12-13 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 5,6-6,8 g

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Verde. Auriculares azules púrpuras. Violeta debajo de las mejillas. Manchita blanca detrás de los ojos. Subcaudales blancas.

Alas pardas. Cola verde azulada con franja oscura subterminal. Leve mancha blanca en la punta de las plumas externas.

El macho tiene el pecho con iridiscencia azul turquesa.

La hembra garganta menos brillante, el pecho escamado de blanco y la barra malar blanca más evidente que el macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Pagano et al. (2018). Néctar, insectos.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva, orillas de bosques y de selvas, sabanas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Pagano et al. (2018).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Mejillas y auriculares violetas. Subcaudales blancas. Banda oscura cerca de la punta de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Observado en Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución se halla en centro y sudeste de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Córdoba

Citas: Miatello et al. (2003); Salvador et al. (2017)

Corrientes

Citas: Contreras y Contreras (1984); Franzoy (2017b); Pagano et al. (2018)

Formosa

Citas: Moschione en Contreras et al. (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Moschione y Segovia (2005)

Misiones

Citas: Pagano et al. (2018); Pugnali (2002a)

Salta

Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Santa Fe

Citas: Giai (1950)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2015); Ortiz et al. (2018b); Pereyra (1927e)

PICAFLOR DE ANTIFAZ *Polytmus guainumbi* (Pallas, 1764)

Otros nombres: Picaflor de cola verde. Picaflor dorado.

DESCRIPCIÓN

Largo: 10-11 cm.

Peso: Short (1971): N= 1 (H) 6,4 g

Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, rojo con punta negra.

Macho. Dorso verde bronceado. Una línea ocrácea va por arriba y otra por debajo de los ojos. Banda auricular oscura. Ventral verde dorada. Centro del vientre blanco. Subcaudales blanquecinas.

Alas pardas. Cola verde con las barbas externas de las plumas exteriores blancas. Punta blanca.

Hembra. Partes dorsales semejantes al macho. Ventral ocrácea blanquecina con puntos verdes en la garganta y superior del pecho.

HÁBITAT

Orillas de selvas, sabanas, selva en galería, matorrales cerca de ríos, sotobosques en orillas de isletas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico ligeramente curvo. Coloración general verde con líneas blancas en la cabeza. Cola ancha, verde con blanco en la punta y en las plumas externas.

La hembra se parece a la del Picaflor lazulita, pero difieren en el color de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Polytmus guainumbi thaumantias (Linnaeus, 1766) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Se conocen 3 poblaciones (subespecies), dos de ellas en el N de Sud América en Colombia, Venezuela, Guayanas y N Brasil. La tercera que es la que consideramos en el parrafo siguiente esta unida a las del norte por una estrecha franja costera en **N de Brasil**.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Polytmus guainumbi thaumantias (Linnaeus, 1766)

Chaco

Citas: Bodrati (2005); Contreras et al. (1990b)

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1981b); Esteban (1947); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Pagano et al. (2018); Short (1971)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Rodriguez, L. en Chebez (2009); Rovira y Beltzer (1992)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); López Lanús (1997)

Misiones

Citas: Bodrati y Klavins (2014); Saibene et al. (1996)

Santa Fe

Citas: Baldo et al. (1995); Luna y Manassero (2008a)

Santiago del Estero

Citas: Luna y Manassero (2008a)

PICAFLOR PECHO NARANJA *Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Colibrí rubí. Picaflor rubí. Picaflor topacio.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-9 cm.

Peso: Schuchmann (1999): 4-5 g

Coloración. Macho. Frente, corona y nuca rojas. Dorso pardo oliváceo oscuro. Cola castaño rojiza con puntas negras. Línea malar oscura. Garganta y parte superior del pecho, naranjas. Vientre y subcaudales pardas rojizas. **Hembra.** Dorso verde cobrizo claro. Lados de la cabeza y parte ventral, grises. Plumas centrales de la cola verdes oliváceas, el resto grisáceo con banda subterminal negra, puntas blancas.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva, selva en galería, sabanas, jardines, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con corona roja y garganta y pecho naranjas. La hembra es confundible con la de otras especies.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) observado en Puerto Iguazú (Misiones).



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se distribuye en una amplia área de Sud América en la sabana que circunda Amazonia, en Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Bolivia, Paraguay, extremo Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Castillo y Florentín (2020); Chebez et al. (2004); Pugnali y Pearman (2001)

PICAFLOR VIENTRE NEGRO *Anthracothonax nigricollis* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Colibrí de cola violeta. Mainumbí. Picaflor de garganta negra. Picaflor violeta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 11-12 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 6,9 g, (H) 7,3 g

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Macho. Verde. Garganta, centro del pecho y vientre negros bordeados de azul.

Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes, las laterales púrpuras.

Hembra. Dorsal verde con tono azulado. Ventral blanca con banda longitudinal oscura desde la garganta al vientre. Rectrices centrales verdes, laterales rojizas en la base, franja subterminal negra y punta blanca.

HÁBITAT

Parques abiertos con arbustos y plantas ralas, plantaciones, orillas de selvas, bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

El macho ventralmente es negro orillado de azul. La hembra es ventralmente blanca con franja longitudinal oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco hasta el sureste de Entre Ríos. Observado en Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Extensa área de distribución desde Panamá a Argentina. Comprende: Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco

Citas: Bertonatti y Heinonen Fortabat (1988); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Herrera (1988)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), apariciones esporádicas en el Parque Nacional Chaco, hacia fines del invierno donde puede aparecer en números llamativos, como en agosto de 1998, cuando en la sabana del Estero Sanjuancito, quemada recientemente, la especie era común.

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Esteban (1953); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos

Citas: Areta et al. (2004); Contreras (1981b); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Narosky (1983); Narosky y Martelli (1995); Nores y Yzurieta (1981)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Dabbene (1910a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Militello y Chebez (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Pereyra (1950a)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

PICAFLOR RUBÍ *Sephanoides sephaniodes* (Lesson, 1827)

Otros nombres: Colibrí corona de fuego. Picaflor austral. Picaflor de cabeza granate. Picaflor de cabeza rubí. Picaflor de corona roja anaranjada. Picaflor galerita. Picaflor verde de corona roja. Pindá.

DESCRIPCIÓN

Largo: 10-11 cm.

Peso: Contreras (1975): N= 12 (M y H) X= 5,5 g (Rango: 4,4 a 6,3)

Coloración. Pico recto, negro.

Macho. Frente y corona rojas. Dorso verde bronceado. Manchita blanca detrás de los ojos. Ventral grisácea con pintas verdes bronceadas en la garganta y en el pecho.

Alas y cola verdes oscuras.

Hembra. Frente, corona y parte dorsal verdes. Menos manchada en la zona ventral que el macho

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1934). Dípteros (Platypezidae).

Fraga et al. (1997). Néctar de *Asteranthera ovata*, *Berberis* sp., *Campsidium valdivianum*, *Dasyphyllum diacanthoides*, *Desfontainia spinosa*, *Embothrium coccineum*, *Escallonia rubra*, *Fuchsia magellanica*, *Mitraria coccinea*, *Nicotiana glauca*, *Salix fragilis*, *Tristerix tetrandrus*.

Estades (2003). *Nothofagus dombeyi*.

Christie et al. (2004 Néctar). *Tristerix tetrandrus*. Insectos.

Devoto et al. (2006). *Embothrium coccineum*.

Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca*.

HÁBITAT

Matorrales húmedos, orillas de bosques, bosques abiertos, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Río Negro, Neuquén, Chubut.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Asentado y adherido a ramas. A baja altura.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción musgos.

Márquez (2001). Lago Queñi, Parque Nacional Lanín, dpto. Lacar, Neuquén, el 16-11-1997, se encontró un nido activo, aferrado a una caña colihue, a 1,70 m del suelo. Estaba construido con musgos. Contenía 2 huevos.

Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en árboles y arbustos.

Calvelo et al. (2006). Neuquén. Nido.

De la Peña (2013c). San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, Río Negro, 21-11-1998, en Caña Colihue, un nido a 1,60 m del suelo, 2 huevos. Medidas: diámetro total: 8 cm, diámetro interno: 5 cm, profundidad: 3,5 cm, alto: 7 cm.

M. Rumboll en Salvador (2016a). Puerto Blest, dpto. Bariloche, Río Negro, 19-11-1977, nido con 2 huevos. Isla Victoria, dpto. Los Lagos, Neuquén, 19 -12-1977, nido con 2 huevos.

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Parque Nacional Los Alerces, dpto. Futaleufú, Chubut, 11-11-1986, nido en un cañaveral, adherido al nudo de una caña (*Chusquea* sp.), a 1,7 m de altura, con 2 huevos frescos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Puerto Manzano, dpto. Los Lagos, Neuquén, 03-12-1986, nido en una caña, a 2,1 m de altura, con 2 pichones.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

De la Peña (2013c): 14,0 a 14,5 x 9,0 a 9,5 X= 14,2 x 9,2 (N= 2)

PICHONES

Descripción

Márquez (2001). A los 10 días de edad, tienen plumón colorido con líneas longitudinales negras y marrones, que tiende a tornarse con el tiempo marrón.

Generalidades

Márquez (2001). A los 22 días de nacer, los pichones abandonan el nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho rojo en la frente y en la corona. Pintas verdes en la parte ventral. Tener en cuenta el hábitat y la distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sephanoides sephaniodes (Lesson, 1827) por el oeste, desde San Juan y Mendoza a Tierra del Fuego. En invierno se desplaza hacia el este hasta Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Accidental en las islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Centro y sur de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Dabbene (1910); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1987a, 1994); Maugeri (2002a); Zotta (1934)

Chubut

Citas: Calvelo et al. (2006); Camperi (1998); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (2015); Vidoz (1995)

Córdoba

Citas: Micheluti en Yzurieta (1995); Salvador et al. (2017); Salvador et al. (2017); Straneck (1999a); Vergara Tabares (2016)

La Pampa

Citas: Serracín (1998)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2019); Fontana (1918); Harper en Pereyra (1950a); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (2005)

Neuquén

Citas: Calvelo et al. (2006); Contreras (1975); Christie et al. (1988, 2004); Daciuk (1978); Devoto et al. (2006); Fraga et al. (1997); Gorgoglione (2005); Márquez (2001); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Peters (1923b); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los lagos, 30-01-1976)

Río Negro

Citas: Calvelo et al. (2006); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977); De la Peña (2013c); Devoto et al. (2006); Fraga et al. (1997); Gelain (1984a, 2001, 2007b, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez et al. (2006); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Izasa y Lucero (2017); Lucero (2009, 2013i)

Santa Cruz

Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2005e); Stone (1928)

Santa Fe

Citas: Giarduz (2008)

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Reynolds en Olrog (1948)

Islas Malvinas

Citas : Woods (2006)

COQUETA VERDE *Lophornis chalybeus* (Temminck, 1821)

Otros nombres: Coqueta abanico puntiblanco. Picaflor de abanico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-8,5 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 3 g

Coloración. Pico recto, negro.

Macho. Frente verde. Cabeza oscura. Barbilla y línea hasta debajo de los ojos verdes oscuras. De las mejillas salen plumas alargadas verdes con punta blanca. Dorso verde. Banda blanca en la rabadilla. Garganta verde. Pecho y vientre grises violáceos. Flancos verdes.

Alas pardas verdosas. Cola verde purpúrea.

Hembra. Dorso verde. Banda en la rabadilla blanquecina. Garganta y barbillas blanquecinas. Resto de la zona ventral gris oscuro. Punta de las plumas externas de la cola gris.

Carece de plumas alargadas en las mejillas.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva en praderas y sabanas, plantaciones, parques, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con “abanico” de plumas en los costados de la cabeza y del cuello. Hembra con blanco en la garganta y en las mejillas. Ambos con banda blanca en la rabadilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Lophornis chalybeus chalybeus (Temminck, 1821) observado en el este de Buenos Aires, centro de Santa Fe, Formosa y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Presenta un área importante de distribución en el norte y en el oeste de Sud América: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Brasil. Tiene otra población en el sudeste de Brasil y áreas adyacentes de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lophornis chalybeus chalybeus (Temminck, 1821)

Buenos Aires

Citas: Olrog (1972)

Entre Ríos

Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Salvador y Salvador (1990)

Misiones

Citas: Heredia, J. en Chebez (2009); Nores e Yzurieta (1997); Salvador y Salvador (1990)

Santa Fe

Citas: De la Peña (1988c)

PICAFLOR YUNGUEÑO *Adelomyia melanogenys* (Fraser, 1840)

Otros nombres: Picaflor de garganta azul. Picaflor de garganta purpúrea. Picaflor de pecho purpúreo.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8,5-9 cm.

Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 3,5 g

Coloración. Pico corto, negro.

Dorsal verde bronceada brillante. Costados de la cabeza oscuros. Línea posocular blanquecina. Ventral ocrácea con puntos verdes en la garganta. Flancos verdosos.

Alas pardas verdosas. Plumas centrales de la cola verdes oliváceas, restantes grises en la base, violetas oscuras hacia el extremo. Punta ocrácea blanquecina.

HÁBITAT

Matorrales húmedos en orillas de selvas y yungas, entre los 500 y los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico corto. Ventral ocráceo con la garganta punteada de verde. Línea blanquecina y mancha oscura en los lados de la cabeza. Punta de la cola ocrácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Adelomyia melanogenys inornata (Gould, 1846) entre los 500 y los 3000 m de altura en Salta y Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. En la cordillera de los Andes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Adelomyia melanogenys inornata (Gould, 1846)

Jujuy

Citas: Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Miranda et al. (2010); Salvadori (1897)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Blendinger (1998); Camperi (1990); Gai (1947); Höy (1980b); Moschione et al. (2013); Navas (1968); Salvador y Di Giacomo (2014)

PICAFLOR COMETA *Sappho sparganurus* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí de cola larga. Picaflor coludo. Picaflor coludo rojo. Picaflor cometa de cola roja. Picaflor de cola larga. Picaflor zumbón. Pindá. Pinuda. Quenti. Rundún. Rumdún coludo. Run run. Safo. Tuminico. Tumuñico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19-22 cm. (macho); 12-15 cm. (hembra)

Peso: Fiora (1933): N= 1 5,5 g

Salvador (1988): N= 3 (M) X= 4,8 g (Rango: 4,2 a 5,2); N= 3 (H) X= 4,7 g (Rango: 4,2 a 5,0)

Salvador (2014a): N= 1 (M) 4,6 g; N= 3 (H) X= 4,7 g (Rango: 4,5 a 4,8)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 6 (M) X= 5,1 g (Rango: 4,3 a 5,4); N= 5 (H) X= 4,8 g (Rango: 4,4 a 5,0)

Capllonch et al. (2018a): N= 7 (M) X= 6,07 g (Rango: 5,0 a 7,0); N= 8 (H) X= 4,8 g (Rango: 4,0 a 6,0)

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Macho. Cabeza parda. Dorso rojizo. Garganta verde dorada brillante. Ventral verde. Subcaudales blancas. Alas pardas. Cola larga, roja anaranjada, con el extremo de las plumas negro.

Hembra. Dorso verde bronceado. Ventral gris blanquecina con pequeños puntos verdes. Cola corta, verde con las plumas externas blancas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Castellanos (1920a). Agua azucarada.
 Genise et al. (1993). Savia de *Aspidosperma quebracho-blanco*, *Prosopis flexuosa*.
 Montaldo (1995a). Néctar de *Aloe arborescens*, *Aloe vera*, *Callandria tweediei*, *Chaenomeles lagenaria*, *Dicliptera scutellata*, *Dolichandra cynanchoides*, *Eriobotrya japonica*, *Erythrina crista-galli*, *Eucalyptus cinerea*, *Jasminum mesnyi*, *Kalanchoe* sp., *Ligaria cuneifolia*, *Nicotiana glauca*, *Puya spathacea*, *Siphocampylus foliosus*.
 Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca*.
 De la Peña (2010d). Néctar de *Cestrum parqui*, *Dolichandra cynanchoides*, *Eucalyptus* sp., *Lycium cestroides*, *Nicotiana glauca*.
 De la Peña De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Jasminum mesnyi*.
 Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Nicotiana glauca*, *Psittacanthus cuneifolicus*. Arácnidos (arañas). Coleoptera, Diptera (Culicidae)
 Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*
 Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.
 Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un áspero y agudo Chechecheitchicheche...chechecheitchicheche..

HÁBITAT

Matorrales, bosques, quebradas, serranías y montañas hasta los 3000 m de altura, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Colgante de ramas, helechos o raíces, en barrancas, salientes rocosas o grietas, en grutas, rocas o barrancas de tierra, o alambres. A mediana y baja altura o altos.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita o cono invertido. Emplea en la construcción musgos, fibras vegetales, líquenes, lanas y materiales vegetales suaves interna y externamente, liados con telas de arañas.

Hartert y Venturi (1909). Dinelli localizó un nido con 2 pichones.

Pozzi (1922). Tucumán, L. Dinelli, encontró en marzo, un nido, P. Girard, en el cerro de Tafí, en noviembre nido con huevos y E. Budin recogió varis nidos.

Castellanos (1932). Córdoba. Nido.

Pereyra (1938a). Capilla del Monte, cerro Uritorco, dpto. Punilla, Córdoba, 12 de enero nido sin postura.

Pereyra (1950a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, nidifica en la zona.

Contino (1975). Sierras de Santa Bárbara, dpto. Santa Bárbara, Jujuy, los estudios se realizaron en noviembre de 1967, marzo y noviembre de 1968 y en marzo de 1969, se localizaron 21 nidos.

Contino (1980). Nidifica en la selva alrededor de los 2.000 m entre los meses de noviembre y febrero. Emplea musgos, líquenes y telas de arañas. Pone 2 huevos blancos.

Salvador y Salvador (1988). Córdoba. Nido.

Nellar Ramonella (1993). En San Luis nidifica en lugares ocultos y sombríos.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en aleros de piedra, grutas en proximidades de arroyos, en las quebradas, hasta 1.990-2.000 m.

Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.

Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, se hallaron 21 nidos entre 1986 y 2006.

De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 2 nidos, 06-12-1977 y 30-11-1978, ambos con 2 huevos, Copina, dpto. Punilla, Córdoba, 2 nidos, 14-11-1980 y 25-11-1990, ambos en construcción, Ascochinga (al oeste), dpto. Colón, Córdoba, 17-12-1981, 3 nidos, uno con un huevo y 2 con 2 huevos cada uno, Aconquija,

dpto. Andalgalá, Catamarca, 09-01-1999, nido con 2 huevos. Los nidos estaban atados a helechos colgantes o a raíces en barrancas, desde 1,60 a 5,0 m del suelo. Medidas: diámetro total, de 3,5 a 5 cm, diámetro interno, de 2,5 a 3 cm, profundidad, de 2,5 a 3,5 cm, alto, de 4,5 a 5 cm.

Salvador y Bodrati (2013a). Salta. Nido.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, un nido con 2 huevos.

Pérez, E. M. (2014c). Villavicencio, Mendoza, 02-01-2014, nido.

Uranga en De la Peña (2016c). Yavi, dpto. Yavi, Jujuy, 26-01-2016, nido con huevos.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis. Nidos.

Rumboll en De la Peña (2016c). La Cumbre, dpto. Punilla, Córdoba, 29-10-1972, nido colgando de un alambre del techo de un gallinero, con 2 huevos.

Straneck en De la Peña (2016c). Cerro Áspero, dpto. Calamuchita, Córdoba, 27-11-1974, nido en una cantera abandonada, a 1,75 m de altura, con 2 pichones. Villa Gral. Belgrano, dpto. Calamuchita, Córdoba, 14-01-1977, nido en una barranca, a 2,5 m de altura, con 2 huevos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 16 nidos, entre setiembre y febrero, en aleros o concavidades de barrancas de tierra, colgando de raíces, enredaderas o claveles del aire, entre 1,8 y 4,5 m de altura, con 2 huevos o 2 pichones.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Torres et al. (2019). Reserva Cerro del Cóndor, dpto. Pocho, Córdoba, nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Pozzi (1922): 15,0 x 9,0 y 15,0 x 9,5

Contino (1975): 14,0 x 9,0

De la Peña (2013c): 13,8 a 15,3 x 8,9 a 9,5

X= 14,4 x 9,1 (N= 9)

Salvador y Salvador (2012): 13,7 a 14,8 x 9,0 a 9,8

X= 14,2 x 9,3 (N= 20)

Pesos

Contino (1975): 0,65

Salvador y Salvador (2012): 0,6 a 0,8

X= 0,7 (N= 16)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,028 a 0,036

X 0,030 (N= 9)

PICHONES

Descripción

Salvador y Salvador (2012). Los pichones al nacer tienen los ojos cerrados. La piel en la zona ventral está desnuda y es de color carne naranja, en el dorso es negruzco con algo de brillo y con plumón ralo de color acanelado o castaño lavado. Pico amarillento.

Cuatro pichones a punto de dejar el nido pesaban entre 4,2 y 4,4 gr.

Generalidades

Contino (1975). El período de incubación es de 19 a 20 días. Los pichones permanecen en el nido 31 a 32 días.

Más información:


Capllonch et al. (2018a); Contino (1975)

Otros

Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.



Ascochinga. Córdoba. 14-11-2005



Jesús María. Córdoba. 01-06-2014

Jesús María. Córdoba. 01-06-2014



Valle Encantado. Salta. 30-11-1978

Valle Encantado. Salta. 30-11-1978



Jesús María. Córdoba. 16-09-2006. Libando



Jesús María. Córdoba. 01-06-2014

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

El macho por su larga cola. La hembra por el tamaño relativamente grande y la cola corta con las plumas externas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sappho sparganurus sappho (Lesson, 1829) hasta los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén. Ocasionalmente en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se encuentra en la ladera este de los Andes de Bolivia y Argentina hasta los 3.000 metros de altura. Además en Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sappho sparganurus sappho (Lesson, 1829)

Buenos Aires

Citas: Barrios et al. (1992); Pereyra (1937a, 1938b)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Agua de las Palomas, dpto. Andalgalá, 11-03-1981)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Deluis y Hammerschmidt (1953); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Montaldo (1995); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Partridge (1953c); Salvador y Salvador (1988, 2012); Sclater y Hudson (1889); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000; Jesús María, dpto. Colón, 13-10-2006)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Contino (1975); Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Mamaní et al. (2018); Montaldo (2014); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Pampa

Citas: Willianson (1971)

La Rioja

Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Lobo Allende y Bortnyk (2018); Pereyra (1923a); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (2013f); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Neuquén

Citas: Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979); Pereyra (1945, 1950); Veiga et al. (2005)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2009, 2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe

Citas: Gai (1950); Giarduz (2008)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2018a); Coria y Heredia (2012); Coria et al. (2017); Nores y Yzurieta (1981); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016);

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán (2000); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán (2005); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b, 2018a, 2020); Echevarría et al. (2008a); Fanjul y Echevarría (2015); Gianini (2000); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero, M. M. (1983); Lucero et al. (2002); Juri y Chani (2005); Malizia et al. (1998); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Vides Almonacid (1991, 1993)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLOR PUNEÑO *Oreotrochilus estella* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Picaflor de vientre castaño. Picaflor serrano. Picaflor serrano grande. Picaflor serrano de vientre castaño. Picaflor serrano ventricanela.

DESCRIPCIÓN

Largo: 13-15 cm.

Peso: Salvador (1990a): N= 1 (H) 6,6 g

Capllonch et al. (2018a): N= 1 (?) 7 g

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro. Patas negras. Iris pardo.

Macho. Dorso pardo verdoso. Garganta y cuello anterior verdes con borde inferior negro. Ventral blanca con línea rojiza en el pecho y abdomen.

Alas pardas. Plumas centrales de la cola verdes, externas blancas.

Hembra. Dorso pardo verdoso. Ventral grisácea. Garganta blanquecina con pequeñas manchitas verdes grisáceas.

Alas pardas. Las plumas centrales de la cola son verdes, las siguientes con punta blanca y las más externas blancas.

HÁBITAT

Zonas arbustivas rocosas entre los 3200 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).

En invierno a niveles más bajos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Colgante del techo de grutas. A baja altura.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, musgos y líquenes, liados con telas de arañas. Internamente plumas.

Salvador (1992). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 3 nidos, todos adheridos al mismo techo metálico bajo un puente sobre un arroyo. El 23-12-1983, sin postura. El 22-06-1985, hembra con dos pichones momificados y un huevo. Nido elaborado con elementos vegetales algodonosos y la parte interior con plumas. Mide 13 cm de alto, 8 cm de diámetro externo, 4,5 cm de diámetro interno y 3,5 cm de profundidad. El tercer nido el 06-12-1987, tenía 2 pichones. La altura desde el suelo era de 5 m, 5,5 m y 4,5 m para cada nido.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 2 pichones. El nido se hallaba en una barranca de tierra sobre un arroyo, a 4 m de altura en un alero natural de 30 cm, a 17 cm del techo y adherido a raíces expuestas, semiesfera profunda elaborada en su totalidad con lana de oveja blanca y marrón, con un diámetro externo de 7 cm, diámetro interno 4,5 cm, altura 8 cm y 3 cm de profundidad.

De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 06-12-1977 y 30-11-1978 nidos sin postura, a 1,50 m del suelo, colgaban del techo de una gruta. Medidas: diámetro total, 7 a 9,5 cm, diámetro interno, 4 cm, profundidad, 3 cm, alto, 7 cm.

Bodrati en Salvador (2016a). San Juan. Nido.

Uranga en De la Peña (2016c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 06-02-2018. Nido en un túnel artificial, por el cual circulaba algo de agua, colgado del techo de este. Tenía 2 pichones.

Huevos

Pone 2 huevos, blancos.

Medidas

Salvador (1992): 16,9 x 10,5

PICHONES

Descripción

Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b). Nacen con los ojos cerrados, la piel en lo dorsal es color córneo oscuro con plumón acanelado, la piel en lo ventral es color carne naranja.

Más información:

Johnson (2012); Capllonch et al. (2018a)



Azul Pampa. Jujuy. 06-02-2018. Fotos: Màximo Uranga



Valle Encantado. Salta. 30-11-1978

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Ventralmente blanco con una línea rojiza en el pecho y abdomen en el macho. La hembra es parda y grisácea con blanco en la cola.

Diferenciar a la hembra de la del Picaflor andino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Oreotrochilus estella estella (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 3800 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En invierno baja hasta los 2000 metros.

Observado en Mendoza.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Hasta los 5000 metros de altura en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Oreotrochilus estella estella (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Catamarca

Citas: Capllonch et al. (2018a); Carma (2009); Nores (1995); Salvador (1990a)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Capllonch et al. (2018a); Chebez et al. (1998); Mamaní et al. (2018); Salvador (2015)

La Rioja

Citas: Chebez (2005b)

Mendoza

Citas: Godoy y Campoy (2003)

Salta

Citas: De la Peña (2013c); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan

Citas: Fava et al. (2012, 2012a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2016)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b, 2018a, 2020); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Salvador (1992)

PICAFLOR ANDINO *Oreotrochilus leucopleurus* (Gould, 1847)

Otros nombres: Picaflor de vientre azul negruzco. Picaflor de vientre fuliginoso. Picaflor serrano. Picaflor serrano chico. Picaflor serrano de vientre negruzco. Picaflor serrano ventinegro.

DESCRIPCIÓN

Largo: 13-15 cm.

Peso: Navas (1968): N= 2 (M) 6,8 y 7,3 g; N= 3 (H) X= 7,1 g (Rango: 6,9 a 7,2)

Capllonch et al. (2018a): N= 14 X= 7 g (Rango: 6,0 a 8,0)

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Macho. Dorso pardo. Garganta y cuello anterior verdes, bordeados hacia abajo por una línea negra. Pecho y abdomen blancos con una línea central negra.

Alas pardas verdosas. Plumas centrales de la cola pardas verdosas, laterales blancas.

Hembra. Ventral grisácea. Garganta blanca con puntos verdes. Cola verde con punta blanca en las plumas más externas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

González Gómez et al. (2004). Néctar de *Puya coerulea*.

Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca*.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis*. *Nicotiana glauca*.

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

HÁBITAT

Zonas arbustivas áridas y rocosas entre los 1000 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).

En invierno a niveles más bajos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción musgos, fibras vegetales, líquenes, lanas, pelos y materiales vegetales suaves internamente.

Navas (1965c). Río Ñirihuau, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, nido adherido a una pared rocosa del cajón del río, en febrero de 1957.

Bodrati et al. (2003). Pampa de los Pozos, Parque Nacional El Leoncito, dpto. Calingasta, San Juan, 15-01-1999, se localizaron 5 nidos (2 activos y 3 inactivos). Los nidos estaban ubicados en lugares ocultos y protegidos, pegados a la irregular pared rocosa, a pocos centímetros del techo y en lugares con luz natural tenue. Estaban contruidos con pelos de guanaco (*Lama guanicoe*), con pocas y finas fibras de gramíneas e inflorescencias de coirón. El interior tapizado con plumas. Los dos nidos activos tenían 2 huevos cada uno y miden: uno 7,9 de alto, 4,2 cm de profundidad, 5,8 de diámetro externo y 4,8 cm en el interno, el otro 10,3 de alto, 3,6 cm de profundidad, 7,0 de diámetro externo y 3,78 cm en el interno.

Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en paredes rocosas.

Calvelo et al. (2006). Neuquén, Chubut. Nidos.

Uranga en De la Peña (2019b). Laguna del Diamante, dpto. San Carlos, Mendoza, 22-12-2017. Nido en una hendidura de una pared vertical de piedra, a 12 m del suelo, 2 pichones.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Bodrati et al. (2003): 15,0 a 16,0 x 10,0 X= 15,5 x 10,0 (N= 4)

Más información:

Bodrati et al. (2003); Capllonch et al. (2018a)



Laguna del Diamante. Mendoza. 22-12-2017. Fotos: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico curvo. Ventral blanca con una mancha oscura en el pecho y abdomen en el macho.

La hembra se parece a la hembra del Picaflor puneño pero difieren en el color de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Oreotrochilus leucopleurus (Gould, 1847) entre los 1000 y los 4000 metros de altura, desde Jujuy y Salta hasta Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Presenta un área de distribución que se extiende desde el sur de Bolivia al sur de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009); Nores (1995); White (1882)

Chubut

Citas: Calvelo et al. (2006); Kovacs et al. (2005); Navas (1965c, 1968)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Rioja

Citas: Dabbene (1910); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b); Nores (1995)

Mendoza

Citas: Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Gosse (1899); Hellmayr (1932); Navas (1965c.); Olivera et al. (2009); Oates y Reid (1903); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Neuquén

Citas: Babarskas et al. (1996); Calvelo et al. (2006); Casares (1938); Contreras (1977b); Christie et al. (1988); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (1997); Matarasso (2007); Navas (1965c, 1978); Olrog (1963, 1979); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Kovacs et al. (2005); Navas (1965c, 1968); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan

Citas: Bodrati et al. (2003); Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas (1968, 1995); Olrog (1962,1963) ; Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz

Citas: Chebez et al. (1988); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2005e); Mazar Barnett (2001); Navas (1965c); Serret y Jonson (1986.)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b, 2018a, 2020); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navas (1965c); Nores (1995); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

PICAFLORES ANDINO CASTAÑO *Oreotrochilus adela* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

DESCRIPCIÓN

Largo: 11-13 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 7,45 g; (H) 8,3 g

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Macho. Dorso pardo grisáceo, bronceado. Garganta y lados del cuello verdes brillantes. Ventral castaña con negro en la parte central (pecho y abdomen).

Cola azul oscura con rojizo en las plumas externas.

Hembra. Garganta blanca con puntos grises. Pecho y abdomen rojizos.

Cola con punta blanca.

HÁBITAT

Zonas semiáridas o temporalmente húmedas, entre los 2600 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Tacita de fibras vegetales, lanas, forrado externamente con líquenes y musgos.

Areta et al. (2006). Yavi, dpto. Yavi, Jujuy, 08-10-2003, nido en construcción a unos 5,5 m del suelo, en una concavidad de la pared. Estaba apoyado sobre una plataforma de piedra. Forrado externamente por líquenes y musgos, de aproximadamente 7 cm de alto y 5 cm de diámetro. El 17-11-2033, se localizó otro nido a 4,50 m del suelo en la pared de una concavidad en el techo de una cueva amplia. El nido con forma de taza alargada, estaba adherido a una estructura de fibras vegetales, la que a su vez se fijaba a la pared rocosa vertical, sin estar apoyada encima de las rocas. Los materiales parecían ser principalmente lana de oveja y fibras vegetales. Medía unos 13-15 cm de alto y 8-10 cm de ancho, contando la estructura sobre la que aseguraba el nido.

Mamaní et al. (2018). Yavi, dpto. Yavi, Jujuy. Nidos con huevos y con pichones. En setiembre y enero.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Ventral castaña con negro en el pecho y abdomen.

Hembra con pecho y abdomen rojizos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Oreotrochilus adela (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Especie de los altos Andes llegando hasta los 4.000 metros en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy

Citas: Alvarez y Blendinger (1995); Areta et al. (2006); Burgos et al. (2009); Mamaní et al. (2018); Mazar Barnett et al. (1998a); Wayar y Segura (2014)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

PICAFLOR FRENTE AZUL *Eriocnemis glaucopoides* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Picaflor de cabeza violácea. Picaflor de frente violácea.

DESCRIPCIÓN

Largo: 9-11 cm.

Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 4,5 g; N= 1 (?) 4,0 g

Capllonch et al. (2018a): N= 3 X= 4 g

Coloración. Pico negro, recto.

Macho. Verde. Frente y anterior de la corona, vientre y subcaudales azules. Muslos blancos. Alas pardas. Cola furcada, negro azulada.

Hembra. Se parece al macho, pero tiene solamente azul en las subcaudales. Ventral acanelada.

HÁBITAT

Matorrales, orillas de selvas, yungas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con azul en la cabeza y en el vientre. Ambos sexos con la cola azulada y blanco en los muslos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Eriocnemis glaucopoides (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 1000 y los 2700 metros de altura en Jujuy, Salta y Tucumán.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monoítica. Cordillera de los Andes en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Moschione (2005p)

Jujuy

Citas: Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Capllonch et al. (2018a); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja

Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Capllonch et al. (2011b, 2018a); Esteban (1953); Handford (1983); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1993)

PICAFLORES GIGANTE *Patagonas gigas* (Vieillot, 1824)

Otros nombres: Colibrí gigante. Colibrí gigante andino. Colibrí grande. Pingara. Quenti. Tuminico grande. Tumínico grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 21-22 cm.

Peso: Contreras (1978): N= 1 (M) 24 g; N= 1 (H) 21,5 g

Capllonch et al. (2018a): N= 1 22 g

Coloración. Pico recto, negro.

Dorso pardo verdoso. La rabadilla es blanquecina. Ventral ocrácea rojiza. Subcaudales blancas.

Alas pardas. Cola parda verdosa.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

González Gómez et al. (2004). Néctar de *Puya berteroniana*, *Puya coerulea*.

Schlumpberger y Badano (2005). Néctar de *Echinopsis atacamensis*.

Speziale y Lambertucci (2009). Néctar de *Kniphofia uvaria*.

Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca*.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis*, *Nicotiana glauca*.

HÁBITAT

Zonas arbustivas áridas, preferentemente con cactáceas, entre los 1000 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Catamarca, Mendoza.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Asentado en tirante de construcción. A baja altura.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Reed (1919). Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 25-11-1918, nido en un arbusto espinoso, a 2 m del suelo. Construido con pelos y lanas y algunas pajitas. Mide 10 cm de diámetro y 6 cm de alto. La parte interna 4 cm de diámetro y 1,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.

Spegazzini (1920). Cerro Jiménez, Mendoza, en enero de 1896 y en Potrerillos, dpto. Luján de Cuyo, Mendoza, en 1909. El nido tiene forma cónica, construido con materiales herbáceos entretejidos con cerdas de caballos al exterior y rellena la cavidad con vilano. Nidos con un huevo.

Contreras (1978a). Río Gualcamayo, Mendoza, nido abandonado, en febrero, en un Sauce.

Uranga en De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 08-02-2001, nido en un tirante en una construcción, a 2,50 m del suelo, 2 pichones. Medidas: diámetro total: 9 cm, diámetro interno: 4 cm, profundidad: 2 cm, alto: 2 cm.

Salvador (2015). Purmamarca, dpto. Tumbaya, Jujuy, 24-02-2007, nido en un Cardón (*Echinopsis atacamensis*) a 2,80 m del suelo, con un pichón.

Salvador et al. (2016a). Catamarca. Nido.

Puca en De la Peña (2016c). Cerro El Huancar, dpto. Cochinoca, Jujuy, 8-12-2015, nido construido con lana de oveja y pelos de llama. Tenía un pichón.

Huevos

Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas

Reed (1919): 20,0 x 16,0



Foto: Teófilo M. Puca. Cerro El Huancar. Jujuy.

Más información:

Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Pardo con rojizo en la zona ventral y rabadilla blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagonas gigas peruviana Boucard, 1893 entre los 2000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y norte de Catamarca. *Patagonas gigas gigas* (Vieillot, 1824) entre los 1000 y los 3000 m de altura, desde el suroeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Observado además en el este de Buenos Aires y en Sierras de Córdoba.

**SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN**

Dos subespecies. En la cordillera de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y oeste de Argentina entre los 1.000 y 4.000 metros de altura.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagonas gigas peruviana Boucard, 1893

Catamarca

Citas: Salvador et al. (2016a)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Capllonch et al. (2018a); Colina et al. (2016); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Mamaní et al. (2018); Salvador (2015)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Cuesta del Obispo, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Capllonch (2007a, 2018a, 2020); Lucero (1983)

Patagonas gigas gigas (Vieillot, 1824)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Cabré et al. (2008); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1986, 1994); García y Paterlini (2016a); Mouchard (1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008); Spegazzini (1920)

Catamarca

Citas: Carma (2009); Hartert y Venturi (1909); Nores (1995); Salvador et al. (2016a); White (1882)

Chubut

Citas: Kovacs et al. (2005)

Córdoba

Citas: Giraudo et al. (2013a); von Wehrden (2008)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Colina et al. (2016)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895b); Nores (1995); Zotta (1937a)

Mendoza

Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1978a); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Olivera et al. (2009); Reed (1916, 1919); Roig (1965); Spegazzini (1920, 1929)

Neuquén

Citas: Babarskas et al. (1996); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Christie et al. (2004); Fierro en Gelain et al. (2003); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Povedano (2016); Speziale y Lambertucci (2009)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan

Citas: Camperi y Darrieu (2004); Contreras (1978a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2009, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Tucumán

Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Nores (1995)

PICAFLOP PICUDO *Heliomaster longirostris* (Audebert & Vieillot, 1801)

Otro nombre: Picaflor estrella.

DESCRIPCIÓN

Largo: 12 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 7,1 g; (H) 6,5 g

Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.

Macho. Corona azul verdosa. Mancha blanca detrás de los ojos. Línea blanca en las mejillas. Barbilla negra. Garganta roja violácea brillante. Dorsal bronceado. Ventral grisácea bronceada. Subcaudales con puntos blancos. Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes azuladas, las externas con puntas blancas.

Hembra. Semejante al macho pero con la corona verde y con las plumas de la garganta orilladas de blanco.

HÁBITAT

Matorrales, montes, orillas de bosques y de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo. Punto blanco detrás de los ojos y línea de igual color por debajo de los mismos. Garganta roja, corona azul en el macho. En la hembra corona verde y garganta oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Helimaster longirostris longirostris (Audebert & Vieillot, 1801) en Chaco, Formosa y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Amplio Rango: de distribución en Centro América y Sud América desde Méjico a Brasil. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, ocasional en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Helimaster longirostris longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)

Chaco

Citas: Bishels y Moschione (2005); Moschione y Bishels (2004)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones

Citas: Chebez et al. (2004)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

Aclaración sobre la cita de esta especie en Santa Fe.

En noviembre de 1976 se halló nidificando en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe un picaflor cuya hembra tenía una visible mancha oscura en la garganta. En esa oportunidad fue consultado el Dr. Ch. Olrog, quien lo toma, al parecer como *Heliomaster squamosus* (Olrog, 1979).

Con posterioridad la foto fue enviada a un Museo de Estados Unidos y se lo identifica como *Heliomaster longirostris*.

Luego de este nido se localizaron dos más con hembras con una mancha en la garganta. En este caso fue consultado el Dr. Karl Schuchmann, (de Alemania) el que determina que algunas hembras muy adultas de *Heliomaster furcifer* tienen una mancha en la garganta. Por este motivo se descarta la presencia de la especie en la provincia de Santa Fe.

PICAFLOR GARGANTA ESCAMADA *Heliomaster squamosus* (Temminck, 1823)

DESCRIPCIÓN

Largo: 10-12 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 5 g; (H) 6,5 g

Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.

Macho. Corona azul-verdosa brillante. Dorso verde bronceado oscuro. Garganta rojiza purpúrea brillante. Ventral verde. Línea blanca en el centro del pecho y vientre.

Alas pardas. Cola verde, furcada.

En el período de reposo sexual la garganta es moteada de violáceo oscuro.

Hembra. Punto blanco detrás de los ojos. Garganta blanquecina, con escamado pardo. Dorso verde bronceado. Ventral gris pálida. Flancos verdosos. Cola verde con banda subterminal negra-azulada y ápices blancos. Puntos blancos a los lados del cuerpo.

HÁBITAT

Sabanas, matorrales, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo. El macho tiene la garganta rojiza y línea ventral blanca. Cola larga, furcada. La hembra es ventralmente gris con punto blanco detrás de los ojos. Garganta escamada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) en Misiones y Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Área reducida en el sureste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Entre Ríos

Citas: Puente et al. (2020)

Formosa

Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones

Citas: Castillo y Chebez (2009)

PICAFLORES DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Dominicó. Mainumbí-yetapá. Picaflor azul. Picaflor azul garganta roja. Picaflor azulado. Picaflor barbijo granate. Picaflor banco debaxo. Picaflor cola de tixera. Picaflor de barba colorada. Picaflor de garganta colorada. Picaflor de garganta rojiza.

DESCRIPCIÓN

Largo: 12,5-13 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 1 5,5 g

Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 6,0 g; N= 2 (H) X= 6,1 g (Rango: 5,8 a 6,4 g)

Salvador (2014a): N= 2 (M) 5,4 y 5,9 g; N= 2 (H) 5,1 y 5,8 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 5,5 g

Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 5,5 g

Capllonch et al. (2018a): N= 10 X= 5,71 (Rango: 5,0 a 6,5)

Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.

Macho. Corona verde brillante. Dorso verde bronceado. Garganta rojiza violeta brillante. Plumas alargadas a los costados del cuello azules metálicas. Ventral azul violáceo.

Alas pardas. Cola verde azulada, furcada.

Hembra. Punto blanco detrás de los ojos. Cabeza pardusca. Dorso verde bronceado. Ventral gris pálida. Cola negruzca y verde, más corta que la del macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Pereyra (1923b). Agua azucarada.

De la Peña (2010d). Néctar de *Canna indica*, *Ipomoea carnea*, *Ipomoea indica*, *Lycium cestroides*, *Nicotiana glauca*, *Pithecoctenium cynanchoides*. Arañas. Mosquitos.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Néctar *Tecoma capensis*.

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite un agudo y claro Tsíi...tsíi...tsíi...

HÁBITAT

Sabanas, matorrales, montes, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Asentado en ramas de árboles. A mediana y baja Altura y altos.

Expuesto. Elaborado. Tacita de fibras vegetales suaves, lana, barba de viejo. Liados con tela de arañas. Recubierto externamente con líquenes.

Barrows, W. (1884a). Concepción del Uruguay, Entre Ríos, noviembre, nido con 2 huevos.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Atahona, dpto. Simoca, Tucumán, 18 -10-1929, nido con 2 huevos.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.

Contino (1980). Nidifica en el mes de diciembre en dpto. Rivadavia, Salta.

Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre setiembre y noviembre. Se localizaron 10 nidos, entre los 4,5 y 10 m del suelo.

De la Peña (2013c). Entre 10-10-1975 y 13-12-2012, se localizaron 37 nidos, 4 en Morteros, dpto. San Justo, Córdoba y el resto en la provincia de Santa Fe. Medidas: diámetro total, de 4,5 a 5 cm, diámetro interno, de 3,5 a 4 cm, profundidad, de 1,5 a 2 cm, alto, de 3 a 3,5 cm. Altura desde el suelo: nido más bajo a 1,80 m, nido más alto a 8,00 m.

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 2 huevos.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Santiago del estero. Nido.

Salvador en Salvador (2016a). Corrientes. Nido.

Wilson en Salvador (2016a). Mercedes, Corrientes, 12 oct. 1972, nido en algarrobo a 2 m de altura, con 2 huevos.

Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Cerro Colorado, dpto. Sobremonte, Córdoba, hallaron 2 nidos, uno con 2 huevos y otro con 2 pichones, el 29-10-1974.

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c). Icho Cruz, dpto. Punilla, Córdoba, 01-12- 1983, nido en un arbusto a 4 m de altura, con 2 huevos.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 14,0 a 14,5 x 8,5 a 9,5

Di Giacomo (2005h): 14,4 a 14,6 x 9,2 a 9,3

X= 14,5 x 9,2 (N= 2)

De la Peña (2013c): 14,5 a 15,5 x 9 a 9,4

X= 14,8 x 9,2 (N= 4)

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 14,4 a 15,0 x 9,4 a 9,5

X= 14,7 x 9,4 (N= 2)

Pesos

Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c):

X= 0,7 (N= 2)

Di Giacomo (2005h):

X= 0,5 (N= 2)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,037 a 0,047

X= 0,042 (N= 2)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Plumón gris. Dos líneas en dorsal.

5 días. Ojos semiabiertos (por momentos). Dos líneas, en dorsal de plumón. Activo.

7 días. Ojos cerrados. Pico pardo oscuro. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillentos.

Plumón gris. Flancos blanquecinos.

10 días. Plumas blanquecinas en los lados del cuerpo.

13 días. Plumas ventralmente. Dorsalmente pardo oscuras con punta ocrácea.

15 días. Plumas tornasoladas. Blanquecinas en la garganta. Láminas oscuras. Cañones alares claros.

18 días. Ventralmente blanquecino. Dorsalmente verdoso con la punta de las plumas ocráceas. Jaspeado.

Desde los 8 días se le notan dos abultamientos a los lados del cuello, que los inflan.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas									
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0.2	0.4	0.7							1.0-1.1

2	0,3	0,5	0,8							1,1-1,3
3	0,3	0,5	0,8							1,3-1,5
4	0,4	0,5	0,8							1,6-1,8
5	0,4	0,5	0,8							1,9-2,2
6	0,5	0,5	0,9							2,3-2,6
7	0,5	0,5	1,0							2,7-3,3
8	0,6	0,5	1,1							3,4-3,6
9	0,6	0,5	1,1							3,7
10	0,6	0,5	1,1	0,1		0,1				3,8
11	0,9	0,5	1,1	0,2						3,8
12	1,2	0,6	1,2	0,3						3,8
13	1,2	0,6	1,2	0,4						4,1-4,3
14	1,2	0,6	1,2	0,5						4,5-5,0
15	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2		5,8-5,9
16	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,6	0,2	0,3		5,9
17	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,7	0,2	0,4		5,9
18	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,8	0,2	0,4		5,9
19	1,2	0,6	1,2	0,8	0,4	0,8	0,2	0,5	0,1	5,9

Observaciones

La hembra construye el nido. Busca telas y trocitos de corteza de chañar, desde 3 m. hasta 30 m. Aletea sobre los troncos y arranca los líquenes. Internamente puede colocar Barba de viejo (*Clematis* sp.). Moldea el nido con el cuerpo.

En el nido localizado el 15-10-98 en Esperanza, a los 11 días de volar los pichones, fue utilizado nuevamente, posiblemente por la misma hembra, criando dos pichones.

No es común la observación de los machos, pero están en las proximidades de los nidos.

Se levanta del nido y corre a todas las aves que pasan cerca. Corrió a un Benteveo hasta 30 m., también a otras aves.

Deja el nido durante mucho tiempo, cuando tiene pichones, pero anda en las proximidades.

Se observó a un macho comiendo arañitas y una hembra comía las arañitas de la tela que rodeaba un nido de *Camptostoma obsoletum*.

Dos días después de dejar el nido, la madre los sigue alimentando y durante varios días permanecen juntos.

Puede ocupar el mismo nido, durante la misma temporada o al año siguiente si está en condiciones.

Las hembras viejas tienen una mancha oscura en la garganta.

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 10-17 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 17 días. Permanencia de los pichones en el nido, 26-27 días

Más información:

Capllonch et al. (2018a); De la Peña (2019a)

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Depredadores

De adultos: *Accipiter striatus* en Córdoba, Carmona en Salvador (2017a), *Glaucidium brasilianum* en Chaco, Bodrati en Salvador (2017)



Esperanza. Santa Fe. 03-11-2005. 17 días



Esperanza. Santa Fe. 07-11-05. 21 días



Esperanza. Santa Fe. 21-10-2005. 3 días



Esperanza. Santa Fe. 06-10-2008. Macho



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005



Elisa. Santa Fe. 30-11-2010



Esperanza. Santa Fe. 25-10-2005. Hembra



Esperanza. Santa Fe. 10-11-2005. 24 días



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo. Macho, ventralmente azul con plumas alargadas de igual color en el cuello. Cola larga, furcada. La hembra es ventralmente gris con punto blanco debajo de los ojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Heliomaster furcifer (Shaw, 1812) desde el norte del país hasta Córdoba, San Luis y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución se encuentra en el centro sur de Sud América, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Bañado de Ovanta, dpto. Santa Rosa, 11-03-1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Capllonch et al. (2018a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a); Bodrati en Salvador (2017)

Córdoba

Citas: Carmona en Salvador (2017a); Castellanos (1932); De la Peña (2005); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 03-02-2006)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, pdo. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biolo (1984); Barrows (1884a), Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja

Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1905, 1923); Lucero (2013d)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989); Holmberg (1887); Krauczuk (2005)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2018a); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Lucero (2012h)

San Luis

Citas: Di Giacomo et al. (2001)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero

Citas: Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998); Capllonch (1998); Capllonch et al. (2018a); Gianini (2000); Brandán (2005); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1993)

PICAFLO ENANO *Microstilbon burmeisteri* (P. L. Sclater, 1887)

Otros nombres: Colibrí de Burmeister. Coqueta serrana.

DESCRIPCIÓN

Largo: 7-9 cm.

Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 2,5 g

Capllonch et al. (2018a): N= 3 X= 3,1 g (Rango: 3,0 a 3,3)

Coloración. Pico recto, negro.

Macho. Dorso verde oscuro brillante. Garganta con plumas alargadas rojizas violetas brillante. Ventral gris con puntos verdes a los lados del pecho y de los flancos. Subcaudales y muslos blanquecinos.

Alas pardas. Cola larga, furcada, con las plumas centrales verdes y las laterales pardas.

Hembra. Dorso verde. Mancha clara a los lados del lomo. Ventral canela clara. Mancha blanca detrás de los ojos. Ceja ocrácea.

Alas pardas. Cola corta canela clara con una banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

De la Peña (2010d). Néctar de *Eucalyptus* sp.

HÁBITAT

Bosques, yungas, alisales, entre los 1000 y los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Catamarca.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Asentado en ramas de plantas. A mediana Altura y altos.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 15-12-1999, se localizó un nido en un árbol, a 6 m del suelo con 2 huevos. Medidas: diámetro total, 4,5 cm, diámetro interno, 2,3 cm, profundidad, 1,5 cm, alto, 3,5 cm.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

De la Peña (2013c): 10,0 x 7,4

X= 2

(N= 2)



Cuesta del Clavillo. Catamarca. 15-12-1999

Más información:

Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño tamaño. Pico corto. Macho con rojizo en la garganta y en la cola. La hembra canela en la parte ventral y en la cola. Mancha clara a los lados del lomo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Microstilbon burmeisteri (P. L. Sclater, 1887) entre los 1000 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Observado además en Córdoba.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución abarca desde el sur Bolivia y **norroeste de** Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Capllonch et al. (2018a); Carma (2009); De la Peña (2001a, 2013c); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (2000)

Córdoba

Citas: Spinuzza (2009b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Capllonch et al. (2018a); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2018a); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan

Citas: Lucero e Izasa (2015)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Antelo (2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2018a); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Vides Almonacid (1991, 1993)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLORES AMATISTA *Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Colibrí amatista. Mainumbí michi eté.

DESCRIPCIÓN

Largo: 6-7 cm.

Peso: Belton (1984): N= 1 (H) 2,0 g

Willis y Oniki (2002): N= 6 (?) de 2,3 a 2,8 g

Coloración.

Pico largo, ligeramente curvado, negro.

Macho. Dorso verde bronceado brillante. Mancha blanca detrás de los ojos. Garganta y lados del cuello rojos violáceos. Pecho blanco. Resto de la zona ventral gris verdoso.

Alas pardas. Cola escalonada, furcada. Plumas centrales verdes, el resto morado.

Hembra. Dorso verde bronceado. Línea alargada detrás de los ojos. Garganta ocrácea con puntos verdes. Banda blanquecina en el pecho. Resto de la parte ventral canela.

Cola corta, rectangular, con las plumas centrales verdes, las externas negras con punta canela.

HÁBITAT

Matorrales, sabanas y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con la cola muy ahorquillada. Garganta roja violácea y banda blanca en el pecho. Hembra con cola cuadrada, garganta con puntos y línea posocular blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se distribuye alrededor de Amazonia desde el norte de Sud América hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2008b, 2010b); Castillo et al. (2012); Chebez (1996a); Mogensen (1930); Navas y Bó (1993); Partridge (1954)

PICAFLORES VERDES *Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí. Colibrí verde. Mainumbí. Manimbé. Picaflor. Picaflor verde común. Pinda. Quenti. Rondín. Tente en el aire. Tuminejo. Tumiñico.

DESCRIPCIÓN

Largo: 9,5-10,5 cm. (macho); 7,5-8,5 cm. (hembra).

Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 3,8 y 3,7 g

Salvador (1988): N= 1 (H) 3,0 g

Blendinger (2005): X= 4,7 g

Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 3,5 g (Rango: 3,2 a 3,7); N= 4 (H) X= 3,4 g (Rango: 3,3 a 3,5)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (H) 3,3 y 3,5 g

Capllonch et al. (2018a): N= 4 X= 3,0 g

Coloración. Pico recto, rojo con punta negra.

Macho. Verde. Garganta y cuello anterior azules verdosos brillantes. Frente verde dorada. Vientre blanquecino. Mancha blanca detrás de los ojos (a veces ausente).

Alas pardas. Cola azulada.

Hembra. Verde. Ventral gris clara. Mancha blanca detrás de los ojos. Cola azulada con las plumas más externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Castellanos (1920a). Hormigas.

Zotta (1934). Arácnidos. Coleópteros. Dípteros (Foridae). (Platypezidae). Hemípteros, Himenópteros.

Olrog (1956). Arácnidos.

Williamson (1975). Insectos (Cochinilla, Pulgones).

Klimaitis (1993). Insectos.

Isacch (2002). Néctar de *Phormium tenax*.

Zelaya et al. (2008). Savia.

Núñez Montellano et al. (2009c). Savia.

Montaldo y Haene (2009). Néctar de *Salvia guaranitica*.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Agapanto praecox*, *Citrus limon*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Hoya carnosa*, *Hypoestes sanguinolenta*, *Ipomoea cairica*, *Ipomoea rubriflora*, *Jazminium sambac*, *Lycianthes rantonnei*, *Nicotiana glauca*, *Plumbago auriculata*, *Punica granatum*.

De la Peña (2010d). Néctar de *Abutilon grandiflorum*, *Ceiba insignis*, *Cestrum parqui*, *Bidens laevi*, *Erythrina crista-galli*, *Funastrum clausum*, *Ipomoea alba*, *Leonurus sibiricus*, *Lycium cestroides*, *Mandevilla laxa*, *Phoradendron liga*, *Pithecoctenium cynanchoides*, *Tecoma capensis*, *Tecoma stans*, *Thalia geniculata*. Agua azucarada

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Arácnidos (arañas). Homoptera (Aphidae). Hymenoptera (formicidae).

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). **Vegetales:** Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo Trtrtlítrtrtlítrtlí repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva en praderas, sabanas, montes, áreas rurales. También en parques y jardines en zonas urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N					N	N	N	N	N

Colgante o asentado en alambres, hierros, cables o hilos pendientes de techos. En ramas de plantas, tallos de enredaderas, yuyos o raíces, en barrancas, plantas en planteras. A mediana y baja altura. Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, cerdas, lanas, materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente trocitos de hojas o de cortezas de árboles, musgos.

Barrows, W. (1884a). Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Noviembre, nido con huevos.

Holland (1892). Buenos Aires. Nido.

Lönnberg (1903). Jujuy. Nido.

Giacomelli (1905). La Rioja. Nido.

Grant (1911). Ajó, Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos con huevos en noviembre y en enero.

Gibson (1918). Buenos Aires. Nido.

Pereyra (1931c.). Buenos Aires. Nido

Pereyra (1923b). San Isidro, pdo. San isidro, Buenos Aires, varios nidos.

Friedmann (1927). Tucumán. Nido.

Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 15-11-1921, huevos.

Pereyra (1933b). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, 22-12-1932, nido con 2 huevos.

Pereyra, C. B. de. (1935). Zelaya, pdo. de Pilar, Buenos Aires, noniembre, nido co 2 pichones.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica desde noviembre.

Masramón (1962). San Luis, nido con 2 pichones.

Fraga (1984a). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, entre 1973 y 1976 se localizaron 4 nidos bajo aleros o techos de edificios abandonados, adheridos a alambres colgantes y 2 a tallos de Hiedra (*Hedera helix*) en una glorieta. Los nidos contenían 2 huevos o 2 pichones. Un nido tenía 3 huevos, puestos al parecer por 2 hembras.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el interior umbrío e selvas y saucedales.

Contreras (1987). Reserva Ecológica del Riachuelo, dpto. Capital, Corrientes, se localizaron 3 nidos, de agosto a octubre de 1987.

Narosky y Lozzia (1988). Formosa. Nido.

Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nidifica en noviembre.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.

Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 12 nidos activos entre octubre y diciembre.

Di Giacomo en Babarskas et al. (2003). Buenos Aires. Nido.

Pereyra en Babarskas et al. (2003). Buenos Aires. Nido.

Leiva et al. (2004). Santa Fe, Entre Ríos. Nidos.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre agosto y diciembre. Se localizaron 35 nidos.

Capllonch (2007). Tucumán. Nido.

Chatellenaz (2008). Formosa. Nido.

Bodrati et al. (2010). Misiones. Nido.

Cervio, M. (2010). Gral. Pico, dpto. Maracó, La Pampa, 10-12-2010, nido con pichones. EcoRegistros. 2019. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 23/05/2019.

Gelain (2011). Rivadavia, dpto. Rivadavia, San Juan, 01-11-2009, nido con 2 huevos.

Gelain (2012a). San Juan. Nido.

Prado, W. (2013b). Los Baldes, Salta, 01-09-2014, nido

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

De la Peña (2013c). Se localizaron 109 nidos, uno en Las Cuevas, dpto. Diamante, Entre Ríos, 21-11-1993, nido en construcción en la raíz de una barranca, Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 6 nidos: dos el 04-10-1989, tres el 02-11-1990 y uno el 07-11-1990. El resto en la provincia de Santa Fe, principalmente en Esperanza.

Medidas: diámetro total, de 3 a 4,5 cm, diámetro interno, de 2 a 3,5 cm, profundidad, de 1,5 a 3 cm y alto, de 3 a 9 cm.

Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 18-01-2014, con 2 huevos.

Gelain (2014e). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 01-01-2013.

Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 2 huevos cada uno.

Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.

Girard en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido

Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Chaco. Nido.

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 47 nidos, posturas entre octubre y marzo, construidos en árboles, arbustos, enredaderas y construcciones humanas, entre 0,9 y 3,2 m ($X = 1,8$). Ponen 2 huevos, en un solo caso 3.

Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Rumboll en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Pagano en en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador en De la Peña (2016c). Capilla del Monte, dpto. Punilla, Córdoba, 06-02-1982, un nido en una enredadera a 1,2 m de altura, con 2 huevos incubados: 12,8 x 8,8 y 12,7 x 8,2 mm. Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 05-12-1997, un nido adherido a un alambre en un galpón, a 3,2 m de altura, con 3 huevos.

Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Quiroga (2017b). Tucumán, nido.

De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 20-11-2015, nido en una ramita de una planta en una galería de una casa urbana, 2 pichones. Esperanza. 05-11-2016. Nido en la ramita de una planta que colgaba de una plantera, a 1,70 m del suelo. 2 huevos. Volaron los pichones.

El 23-12-2016, ocupó el mismo nido. Tenía 2 huevos. 28-11-2018. Nido en un alambre colgante del techo de un garage abierto a la calle. A 3 m del suelo. 2 pichones.

De la Peña (2020). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido en Santa Rita a 3 m. del suelo, 2 pichones.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Smyth (1928): 12,5 a 13 x 7,5 a 8,0

Pereyra (1938): 13,0 x 9,0

Alabarce y Antelo (1998): 12,5 x 7,9

Di Giacomo (2005h): 11,3 a 13,1 x 7,9 a 8,4

$X = 12,2 \times 8,9$ (N= 16)

De la Peña (2013c): 11,4 a 13,4 x 7,0 a 8,5

$X = 12,4 \times 8,1$ (N= 8)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 11,9 a 13,4 x 8,0 a 8,8

$X = 12,88 \times 8,42$ (N= 28)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 0,42 a 0,51 gr

X= 0,46 (N= 6)

Di Giacomo (2005h): 0,3 a 0,4

X= 0,3 (N= 16)

De la Peña (2013c): 0,20

X= 0,20 (N= 1)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,018 a 0,027

X= 0,022 (N= 7)

PICHONES

Descripción

Fraga (1984a). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel de color rosáceo y una línea dorsal de color ocre-rojizo. Pico amarillento. Al 6° día comienzan a abrir los ojos. Son visibles dos líneas de canutos. Hacia el día 12 se ven las puntas de las plumas, que tienen un color pardo rojizo. Hacia el día 16-17 están bien emplumados, con una coloración similar al de las hembras.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico amarillento. Plumón ocráceo rojizo.

6 días. Abre los ojos. Aparecen las vainas de las plumas dorsales.

9 días. Interior de la cavidad bucal rojizo. Paladar naranja. Plumitas en el dorso.

11 días. Se notan las vainas de las secundarias, en la cabeza y dorsalmente. Plumas color canela.

15 días. Emplumado.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas				
	Pico	Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
		Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Total
9	0,5	0,3			
11	0,5	0,7			
13	0,8	0,9	0,4	0,7	0,4
15	0,9	0,9	0,6		0,5

Pesos

Fraga (1984a): X= al nacer 0,3; 1 día, 0,45; 4 días, 0,85; 6 días, 1,8; 10 días, 3,25; 13 días, 3,95 (N= 2)

Observaciones

De la Peña (2013c). La hembra construye. Repara nidos viejos y los utiliza en la misma temporada. Pueden realizar tres posturas en una temporada.

Se localizaron hasta 4 nidos superpuestos.

Los nidos en general son colgantes, a veces asentados.

Los pichones elevan la cola y defecan fuera del nido y a los 15 días de edad se paran en el borde del nido.

Generalidades

Fraga (1984a). El período de incubación es de 15 días. Los pichones permanecen en el nido entre 21 y 23 días.

Di Giacomo (2005h). La postura ocurre en días alternos. El período de incubación es de 15 días. Los pichones permanecen en el nido de 20 a 22 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 9-13 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 15-16 días. Permanencia de los pichones en el nido, 21-23 días

Desde fines de octubre de 2008 a fines de enero de 2009 se realizó un relevamiento de los nidos del Picaflor común, para determinar la cantidad de parejas que estaban nidificando en la ciudad de Esperanza (Santa Fe).

Se detectaron 44 nidos con huevos o con pichones.

Ubicación		
Número de nidos	Elemento sostén	
9	Ficus	En jardín. Dos nidos en galería
6	Santa Rita	En jardín
4	Alambre colgante	En techo de galpón o garaje
4	Hiedra	En jardín. Tres nidos en galería
4	Mandarino	En jardín
3	Cable de la luz	En galería o en galpón
1	Arbusto	En jardín
1	Bignonia rosada	En galería
1	Botón azul	En jardín

1	Cascada	En galería
1	Fresno	En jardín
1	Jazmín del cielo	En jardín
1	Limpiatubo	En jardín
1	Mora	En jardín
1	Naranjo	En jardín
1	Paja de techar	En techo de un “quincho”
1	Planta en maceta	En galería
1	Porta maceta	En galería
1	Tumbergia azul	En jardín
1	Vid	En jardín

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

Depredadores

De adultos: *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (2009e)

Más información:

Capllonch et al. (2018a); De la Peña (2019a)



Esperanza. Santa Fe. 05-11-2008



Esperanza. Santa Fe. 14-03-2008



.Esperanza. Santa Fe. 17-11-2008



Esperanza. Santa Fe. 18-12-2008. Ubicación nido



Esperanza. Santa Fe.17-10-2008



Esperanza. Santa Fe. 17-10-2008



Esperanza. Santa Fe. 16-12-2008



Esperanza. Santa Fe. 11-01-2008



Esperanza. Santa Fe. 03-01-2009



Esperanza. Santa Fe. 08-06-2006



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Verde con garganta azul en el macho y gris en la hembra. Cola azul.
Diferenciar a la hembra de la del Picaflor corona violácea y de la del Picaflor copetón.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chlorostilbon lucidus igneus Gould, 1861 en el norte del país al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Mendoza, La Pampa y Río Negro, y *Chlorostilbon lucidus berlepschi* Pinto, 1938 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Extensa área de distribución que abarca: centro de Bolivia, este y centro de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlorostilbon lucidus igneus Gould, 1861

Catamarca

Citas: Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 11-03-1981)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Capllonch et al. (2018a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa General Belgrano, dpto. Calamuchita, 25-11-1990)

Formosa

Citas: Capllonch et al. (2018a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Mamaní et al. (2018); Miranda et al. (2010)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006); Williamson (1975)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Salvador (1988)

Mendoza

Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Lucero (2013f); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005)

Misiones

Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Militello y Chebez (2009)

Rio Negro

Citas: Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2018a, 2020); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, 07-02-1977)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2011a, 2012a, 2014e); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis

Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c.)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe

Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2002h, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaldo et al. (2019); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2018a); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nore et al. (1991)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Antelo (1992, 1992); Antelo y Brandán (2006, 2013); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2018a); Chani et al. (2000); Echevarría y Chani (2006); Echevarría et al. (1998, 2008a, 2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría y Chani

(1999); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Malizia et al. (1998); Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1991, 1993)

Chlorostilbon lucidus berlepschi Pinto, 1938

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2005); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009e, 2012b); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1935); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Barrows, W. (1884a), Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

PICAFLOP COPETÓN *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831)

Otros nombres: Mainumbí-apirati. Picaflor de copete.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8,5-9 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 3-4 g, (H) 2,2 g

Coloración. Pico recto, negro.

Macho. Frente y corona azules violetas con larga cresta puntiaguda negra. Punto blanco detrás de los ojos. Dorso verde brillante. Región subocular, lados del cuello y del pecho, flancos y abdomen grises. Centro del cuello y del pecho negro azulado.

Alas pardas violáceas. Plumaz centrales de la cola verdes brillantes, el resto con la base verde, distalmente oscuro y con punta blanca.

Hembra. Dorso y plumaz centrales de la cola verdes brillantes. Las plumaz externas de la cola casi todas negras con la punta blanca. Ventral gris blanquecina. Mancha blanca detrás de los ojos. Carece de copete.

HÁBITAT

Orillas de selvas, capueras, selvas.

NIDIFICACIÓN

Nido en Misiones

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N				N	N	



Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Di Fiore, E. (2013b). Oberá, dpto. Oberá, Misiones, 23-06-2011, nido.

Tejo, L. C. (2015). Chacra Mariposa, Campo Ramón, Misiones, 06-10-2011, nido.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete y pecho, negros azulados en el macho. Hembra verde con la parte ventral blanquecina. Plumas externas de la cola con banda oscura y punta blanca en el macho.

La hembra se parece a la hembra del Picaflor corona violácea y a la hembra del Picaflor común, pero es más clara, más blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Stephanoxis loddigesii (Gould, 1831) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Rango: de distribución limitado al este de Paraguay, sur de Brazil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Darrieu y Martínez (1984)

Misiones

Citas: Bertoni (1901); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Gai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Ménégau (1918); Navas y Bó (1993); Pereyra (1950a)

PICAFLOR TESORO *Eupetomena macroura* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Colibrí golondrina. Picaflor tijereta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15-17 cm.

Peso: Willis y Oniki (2002): N= 27 (?) de 7,0 a 11 g

Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.

Macho. Pardo azulado. Cabeza, garganta y pecho violetas o azules violetas. El resto, verde azulado o verde bronceado.

Hembra. Similar al macho, pero con la cabeza y el pecho azulados pálidos.

HÁBITAT

Sabanas, arboledas, parques, plantaciones, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

NIDIFICACIÓN

Adulto con pichones Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Pichones

Observaciones

Bodrati, Di Sallo y Ferreyra en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cola larga. Verde azulado, cabeza, garganta y pecho, violetas. Hembra más pálida.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Eupetomena macroura macroura (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Desde Guayanas, Brasil, sur de Perú, Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Eupetomena macroura macroura (J. F. Gmelin, 1788)

Corrientes

Citas: Bernasconi et al. (2019)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2016b); Castillo et al. (2009); Chebez et al. (2006); Del Castillo et al. (2012); Martínez Gamba (2014); Povedano en Saibene et al. (1996); Krauczuk en Straube et al. (2006)

PICAFLOR ZAFIRO *Thalurania furcata* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Mainumbí. Picaflor de garganta verde. Picaflor de vientre azulado. Picaflor de vientre azul negruzco.

DESCRIPCIÓN

Largo: Macho: 9,5-11 cm, Hembra : 8-9 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,8 g; (H) 4,2 g

Pagano y Salvador (2017): N= 1(M) 5,1 g

Coloración. Pico recto, negro.

Macho. Verde. Hombros, pecho inferior y vientre violetas. Garganta y pecho superior color verde esmeralda brillante. Subcaudales blancas.

Alas pardas azuladas. Cola negro azulada, ahorquillada.

Hembra. Dorsal verde. Azulada en la rabadilla. Ventral gris. Subcaudales blancas.

Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes, externas verdes en la base, azuladas hacia el extremo y punta grisácea.

HÁBITAT

Matorrales húmedos en orillas de selvas, parques, plantaciones y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999). Oniki y Willis (1983c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con garganta verde y vientre violeta. Cola ahorquillada. La hembra es gris en la parte ventral y verde en la dorsal. Diferenciarla de la hembra del Picaflor corona violácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Thalurania furcata baeri Hellmayr, 1907 en Formosa, Tucumán, Jujuy y Salta y *Thalurania furcata eriphile* (Lesson, 1832) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tresce subespecies. Extensa área de distribución desde el norte de Sud América hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalurania furcata baeri Hellmayr, 1907

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán

Citas: Lucero (1983); Olrog (1953); Ortiz y Aráoz (2015)

Thalurania furcata eriphile (Lesson, 1832)

Corrientes

Citas: Contreras y Contreras (1990); Contreras et al. (1990b) (*)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1994, 1996a, 2009); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Pagano y Salvador (2017); Saibene et al. (1996); Savigny (2010)

Observaciones: De la Peña (Puerto Rico, dpto. Libertador General San Martín, 10-02-1973)

PICAFLO CORONA VIOLÁCEA *Thalurania glaucopis* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres : Mainumbí. Picaflor de corona azul. Picaflor verde de frente azul.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-11 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 5 g; (H) 4 g

Coloración. Pico recto, negruzco.

Macho. Verde. Frente y corona azules violetas. Vientre blanquecino.

Alas pardas azuladas. Cola azulada, furcada.

Hembra. Dorsal verde dorada con las plumas orilladas de oscuro (“escamado”).

Ventral gris.

Alas iguales a las del macho. Cola con las plumas centrales verdes, las laterales verdes en la base, luego azules y con punta blanca.

HÁBITAT

Orillas de selvas, selvas, capueras, parques y jardines en áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Colgante en ramas de plantas. Altos.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

De la Peña (2013c). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, nido en la rama de árbol, a 4 m de altura. Contenía un huevo y un pichón. Medidas: diámetro total, 3 cm, diámetro interno, 2 cm, profundidad, 1,5 cm y alto, 3 cm.

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medida

De la Peña (2013c): 12,2 x 7,8 (N= 1)

Peso

De la Peña (2013c): cáscara 0,020 (N= 1)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

El macho, es violeta en la frente y en la corona. Cola furcada, azulada. En la hembra hay contraste entre el gris ventral y el verde dorsal, se parece a la hembra del Picaflor zafiro pero tiene la cola más furcada.

De las hembras del Picaflor común y del Picaflor copetón se diferencia por ser más oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Thalurania glaucopsis (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se encuentra en sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.



Puerto Iguazú. Misiones. 12-10-1981

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b); Castelino (1986); Chebez (1996a); De la Peña (1984d); Militello y Chebez (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 21-09-1993)

PICAFLOR SOMBRÍO *Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot, 1818)

DESCRIPCIÓN

Largo: 11-12 cm.

Peso: Schuchmann (1999): 9 g

Coloración.

Pardo oscuro. Cabeza y parte dorsal verdosas. Cola gris con la parte terminal negruzca.

HÁBITAT

Selvas, plantaciones.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración general parda.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Área reducida del este de Brasil y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Chebez et al. (2004)

PICAFLOR VIENTRE PUNTEADO *Taphrospilus hypostictus* (Gould, 1862)

DESCRIPCIÓN

Largo: 10,5-11,4 cm

Peso: Schuchmann (1999): (M) 6,7 g; (H) 7,2 g

Coloración. Verde bronceado. Punto blanco postocular. Ventral blanco punteado de verde, excepto el centro de vientre.

Cola azul verdosa. Punta gris.

HÁBITAT

Selvas, matorrales, quebradas, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Taphrospilus hypostictus (Gould, 1862) en Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Por el este de los Andes, Ecuador, este de Perú, este de Bolivia, soroeste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

PICAFLORES GARGANTA BLANCA *Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818)

DESCRIPCIÓN

Largo: 10-11,5 cm.

Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 6,1 g

Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior roja, punta oscura.

Cabeza y parte dorsal verdes. Mentón verde con las plumas orilladas de blanco. Garganta, vientre y subcaudales blancos. Pecho verde brillante.

Alas pardas verdosas. Cola azul con ancha punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Isacch (2002). Néctar *Phormium tenax*.

Montaldo y Haene (2009). Néctar *Salvia guaranitica*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Lantana camara*.

Bodrati (*in litt.* 2019), Néctar: de *Hibiscus rosa-sinensis*, *Hibiscus tiliaceus*, *Hibiscus syriacus*

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo Tsintsintsintsint repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Matorrales, bosques, arboledas, orillas de selvas, capueras, plantaciones, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



		N						N	N	N

Tacita. Emplea en la construcción fibras vegetales liadas con telas de arañas y tapizado externamente con líquenes.

Núñez Chas (1992). Mar del Plata, pdo. General Pueyrredón, Buenos Aires, 21-03-1991, nido en una rama de un nogal (*Juglans nigra*). Forma cónica invertida: 3,9 cm de diámetro, 1,6 cm de profundidad, 4-6 cm de altura. Construido con musgos, fibras vegetales, telas de arañas, frutos de compuestas y tapizado externamente con líquenes. Contenía 2 pichones bien desarrollados.

Bodrati et al. (2010b). Nido a 2,5 m de altura colgando de una enredadera en el borde este del Parque Provincial Cruce Caballero, Misiones. Dos pichones

Bodrati (*in litt.* 2019). Villa Adelina, Buenos Aires, nido en el fondo de una casa en una horqueta triple de un *Ficus benjamina* que estaba dentro de una maceta y debajo de un techo. A 2,3 m de altura con dos huevos blancos incubados, noviembre de 2007.

Nido activo con un adulto incubando, en ramas bajas a 3, 2 m de altura en una casuarina (*Casuarina cunninghamiana*) en un bosque denso de esa especie, en La Lonja, partido de Pilar, Buenos Aires.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Garganta, anterior del cuello y vientre blancos. Ancha franja verde en el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Observado en Bariloche (Río Negro)



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución comprende este de Bolivia, este de Paraguay, centro y sur de Brasil, Uruguay y Argentina.



Mar del Plata. Buenos Aires 24-02-2019 Foto: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Carrizo et al. (2001); Darrieu y Camperi (2001a); De Lucca (1990a); Delhey (1992); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Leveau y Leveau (2004, 2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1984); Narosky (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Núñez Chas (1992); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1965); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999)

Chaco

Citas: Bodrati (2005); Contreras et al. (1990b)

Córdoba

Citas: Montaldo (1995b); Salvador y Salvador (2014); Salvador et al. (2017); Zarco y Villafañe (2010)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)

Entre Ríos

Citas: Canavelli et al. (2004); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Formosa

Citas: Gorleri et al. (2011)

La Pampa

Citas: Chebez et al. (1998); De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones

Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Militello y Chebez (2009); Straneck (1990h)

Neuquén

Citas: Matarasso (2007); Veiga y Dupuy (2009)

Río Negro

Citas: Fierro en Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Fe

Citas: Giarduz (2008); Manassero et al. (2006)

Santiago del Estero

Citas: Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: Salvador y Salvador (Sachayoj, 05-12-87)

PICAFLORES BLANCO *Amazilia chionogaster* (Tschudi, 1845)

Otros nombres: Picaflor de pecho blanco. Quenti.

DESCRIPCIÓN

Largo: 9-12 cm.

Peso: Fiora (1933): N= 7 X= 3,8 g (Rango: 3,2 a 4,5)

Salvador (1988): N= 2 (M) 5,0 y 6,5 g; N= 1 (H) 4,6 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X 5,3 (Rango: 4,9 a 5,8)

Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 6,0 g

Capllonch et al. (2018a): N= 19 X= 5,34 (Rango: 3,5 a 7,0)

Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior rojiza, punta oscura.

Dorsal verde dorada. Ventral blanca con puntos verdes en la garganta y en la parte anterior del cuello.

Alas pardas. Cola verde bronceada con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

De la Peña (2010) Néctar *Eucalyptus* sp.

Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo y cristalino Tsing...tsig...tsing.. repetido insistentemente.

HÁBITAT

Matorrales, bosques, yungas, plantaciones, jardines, áreas con cactáceas y arbustivas xerófilas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N						N				N

Asentado en ramas de plantas. A mediana y baja altura.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Hartert y Venturi (1909). Tucumán, nido de líquenes. Mide 5 cm. de diámetro y 3,5 cm de profundidad.

Salvador (1992). Chuquis, dpto. Castro Barros, La Rioja, el 09-02-1990, se localizó un nido en una quebrada húmeda y arbolada, en un molle de beber (*Lithraea ternifolia*) a 4,5 m del suelo. El nido es una semiesfera profunda, recubierta de líquenes. En la parte interna elementos algodonosos y unas pocas plumas. Diámetro externo de 4,8 cm, interno de 3,2 cm, altura 5 cm y 2,8 cm de profundidad. Contenía 2 pichones emplumados.

Di Giacomo y López Lanús (2000). Mesada de las Colmenas, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, 12-08-1991, un nido fue observado.

De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-12-1999, nido en un arbusto a 2,50 m del suelo, un huevo y un pichón. Medidas: diámetro total, 5 cm, diámetro interno, 3 cm, profundidad, 2,5 cm y alto, 4 cm.

Pagano en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Huevos

Pone 2 huevos. Elípticos. De color blanco.

Medida

De la Peña (2013c): 13,0 x 8,5 (N= 1)

Más información:

Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Parte dorsal verde. Ventral blanca.

Se parece al Picaflor esmeralda pero éste tiene más marcados la garganta y el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Amazilia chionogaster hypoleucus (Gould, 1846) en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Formosa.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se encuentra en Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia chionogaster hypoleucus (Gould, 1846)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); De la Peña (2001a, 2013c); Salvín (1982); White (1882)

Formosa

Citas: Esteban (1953)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (2000); Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Montaldo (2014); Moschione y Segovia (2005) ; Salvador (1988)

La Rioja

Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Salvador (1992)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capllonch et al. (2018a); Coconier et al. (2007); Malizia et al. (2005); Moschione et al. (2013); Pagano y Salvador (2017); Rodríguez (2012b); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990f); Zimmer (1950)

San Juan

Citas: Ortiz et al. (2016)

Santiago del Estero

Citas: Coria y Heredia (2012); Coria et al. (2017); Nores et al. (1991); Nores y Cerana (1990); Nores y Yzurieta (1981)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Antelo (2009); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigiliano (2019); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2018a); Chani et al. (2000); Echevarría et al. (2008a, 2011b); Fanjul (2010); Fanjul y Echevarría (2015); Gianini (2000); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Malizia et al. (1998); Marigiliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b); Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1991, 1993); Zimmer (1950)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLOR ESMERALDA *Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Picaflor mainumbí. Picaflor pequeño verde.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-10 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 4 g, (H) 3,5 g

Willis y Oniki (2002): N= 4 (?) de 3,5 a 4,9 g

Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior rojiza, punta oscura.

Frente y corona pardas grisáceas. Dorsal verde. Ventral verde dorada. Vientre inferior y subcaudales grises.

Alas parduscas. Cola verde olivácea con banda subterminal oscura y punta más clara.

La hembra tiene blanco en la garganta y en la parte anterior del cuello.

HÁBITAT

Capueras, orillas y claros de selvas, selvas en galería, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Semiesfera, asentada en ramas. Emplea en la construcción musgos, hojitas, fibras vegetales liadas con telas de arañas.

Militello y Castillo (2005). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 02-02-2002, nido con 2 pichones. Estaba en una rama de un Marmelero (*Ruprechtia laxiflora*) a 6 m del suelo. Tiene forma de semiesfera asentada en

la rama, de 4,4 cm de ancho por 2,9 cm de alto. Construido con musgos, telas de arañas y hojitas secas. Internamente fibras vegetales finas.
Heredia, A. (2012b). R. P. Surucuá, Misiones, 17-12-2012 nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Verde. Superior de la cabeza parda y el vientre gris.
Diferenciarlo del Picaflor blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Amazilia versicolor kubtchei (Ruschi, 1959) en Misiones y Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. En ambientes abiertos en Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Bolivia, este de Paraguay y Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia versicolor kubtchei (Ruschi, 1959)

Corrientes

Citas: Darrieu y Camperi (1993); López-Lanús et al. (2013b)

Misiones

Citas: Bertoni (1906); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Militello y Castillo (2005); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1993)

PICAFLOR VIENTRE BLANCO *Amazilia brevirostris* (Lesson, 1829)

DESCRIPCIÓN

Largo: 8,5-9 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,6 g; (H) 4,4 g

Coloración. Pico, maxila negra, mandíbula rosada oscura.

Corona, dorsal, cobertoras alares, lados del cuello y del pecho, y flancos verdes bronceados. Alas pardas purpúreas, cola parda bronceada con dos plumas centrales verdes bronceadas. Centro de la garganta y abdomen blancos, subcaudales pardas bronceadas pálidas bordeadas de blanco grisáceo.

HÁBITAT

Bordes de selvas, plantaciones, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Similar a *Amazilia versicolor* pero sin pecas verdes en garganta y pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Amazilia brevirostris (Lesson, 1829) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Especie de la costa de Venezuela, Guayanas y norte de Brasil. Observado en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones

Citas: Chebez et al. (2009)

PICAFLOR PECHO AZUL *Amazilia lactea* (Lesson, 1832)

DESCRIPCIÓN

Largo: 9-10 cm.

Coloración. Pico, maxilar negro, mandíbula rosada o córnea.

Parte dorsales verdes con reflejos bronceados. Garganta y pecho azules violetas. Centro del vientre y subcaudales blancos.

Plumas centrales de la cola verdes. Externas azules. Ventralmente es azul oscura.

HÁBITAT

Bordes de selvas, matorrales, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Garganta y pecho azules violetas. Centro del vientre y subcaudales blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Amazilia lactea lactea (Lesson, 1832) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Áreas aisladas en Venezuela, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia lactea lactea (Lesson, 1832)

Misiones

Citas: Chebez et al. (2004); Güller y Oste (2011); Güller y Rodríguez Elías (2013); Militello y Chebez (2009)

PICAFLORES CASTAÑOS *Hylocharis sapphirina* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Picaflor azul de garganta roja (al macho). Picaflor de barba castaña. Picaflor de cabeza azul. Picaflor de pecho azul.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8,5-9,5 cm.

Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,1-4,5 g, (H) 3,9-4,3 g

Coloración. Pico recto, rojo con punta negra.

Macho. Parte dorsal, inferior del pecho y abdomen verdes brillantes. Barbillas y garganta castañas.

Parte anterior del cuello y superior del pecho violetas. Vientre blanco. Subcaudales castañas.

Alas pardas. Plumaz central de la cola verdes bronceadas purpúreas, las externas castañas orilladas de negro.

Hembra. Dorso verde bronceado. Garganta y subcaudales rojizas. Ventral blanquecino grisáceo, con puntas verdes azuladas en la parte anterior del cuello y superior del pecho.

Cola como la del macho, pero con las plumas externas con puntas blanquecinas.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva en sabanas, orillas de selvas, bosques, capueras, plantaciones de café.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con el pecho violeta y la garganta rojiza. Hembra con rojizo en la garganta y puntos azules en el pecho.

Ambos con la cola bronceada y castaña.

Diferenciar a la hembra de la del Picaflor lazulita.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hylocharis sapphirina (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y noreste de Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Amplia área de distribución como poblaciones separadas en el norte de Sudamérica: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador Perú y norte de Brasil (Amazonia). Otra población se encuentra en Bolivia, este de Brasil, este de Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Olrog (1979)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chebez (2009); Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006)

Formosa

Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); López Lanús (1997); Ramírez-Llorens et al. (2003)

Misiones

Citas: Chebez (1996a); Saibene et al. (1996)

Santa Fe

Citas: Manassero et al. (2004); Manassero y Luna (2009a)

Santiago del Etero

Citas: Quiroga et al. (2016b)

PICAFLOR LAZULITA *Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Picaflor azul de garganta blanca (a la hembra). Picaflor de cabeza azul.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-9 cm.

Peso: Schuchmann (1999): 3,5 g

Coloración. Pico recto, rojo con punta oscura.

Macho. Verde. Cabeza, garganta y cuello azules violetas. Pequeño punto blanco en el mentón.

Alas pardas verdosas. Subcaudales y cola negras azuladas.

Hembra. Dorsal verde. Ventral gris blanquecina con puntos verdosos en la garganta y en el pecho. Subcaudales grises con puntos negros.

Cola negra azulada con las puntas de las plumas externas grises.

HÁBITAT

Vegetación arbustiva en bosques y selvas, orillas de selvas, selvas en galería, plantaciones, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:

Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho con la cabeza, el pecho y la cola azules. La hembra se parece a la del Picaflor cola castaña, pero tiene castaño en la garganta, subcaudales y cola. También a la hembra del Picaflor de antifaz pero tienen diferente color en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hylocharis cyanus griseiventris Grantsau, 1988 en el sureste de Buenos Aires, Misiones y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinci subespecies. Ampla área de distribución que comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Hylocharis cyanus griseiventris Grantsau, 1988

Buenos Aires

Citas: Dabbene (1926a); Fiameni (1994)

Misiones

Observaciones: A. Bodrati (*in litt.* 2019). Un individuo observado y fotografiado en el Parque Provincial de la Araucaria en enero de 2008.

Salta

Citas: Cuñado et al. (2012); Moschione et al. (2013)

PICAFLORES BRONCEADO *Hylocharis chrysura* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí bronceado. Picaflor dorado.

DESCRIPCIÓN

Largo: 8-10 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 4,0 y 4,2 g; N= 1 (H) 5,0 g

Camperi (1992a): N= 1 (H) 4,3 g

Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 3,6 g

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 4,1 g (Rango: 3,6 a 4,5)

Pagano y Salvador (2017): N= 2 (?) 4,0 y 4,5 g

Capllonch et al. (2018a):

Coloración. Pico rojo con punta negra.

Verde dorado. Rojizo pálido en la rabadilla.

Alas pardas. Cola verde bronceada en ambos sexos.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Olrog (1956). Insectos.

Lucero (2009). Néctar de *Nicotina glauca*.

Montaldo y Haene (2009). Néctar de *Salvia guaranitica*.

De la Peña (2010d). Néctar de *Tecoma capensis*.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Pyracantha coccinea*.

Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*

Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Salvador et al. (2017). Insectos.

Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). El canto es un agudo Tsiirrrtsiirrrtsiirrr repetido a intervalos.

HÁBITAT

Sabanas, matorrales, selva en galería, bosques, selvas, jardines, parques, plantaciones.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Asentado en ramas de plantas, tallos de enredaderas. A baja altura.

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, fibras algodonosas del fruto del Palo borracho, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Pereyra (1933b). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, 22-12-1932, nido con 2 huevos.

Giai (1950). Santa Fe. Nido.

Klimaitis y Moschione (1987). Anida en sectores de vegetación densa y sombría de la selva.

Narosky y Lozzia (1988). Formosa. Nido.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre setiembre y noviembre. Se localizaron 4 nidos.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Bañados de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, 2 nidos: 21-10-82, nido con 2 huevos, se hallaba en un área de bosques próximo a un bañado, a 4 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, apoyado en una rama horizontal de 2 cm de espesor, elaborado con ootecas de arañas y barba de viejo, exteriormente revestido con líquenes e interiormente forrado en su totalidad de barba de viejo, con un diámetro externo de 4 cm, diámetro interno 2,5 cm, altura 3 cm y 1,5 cm de profundidad. El mismo día otro nido, con 2 huevos se hallaba a 50 m del anterior, a 3,5 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, colgando en el extremo de una rama, de construcción y medidas similares al anterior.

Godoy et al. (2012). Avellaneda, pdo. Avellaneda y Quilmes, pdo. Quilmes, Buenos Aires, nido con un pichón en un Ligustro (*Ligustrum lucidum*).

De la Peña (2013c). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 2 nidos, el 20-11-1978, en un Ombú, a 2,50 m del suelo con 2 huevos y el 31-10-1981, en una enredadera a 2 m. con un huevo.

Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

Bodrati en Salvador (2016a). Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires. Nidos.

Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.

Uranga en De la Peña (2019b). 20 km al NE de Palo Santo, dpto. Pirané, provincia de Formosa 21-11-2016, nido asentado sobre una rama horizontal, a 2 m del suelo. Tenía un pichón y un huevo.

Huevo

Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 13,0 a 14,0 X 8,5 a 9,0

Di Giacomo (2005h): 12,9 a 13,6 x 8,1 a 9,1

X= 13,2 x 8,6 (N= 4)

Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b): 12,5 a 12,7 x 8,1 a 8,4

X= 12,6 x 8,2 (N= 4)

De la Peña (2013c): 13,4 a 14,4 x 8,8 a 9,3

X=13,6 x 9 (N= 3)

Pesos

Di Giacomo (2005h):
De la Peña (2013c): 0,557
De la Peña (2013c): cáscaras 0,029 a 0,032

X= 0,4 (N= 4)
X= 0,557 (N= 1)
X= 0,030 (N= 3)

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis*.

	
Palo Santo. Formosa. 21-11-2016. Foto: Máximo Uranga	Elisa. Santa Fe. 30-11-2010
	
Cayastá. Santa Fe. 20-10-1978	

Depredadores

De adultos: *Pitangus sulphuratus* en Chaco, Salvador y Bodrati (2013c)
Más información:
Capllonch et al. (2018a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Verde bronceado uniforme con las alas pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) desde el norte del país hasta San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución se extiende por Bolivia, Paraguay, suroeste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1991, 1994); Gasparri et al. (2018); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1984, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a, 2013c)

Córdoba

Citas: Nores (1996); Nores e Yzurieta (1995); Salvador et al. (2017); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ascochinga, 13-03-2003)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a, 2018a); Chatellenaz (2004); Contreras (1919f, 1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Contreras (1979f); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa

Citas: Capllonch et al. (2018a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Rioja

Citas : Fracchia y Aranda-Rickert (2015)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1993)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, 12-10-1982)

Salta

Citas: Capllonch et al. (2018a); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (La Viña, dpto. La Viña, 08-12-1977)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009); Lucero (2013i)

Santa Fe

Citas: Capllonch et al. (2018a); De la Peña (2011f, 2013c); Gai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Capllonch et al. (2018a); Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

AMBIENTES, LUGARES, EXCURSIONES



1978-1879



1978. Parque Nacional, El Rey. Salta.



1978. Valle Encantado. Salta.



1978. Valle Encantado. Salta



1978. Valle Encantado. Salta



1979. Humahuaca. Jujuy



1979. El Volcán. Jujuy



1979. Quebrada de Humahuaca. Jujuy



1979. Azul Pampa. Jujuy



1979. Abra Pampa. Jujuy



1979. Abra Pampa. Jujuy.



1979. Abra Pampa. Jujuy. Nido de pato.



1979. Abra Pampa. Jujuy.



1979. Península Valdés. Chubut.



1979. Isla de los Pájaros. Chubut



1979. Punta Norte. Chubut



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz.



1979. Paso Gregores. Santa Cruz.



1979. Paso Gregores. Santa Cruz.



1979. Río Turbio. Santa Cruz.



1979. Laguna La Loca. Santa Fe.



1979. Isla El Rico. Santa Fe.



1979. Miguel escalada. Santa Fe. Nido de Cigüeña.