Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2020 | N° 5 | Pág. 1-247| ISSN 0325-3856

AVES ARGENTINAS

Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución

(ACTUALIZACIÓN)

Martín R. de la Peña

TOMO 5

Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Chionidae, Pluvianellidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Jacanidae, Rostratulidae, Stercorariidae, Laridae, Rynchopidae

MUSEOAMEGHINO

Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2020| N° 5| Pág. 1-246| ISSN 0325-3856

Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución
(ACTUALIZACIÓN)

TOMO 5

Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Chionidae, Pluvianellidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Jacanidae, Rostratulidae, Stercorariidae, Laridae, Rynchopidae

2020

Martín R. de la Peña

Colaborador: Alejandro Bodrati

ORDEN: CHARADRIIFORMES

TEROS Y CHORLOS

FAMILIA: CHARADRIIDAE

Aves de las patas largas.
El nido es poco elaborado. Ligera excavación, bordeada de palitos, pastos, tallos de yuyos, materias fecales de bovinos o de equinos.
Ponen huevos en el suelo, 3 ó 4, piriformes. Con manchas (miméticos)
Los pichones son nidífugos.
Se alimentan de vermes, caracoles, crustáceos, moluscos, larvas, insectos, lombrices
Frecuentan playas marinas, turbales, orillas de lagunas, pantanos, esteros, bañados, charcos, áreas rurales, ruderales.

CHORLO PAMPA *Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Chorlito. Chorlaco. Chorlito dorado. Chorlo. Chorlo de chacra. Chorlo del campo. Chorlo dorado. Chululú. Mbatutuí pecho de mármol. Mbatutuí pecho listado. Playero de oro.

DESCRIPCIÓN

Largo: 24-28 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 1 (?) 132,0 g
Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 148,0 g (Rango: 133 a 162); N= 3 (H) X= 144 g (Rango: 136 a 149)
Pagano y Salvador (2017): N=2 (M) 106 y 140 g

Coloración. Pico negro. Patas grises oscuras. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cara, cuello y pecho blanquecinos jaspeados de pardo claro. Frente, ceja y resto de lo ventral blanquecinos. Dorsal parda oscura con plumas orilladas de blanquecino.
Alas pardas oscuras. Cubiertas como el dorso. Axilares grises parduscas.
Cola parda y grisácea.
Plumaje nupcial.
Corona y posterior del cuello negros jaspeados de amarillento. Partes dorsales pardas oscuras con puntos amarillos dorados. Frente, ceja, lados del cuello y del pecho blanco. Garganta, lados de la cara, pecho y abdomen, negros.

COMPORTAMIENTO

Forma grupos dispersos. Se lo ve en campos o cerca del agua.

Alimentación
Zotta (1934). **Insectos:** Ortópteros (*Schistocerca paranensis*)
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros.
Klimaitis (1993). Coleópteros. Piedritas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros (larvas). Hormigas. Lepidópteros (larvas). **Crustáceos:** Isópodos. **Moluscos:** Gasterópodos. **Otros:** arácnidos, lombrices, semillas, vegetales.
Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Crustáceos:** Gammaridae (*Gammarus* sp.)

HÁBITAT

Estepas, praderas, costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Ceja blanquecina. Dorso pardo, ventral blanquecino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Migratorio del Ártico de Norte América. Durante la primavera y verano austral llega hasta Centro América e Islas del Caribe y Sud América, hasta Bolivia y centro de Argentina. Por la costa Atlántica llega hacia el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Codesido et al. (2013); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2003); Klimaitis (1975b, 1993); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, pdo. Gral Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca

Citas: Bianchini (2019c); Carma (2009); Salvador (1990a)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), campos semi-inundados al oeste de la localidad de Capitán Solari, dpto. Sargento Cabral, Chaco. Muchos individuos observados entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre de 1998.

Chubut

Citas: Bradley et al. (1985); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995, 2012b)

Córdoba

Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes

Citas: Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: Bodrati (in litt. 2019), grupos de entre 6 y 14 individuos observados en la Estancia La Blanca, dpto. Santo Tomé, el 13 de septiembre de 2016 (A, Bodrati y L. G. Pagano)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (1996b, 2012b); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Serié y Smyth (1923)

Observaciones : Bodrati (*in litt*. 2019), más de 10 individuos dispersos en un bosque de ñandubay (*Prosopis algarrobilla*) inundado en octubre de 1994, Ceibas, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos.

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011); Pagano y Salvador (2017)

Observaciones: Bodrati, A. en De la Peña (2016c)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Dabbene (1920d); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Chebez et al. (1989); Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1988); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988a); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Ramilo y Pastore (2015)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Maugeri et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Moschione y Bishels (2004); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

CHORLO ÁRTICO *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito gris. Chorlo blanco. Chorlo gris. Chorlo de pecho negro. Pollo cabezón. Pollo de mar grande.

DESCRIPCIÓN

Largo: 27-31 cm.
Peso: Harrington et al. (1986): N= 5 (?) X= 292,5 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente, cejas, cara, cuello por delante, pecho y flancos blanquecinos. Dorso pardo grisáceo con las plumas marginadas de blanquecino. Supracaudales blancas. Cola blanca barrada de pardo. Punta de la cola parda. Remeras pardas oscuras con base blanca. Cubiertas alares pardas oscuras con las plumas orilladas de blanquecino. Axilares negras.
Plumaje nupcial.
Cara, cuello anterior, pecho, vientre, flancos y axilares negros. Abdomen y subcaudales blancos. Resto de la cabeza blanco, con la corona manchada de pardo. Dorsal parda, negruzca y blanquecina. Rabadilla y banda alar blancas.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*)

HÁBITAT
Playas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, ventral, rabadilla y banda alar blancas. Cola barrada. Axilares negras, visibles en vuelo. Se parece al Chorlo pampa, pero se diferencia por tener axilares negras, rabadilla y banda alar blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Llega a lagunas del interior, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y costas de Buenos Aires a Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en todo el Ártico extremo, más al norte que la mayoría de las aves (Nuevo y Viejo Mundo). Desde allí migra a playas y ambientes acuáticos de todo el mundo.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gavensky (2013); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2012); Moschione (2010b)

Río Negro
Citas: Canevari (1979); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Paz Barreto (1997b); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Fe
Citas: Baldo et al. (1995); Giraudo et al. (2008)

Tierra del Fuego
Citas: Jehl y Rumboll (1976)

CHORLO CABEZÓN *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829)

Otros nombres: Chorlaco. Chorlito. Chorlo. Chorlo campestre. Chorlo canela. Chorlo colorado. Chorlo de campo. Chorlo de garganta oxidada. Chorlo de loma. Chorlo de vientre negro. Chorlo garganta tostada. Chorlo pampa. Chorlo rastrojero. Pachurrón. Pampero. Pollo de campo. Talulo. Tinta. Tinta-yesgüí. Tiula. Yesgüí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-29 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 1 (H) 132,5 g
Camperi (1992c): N= 3 (M) X= 183,3 gr (Rango: 150 a 200); N= 2 (H) 150 y 200
Christie et al. (2004): N= 1 (?) 169 g
Salvador (2014a): N= 1 (M) 142,5 g; N= 1 (H) 133 g

Coloración. Pico negro. Patas naranjas o rosadas con tibias parduscas. Iris pardo oscuro.
Corona, cuello y partes dorsales pardas grisáceas estriadas de negro y canela. Frente y ceja superciliar ocráceas. Línea oscura a través de los ojos. Rabadilla gris pardusca. Garganta y cuello canelas. Pecho pardo grisáceo. Mancha negra en el vientre. Resto de lo ventral ocráceo.
Primarias pardas con los raquis y zonas adyacentes blanquecinas. Secundarias pardas con puntas blanquecinas. Cobijas alares como las partes dorsales. Cola gris con franja subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Se para con el cuerpo erguido. Arisco.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos y larvas.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Escarabacidae, Curculionidae). Dípteros. Himenópteros. Lepidópteros.
Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros. **Otros**: Lombriz (*Pheretima*). Minerales. Semillas.
Olrog (1956a). **Insectos:** Coleópteros. Langostas.
Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Coleópteros.
Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. **Crustáceos:** Isopoda (Bicho bolita). **Otros:** semillas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Arácnidos. Otros:** lombrices, semillas, vegetales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Lepidoptera (crisálidas). Orthoptera (Acridiidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres) **Anélidos:** Oligoquetos: (lombrices de tierra).

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite un suave y melancólico Juirrhh...juir..juirrhh..

HÁBITAT
Estepas, turbales. En otoño e invierno praderas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Expuesto. Rudimentario. Depresión en el suelo, con o sin pastos en la base.

Durnford (1877a). Chubut. Nido.
Reynolds en Pereyra (1951). Tierra del Fuego. Nido.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con 3 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre setiembre y octubre.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Sosa (1995). Mendoza. Nido.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nidos en setiembre.
Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y diciembre. Construye en pequeñas depresiones en el suelo, en sectores pedregosos y más bien abiertos, con pastos cortos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifica en el lugar.
Pagano en Salvador (2016a).Tierra del Fuego. Nido.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Pardos con pintas negras.

Medidas
Goodall et al. (1951): 42,3 a 44,2 x 32,2 a 33,1

PICHONES
Observaciones
Salvador en De la Peña (2016c). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 09-11-1979, una pareja con 2 pichones de 2-3 días, a orillas de un camino de ripio.
Belcher (1936). Pilcaniyeu, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 05-12-1935, un pichón.
Humphrey et al. (1970). Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, 09-12-1931, pichones, observados por Reynolds.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, juveniles en diciembre.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.
Petracci et al. (2004a). El Nihuil, Mendoza, 100 km al sur, el 01-12-2001, en la ruta provincial 180, 3 adultos con pichones.
Colina (2011). Recta Tin-Tin, dpto.Cachi, Salta, adulto con un pichón el 28-10-2008.
De la Peña (2013c). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 07-11-1979. Pareja con un pichón.
Peters (1923). Río Negro. Pichones.
Contreras (1978a). Río Negro. Pichones.
Boswall y Prytherch (1972). Chubut. Adulto con pichones.
De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.

Otros
Dabbene (1926g). Dolores, pdo. Dolores, Buenos Aires, un ejemplar con Semialbinismo.
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), en Patagonia, Ellis et al. (2002), en Tierra del Fuego, McNutt (1981)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Notable mancha negra en el vientre. Dorso estriado de negro. Cuello canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Oreopholus ruficollis ruficollis (Wagler, 1829) por la cordillera y precordillera desde Jujuy y Sierras Grandes (Córdoba) y por el llano desde Chubut hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.
En otoño migra hasta Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Desde Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

Península Valdés. Chubut. 16-11-2019 Fotos: María Fernanda Gauna

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Oreopholus ruficollis ruficollis (Wagler, 1829)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (1998, 2003); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Roesler (2001a); Straneck (1990a); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Hartert y Venturi (1909); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Punta Clara, dpto. F. Ameghino, 05-11-1979)

Córdoba
Citas: Cabanis (1878); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Los Gigantes, dpto. Punilla, 28-11-1989)

Entre Ríos

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019). Especie reiteradamente observada en campos de las inmediaciones de Perdices, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Rios, en los meses de mayo, junio, julio en distintos años (1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2003).

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); De la Peña y Tittarelli (2011); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Laredo (1996)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Ordano y Bosisio (2001); Petracci et al. (2004a); Reed (1914, 1916, 1921); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1968, 1983a); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b.)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Dacuik (1978c); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1990c, 1997b); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Ñorquinco, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

Salta
Citas: Colina (2011); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr (1932); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Lange (1981); Peri (2013); Petracci et al. (2004a); Sclater et al. (1870); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Jaramillo, dpto. Deseado, 02-02-1974: Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Nardi (2012); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Ripley (1950)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Dacuik (1983c); Wace (1921); Woods (2006)

CHORLO DE ESPOLÓN *Vanellus cayanus* (Latham, 1790)

Otros nombres: Armado. Avefría de espolón. Chorlo armado. Chorlo de Cayena.Tero armado. Tero de espolón. Tero overo. Teru teru de collar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-26 cm.
Peso: Graves y Zusi (1990): N= 2 (M) 72 y 73 g; N= 1 (H) 79 g

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Espolón alar rosado. Párpados rojoa anaranjados. Iris pardo.
Cara y lados de la cabeza negros. Corona blanca, con centro pardo grisáceo, formando una línea a los lados de la cabeza. Dorso pardo. Escapulares negras y blancas. Garganta y abdomen blancos. Lados del cuello y del pecho negros.
Cobijas alares pardas grisáceas. Secundarias blancas, las más externas con puntas oscuras. Primarias pardas oscuras. Cola blanca con ancha banda negra en la extremidad.

HÁBITAT
Riberas de ríos y de lagunas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Piersma (1996b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso pardo. Pecho negro. Alas con bandas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Vanellus cayanus (Latham, 1790) en Salta y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distribuye por todos los países de América del Sur, excepto Chile y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1994, 1996a); Mogensen (1930)

Salta
Citas: Jensen y Areta (2007); Moschione et al. (2013)

TERO *Vanellus chilensis* (Molina, 1782)

Otros nombres: Avefría. Avefría americana. Frailecillo del plata.Güerequeque. Queltregüa. Queltreque. Queroquero. Quetreque. Quiltegue. Tegle. Telo. Terencho. Terito. Tero austral. Tero chileno. Tero cordillerano. Tero de la cordillera. Tero del oeste. Teru-teru. Tetén. Teteu. Teu-teu. Tilo. Tilo-tilo. Tregül.

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-38 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 4 X= 348,2 g (Rango: 335,0 a 362,0)
Navas y Bó (1986a): N= 5 (M) X= 351,3 g (Rango: 291 a 416); N= 7 (H) X= 352,7 g (Rango: 276,8 a 430)
Camperi (1992c): N= 1 (M) 350 g; N= 3 (H) 300 g cada una.
Salvador (2014a): N= 6 (M) 304,0 g (Rango: 281,0 a 328,0); N= 4 (H) X= 299,0 (Rango: 288,0 a 312,0)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 260 g; N=1 (H) 220 g

Coloración. Pico, patas y espolón alar rojizos. Iris rojo.
Frente, garganta y cuello anterior negros, separados del resto del cuerpo por un margen blanco. Pecho negro. Resto de la cabeza, cuello posterior y dorso grises. Copete negro. Resto de las partes ventrales blancas.
Alas negras. Cubiertas verdes bronceadas. Las mayores blancas.
Cola blanca con ancha banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos. Es muy cuidadoso del nido y de los pichones. Cuando algún intruso se aproxima a ellos realiza ceremonias de distracción que consisten en agacharse en distintos lugares lejos del nido o de los pichones o bien simulan estar heridos. A veces realiza vuelos rasantes sobre los extraños. En poblaciones se posa en los techos de construcciones.

Alimentación

Marelli (1919). Coleópteros. Lombrices.
Aravena (1927). **Insectos:** Curculiónidos (*Listroderes cotirrostris*). Crisomélido (*Haltica*). Escabajos. Carábidos. Grillo topo (*Scapteriscus didactylus*). Hormigas. Lepidópteros. Tucura. **Vegetales:** Semillas de *Xanthium macrocarpum*. **Otros:** Piedritas.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae). Dípteros Acuáticos (Dolichopodidae)
Fiora (1939). Insectos, tierra, limo, restos vegetales.
Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Coleópteros.
Willianson (1975). **Vegetales:** Semillas de *Panicum mileaceum, Phalaris canariensis.* **Otros:** Pan.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Ortópteros.
Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. **Otros:** Piedritas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Blattaria. Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae). **Anélidos:** oligoquetos. (lombrices de tierra). **Arácnidos**: arañas. **Crustáceos:** Isópodos terrestres. **Vegetales:** semillas no determinadas. Frutos Solanáceas. **Otros:** Arena.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Hormigas. Lombrices. Insectos.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Cuando se alarma repite un sonoro y estridente Tere..ter..kere..tere...

HÁBITAT
Bañados, charcas, praderas, áreas rurales, parques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En el suelo. En praderas, áreas rurales, parques, orillas de humedales.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación bordeada de palitos, pastos, tallos de yuyos, materias fecales de bovinos o de equinos.
A veces sin materiales, o pueden estar sobre o entre materias fecales de bovinos o de equinos.

Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.
Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires. Nidos.
White (1882). Buenos Aires. Nido.
Barrows (1884c). Concepción del Uruguay, Entre Ríos, nido con huevos.
Holland (1892). Buenos Aires. Nido.
Crowshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.
Shipton (Instituto Miguel Lillo). Chicligasta, dpto. Chicligasta, Tucumán, 25-11-1909, 3 huevos.
Lillo (Instituto Miguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 30-12-1912, 3 huevos.
Gibson (1920). Buenos Aires. Nido.
Reed (1921). Mendoza. Nido.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 02-10-1919 y 17-10-1920, dos nidos con 3 huevos cada uno; Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 21-01-1923, nido con 3 huevos.
Pereyra, C. B. de (1928). Provincia de Buenos Aires, nidos desde junio a febrero.
Budin (1931). Tucumán. Nido.
Castellanos (1931). Córdoba. Nido.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Pozzi (1934). Estancia La Balbina, pdo. Balcarce, Buenos Aires, nidos a mediados de agosto.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Comienzan la postura en junio. Pone 4 huevos y alguna vez 5.
Contino (Instituto Miguel Lillo). Palma Sola, dpto. Santa Bárbara, Jujuy, 08-11-1969, nido con 2 huevos.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires. Un nido con 4 huevos el 28-10-1967 y otro con 3 huevos el 06-11-1967.
Zuberbühler (1971). Provincia de Buenos Aires. Nido con 4 huevos.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con huevos, el 23 de octubre.
Zapata (1977). Entre Ríos. Nido.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.
Myers y Myers (1979). Buenos Aires. Nido.
Contino (1980). Nidifica en diciembre en el noroeste.
Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.
Gallegos Luque (1984). Estancia La Armonía, pdo. General Las Heras, Buenos Aires, nidos desde fines de agosto hasta mediados de enero.
Narosky y Lozzia (1988). Formosa. Nido.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en setiembre con 4 huevos.
Partridge en Chebez (1992b). Misiones. Nido.
De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Nido.
Sosa (1995, 2005). Mendoza. Nido.
Jenny (1997). Wildermuth, dpto. San Martín, Santa Fe, el 20-12-1996, un nido con 4 huevos propios, tenía uno de Pirincho (*Guira guira*)

Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en setiembre.
Ríos en Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Christie et al. (2004). Nidos con huevos desde agosto a diciembre, en el noroeste patagónico.
Albrieu et al. (2004). Estuario del Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, construye el nido en el suelo, con pastos y piedritas.
Imberti (2005e). Nidifica en pastizales cercanos al agua, en el oeste de Santa Cruz.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se observaron 30 nidos. Anida desde fines de julio a mediados de enero.
Maugeri (2007). Laguna Epecuén, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 23-10-1999, nido con 3 huevos y 2 de Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*).
Capllonch (2007). Tucumán. Nido.
Tajer et al. (2007). Buenos Aires. Nido.
Bodrati et al. (2010). Misiones. Nidos. Bodrati (*in litt*. 2019), nidos en Tobuna, dpto. San Pedro, 17 de septiembre de 2007, 3 huevos. Pueblo de San Pedro, dpto. homónimo, 23 octubre de 2004, 2 huevos, Parque Provincial de La Araucaria, San Pedro, dpto. homónimo, 30 de octubre de 2003, 2 pichones. Santa Rosa, dpto. San Pedro, 20 de agosto de 2009, 3 pichones, Misiones.
Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.
De la Peña (2013c). En total 91 nidos, en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 66 nidos: 07-10-1970, 3 huevos, 15-06-1989, 4 huevos, 20-09-1989, 2 huevos y un pichón; 25-08-1998, 4 huevos, 25-08-1998, 3 huevos, 02-09-1998, 2 huevos, 22-09-1998, 2 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 17-10-1998, 3 huevos, 3 huevos; 05-02-1999, 3 huevos; 15-07-1999, 2 huevos; 17-10-2000, un huevo; 13-07-2003, 4 huevos; 30-07-2003, 2 huevos; 01-08-2003, 3 huevos; 09-08-2003, 4 huevos; 09-08-2003, 4 huevos; 10-08-2003, un huevo y un pichón, 4 huevos, 4 huevos; 13-08-2003, 4 huevos, 3 huevos, 3 huevos; 15-08-2003, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 17-08-2003, 4 huevos, 3 huevos; 18-08-2003, 4 huevos; 19-08-2003, un huevo; 06-09-2003, 3 huevos, 3 huevos; 15-09-2003, 2 huevos; 16-09-2003, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos; 20-10-2003, 4 huevos; 20-08-2004, 4 huevos; 24-08-2004, 3 huevos, 3 huevos; 06-09-2004, 3 huevos; 11-09-2004, 4 huevos; 27-09-2004, 3 huevos; 30-10-2004, 2 huevos, 3 huevos; 31-10-2004, 3 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 15-08-2005, 2 huevos; 3 huevos; 20-01-2007, 2 huevos; 03-09-2007, 3 huevos; 3 huevos; 20-09-2007, 4 huevos, 4 huevos; 09-01-2009, 3 huevos; 03-09-2112, 5 huevos. Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 5 nidos: 13-10-1972, 3 huevos; 03-08-1973, 3 huevos, 3 huevos; 03-01-1979, 4 huevos; 27-10-1983, 3 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 05-01-1979, 4 huevos; Llambi Campbell, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 18-10-1986, 3 huevos, 4 huevos; Río Ñirihuau, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 07-10-1989, 2 huevos; Los Amores, dpto. General Obligado, Santa Fe, 08-11-1989, 2 huevos; Laguna del Palmar, dpto. Vera, Santa Fe, 2 nidos: 18-11-1989, 4 huevos, 3 huevos; Malabrigo, dpto. General Obligado, Santa Fe, 02-1019-91, 4 huevos; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 10-10-1991, 4 huevos; Franck, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 12-11-1991, 1 huevo; Rincón de Ávila, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 09-12-1994, 3 huevos, 2 huevos; Ruta 13 y 36, dpto. Vera, Santa Fe, 14-11-1996, 2 huevos; Empalme San Carlos, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 3 nidos: 15-08-1998, 3 huevos, 17-08-1998, en construcción y 4 huevos, San Carlos Centro, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 12-07-2003, 2 huevos; La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, 20-01-1999, un huevo; Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 09-12-2007, 3 huevos; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 06-11-2012, 2 huevos.
Un nido construido con tallitos de yuyos y algunos trocitos de materias fecales de vaca. Algunos no tienen materiales. Miden un diámetro total, de 12 a 14 cm.
Salvador y De la Peña. 2014. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 03-09-2012 nido con 5 huevos; Gral. Las Heras, pdo. Gral. Las Heras, Buenos Aires, 09-07-2014, nido con 6 huevos.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 13 nidos.
Girard en Segura et al. (2014). Tucumán. Nido.
Runnacles en Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 13 nidos.
Salvador y De la Peña. 2014. Gral. Las Heras, pdo. Gral. Las Heras, Buenos Aires, 09-07-2014, nido con 6 huevos.
Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Rumbollor en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 81 nidos entre junio y febrero, en campos con pasturas naturales, rastrojos o alfalfares, posturas de 3 ó 4 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis J. Fontana, Chaco, 16-12-1982, un nido en un pastizal próximo a un bosque inundado, con 4 huevos.

Salvador en De la Peña (2016c). Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, Neuquén, 01-12-1986, un nido en la playa a orillas del lago, con 3 huevos frescos.
Rumboll en Salvador (2016a). Corrientes. Nido.
Sympson en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Moroni en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Bianchini (2017b). Neuquén. Nido.
Bianchini (2017c). Neuquén, dpto. Confluencia, 17-12-2016, nido con 7 huevos. San Pedro, Pdo. Madariaga, Buenos Aires, 24-10-2015, nido con 7 huevos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 04-09-2017. Nido con 4 huevos. A 150 m otro con 6 huevos, 04-01-2019, nido con 4 huevos.19-01-2019, nido en un montículo de tierra con 4 huevos.
Quiroga et al. (2019). Dpto Paclín, Catamarca, 29-11-2015, nido con 4 huevos.
De la Peña (2020). Esperanza. 02-09-2019. Tres nidos con 4 huevos cada uno.
Ker, V. (2020 *in litt*.). Progreso, Dpto. Las Colonias, Santa Fe. 18-11-2020, nido con 7 huevos.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Raramente 5 ó más. Cónicos o piriformes. De color verdoso, pardo, pardo verdoso o verde oliva, con manchas, pintas y rayitas negras y grises.

Medidas
Contino (Instituto Miguel Lillo): 44,3 x 34,5 y 44,5 x 33,6
Crawshay(1907): 51,2 x 35,0
Hartert y Venturi (1909): 45,0 a 48,0 x 32,0 a 34,0
Gibson (1920): 45,0 a 47,0 x 32,0 a 34,0
Pereyra (1938b): 45,0 x 33,0
Zapata y Cabrera (1969): 44,0 a 49,3 x 31,8 a 35,0 X= 46,9 x 33,8 (N= 7)
Contino (1980): 46,0 x 33,0
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990): X= 46,25 x 33,5
Di Giacomo (2005h): 42,7 a 47,7 x 31,5 a 33,8 X= 45,1 a 32,6 (N= 46)
Maugeri (2007): X= 42,6 x 28,7 (N= 3)
Quiroga et al. (2019): 44,7 a 48,9 x 33,3 a 34,3 X= 46,8 x 34,0 (N= 4)

De la Peña (2013c):
Para *V.ch.lampronotus*
De 41,2 a 51,5 x 31,3 a 35,5 X= 46,2 x 33,2 (N= 42)

Para *V. ch.chilensis*
De 49,2 a 53,8 x 34,4 a 35,4 X= 51,5 x 34,8 (N= 2)

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 44,1 a 50,9 x 32,1 a 36,7 X= 47,4 x 33,9 (N= 63)
Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 46,2 a 49,7 x 32,2 a 32,9 X= 48,0 x 32,7 (N= 4)
Salvador en De la Peña (2016c): 46,3 a 47,0 x 34,7 a 35,6 X= 46,6 x 35,0 (N= 3)
Bianchini (2017c): 46,4 a 49,2 x 33,0 a 34,5 X= 48,4 x33,8 (N= 5)

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 25,5 a 33 X=29,3 (N= 48)
Salvador en De la Peña (2016c): 28 a 29 X= 28,6 (N= 3)
Zapata y Cabrera (1969): 21,5 a 30,0 X= 25,7 (N= 7)
Di Giacomo (2005h): 21,0 a 27,2 X= 23,5 (N= 46)

Quiroga et al. (2019): 24,0 a 25,0 X= 24,7 (N= 4)

De la Peña (2013c):
Para *V.ch.lampronotus*
Peso: 20 a 28,0 X= 24,4 (N= 32)
Peso de las cáscaras: 1,625 a 1,980 X= 1,730 (N= 15)

Para *V. ch.chilensis*
Peso: 29,7 X= 29,7 (N= 2)
Peso de las cáscaras: 2,3 X= 2,3 (N= 2)

Anónimo (1933): huevos colectados en Tierra del Fuego por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24-36 horas. A los 3 días de edad, tienen los ojos marrones. Pico negro. Interior de la cavidad bucal, gris-rosado. Patas grises.
Plumón gris moteado de negro en la parte dorsal y alas (excepto la punta, que es blanca). Plumón de las primarias blanco. Franja oscura donde comienzan las secundarias.
Ventralmente blanco. Franja negra debajo de la nuca. Cuello blanco. Collar pectoral negro más ancho y más notable en los costados. A los 5 días se nota el espolón naciente.

Peso al nacer

De la Peña (2013c): 18,4 a 21,5 (N= 4)

MEDIDAS

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso	Tibia	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						2,4-3,1	3,6-4,1	1,0-1,3
3						3,4	4,3	1,2
5					1,5	3,4	4,3	1,4
11					1,5	3,9	4,7	1,5
28	1,2	0,9	1,4	2,3	4	5,9	7,2	2,2

Observaciones

Fiora (1939). Zapla, Jujuy, diciembre de 1930 dos pichones recién emplumados.
Olrog (1965b). Bañado de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, primera semana de junio de 1963, pichones de corta edad.
Humphrey et al. (1970). Desde Río Grande a Ushuaia, Peterson y Humphrey, el 28 de noviembre observaron pichones.
Christie et al. (2004). Pichones desde setiembre a diciembre, en el noroeste patagónico.
Salvador en Salvador (2016a). Mendoza. Adulto con pichones.
De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Humphrey et al. 1970). Tierra del Fuego. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.
De la Peña (2020). Esperanza. 04-01-2019. Pareja con 4 pichones.

Generalidades

Paradas nupciales
De la Peña (2013c). Realizan “paradas” desde tres a varios ejemplares juntos. Estas consisten en marchar con el cuerpo erguido, con pasos rápidos, corren y emiten voces fuertes. Se paran y agachan la cabeza, el pico casi rozando el suelo. Abren y elevan la cola y las alas están entreabiertas.
Corren juntos, a veces algunos levantan vuelo y a los pocos minutos regresan para reiniciar la ceremonia.
El 17-08-1998 en Empalme San Carlos se observó una cópula y la construcción del nido y a los 6 días puso el primer huevo. La pareja traía unos tallos de yuyos.

Período de puesta, incubación, cuidados
Pereyra (1938b). Período de incubación, 21 días.
Di Giacomo (2005h). Período de incubación, 28 días. Postura en días alternos.
De la Peña (2013c). Período de incubación, 25-26 días. Demora en la construcción del nido de 4 a 6 días. Pone en días corridos o alternos. Los pichones nacen en 24 a 36 horas. Algunos nidos son cuidados por tres adultos.

Costumbres
Cuando está en el nido y nota un extraño, puede levantarse rápidamente o se levanta y caminando despacio se agacha en distintas lugares para simular que se echa en otros nidos.
Los pichones duermen protegidos bajo el cuerpo de un adulto.
En algunos casos, sobre todo cuando están roturando la tierra, si los huevos son corridos de lugar por alguna persona, no los afecta, continúan con la incubación.
Algunos ejemplares cuando incuban permiten que el observador se aproxime a pocos centímetros del nido.
Ataca a perros y otros animales cuando está con huevos o con pichones.
Se los ha visto hacer frente a las vacas y ovejas que se aproximan al nido cuando comen. En estos casos se paran sobre el nido, entreabren las alas y llegan a picotear el morro del animal.
En Esperanza, en un lote de 10 hectáreas se contaron en forma simultánea 8 nidos. Dos nidos estaban separados por 30 metros.
Los pichones son depredados por los Caranchos y los Chimangos. Los huevos suelen ser destruidos por las personas y los pichones llevados como mascotas.

Otros
Pereyra (1937c)**.** Un ejemplar con Albinismo parcial.
De la Peña (1988a). Un ejemplar Albino total.
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial y dos con Dilución pastel.

Depredadores
De adultos: *Parabuteo unicictus* en Neuquén, Cusano en Salvador (2017a), *Geranoaetus melanoleucus* en Neuquén, Hiraldo et al. (1995), en Neuquén, Trejo et al. (2006a), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Bubo virginianus* en Formosa, Di Giacomo (2005h), *Bubo magellanicus* en Neuquén, Donázar et al. (1997), en Córdoba, Miatello et al. (1999), en Neuquén y Río Negro, Teta et al. (2001), en Río Negro, Trejo et al. (2005a), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), en Córdoba, Salvador et al. (2017), *Falco femoralis* en Buenos Aires, Bó (1999), en Córdoba, Salvador (2012), en La Pampa, Liébana (2015), *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), en Patagonia, Ellis et al. (2002), en Tierra del Fuego, McNutt (1981), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010)
De pichones: *Circus buffoni* en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Nycticorax nycticorax* en Córdoba, Salvador (2016b), *Falco sparverius* en Córdoba, Salvador (2016b), *Caracara plancus* en Santa Fe, De la Peña en De la Peña y Salvador (2010), en Córdoba, Salvador (2013a), *Geranoaetus polyosoma* en Río Negro, De Lucca (2011b)

Más información:
Gallegos Luque (1984)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pecho negro, en contraste con el blanco abdominal. Dorso gris. El copete y el grito.

Esperanza. Santa Fe. 03-09-2012. Nido con 5 huevos

Esperanza. Santa Fe. 22-10-2013. Incubando

Esperanza. Santa Fe. 01-11-2011

Esperanza. Santa Fe. 03-10-2005

Esperanza. Santa Fe. 06-01-2008. Parada nupcial

Esperanza. Santa Fe. 09-09-1999

Esperanza. Santa Fe. 10-10-2006
Nido con huevo de Gorrión *Passer domesticus*

Esperanza. Santa Fe. 10-10-2008. Incubando

Esperanza. Santa Fe. 14-01-2007

Esperanza. Santa Fe. 10-02-2008

Pregreso. Santa Fe. 18-11-2020 Foto: Verónica Kern

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Vanellus chilensis lampronotus (Wagler, 1827) en Salta, Jujuy, este de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja, de San Juan, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, este de Río Negro y noreste de Chubut ; *Vanellus chilensis chilensis* (Molina, 1782) en Jujuy, Salta, oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén y oeste de Río Negro

y de Chubut y *Vanellus chilensis fretensis* (Bordkorb, 1934) en Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas Malvinas. En otoño migra al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se extiende por Sud américa desde Panamá hacia el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Vanellus chilensis lampronotus (Wagler, 1827)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bianchini (2017c); Bó (1999); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Fiora (1939); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004b, 2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Maugeri (2007); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas y Bó (1986a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Soave et al. (1999); Straneck (1990b); Vargas et al. (2007); Weller (1967a); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Hartert y Venturi (1909); Navas y Bó (1986a); Pagnoni (2012a, 2012b); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Frenzel (1891); González-Calderón (2017); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 2012, 2013a, 2013e, 2016b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Barrows (1884c), Beltzer et al. (2006); Beltzer (1981c); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017); Serié y Smyth (1923)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Mamaní et al. (2018)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Bruno y Erro (2010); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Grilli et al. (2009); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986a); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b); Williamson (1975)

Observaciones: De la Peña (Anzoategui, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), Dique de Olta, dpto. Gral Belgrano, 16-02-2012, 2 individuos. Villa Unión, dpto. Felipe Varela, 25 al 30-06-2003, 4 individuos. Banda Florida, dpto. Felipe Varela, 26-06-2003 y febrero de 2009, 2 individuos. Olpas, dpto. Gral. Ocampo, 17-02-2012, 2 individuos. Paca Tala, dpto. Gral Belgrano, 17-02-2012, un individuo. Quebrada de los Condores, Sierra de los Quinteros, dpto. Gral. Belgrano, 18 al 22-02-2012, 2 individuos. Dique La Aguadita (pie de la Sierra de los Llanos, dpto. Chamical, 23-02-2012, varios individuos. Malanzán, dpto. Gral Facundo Quiroga, febrero de 2009, varios individuos.

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chatellenaz (2007); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Casas (1992a); De la Peña (2013c); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1986a); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Catriel, dpto. Gral. Roca, 20-11-1998, San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 22-11-1998)

Salta
Citas: Navas y Bó (1986a)

San Juan
Citas: Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Hartert y Venturi (1909); Lucero (2013i); Navas y Bó (1986a); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2018e)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Navas y Bó (1986a); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (San Luis, dpto. La Capital, 13-10-2004)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Beltzer et al. (2003-2004); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); De la Peña en De la Peña y Salvador (2010); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Quiroga y Hadad (2004); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Coria et al. (2017); Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Lucero (1983); Navas y Bó (1986a); Ortiz y Ruiz (2011)

Vanellus chilensis chilensis (Molina, 1782)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chubut

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 03-02-1976)

Jujuy
Citas: Budin (1931)

Observaciones: De la Peña (Jujuy, dpto. Capital, 06-02-1983)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); De la Peña (2013c); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Giacomelli (1923); Gómez (2006); Hellmayr (1932); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Navas y Bó (1986a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993a, 2005); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (Malargüe, dpto. Malargüe, 14-10-2004)

Neuquén
Citas: Bianchini (2017c); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1968, 1978, 1983a); De Lucca (2011b); Donázar et al. (1997); Fiori y Zalba (1999); Gollán (1951); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1948b); Heredia y Funes (1987); Hiraldo et al. (1995); Matarasso (2007); Navas y Bó (1986a); Pereyra (1945); Cusano en Salvador (2017a); Teta et al. (2001); Trejo et al. (2006a); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c., 1978c); Gelain y Tolosa (2011); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Navas y Bó (1986a); Teta et al. (2001); Trejo et al. (2005a); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976; 22-11-1998)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain (2008b); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f); Navas y Bó (1986a); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán (2006, 2013); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Cocimano et al. (2005b); Echevarría et al. (2008a, 2008c, 2014); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Handford (1983); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Quiroga (2017b)

Vanellus chilensis fretensis Bordkorb, 1934

Buenos Aires
Citas: Morici (2020)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Quiroga et al. (2019)

Chubut
Citas: Darrieu y Camperi 2000 (2001); Navas y Bó (1986a)

Neuquén
Citas: Bianchini (2017b); Navas y Bó (1986a)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Bó (1986a, 1990)

Santa Cruz
Citas: Brodkorb (1934); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Navas y Bó (1986a); Oustalet (1891); Peri (2013); Scott y Sharpe (1910); Travaini et al. (2004); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); McNutt (1981); Navas y Bó (1986a); Olrog (1948, 1950)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 01-02-1972)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

TERO SERRANO *Vanellus resplendens* (Tschudi, 1843)

Otros nombres: Avefría serrana. Leque-leque. Leuquencho. Lico lico. Tero de la puna. Teru teru de la puna. Teru teru serrano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-33 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 240 g
Navas y Camperi (2006): N= 1 (M) 230 g; N= 2 (H) 370 y 390 g

Coloración. Pico amarillo en la base, negro hacia la punta. Patas y espolones alares rosados. Iris rosado.
Cabeza, cuello y pecho grises. Garganta blanquecina. Dorso pardo con reflejos verdosos.
Semicollar blanco en dorsal del cuello que lo separa del dorso. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con blanco en la base de las primarias y de las secundarias. Secundarias más internas, blancas y negras. Cubiertas menores pardas violáceas, mayores blancas.
Cola con banda subterminal parda oscura.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos, caparazón de gasterópodo, minerales, vegetales, larvas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Su voz de alarma es un agudo Kier..kierrr.kier..kier...

HÁBITAT
Estepas y praderas húmedas y orillas de pantanos, charcos, arroyos, entre los 2000 y los 3800 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca
.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Expuesto. Rudimentario. Depresión en el suelo, revestida de pajitas, raicillas y líquenes.

Hartert y Venturi (1909). Altas cumbres, Tucumán, a 4400 m de altura, Dinelli localizó un nido, en febrero de 1903 con 4 huevos.
Budin (1931). Río Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, en febrero de 1931, nido con 4 huevos.
Dabbene (1972). Dinelli encontró huevos en la puna en el mes de febrero a 4.400 m de altura.
Contino (1980). En el Noroeste argentino se encuentran pichones recién nacidos desde diciembre hasta marzo.
Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 12-01-1973, nido con 3 huevos.
Salvador (1992). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 04-12-1987, nido con 4 huevos.
El nido estaba en una suave ladera herbácea (que recuerda césped cortado) y junto a una piedra plana de 15 x 17 cm. Es una depresión de 10 cm de diámetro y 3,5 cm de profundidad; poco revestida con líquenes, pajitas y raicillas, esta cama con un espesor de 1 cm.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nidifica de noviembre a enero.
Capllonch (2007). Tucumán. Nido.
Capllonch et al. (2011). Tucumán. Nido.
Capllonch y Quiroga (2013). Jujuy. Nido.
Capllonch y Quiroga (2013). La Quebradita, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, entre 2005 y 2011 se encontraron 5 nidos. Nidifica de noviembre a enero.
Uranga en De la Peña (2016c). Laguna El Huancar, dpto. Cochinoca, Jujuy, 27-01-2016, nido a 70 m de una laguna, depresión poco tapizada con pastos.Tenía 4 huevos.

Tilcara. Jujuy. 11-03-2014 Foto: Cynthia Arenas	Laguna El Huancar. Jujuy. 27-01-2016. Foto Máximo Uranga

Huevos
Pone 4 huevos. Piriformes. De base verde olivácea con pintas marrones oscuras y grisáceas distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo Mayor.

Medidas
Salvador (1992): de 45,1 a 47,5 x 33,1 a 34,5 X= 46,5 x 35,2 (N= 4)
Capllonch y Quiroga (2013): de 45,0 a 47,0 x 32,0 a 33,0

Peso
Salvador (1992): de 25,2 a 27,8 X= 26,5 (N= 4)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Pico negro. Paladar rosado. Patas grisáceas. Uñas negras. Piel oscura.
Cara con puntillado pardo. Cejas crema. Corona marrón claro jaspeada de gris y ocre. Garganta blanquecina. Pecho gris. Abdomen blanco.
Espalda blanca con plumón pardo en la nuca. Dorsalmente plumas marrones con los bordes ocres. Cubiertas alares oscuras (tornasoladas) orilladas de ocre, formando un barrado.
Primarias negras de 7 cm. Secundarias blancas, de 5 cm. Rabadilla con plumón pardo y ocre.
Ventral de la cola blanca, le sigue una barra negra y termina en ocráceo. Las tres plumas externas blancas.

Observaciones
Contino (1980). En el noroeste, pichones de diciembre a marzo.
Capllonch et al. (2011b). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán. Pichones y juveniles.
Capllonch y Quiroga (2013). Jujuy. Adulo con pichones
De la Peña (2013c). Abra Pampa, dpto. Cachinoca, Jujuy, 04-02-1977, una pareja andaba con un pichón.
Acosta, N. en De la Peña (2013c). Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 28-12-2002, pareja con un juvenil.
Capllonch y Quiroga (2013). Ruta Provincial Nº 5, entre Yavi y La Quiaca, dpto. Yavi, Jujuy, enero de 2010, pichones.
Salvador (2015). Cortaderas, dpto. Tinogasta, Catamarca, 11-03-2008, una pareja con dos pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pecho gris. Mancha alar blanca. El hábitat.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Vanellus resplendens (Tschudi, 1843) entre los 2000 y los 3800 m de altura en Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendosa, Tucumán y Catamarca. Observado además en el norte de Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra entre 2.000 y 3.800 metros de altura en la cordillera de Los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Carma (2009); Navas y Camperi (2005, 2006); Pereyra (1942a); Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 28-12-2002)

Córdoba
Citas: Michelutti y Torres (2006)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Fiora (1933, 1939); Laredo (1996); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Narosky (1988); Navas y Camperi (2005, 2006); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Cieneguillas, dpto. Santa Catalina, 10-02-1983)

La Rioja
Citas: Navas y Camperi (2005); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Navas y Camperi (2005); Moschione et al. (2013); Salvadori (1897)

San Juan
Citas: Agnolín et al. (2009); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Baer (1904); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b, 2020); Capllonch y Quiroga (2013); Echevarría et al. (1998, 2007, 2000a, 2008c, 2008b, 2011); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lillo (1902, 1905); Lucero (1983); Navas y Camperi (2005, 2006); Navarro et al. (2000); Olrog (1949a); Salvador (1992)

CHORLITO PALMADO *Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825

Otros nombres: Butuirá. Chorlitejo semipalmado. Chorlito de dedos semipalmados. Chorlito semipalmado. Chorlo semipalmado. Pollito de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-19 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 4 (M) X= 52,3 g (Rango: 49 a 59); N= 1 (H) 42 g; N= 145 (?) X= 39,4 g (Rango: 20 a 70)

Coloración. Pico negro con la base rojiza. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Cabeza y dorso pardos. Frente, cejas, mancha detrás de los ojos, garganta y collar nucal blancos. Ventral blanca con banda parda en el pecho.
Alas pardas oscuras con banda blanca. Cubiertas pardas.
Cola parda con la punta blanca
Plumaje nupcial.
Pico negro con la base naranja. Patas naranjas. Iris pardo oscuro.
Cara, anterior de la corona y banda pectoral negros. La banda se continúa por detrás del cuello formando un collar.
El resto del plumaje como en reposo sexual pero con la corona más oscura.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma bandadas.

HABITAT
Costas marinas, de lagunas y bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Collar nucal blanco. Banda pectoral parda.
Se parece al Chorlito de collar, pero tiene collar nucal blanco y carece de canela en las partes dorsales. Diferente color de pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta La Rioja, Mendoza, Neuquén, norte de Río Negro, Entre Ríos y por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el ártico migrando hacia el sur en el invierno boreal, distribuyéndose principalmente por la costa del Océano Pacífico hasta Chile y por las del Atlántico hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Canevari et al. (1991b); Fiameni (1994); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Dabbene (1929a); Isacch et al. (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991-1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Sainz-Trápaga (2014)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Lonnberg en Dabbene (1920d)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Tittarelli (2002)

La Rioja
Citas: Lobo Allende y Marano (2017)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019); Sosa (1993b, 1995d, 2003, 2005)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1920a); Seebohm (1887); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c, 2011f)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Humphrey Bridge (1970); Olrog (1979b)

CHORLITO MONGOL *Charadrius mongolus* Pallas, 1776

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-21 cm.

Coloración. Pico negro. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Dorsal gris. Ventral blanco. Pecho y corona castaños. Oscuro alrededor de los ojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Observado en las costas de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. China, Mongolia, Rusia, Siberia. Migra a India, Asia, África, Australia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Le Nevé y Manzione (2011)

CHORLITO PICUDO *Charadrius wilsonia* Ord, 1814

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5-20 cm.
Coloración. Pico negro, grueso. Patas rosa grisáceas. Iris pardo.
Dorsal pardo. Frente blanca con banda negra en la parte superior. Ventral blanco con collar pardo.
En el período no reproductivo sin la banda negra y la banda pectoral poco notable.
Plumas externas de la cola blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Observado en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Estados Unidos, América Central, Caribe. Migra a Perú, norte de Argentina, Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Charadrius wilsonia beldingi (Ridgway, 1919) (*) Posible subespecie

Jujuy
Citas: Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

CHORLITO DE COLLAR *Charadrius collaris* Vieillot, 1818

Otros nombres: Angelito. Arenero. Chorlaco. Chorlitejo de collar. Chorlito. Chorlito costero. Chorlito de collar negro.Chorlo. Mbatuituí collar negro. Pollito de mar. Terito de arena. Terito de arenales.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14-16 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 2 (?) 31,2 y 34,5 g
Camperi (1992a): N= 1 (M) 31,4 g; N= 1 (H) 34,5 g
Salvador (2014a): N= 1 (M) 29,5 g; N= 2 (H) 30,3 y 31,3 g

Coloración. Pico negro. Patas amarillo-naranjas. Iris pardo oscuro.
Adulto.
Frente, garganta, manchita posoculares y partes ventrales blancas. Anterior de la corona, línea loral y banda en superior del pecho negras. Cara, nuca y cuello posterior canelas rojizos. Dorso pardo con las plumas orilladas de canela. Rabadilla blanca con central pardo.
Remeras pardas oscuras con la base blanca. Secundarias y cubiertas pardas con punta blanca.
Cola parda con las plumas externas blanquecinas.
Juvenil.
Similar al adulto pero con la corona y collar pectoral pardos.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja, a veces en grupo. Corre rápido.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos, semillas.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleopteros. Dípteros (larvas acuáticas).
Beltzer (1986d). **Insectos:** Coleóptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, Curculionidae, Carabidae). Diptera (Chironomidae, *Glyptotendipes* sp.). **Moluscos:** (Hydrobiidae, *Littoridina parchappei*) (Planorbidae).
Beltzer y Lajmanovich (1990). **Insectos:** Coleópteros. Coleoptera (Carabidae). Ephemeroptera (*Campsurus* sp.). Hemiptera (Belostomidae). Lepidoptera (Larvas). Ortoptera (Grillotalpidae). **Moluscos:** (Planorbidae). **Vegetales:** semillas (Polygonaceae, *Polygonum acuminatum*).
Beltzer (1991a). **Insectos:** Coleóptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, Curculionidae, Carabidae). Diptera (Chironomidae, Glyptotendipes sp.). **Moluscos:** (Hydrobiidae, *Littoridina parchappei*) (Planorbidae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, larvas). Hemiptera (Corixidae). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.)

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Hace un corto y esporádico Pip....piph...

HÁBITAT
Orillas de ríos, de esteros, de lagunas, bancos de arena.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Salta, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En el suelo. En bancos de arena, playas o islas arenosas, orillas de ríos y de lagunas.
Expuesto. Rudimentario. Excavación en el suelo arenoso o salitroso. Sin aporte de materiales.

Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.
Gibson (1920). Buenos Aires. Nido
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 3 nidos: 16-10-1922, con un huevo, 21-10-1925, un huevo y 03-10-1926 con 3 huevos.
Fiora (1939). Río Ledesma, agosto de 1933 una hembra con un huevo a término.
Klimaitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 2 nidos con 2 y 3 huevos cada uno, en una colonia de *Sternula superciliaris* y *Rynchops niger*.
Maugeri (2005). Río Paraná inferior, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 27-01-2001, nido con huevos, junto al Gaviotín chico común (*Sternula superciliaris*)
Coconier et al (2007). Salta. Nido.
De la Peña (2013c). Reconquista, dpto. General Obligado, Santa Fe, 2 nidos: 01-11-1975, 3 huevos y 2 huevos; Río Paraná (Boca del Yacaré). Dpto. Garay, Santa Fe, 31-11-1977, 2 huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 7 nidos: 22-11-1977, 2 huevos y 3 huevos; 04-11-78, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 2 huevos, 2 huevos; Laguna Setubal, dpto. La Capital, Santa Fe, 14-12-1989, 2 huevos; Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe, 3 nidos: 09-09-1995, 3 huevos; 11-11-2000, 2 huevos y 2 huevos; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 2 nidos: 18-10-1998, 3 huevos; 24-10-1998, un huevo.
Medidas: diámetro total: de 5 a 8 cm, profundidad: de 1 a 3 cm.

Capovilla, P. (2015). Parque Gral. San Martín, dpto. Paraná, Entre Ríos, 13-09-2015, nido con 3 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Klimaitis y Borba (2016). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, 27-10-2007, nido con 3 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos entre octubre y diciembre, en playas de lagunas salinas y en costas de arroyos, postura de 3 huevos.
Salvador, Salvador y Fraga en De la Peña (2016c). Banco Caraballo, río Uruguay, dpto. Colón, Entre Ríos, 10-01-1985, nido en una depresión en la arena, con un pichón recién nacido y un huevo.
Salvador en De la Peña (2016c). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 28-10-1991, nido en una depresión, a 7 m de la laguna, con 3 huevos a punto de eclosionar.
Narosky e Yzurieta en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
De la Peña (2019b). Saladillo y ruta 62. Dpto. San Justo. Salta Fe. 15-11-2016. Nido con 2 huevos, El 09-12 tenía un pichón.
Bodrati (*in litt.* 2019). Isla del Cerrito, dpto. Bermejo, Chaco, 12-12-1998, dos nidos, uno con 2 y otro con 3 huevos, en la playa del río Paraguay.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales o cónicos. De color pardo, ocre u ocre oscuro, con pintas y manchitas pardas oscuras y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 28,0 a 30,0 x 21,0 a 22,0
Klimaitis y Moschione (1984): 27, 5 a 30, 1 x 20,5 a 21,2 X= 28,8 x 20,8 (N= 5)
De la Peña (2013c): 26,5 a 30,4 x 20,8 a 22,4 X= 28,1 x 21,4 (N= 16)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 26,9 a 29,8 x 21,1 a 22,7 X= 28,5 x 22,1 (N= 9)
Salvador, Salvador y Fraga en De la Peña (2016c): 28,6 x 21,9

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 6,9 a 8,3 X= 7,7 (N= 9)
De la Peña (2013c): 7 a 7,1 X= 7,05 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,343 a 0,431 X= 0,384 (N= 16)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Plumón crema amarillento con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.

Observaciones
Christie et al. (2004). Pichones en enero, en el noroeste patagónico, observados por E. A. Casas.
De la Peña (2013c). Río Paraná (Paraná). 22-11-1977. Pareja con 2 pichones en banco de arena; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 01-11-94. Pareja con un pichón chico, cruzando un camino de tierra. Ruta 13 y Río Saladillo, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 14-11-96. Pareja con 2 pichones chicos. Villa Roda, 09-03-2007, adulto con 3 pichones chicos.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en La Pampa, Galmes et al. (2008b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Ventral blanca con corona y collar pectoral negro.

Esperanza. Santa Fe. 18-10-1998

Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007

Monte Vera. Santa Fe. 09-09-1995

Monte Vera. Santa Fe. 09-09-1995

Villa Roda. Santa Fe. 01-11-1994. Pichón

Campo Andino. Santa Fe. 01-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Charadrius collaris Vieillot, 1818 en todo el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y norte de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se destribuye desde Méjico hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Filipello y López de Casenave (1993); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Klimaitis y Borba (2016); Maugeri (2005);Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Mougeri (2005); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1963b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926); White (1882); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Heinonen Fortabat et al. (1992); Salvador (1990a)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), especie relativamente común en las costas del río Paraná y el río Paraguay en los dptos. Bermejo, Libertad, 1º de Mayo y San Fernando, ingresando en el interior por ríos o arroyos como el Guaicurú o el Tragadero cuando existe la oferta de playas arenosas.

Chubut
Citas: Babarskas y Flombaum (1998)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1991-1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b, 1983c); Chatellenaz et al. (2010); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939)

La Pampa
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005cc); Galmes et al. (2008b); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Heinonen Fortabat et al. (1992)

Bodrati (*in litt*. 2019). Salina La Antigua, dpto. Chamical, La Rioja, 23-02-2012, dos individuos en sectores encharcados del salar.

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Darrieu et al. (1989); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Pereyra (1927e); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Nores e Yzurieta (1982b); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Christie et al. (2004); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Casas (1986b); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Navas (1970b); Nores e Yzurieta (1992); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, pdto. Cafayate, 08-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986d, 1991a); Beltzer et al. (2003-2004); Beltzer y Lajmanovich (1990); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2013); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Moschione y Bishels (2004); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

CHORLITO PUNEÑO *Charadrius alticola* (Berlepsch & Stolzmann, 1902)

Otros nombres: Chorlitejo serrano. Chorlito serrano. Chorlo andino. Chorlo de la puna. Chorlo de las sierras. Chorlo serrano.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17-18 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 42 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Frente, cara, garganta y partes ventrales blancas. Anterior de la corona, región auricular y línea a los lados del cuello negras. Nuca y cuello posterior rojizos. Resto de lo dorsal y cubiertas alares pardos.
Remeras pardas con blanco hacia la base, formando una banda. Secundarias pardas con puntas blancas.
Cola parda en el centro y blanca en los costados.
En invierno carece de rojizo y el negro de la cabeza y del cuello es pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos.

HÁBITAT
Orillas de ríos y lagunas, entre los 3000 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Catamarca, La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									

Ligera depresión del suelo.

Höy (1967). Altiplano de Jujuy, enero de 1965, nido con 2 huevos.
Salvador et al. (2016a). La Rioja. Nido.

Huevos
Pone 2. Piriformes. Pardo claro con puntos violetas y rayitas negras.

Medidas
Höy (1967): 34,8 x 24,7 y 34,9 x 24,2

Pichones
Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, pichones y juveniles en enero.
Salvador (2015). Cortaderas, dpto. Tinogasta, Catamarca, 11-03-2008, pareja con 2 pichones pequeños.
Salvador et al. (2016a). La Rioja. Adulto con pichones

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral blanca, sin collar. Negro por detrás de la frente y a los lados del cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Charadrius alticola (Berlepsch & Stolzmann, 1902) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan.

SUBESPECIES.Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Por la cordillera de Los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Dabbene (1919a); Salvador (2015)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Höy (1967); Laredo (1996); Olivera (2009); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 04-02-1977)

La Rioja
Citas: de La Fuente (2002); Salvador et al (2016a)

Mendoza
Citas: Bodrati (2005c); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2012h); Martínez et al. (2009); Olivera et al. (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Bodrati (2005c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene y Montañez (1996); Lucero (2012c, 2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Ortiz et al. (2005)

CHORLITO DOBLE COLLAR *Charadrius falklandicus* Latham, 1790

Otros nombres: Angelito. Chorlaco. Chorlitejo de doble collar. Chorlito. Chorlito dos collares. Chorlo de doble collar. Chorlo de las Malvinas. Playero de la patagonia. Pollito de mar. Tero de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-19 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (M) 75 g
Contreras (1975): N= 1 (M) 66 g
Salvador (2014a): N= 1 (H) 63,7 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Frente blanca. Anterior de la corona negra. Posterior de la corona y del cuello canela rojizo. Resto de las partes dorsales pardo grisáceo. Rabadilla parda. Ventral blanca, con dos collares negros. Uno fino en el cuello y el otro ancho sobre el pecho.
Primarias pardas con blanco hacia la base formando una banda. Secundarias pardas con punta blanca.
Cola con las plumas centrales pardas oscuras, las laterales blanquecinas.

En el plumaje de reposo sexual, el negro de la cabeza y de las bandas es reemplazado por un grisáceo.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma grupos de pocos ejemplares.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:** Coleópteros. Vegetales.
Zotta (1932). Coleópteros (*Clavicornia*). Hemípteros. Himenópteros.
Humphrey et al. (1970). Coleópteros.
Klimaitis (1993). Caracoles pequeños. Piedritas. Semillas.
D´Amico et al. (2004). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos:** Cangrejos (*Cyrtograpsus affinis*). **Insectos**. **Anélidos:** Poliquetos (*Travisia olens*), (*Glycera americana*), (*Laeonereis acuta*).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Diptera. Hymenoptera (Formicidae). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*)
Musmeci et al. (2013). **Poliquetos:** *Travisia olens***. Moluscos bivalvos:** *Darina solenoides, Tellina petitiana,* Mytilidae indeterminado. **Insectos:** hormigas y coleópteros. **Crustáceos:** isópodos y anfípodos. **Semillas.**

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En playas con piedritas, en orillas de ríos, de lagunas o costa marina.
Expuesto. Rudimentario. Excavación en el suelo.

Durnford (1878). Valle del Río Chubut, 29-09-1977, nido con huevos.
Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 4 nidos, entre agosto y setiembre.
Gibson (1918, 1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 28-10-1885, nidos con huevos.
Wetmore (1926). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 01-10-1923, 2 huevos.
Zapata (1967). Santa Cruz. Nido.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 13 al 19 de noviembre de 1971, nido con 3 huevos.
Nores e Yzurieta (1975). Laguna Mar Chiquita, Río Ancho, dpto. Tulumba, Córdoba, 29-09-1973 a 03-10-1973, nido con 3 huevos.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con 3 huevos, el 24 de octubre.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nidos.
Myers y Myers (1979). Buenos Aires. Nido.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Sosa (1995). Mendoza. Nido.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de setiembre a enero, nidos.
Yorio et al. (1998a). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.

Blendinger (en Sosa, 2005). Nidos en salitrales de la zona de Cari Lauquen, dpto. Chos Malal, Neuquén, en verano de 2001
Maugeri (2007). Buenos Aires. Nido.
Maugeri (2007). Laguna Epecuén, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 23-10-1999, nido con 2 huevos y 3 de Tero (*Vanellus chilensis*). Originalmente el nido tenía 3 huevos.
García Peña et al. (2008). Playa Fracasso (Península Valdés) y playas cercanas a Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, entre el 26 de octubre de 2006 y el 11 de enero de 2007, 45 nidos.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nidos.
Villabriga et al. (2009). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, nidifica de octubre a diciembre. Posturas de 3 huevos.
Nadal, E. (2014). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 17-10-2014, nido con 3 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Punta Honda, dpto. Sierra Grande, Río Negro, 21-11-1983, nido en una depresión en un suelo con conchillas, con 3 huevos frescos.
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Salvador en De la Peña (2016c). Puerto Pirámides, dpto. Biedma, Chubut, 02-12-1995, nido en una depresión en la playa de canto rodado con 3 huevos.
Uranga en De la Peña (2016c). Camarones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 01-12-2013, dos nidos con 3 huevos cada uno.
Sainz-Trápaga en De la Peña 2016c. Playa Paraná, Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 25-10-2014, nido con 3 huevos.
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Nidos.
Sainz Trápaga, S. (2014a). Puerto Madryn, Chubut, 18-10-2014, nido con huevos.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Halliday en MVZ, en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Bianchini, M. (2017b). Nido en Neuquén.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Piriformes. Pardo amarillento, manchados de marrón oscuro, negro y púrpura pálido, mayormente en el polo mayor.

Medidas
Durnford (1878): 35,0 x 25,0
Gibson (1920): 36,0 a 39,0 x 25,0 a 27,0
Nores e Yzurieta (1975): 36,0 a 38,0 x 20,0 a 25,0 X= 37,0 x 21,6 (N= 3)
Maugeri (2007): X= 35,2 x 25,5 (N= 2)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 35,7 a 36,3 x 24,3 a 25,3 X= 36,0 x 24,8 (N= 3)
Salvador en De la Peña (2016c): 34,9 a 35,7 x 24,4 a 25,7 X= 35,3 x 24,9 (N= 3)

Peso
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 10,1 a 10,9 X= 10,5 (N= 3)

Anónimo (1933): huevo colectado en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

Playa Paraná, Madryn. Chubut. 25-10-2014.
Foto: Santiago Sainz-Trápaga

PICHONES

Descripción

Zapata (1967). Plumón blanco acanelado en el vientre, gris oliváceo con manchas y rayas negras en la parte dorsal. Patas gris verdosas y el pico oscuro con ápice negro.

Observaciones

Durnford (1878). Valle del Río Chubut, 29-09-1977, adultos con pichones.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 20-10-1961, pareja con un pichón y el 25 otra con 2 pichones.
Reynolds en Humphrey et al. (1970). 18-12-1929, pichones en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Rumboll, el 17-01-1974 observó pichones.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. El 20-11-2004, adulto con pichones en costas salitrosas de la laguna Bravina (Agua Escondida)
Boswall y Prytherch (1972). Chubut. Adulto con pichones.
Boswall (1973). Chubut. Adulto con pichones.

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985)

Más información:
García Peña et al. (2008)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Ventral con dos bandas negras o pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Charadrius falklandicus Latham, 1790 desde Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. En otoño migra al norte hasta Catamarca, Santiago del Estero.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en el sur de Sud América migrando hacia el norte en el invierno austral hasta Uruguay y sureste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Lucero (1982); Marelli (1933); Maugeri (2007); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927f, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Camperi (1998); Contreras (1975); D´Amico et al. (2004); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Gatto et al. (2005); Musmeci et al. (2013); Pagnoni (1995, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 04-02-1972)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1975, 1980b); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda et al. (2008); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Roig (1965); Sosa (1993b, 2003, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Bianchini, M. (2017b); Chehebar et al. (1992); Daciuk (1968, 1983a); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988a); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Oustalet (1891); Scott y Sharpe (1910); Sharpe (1896); Straneck (1990a); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Giraudo et al. (2008); López-Lanús et al. (2013a); Luna y Manassero (2010, 2013); Romano et al. (2005)

Santiago del Estero

Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Dacuik (1983c); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

CHORLITO PECHO CANELA *Charadrius modestus* Lichtenstein, 1823

Otros nombres: Chorlitejo pecho rojo. Chorlito cabezón. Chorlito de invierno. Chorlito de pecho castaño. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito de pecho rojo y negro. Chorlito de pecho colorado. Chorlito pechicolorado. Chorlo canela. Chorlo de campo. Chorlo de invierno. Chorlo negro. Chorlo pechicolorado. Pollito. Pollo colorado. Pollo de mar. Pollo negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-22 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 77 g
Salvador (2014a): N= 1 (M) 77 g

Coloración. Pico negro. Patas grises verdosas. Iris pardo.
Cara grisácea. Frente y superciliares blancas. Corona, nuca, dorso y rabadilla pardos. Anterior del cuello y pecho canelas rojizos separada por una banda negra del blanco del vientre.
Alas pardas. Cola parda con las plumas externas blancas.
En el plumaje de reposo sexual el cuello y el pecho son pardos cenicientos y la banda negra es poco notable.

COMPORTAMIENTO
Bastante manso, confiado. En invierno forma bandadas.

Alimentación
Crawshay (1907). Insectos. Larvas.
Zotta (1934). Lepidópteros. Piedritas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae,Chrysomelidae). **Moluscos:** (*Planorbis* sp.) (*Kermatoides* sp.). Minerales.
Humphrey et al. (1970). Crustáceos. Ostras. Algas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Arácnidos. Otros: s**emillas, vegetales, lombrices.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Hymenoptera (Formicidae). **Moluscos:** Planorbidae: (*Biomphalaria* sp.)

HÁBITAT
Turbales, costas marinas, de lagunas y de ríos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Expuesto. Rudimentario. Base de pasto o musgos.

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.
Olrog (1950). Tierra del Fuego. Nido.
Humphrey et al. (1970). Tierra del Fuego, huevos en octubre.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Tres nidos con 3 huevos cada uno, el 30 de octubre.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y noviembre, en el suelo, generalmente en murtillares. Ambos sexos incuban.
Spooner en WFVZ, en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.
Peddar en WFVZ, en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Halliday en WFVZ, en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Narosky en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos. De color leonado con manchas pardas y grisáceas más concentradas en el polo mayor.

PICHONES
Observaciones
Hartert y Venturi (1909). Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, juveniles el 20-02-1898.
Humphrey et al. (1970). Perterson y Humphreyy, 18-12-1960, pichones en Cabo San Pablo.
Reynold en Humphrey et al. (1970). Pichones en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, el 02-02-1929.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), *Falco femoralis* en Entre Rios (A. Bodrati obs. pers).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pecho canela con banda negra que separa el blanco ventral. Cejas superciliares. En reposo sexual cejas superciliares blancas y pecho pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Charadrius modestus Lichtenstein, 1823 en Tierra del Fuego y las islas Malvinas.
En otoño migra hasta Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en extremo sur de Argentina incluyendo las islas Malvinas y sur Chile. En su migración invernal alcanza hasta Uruguay y extremo sureste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Carrizo et al. (2001); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (1998, 2003); Klimaitis (1975b); Marelli (1933); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo

(1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990a)

Chubut
Citas: Harris (2008); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Burmeister (1861); Frenzel (1891); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1987a); Contreras y Contreras (1984)

Entre Ríos
Citas: De la Peña (2012b)

Observaciones : A. Bodrati (*in litt*. 2019). Perdices, dpto. Gualeguaychú, 20 junio de 2003, grupos y bandadas en campos húmedos. Ceibas, dpto. Islas del Ibicuy, bandadas o individuos aislados en diversas ocasiones en mayo y junio (1992-1993), Mayo (1994), junio (1996), junio (1997) y Julio (2000).

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Di Giácomo et al (2007); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1993b, 1995d, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945)

Río Negro
Citas: Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005cc); Ferrari y Albrieu (2005); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Giraudo et al. (2008); López-Lanús et al. (2013a); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

CHORLITO DE VINCHA *Phegornis mitchellii* (Fraser, 1845)

Otros nombres: Becasina. Becasina de las ciénagas. Chorlitejo de corona. Chorlito cordillerano. Chorlito coronado. Chorlito de las ciénagas. Chorlito de las vegas. Chorlo. Chorlo de Mitchell. Chorlo diademado. Chorlo vincha blanca. Pollito cordillerano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-19 cm.
Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo.
Cabeza parda. Cejas superciliares blancas hasta la nuca. Nuca y posterior del cuello castañas. Anterior del cuello blanca. Partes dorsales pardas. Ventral gris blanquecina barrada de pardo. Alas pardas grisáceas. Secundarias con puntas blanquecinas. Cola parda con las plumas externas barradas de blanco.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Relativamente manso.

HÁBITAT
Orillas de ríos y ciénagas de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Mendoza, Catamarca, La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									N

Expuesto. Rudimentario. Plataforma circular con pocos pastos en la base.

Fernándes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997). Laguna Los Horcones, dpto. Las Heras, Mendoza, 06-12-1993, nido sobre la arena a 25 cm de un pequeño curso de agua. Nido circular de pastos secos, de 8 cm de diámetro y 2 cm de profundidad, tapizado con piedritas.
Ferrer et al. (2013a). Parque Provincial Aconcagua, dpto. Las Heras, Mendoza, 20-01-2008, nido circular de 10 cm de diámetro, con 2 huevos. Casa de Piedra, 3 nidos: 05-03-2009, nido con 2 huevos, el 04-12-2010, nido con 2 huevos y el 27-12-2010 otro con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Piriformes, de color oliva grisáceo con pintas negruzcas, gruesas y finas.

Medidas
Fernándes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997): 36,0 x 25,3 y 34,8 x 24,1

PICHONES
Observaciones
Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, juveniles en febrero.
Vitale y Cockle (2012). Laguna brava, dpto. Vinchina, La Rioja, 08-02-2009, pareja con 2 pichones.
Ferrer et al. (2013a). Parque Provincial Aconcagua, 19-02-2008, adulto con 2 pichones (observados por D. Cucchiara), Casa de Piedra, 06-01-2008, dos adultos y 2 pichones.
Salvador (2015). Paso San Francisco, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, pareja con 2 pichones pequeños.

Más información:
Ferrer et al. (2013a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Notables cejas blancas. Castaño en la parte posterior del cuello. Ventral barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phegornis mitchellii (Fraser, 1845) en la cordillera y precordillera del oeste, desde Jujuy y Tucumán hasta Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Cordillera de los Andes en Perú, Chile, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Salvador (2015)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Laredo (1996)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Vitale y Cockle (2012)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Fernandes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997); Ferrer et al. (2013a, 2018, 2019); Ferrer (2016); Lynch Arribalzaga (1902); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

OSTREROS

FAMILIA: HAEMATOPODIDAE

Aves de pico largo, fuerte y aplanado, lo que les permite sacar a los moluscos de sus valvas.
Frecuentan costas marinas, riberas de arroyos, ríos, lagunas, zonas húmedas en estepas.
Se alimentan de crustáceos, moluscos y larvas.

OSTRERO PARDO *Haematopus palliatus* Temminck, 1820

Otros nombres: Fil fil. Ostrero americano. Ostrero blanco. Ostrero de abdomen blanco. Ostrero de Dunford. Ostrero de la patagonia. Pilpilén. Pitanay. Tero costero. Tero de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-44 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 2 (H) 600 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) juvenil 440 g

Coloración. Pico rojo. Patas blanquecinas rosadas. Iris anaranjado.
Cabeza, cuello y superior del pecho negros. Rayita blanca debajo de los ojos. Partes dorsales, cubiertas alares, primarias y parte de las secundarias pardas. Inferior del pecho, punta de las secundarias y de las cubiertas mayores, supracaudales, y resto de las partes ventrales blancos.
Cola parda oscura con base blanca.

COMPORTAMIENTO
Vuela a baja altura. Anda en pareja o en grupos.

Alimentación
Crawshay (1907). Larvas.
Humphrey et al. (1970). Larvas. Ostras. Vegetales.
Martínez y Bachmann (1997). **Moluscos:** Psammobiidae (*Tagelus plebeius*). **Crustáceos:** Cangrejo (*Cyrtograpsus angulatus*).
Bachmann y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejo (*Cyrtograpsus angulatus*). (*Chasmagnathus granulata*).
Albrieu et al. (2004). Moluscos. Poliquetos.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Moluscos:** Mactridae (*Darina solenoides*). Mesodesmatidae (*Mesodesma mactroides*). Mytilidae (*Aulocomya ater*, *Brachidontes rodriguezi*). Naticidae (*Natica isabellana*). Ostreidae (*Crassostrea gigas*). Psammobiidae (*Tagelus plebeius*). Tellinidae (*Tellina petitiana*)
Oscar, D. (2014). **Moluscos:** Uña de vieja (*Tagelus plebeius*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Oscar, D. (2015). **Crustáceos:** Cangrejo granuloso (*Neohelice granulata*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Meyer, P. M. (2015). **Moluscos:** Oliva inflada (*Olivancillaria deshayesiana*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Oscar, D. (2016). **Crustáceos:** Cangrejo granuloso (*Neohelice granulata*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Tolosa, H. (2017). **Crustáceos:** Cangrejo de las rocas (*Cyrtograpsus angulatus*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Su voz es un agudo silbo Juiiit..Juiiít.: que suele finalizar con un Pirrrippirrrhh...

HÁBITAT
Costas marinas, playas, orillas de lagunas, lagos y de ríos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N							N	N	N	N

En el suelo arenoso o entre piedras.
Expuesto. Poco elaborado. Depresión con caparazones de ostras, huesos o piedritas, en la base o en el reborde.

Durnford (1878b). Chubut. Nido.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 08-12-1913, nido.
Wetmore (1926). Buenois Aires. Nido.
Boswall y Prytherch (1972). Chubut. Nido.
Daciuk (1977a, 1977b). Chubut. Nido.
Bertellotti et al. (1995). Islote Notable (Isla de los Pájaros), dpto. Biedma, Chubut, 16 nidos.
Bachmann y Martínez (1998). Reserva Mar Chiquita, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, desde el 9-09 al 02-11-1997, 33 nidos, con huevos.
González et al. (1998). Islotes frente a Punta Verde, dpto. San Antonio, Río Negro, en 1994 se contaron 12 nidos en el islote mayor y 5 nidos en el islote menor; en Isla Novaro, dpto. San Antonio, Río Negro, 24 nidos.
González et al. (1998). Islote Redondo, dpto. San Antonio, Río Negro, en 1995, 3 nidos.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, en 1994, 16 nidos; Isla Primera, en 1993, 6 nidos, en 1993, 2 nidos en Punta Pirámide, dpto. Biedma, Chubut.
Yorio et al. (1998a). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Cumbre, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, en 1994, 3 nidos.
Albrieu et al. (2004). Nidifica en octubre y noviembre. Construye el nido sobre la arena o entre cantos rodados, en la zona costera. Suele colocar restos de valvas y piedritas.
Simonetti y Fiori (2009). Estuario de Bahía Blanca, dpto. Villarino, Buenos Aires, primavera de 2008, nidos entre setiembre y noviembre, nidos con 1 o 2 huevos, pocos con 3.
Tejo, L. C. (2009). Las Grutas, Río Negro, 18-02-2009, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Bachmann y Darrieu (2010). Mar Chiquita, Mar de Cobos y La Caleta, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, entre 1997 y 2001, 142 nidos. Puesta desde principio de setiembre a principio de octubre.
García, C. H. (2011). Puerto San Antonio Este, Río Negro, 01-12-2011, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Agulián, C. (2012f). Isla Pingüino, Santa Cruz, 13-11-2012, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Simonetti et al. (2013). Estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, nidos en septiembre a diciembre en los años 2008 (28 nidos) y 2009 (34 nidos).
De la Peña (2013c). Punta Logaritmo, dpto. Biedma, Chubut, 4 nidos: 26-11-1973, 2 huevos, 26-11-1973, 2 huevos, 04-11-1979, 2 huevos, 04-11-1979, 2 huevos.
Nidos en playas arenosas o entre y sobre piedritas. Medidas: diámetro total: de 15 a 18 cm.
Sainz-Trápaga, S. (2013). Península Valdés, Chubut, 17-11-2013, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Necochea, pdo. Necochea, Buenos Aires, 24-11-1983, un nido a 3 m de la línea de marea, en una simple depresión en la arena de unos 12 cm de diámetro con 2 huevos.
Salvador en De la Peña (2016c). Puerto Pirámides, dpto. Biedma, Chubut, 02-12-1995, un nido en la costa, en zona de restingas, a 13 m del mar, en una depresión natural de 15 cm de diámetro y 4 cm de profundidad, contenía 2 huevos incubados.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.
Moroni en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Peralta, L. (2016). Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, 02-09-2016, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Passafaro, S. (2016). Reserva Natural Punta Rasa, Buenos Aires, 19-11-2016, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Borrillo, E. G. (2017). Reserva Natural Punta Rasa, Buenos Aires, 18-11-2017, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
Fernández, E. J. (2018). San Antonio Este, Río Negro, 17-11-2018, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.

Huevos
Pone 2, a veces 3 huevos. Ovoidales. De color ocre o pardo verdoso, con pintas y manchas pardas, grises y negras distribuidas por toda la superficie.

Medidas

Gibson (1920): 55,0 x 37,0		
Bachmann y Martínez (1998): 52,5 a 62,4 x 33,0 a 41,9	X= 56,6 x 38,5	(N= 78)
De la Peña (2013c): 52 a 58,6 x 37,7 a 40,9	X= 54,3 x 38,9	(N= 12)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 54,0 a 55,4 x 37,6 a 37,7	X= 54,7 x 37,6	(N= 2)
Salvador en De la Peña (2016c): 53,2 a 54,1 x 39,3 a 39,6	X= 53,6 x 39,4	(N= 2)

Peso

Bachmann y Martínez (1998): 37,5 a 53,8	X= 43,6	(N= 78)
De la Peña (2013c): cáscaras 3,143 a 3,490	X= 3,358	(N= 6)

Generalidades

Bachmann y Martínez (1998). Período de incubación 27 a 30 días. Los pichones volaron a los 35-40 días.
Bachmann y Darrieu (2010). Período de incubación, aproximadamente 27-28 días.

Otros

Zelaya et al. (1997). Mayor Buratovich, pdo. de Villarino, Buenos Aires, observaron un ejemplar Albino.

Pichones

Observaciones

Prado (2013). Buenos Aires. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Adulto con pichones.
Moroni en Salvador (2016a). Chubut. Adulto con pichones.

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* en Río Negro, Salvador (2017a)
De pichones: *Nycticorax nycticorax* en Chubut, Daciuk (1973b)
De huevos: *Milvago chimango* en Buenos Aires, Bachmann y Darrieu (2010)

Más información:
Bachmann y Darrieu (2010). Simonetti et al. (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo, rojo. Contraste entre el negro de la cabeza, cuello y pecho, y el resto de lo ventral. Notable banda alar blanca visible en vuelo.

Punta Logaritmo. Chubut. 04-11-1979

Punta Logaritmo. Chubut. 26-11-1973

Punta Norte. Chubut. 04-02-1972

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820 por la costa desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.
Un ejemplar capturado en Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se distribuye por costas marinas tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico, en toda América, aunque en forma discontínua.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820

Buenos Aires

Citas: Bachmann y Martínez (1999); Bachmann y Darrieu (2010); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1938b); Simonetti et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chubut
Citas: Daciuk (1973b, 1977c); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Jehl y Rumboll (1976); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-1999)

Mendoza
Citas: Zotta (1936c)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Peters (1923b); Povedano (2016); Salvador (2017a)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr y Conover (1948b); Jehl (1978); Jehl y Rumboll (1976); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1969)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986)

OSTRERO NEGRO *Haematopus ater* Vieillot, 1825

Otros nombres: Fil fil negro. Pilpilén negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 43-46 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 3 (M) X= 708 g (Rango: 660 a 780); N= 2 (H) 765 y 795 g; N= 1 (?) 775 g

Coloración. Pico rojo. Patas blanco-rosadas. Iris anaranjado.
Cabeza, cuello, lomo y partes ventrales negros. Partes dorsales pardas. Primarias pardas oscuras.
Cola parda oscura, casi negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Crawshay (1907). Ostras .Peces.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Suele cantar a dúo y su voz es muy parecida a la del Ostrero común.

HÁBITAT
Costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

En el suelo arenoso o entre piedras. En costas marinas o en islas.

Expuesto. Poco elaborado. Sin elementos o con alguna piedrita en el borde.

Smyth (1927). Islas Malvinas, 05-11-1923, 2 huevos.
Reynold (1935). Tierra del Fuego. Nido.
Olrog (1950). Tierra del Fuego, nido con 2 huevos en noviembre.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 24-10-1961, nido con 2 huevos en la isla Quiroga. El 03-11-1961 y el 07-11-1961, dos nidos con un huevo cada uno.
Korschenewski (1969b). Chubut. Nido.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 13 al 19 de noviembre de 1971, 5 nidos, uno con un huevo, 3 con 2 y uno con 3 huevos.
Jehl (1978). Tierra del Fuego. Nido.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Bertellotti et al. (1995). Islote Notable (Isla de los Pájaros). Dpto. Biedma, Chubut, 9 nidos.
Punta et al. (1995). Islas Isabel, dpto. Escalante, Chubut, 26 nidos, comenzó la postura en la segunda semana de octubre de 1991.
Gandini y Frere (1995b). Punta Medanosa, 5 nidos en 1995, Punta Sur, varios nidos en 1994, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Gandini y Frere (1996). Isla Chaffers, en el año 1993, se localizaron 5 nidos, Isla Quiroga, 5 nidos en 1992, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de octubre a enero, nidos.
González et al. (1998). Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, en 1994, 9 nidos; Isla Primera, en 1993, 4 nidos; en 1993 en Punta Pirámide, 6 nidos; dpto.Biedma, Chubut.
Yorio et al. (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, de 1989 a 1995, nidos. Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Cumbre, en 1994, 4 nidos; en Isla Blanca Menor Oeste, en 1995, 7 nidos, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
Yorio et al. (1998b). Isla Aguilón del Norte, Isla Leones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Lobos, en noviembre de 1993, 3 nidos; Isla Galiano Norte, en 1993, 6 nidos; Isla Galiano Central en 1993, un nido, dpto. Florentino Ameghino, Chubut. Isla Vernaci Este, en 1993, un nido; Isla Vernaci Sudoeste, en 1993, un nido; Isla Vernaci Oeste, en 1993, un nido; Isla Vernaci Noroeste, en 1993, un nido; Isla Viana Menor, en 1993, 3 nidos, Isla Felipe, un nido, en 1993, dpto. Escalante, Chubut.
Gandini y Frere (1998a). Cabo Blanco, nidificando, Islas Larga, 8 nidos en 1994, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Frere y Gandini (1998). Banco Justicia II, dpto. Magallanes, Santa Cruz, 7 nidos en 1994.
Schiavini et al (1998). Tierra del Fuego. Nido.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido
Harris (2008). Chubut. Nido.
Agulián, C. (2012). Isla Pingüino, Santa Cruz, 13-11-2012, nido con 2 huecos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.
De la Peña (2013c). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 3 nidos: 27-11-1973, un huevo y un huevo; 05-11-1979, 2 huevos; Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 2 nidos: 07-11-1979, 2 huevos y un huevo. Nidos en suelo arenoso o entre piedras en una isla. Medidas: diámetro total: de 14 a 16 cm.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18-11-1983, 3 nidos, uno en una depresión en la arena y algunas piedritas, de unos 15 cm de diámetri y 3 cm de profundidad, 2 huevos, otro en una depresión en una restinga, con un huevo y el último entre unas rocas, en una represión de piedritas y conchillas con 2 huevos.
Salvador en De la Peña (2016c). Playa Larralde, Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 03-12-1995, un nido entre las rocas a pocos metros de la línea de marea en una depresión de conchillas, 2 huevos incubados.
Rumboll en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Juliano, R. (2016): Punta Buque, Santa Cruz, 20-12-2016, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.

Huevos
Pone 2 huevos a veces 3.
Ovoidales. De color ocre, ocre grisáceo o pardo verdoso, con pintas y manchitas grises y pardas oscuras distribuidas por toda la superficie. Algunos tienen líneas pardas claras.

Medidas

Zapata (1967): 64,0 x 40,0

De la Peña (2013c): 54,5 a 60,5 x 40,0 a 41,3	X= 57,9 x 40,6	(N= 7)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 58,1 a 67,6 x 39,7 a 41, 8	X= 62,4 x 40,9	(N= 5)
Salvador en De la Peña (2016c): 62 a 63,4 x 39,8 a 41,1	X= 63,1 x 40,4	(N= 2)

Pesos

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 48,5 a 58,5	X= 54,8	(N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 3,212 a 4,116	X= 3,828	(N= 7)

PICHONES

Observaciones

Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 03-11-1961, pichones en la isla Larga; 04-12-1961, varios pichones en la isla Quiroga.
De la Peña (2013c). Punta Logaritmo, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973. Pareja con un pichón.
Parmelee y Mc Donald (1975). Tierra del Fuego. Adulto con pichones.

Generalidades

Punta et al. (1995). Período de incubación 28 días.

Depredadores

De huevos: *Larus dominicanus* en Chubut, Salvador (2016b)

Más información:
Punta et al. (1995)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico largo. Negro con el dorso pardo.

Punta Tombo. Chubut. 05-11-1979

Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973

Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973

Punta Tombo. Chubut. 05-11-1979



Península Valdés. Chubut. 16-11-2019 Fotos: María Fernanda Gauna

Península Valdés. Chubut. 16-11-2019 Fotos: María Fernanda Gauna

Puerto Deseado. Santa Cruz. 03-02-2016 Foto: Cynthia Arenas

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Haematopus ater Vieillot, 1825 en las costas de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.
En invierno llega a la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Costas marinas del sur de Sud América en Perú, Chile y Argentina, incluyendo las Islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Fiameni (1994); Narosky y Di Giacomo (1993); Rodríguez Moulín (1984b); Savigny (2002d)

Chubut

Citas: Bó (1958); Daciuk (1977a, 1977b, 1977c); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Parera (1992); Punta et al. (1995); Sainz-Trápaga (2014); Salvador (2016b); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Logaritmo, dpto. Biedma, 26-11-1973)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1992); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a., 1998b); Jehl (1978); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 25-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Ripley (1950)

Canal de Beagle
Citas: Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Daciuk (1983c); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

OSTRERO AUSTRAL *Haematopus leucopodus* Garnot, 1826

Otros nombres: Ostrero del sur. Ostrero de patas blanquecinas. Ostrero overo. Pipilén austral. Pilpilén overo. Pipilero overo. Tero de mar. Tero real.

DESCRIPCIÓN
Largo: 42-46 cm.
Peso: Jehl (1978): N= 2 (H) 585 y 610 g

Coloración. Pico rojo. Patas blanco-rosadas. Iris amarillo.
Cabeza, cuello, dorso, pecho, primarias y tercio terminal de la cola negros.
Secundarias, borde de las cubiertas mayores, supracaudales, base de la cola y partes ventrales blancas.

COMPORTAMIENTO
Solitario o en pareja. A menudo nidifica en estepas alejado del agua

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Su voz en un agudo silbo siiiiiíihhh...siiiiihiih.

HÁBITAT
Costas marinas, riberas de arroyos, ríos, lagunas, zonas húmedas en estepas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

En el suelo arenoso o entre piedras. En playas marinas o en lagunas del interior.
Expuesto. Poco elaborado. Depresión, con o sin algunas piedrita u otro elemento.

Crawshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 16-10-1923, 2 huevos.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Olrog (1950). Tierra del Fuego, nido con huevos en noviembre.
Zapata (1967). Santa Cruz. Nido.
Parmelee y Mc Donald (1975). Tierra del Fuego. Nido.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nidos en octubre con huevos.
Daciuk (1977b). Santa Cruz. Nido.
Jehl (1978). Tierra del Fuego. Nido.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de setiembre a enero, nidos.
Chebez et al. (1998). Parque Nacional Los Glaciares, dpto. Los Lagos, Santa Cruz, nidifica.
Schiavini et al. (1998). Islote Bertha Mayor, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Estuario del Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre setiembre y noviembre. Construye el nido en orillas de lagunas o zonas anegadas y mallines, en la estepa y hasta la zona cordillerana.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
De la Peña (2013c). Cancha Carrera, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 08-11-1979, 2 huevos; La Esperanza, dpto. Guer Aike, Santa Cruz, 08-11-1979, 2 huevos.
Nidos en laguna seca, a 50 m y otro a 20 m de una ruta. Medidas: diámetro total, de 14 a 15 cm.
Rumboll y Jehl en WFVZ, en Salvador (2016a). Santa Cruz, Tierra del Fuego. Nidos.
Parmelee en UWBM, en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.
Sin datos WFVZ, en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Straneck, R. (*in litt.* 2019). Dpto. Guer Aike, Santa Cruz, nido con huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre oscuro o verde oliváceo con pintas y manchas pardo oscuro y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Smyth (1927): 58,0 x 39,5 a 41,5
De la Peña (2013c): 51,4 a 57,1 x 39,8 a 40,5 X= 54,7 x 40,1 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 3,028 a 3,528 X= 3,259 (N= 4)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Observaciones
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 05-12-1961, pareja con 2 pichones, al borde de la isla Quinta.
Humphrey et al. (1970). Reynolds observó pichones el 02-02-1929, en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Parmelee et al. (1994). Tierra del Fuego. Adulto con pichones.

Depredadores
De adultos: *Phalcoboenus australis* en Islas Malvinas, Catry et al. (2008)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Contraste entre el negro de la parte dorsal y el blanco de la ventral.

La Esperanza. Santa Cruz. 08-11-1979

La Esperanza. Santa Cruz. 08-11-1979

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Haematopus leucopodus Garnot, 1826 en el interior y costas de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.
En invierno llega hasta la costa de Buenos Aires.
Observado en Lago Puelo (Chubut).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distribuye en el extremo sur de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Bachmann e Isacch (1999); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Nores (1986b); Salvador y Narosky (1987)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977b); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Humphrey y Bridge (1970); Kovacs et al. (2005); Jehl y Rumboll (1976); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987); Vidoz (1995)

Neuquén
Citas: Del Valle y Funes (1994); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Nores (1986a.); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988a); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Fjeldsa (1985); Gandini y Frere (1998b); Harris (2008); Humphrey y Bridge (1970); Imberti (2003); Imberti y Albrieu (2001); Jehl y Rumboll (1976); Lange (1981); Millar y Baker (1980); Murphy (1925); Oustalet (1891); Scott y Sharpe (1910); Zapata (1967, 1969)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Olrog (1948, 1950); Pereyra (1950a); Reynolds (1934); Ripley (1950); Schiavini et al. (1998)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Catry et al. (2008); Dacuik (1983c); Straneck (1990a); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

TEROS REALES

FAMILIA: RECURVIROSTRIDAE

Aves acuáticas de pico, cuello y patas largos.
Se alimentan de insectos acuáticos, vermes, semillas.
Frecuentan bañados y lagunas.
Nidifica en forma aislada o en colonias. Construye el nido en pastos naturales al borde de lagunas, en islotes con gramíneas dentro de lagunas y en pastos salados al bord e de arroyos. En suelos arenosos de las costas sin vegetación. También en isletas o en albardones.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de tallos de yuyos o pastos, en la base o en el reborde.
Pone 3 ó 4 huevos, cónicos, de color pardo u ocre oscuro, con pintas y manchas pardas oscuras o violeta oscuro, distribuídas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.
Cuando tienen pichones y notan un extraño, se apartan simulando tener un ala quebrada y se agachan aleteando. Emiten voces chillonas y fuertes, en el interín los pichones se esconden en huecos, pisadas de animales o entre los pastos, quedando inmóviles.

TERO REAL *Himantopus mexicanus* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Avoceta. Canilludo. Chorlito palmeado. Cigüeñuela. Haito. Mbatituí zancudo. Perrito. Perrito del agua. Perro. Perro de agua. Terito de laguna. Terito overo. Terito real. Tero de agua. Teru real. Tero real de cola negra. Zancudo. Zancudo de Azara.

DESCRIPCIÓN
Largo: 37-42 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 211 g (Rango: 203 a 216); N= 4 (H) X= 195 g (Rango: 189 a 202)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 180 g

Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris carmín.
Nuca, posterior del cuello, región escapular y alas negros. Frente, corona, dorsal de la base del cuello, rabadilla, cola y partes ventrales blancas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en grupos de pocos ejemplares o en bandadas de muchos.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleóptero (*Sphenophorus crassus*). Carábidos (*Platima*) y (*Scarites anthracinus*). **Arácnidos.**
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros. **Crustáceos**.
Fiora (1939). Insectos.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Corixidae. Hormigas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, larvas, no identificado). Diptera (Culicidae: larvas). Hemiptera (Belostomatidae, Corixidae). **Crustáceos:** (Gammaridae:

Gammarus sp., Paleamonidae: *Palaemonetes* sp.). Ephemeroptera (náyades y adultos). **Moluscos:** Ampullaridae: (*Ampullaria canaliculata*, Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Arácnidos:** arañas. **Otros:** Arena.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Cuando está alarmado repite una voz nasal: guep..guep..guep..

HÁBITAT
Lagunas, bañados, charcas, basurales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N			N	N	N	N	N

En el suelo. En albardones o en orillas de lagunas, cerca del agua.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de tallos de yuyos o pastos, en la base o en el reborde.

Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 2 nidos, entre agosto y octubre.
Holland (1892). Buenos Aires. Nido.
Shipton (Instituto Miguel Lillo). Toro Muerto, dpto. Leales, Tucumán, 11-12-1909, nido con 4 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca, Buenos Aires, 23-10-1899, nido con 4 huevos.
Gibson (1920). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Wilson (1924). Santa Fe. Nido.
Pereyra (1929). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1938b). Río Luján, pdo. Luján, Buenos Aires, colonia con 9 nidos, todos con 4 huevos.
Zapata y Cabrera (1969, Laguna Chasicó. pdo. Villarino, Buenos Aires, un nido con 4 huevos, 04-12-1967.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires. Dos nidos con 4 y 3 huevos.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en setiembre con 4 huevos. Diámetro externo de 17 a 19 cm.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifica en forma aislada en suelos arenosos de las costas sin vegetación. También en isletas.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 11 nidos: 16-11-1972, 4 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos; Isla Verde, dpto. Marco Juárez, Córdoba, 4 nidos: 05-02-1992, 2 huevos y 3 huevos; 21-10-1998, un huevo y 3 huevos,
Los nidos de Cayastacito, estaban en un albardón en el medio de una laguna los de Isla Verde, en la orilla de una laguna. Medidas: diámetro total: de 10 a 14 cm, alto: 3 a 4 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 6 nidos. Uno parasitado por *Heteronetta atricapilla*.
Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Cuatro nidos, 3 en Laborde, dpto. Unión, Córdoba, uno con 3 huevos, el 03-09-1973, otro con 3 huevos el 30-10-1973 y el tercero con 4 huevos el 15-11-1973; el cuarto nido lo hallaron en la laguna Ludueña, dpto. Juárez Celman, Córdoba, con 4 huevos, el 25-08-1977.
Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña (2016c). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 11-12-1980, 3 nidos en un manchón de pasto salado, con 4 huevos cada uno.

Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Dpto. San Martín, Córdoba, 69 nidos entre agosto y mayo, en pastos naturales al borde de lagunas, en islotes con gramíneas dentro de lagunas y en pasto salado al borde de arroyos, posturas de 3 a 4 huevos.
Rumboll en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Canevari en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Eguía, P. (2917). Laguna de Plata, La Para, dpto. Río Primero, Córdoba, 16-12-2017, nidos con huevos.
EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 17/05/2019.

Huevos
Pone 4 huevos. Cónicos. De color pardo u ocre oscuro, con pintas y manchas pardas oscuras distribuidas por toda la superficie.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 42,5 a 43 x 31,5		
Gibson (1920): 45,0 a 47,0 x 33,0		
Pereyra (1938b): 45,0 x 33,0		
Zapata y Cabrera (1969): 46,1 a 46,9 x 31,6 a 34,9	X= 46,5 x 33,7	(N= 2)
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990):	X= 47,73 x 34,30	(N=4)
De la Peña (2013c): 44,6 a 48,9 x 31,0 a 34,0	X= 45,3 x 32,5	(N= 11)
Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña (2016c): 44,8 a 46,2 x 31,9 a 32,2	X= 45,5 x 32,1	(N= 8)
Salvador y Salvador en Salvador (2016a): 43,6 a 47,1 x 30,2 a 33,2	X= 45,7 x 31,9	(N= 68)

Pesos

Salvador y Salvador en Salvador (2016a): 22 a 28,5	X= 26,1	(N= 49)
Zapata y Cabrera (1969): 18 a 28	X= 23	(N= 2)
De la Peña (2013c): 22,8 a 23,9	X= 22,9	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,4 a 1,7	X= 1,6	(N= 11)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c): Pichón de 5-6 días.
Pico oscuro. Corona y dorso pardo oliváceo con puntos y líneas negras. Ventral blanquecino.

Observaciones
De la Peña (2013c). Isla Verde, dpto. Marco Juárez, Córdoba, 21-10-1998. Pareja con 2 pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Generalidades
De la Peña (2013c). El 17-09-2003 en Esperanza, se observó una cópula.
Cuando tienen pichones y notan un extraño, se apartan simulando tener un ala quebrada y se agachan aleteando. Emiten voces chillonas y fuertes. En el interín los pichones se esconden en huecos, pisadas de animales o entre los pastos, quedando inmóviles.
Los pichones pían antes de salir del huevo.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en La Pampa, Galmes et al. (2008b), *Parabuteo unicinctus* en Córdoba, Salvador (2017a)

De pichones: *Ardea cocoi* en Córdoba, Salvador (2016b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico, cuello y patas largos. Blanco y negro. El grito.

Esperanza. Santa Fe. 12-12-2007

Esperanza. Santa Fe. 30-06-2008

Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998

Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998

Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998

Esperanza. Santa Fe. 12-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Himantopus mexicanus melanurus Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. **S**e extiende desde Norte América, Islas del Caribe, Centro América y Sud América hasta Chile, Perú, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Himantopus mexicanus melanurus Vieillot, 1817

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Fiora (1939); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López de Casenave y Filipello (1995); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Straneck (1990b); Weller (1967a); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Silverio y Fra (2009)

Observaciones: De la Peña (Salinas Grandes, dpto. La Paz, 08-03-1981)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Quitilipi, dpto. Quitilipi, 03-05-1988)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Escudero et al. (2004); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Leleque, dpto. Cushamen**,** 01-02-1976; Trelew, dpto. Rawson, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a, 2016b, 2017a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Balnearia, dpto. San Justo, 15-01-2009)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Gorleri et al. (2011); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Bruno y Erro (2010); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b); Grilli et al. (2009); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998; Gral. Acha, dpto. Utracán**,** 19-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Lucero (2009, 2013f); Martínez et al. (1997a); Pereyra Lobos y Martínez (2011); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Chebez et al. (1989); Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Canevari et al. (1991b); Chehebar et al. (1992); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz, D. et al. (2004); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988); Capllonch et al. (2020); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis
Citas: Bianchini y Arenas (2014b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001)

Santa Fe

Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores e Yzurieta (1982a)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977; Bandera, dpto. Belgrano, 30-07-1987)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Cocimano et al. (2005); Echevarría (2001, 2014); Echevarría y Chani (1999, 2001, 2006); Echevarría et al. (1998, 2008c); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

AVOCETA ANDINA *Recurvirostra andina* Philippi & Landbeck, 1861

Otros nombres: Caití. Caito. Kaito. Tero real andino. Tero real andino de pico corvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 43-48 cm.
Peso: Navas y Camperi (2006): N= 1 (M) 370 g

Coloración. Pico negro. Patas grises azuladas. Iris anaranjado.
Blanco con las alas, la cola y la parte media del cuerpo negros.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando pequeños grupos.

Alimentación
Fiora (1939). Vegetales, insectos, larvas, limo, arena.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). La voz es un ascendente y nasal Düit..düit.. Düit.

HÁBITAT
Orillas de lagunas, arroyos, charcos, entre los 3.000 y los 4.000 metros de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N									

Expuesto. Elaborado. Depresión en el suelo tapizada o no con palitos.

Contino (1980). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, pequeñas colonias en las playas, con huevos en febrero.

Contino y Narosky en Salvador (1992). Hallaron 3 nidos en laguna de Pozuelos, Jujuy, el 25-02-1976. Dos sin postura y el otro con un huevo roto. Un nido mide 20 cm de diámetro externo, 12 cm en el interno y 2 cm de profundidad.
Salvador (1992). Contino (Fundación Miguel Lillo). Abra Pampa, dpto. Cachinoca, Jujuy, 19-02-1964, 3 huevos.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nido con huevos en febrero.
Uranga en De la Peña (2016c). Laguna Runtuyoc, Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, nido en un albardón de tierra rodeado por agua, con 2 huevos y otro con 4.

Laguna Runtuyoc, Abra Pampa. Jujuy Fotos Máximo Uranga

Huevos
Pone 3 huevos. Fondo pardo oliváceo con manchas, líneas y puntos neguzcos y violeta oscuro más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Salvador (1992). Contino (Fundación Miguel Lillo): 51,3 x 35,9 y 51,2 x 38,2

Peso
Contino (1980): 38,5

PICHONES
Observaciones
Contino (1980). Pichones en marzo.

Depredadores
De huevos: *Larus serranus* en Jujuy, Laredo (1996)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Blanco con las alas y la cola negras. Pico largo curvado hacia arriba. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Recurvirostra andina Philippi & Landbeck, 1861 lagunas entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Región altoandina de Perú, Chile, Argentina y Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Navas y Camperi (2005, 2006); Peters (1934)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Contino en Salvador (1992); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018); Navas y Camperi (2005); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, 10-02-1983)

La Rioja
Citas: Eguía (2014)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999)

PALOMA ANTÁRTICA

FAMILIA: CHIONIDAE

Aves que se caracterizan por tener el pico corto y grueso.
Alimentación omnívora.
Frecuentan costas marinas, principalmente en colonias de pingüinos, cormoranes, gaviotas, focas, lobos y elefantes marinos.
Ponen 1 o más huevos.
Pichones cubiertos de plumón pardo.

PALOMA ANTÁRTICA *Chionis albus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Chorlo gigante. Chorlote blanco antártico. Pico de estuche. Pico envainado blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-41 cm.
Peso: Favero (2001): N= 40 (M) X= 719,1 g (Rango: 640 a 810); N= 37 (H) X= 635,3 g (Rango: 560 a 720)

Coloración. Pico amarillo rosado con punta negra. Patas grisáceas. Iris pardo.
El pico es corto, cónico, fuerte. La mitad basal del maxilar superior está cubierta por una vaina ocrácea. La base del pico y los lados de la cara, por debajo de los ojos, implumes. Carúncula rosada.
Coloración general del plumaje blanca.

COMPORTAMIENTO
Relativamente mansa. Corre como si diera saltitos. Solitaria o a veces en grupos dispersos.

Alimentación
Burger (1981). **Carroña:** (Pingüinos, otras aves, Pinnípedos, Cetáceos). Crustáceos. Desperdicios. Huevos (Pingüinos y otras aves). Moluscos. Leche (Pinnípedos). Placentas (Pinnípedos).
Favero (1996). **Carroña:** (Elefantes marinos). Leche (de Elefantes marinos). Materias fecales. Placentas.
Albrieu et al. (2004). Crustáceos. Desperdicios. Moluscos. Materias fecales.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Carroña. Huevos. Materias fecales.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Carroña:** (Pingüinos, Pinnipedos, Peces). Huevos.

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Antártida, Islas Shetland del Sur, Islas Orcadas del Sur.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N			N						N	N

Plataforma de diversos materiales.
Ubica el nido en el suelo, entre las rocas o en construcciones abandonadas, cerca de las costas marinas. Es redondeado, bordeado con piedritas, plumas, cáscaras de huevos y trozos pequeños de madera. También puede emplear materiales vegetales.

Olrog (1958a). Nidificando en la Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur.
Coria y Montalti (1993b). Aguirre (1995). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Bahía Esperanza, Península Antártica, nidos desde noviembre de 1989 a febrero de 1990.
Coria et al. (1996). Península Antártica. Nido.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Soave et al. (2000). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Favero et al. (2000). Península Antártica. Nido.
Quintana et al. (2000). Península Antártica. Nido.
Militello, E. (2006). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 07-12-2006, nido con 2 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, diciembre de 1994, nidificando.
Clarke et al. (2012. Islas del Atlántico Sur. Nido.
Montalti en De la Peña (2016c). Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, 06-01-1997, nidos.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Ovoidal alargado. Ocre grisáceo, blanquecinos o grises, con manchas y pecas pardas oscuras más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Montalti en De la Peña (2016c): 61,7 x 39,0
Straneck en De la Peña (2016c). : 54,0 a 60,0 x 37,0 a 40,0

PICHONES
Observaciones
Olrog (1958a). Bahía Esperanza, 24-01-1953, pichones.

Más información:
Favero (2001)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Blanca. La forma del pico.

Isla de los Pájaros. Chubut. 04-02-1972

Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973
Comiendo huevos de Gaviota cocinera.

Península Valdés. Chubut. 16-11-2019 Fotos: María Fernanda Gauna

Puerto Deseado. Santa Cruz. 20-20-2016 Foto: Cynthia Arenas

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chionis albus (J. F. Gmelin, 1789) nidifica en Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur y en el Archipiélago Antártico. Habita además las islas Malvinas, costas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En invierno llega hasta la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Georgias, Sandwichs, Orcadas y Shetlands del Sur y en el Archipiélago Antártico. Habita además las Malvinas, costas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En invierno sube por la costa hasta Río Negro, Buenos Aires.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut
Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Harris (2008); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, 04-02-1972; Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 27-11-1973)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Paz, D. (1991b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Dabbene (1910); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Olrog (1948); Salvadori (1900); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Mares, islas y Antártica
Citas: Castellanos (1927); Coria y Montalti (1993b); Favero (2001); Massoia y Navas (1992); Novatti (1978); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Castellanos (1935); Coria et al. (2011); Paz, D. (1990a)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); Bennett (1920); Favero y Silva (1993); García Esponda et al. (2000); Shuford y Spear (1988)

CHORLITO CENICIENTO

FAMILIA: PLUVIANELLIDAE

Nidifican solitariamente.
Construyen el nido en orillas de lagos y lagunas, generalmente entre piedras.
Pone 2 huevos. La pareja incuba.

CHORLITO CENICIENTO *Pluvianellus socialis* G. R. Gray, 1846

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de lomo gris. Chorlo de Magallanes.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-21cm.
Peso: Reynold en Humphrey et al. (1970): N= 1 (H) 85,0 g
Jehl (1975): N= 5 (M) X= 89,1 g (Rango: 79 a 102); N= 8 (H)=: 79,5 g (Rango: 69,5 a 87,3)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) juvenil 74 g

Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris rojo.
Frente y garganta blanquecinas. Lorum oscuro. Resto de la cabeza, cuello, pecho y partes dorsales grises oscuras.
Resto de ventral blanco.
Alas pardas con las secundarias blancas.
Cola con las plumas centrales pardas oscuras y las laterales blancas.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma pequeños grupos.

Alimentación
Crawshay (1907). Crustáceos

HÁBITAT
Orillas de lagunas y charcas, playas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Rudimentario, expuesto. Huevos puestos sobre el suelo. Algunos con pequeñas piedritas.

Reynold (1953). Nido con 4 huevos en Cabo Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.
Reynold en Humphrey et al. (1970). Tierra del Fuego. Nido.
Jehl, (1975). Comienza a nidificar en setiembre en Tierra del Fuego. Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Jehl y Rumboll (1976). Laguna Los Escarchados, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz. Enero de 1976, R. W. Storer, observó 5-6 parejas nidificando.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz, nidifica entre setiembre y enero.
Ferrari et al. (2008). Comienza a nidificar en Agosto. Ubica el nido en lagunas con playas de canto rodado mezclado con arcilla.
Entre el 12-10-2006 y el 23-01-2007, 20 nidos con 1 ó 2 huevos, en Santa Cruz. De 71 nidos monitoreados, el 71% resultó exitoso. Una misma pareja ha sido observada nidificando 3 veces (las dos primeras con éxito) en una misma temporada.
Lishman y Nol (2012). Santa Cruz. Nido.

Huevos
Pone 2 huevos, piriformes, grisáceos o gris verdosos, con pintas oscuras.

Medidas

Ferrari et al. (2008): X= 34, 8 x 25, 2 (N=21)

Peso
Jehl (1975): 9, 6 a 10, 9

PICHÓN
Descripción
Jehl (1975). Cara, cabeza y dorsalmente, gris verdoso. Alas teñidas de dorado. Garganta blanca, sombreado de dorado en la parte superior del pecho. Resto de la parte ventral, blanco.

Generalidades
Ferrari et al. (2008). Período de incubación, 24 días.
Jehl (1975). Período de incubación, 24-26 días.

Observaciones
Humphrey et al. (1970). Reynold observó juveniles en Cabo Peñas, el 31-01-1927.

Más información:
Lishman y Nol (2012). Ferrari et al. (2003, 2008). Jehl (1975)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración general gris con el vientre blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pluvianellus socialis G. R. Gray, 1846 en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.
Observado además en La Rioja, Río Negro y en Chubut.
En otoño migra hasta Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el sur de la patagonia, tanto en Chile como Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Chiurla (1996); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Lowen et al. (2009); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut
Citas: Harris (2008); Pagnoni (1995); Pierce (1990)

La Rioja
Citas: Chebez (2005b); Sosa (2010)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1990, 1991, 1996); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al (1998); Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005cc); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Ferrari et al. (2003, 2008); Fjeldsa (1985); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Jehl (1975); Jehl y Rumboll (1976); Lange (1981); Lishman y Nol (2012); Pagano y Salvador (2017); Rumboll (1974); Scott y Sharpe (1910); Straneck (1990a)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Crawshay (1907); Humphrey et al. (1970); Jehl (1975); Jehl y Rumbold (1976); Mogensen (1930); Olrog (1948); Pierce (1990); Reynolds (1953)

Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

CHORLOS Y BECASINAS

FAMILIA: SCOLOPACIDAE

Aves de pico y patas largos.
Las alas son largas y puntiagudas.
Construyen el nido en el suelo. Cerca de ambientes acuáticos (campos inundados, bañados, arroceras)
Semioculto. Poco elaborado. Depresión forrada con pastos, a veces con reborde con el mismo material.
Pone 3 huevos. Ovoidales ó cónicos. De color pardo amarillento o crema con pintas y manchitas pardo claro, pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor. Algunos con manchas y líneas negras.
Los pichones son nidífugos.
Se alimentan de vermes, caracoles, larvas.
Frecuentan lagunas, esteros, bañados, playas marinas.

Subfamilia: Numeniinae

BATITÚ *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)

Otros nombres: Batuitui. Batutú. Chorlaco. Chorlito ribetes blancos acanelados. Chorlo solo. Chorlo solitario. Chululú. Gordillo. Mbatitiú. Mbatui. Sacha pollito del pasto.

Esperanza. Santa Fe. 10-12-2003

Progreso. Santa Fe. 08-12-2008

DESCRIPCIÓN
Largo: 26-32 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 4 (?) 135,0, 136,0, 141,0 y 143,0 g
Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 139,5 g (Rango: 135 a 143)

Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo.
Cabeza, cuello y pecho ocráceos canelas estriados de negro. Cejas y garganta blanquecinas. Dorsal parda y negra con las plumas orilladas de ocráceo. Rabadilla parda oscura. Resto de lo ventral blanco. Flancos barrados de blanco y negro.
Alas pardas grisáceas y blanquecinas. Puntas de las secundarias blancas.
Cola parda grisácea con las plumas externas acaneladas y todas barradas de negro.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos. Relativamente arisco. Se suele posar sobre los postes de los alambrados.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:** Dípteros. Coleópteros. **Otros:** Vegetales.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros (Pentatomidae). **Otros:** Moluscos. Semillas. Vegetales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Lepidoptera (Pieridae: orugas). Orthoptera (Acridiidae). **Otros:** Semillas. Vegetales.

HÁBITAT
Terrenos húmedos, praderas, áreas rurales.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004), en La Pampa, Galmes et al. (2008b), *Circus cinereus* en Córdoba, Salvador (2017a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico corto. Cabeza pequeña. Cola larga, barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) migratorio de Norteamérica. Llega por el interior hasta Neuquén y Río Negro. Accidental en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en praderas de Norte América. Migra durante el invierno boreal a regiones con habitat semejante (pastizales) del sur de Brasil, Paraguay, este de Bolivia, Uruguay **y** Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Chebez et al. (1998); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Hartert y Venturi (1909); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Petracci et al. (2004); Savigny (2002a)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Córdoba
Citas: Dabbene (1920d); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a, 1990a, 2017a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Dabbene (1920d, 1972); De la Peña (1996, 2012b); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923); Izasa y Lucero (2017)

Mendoza
Citas: Burmeister (1861); Ferrer et al. (2019); Reed (1914); Roig (1965)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Navas y Bó (1991a); Steullet y Deautier (1939)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch (2011); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Dabbene (1920d); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (2001); Lucero (2013i); Martínez et al. (2009); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Manassero y Luna (2009a); Rodríguez Graves et al. (2009); Straneck (1990e); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2016); Heredia (2011); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a, 2011); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1972); Dinelli en Dabbene (1920d); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Islas Malvinas
Citas: Hayman et al. (1986); Woods (2006)

Antártida
Citas: Massoia y Navas (1993)

Islas Shetland del Sur
Citas: Dabbene (1923a)

ZARAPITO REAL *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) migratorio de Europa.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Vander Pluym y Sterling (2019). Observado en Punta Rasa, pdo. de La Costa, Buenos Aires, el 28-01-2010

PLAYERO ESQUIMAL *Numenius borealis* (J. R. Forster, 1722)

Otros nombres: Chorlito campesino. Chorlo de pico corvo. Chorlo esquimal. Chorlo polar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 29-34 cm.

Coloración. Pico negruzco con pardo en la base de la mandíbula. Patas grises. Iris pardo.
Corona parda estriada de ocráceo. Cejas blanquecinas. Dorso pardo jaspeado de ocráceo. Garganta blanquecina. Resto de la cabeza, cuello y pecho ocráceos jaspeados de pardo. Abdomen blanquecino. Flancos barrados de ocráceo y pardo.
Alas pardas grisáceas, con las plumas de cubierta orilladas de ocráceo. Cola parda ocrácea.

HABITAT
Estepas húmedas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo, curvado hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Numenius borealis (J. R. Forster, 1722) migratorio del Ártico de. Llega hasta Corrientes, Córdoba y Chubut. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico, Estados Unidos, Canadá y posiblemente Alaska desde donde se dirigía hacia las islas del Caribe y desde allí a Paraguay, sur de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1926e); Daguerre (1924c); Gibson (1920); Pereyra (1938b); Runnacles en Wetmore (1939)

Córdoba
Citas: Michelutti (1991)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1884)

Tierra del Fuego
Citas: Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

PLAYERO TRINADOR *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlo grande de pico curvo. Chorlo pico curvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-46 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 5 (?) X= 322 g (Rango: 275 a 375)

Coloración. Pico pardo. Patas grisáceas. Iris pardo oscuro.
Cejas blanquecinas. Bandas oculares oscuras. Dorsal parda jaspeada de blanquecino. Rabadilla y cola pardas oscuras barradas de pardo claro. Garganta blanca. Cuello y pecho blanquecinos jaspeados de pardo. Resto de lo ventral blanco. Alas pardas moteadas de blanquecino.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario. Arisco.

Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). Cangrejos (*Uca uruguayensis*)

HÁBITAT
Costas marinas, cangrejales, marismas, humedales.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo y curvado hacia abajo. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790 migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego, Islas Malvinas y en humedales del interior (Formosa, oeste de Río Negro, Córdoba).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Nidifica en región Paleártica (Europa) y Neártica: Alaska a norte de Canadá. Migra en el invierno boreal a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Mérida y Bodrati (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1923b); Petracci et al. (2004); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019). Individuos observados durante varios días consecutivos en agosto de 1998, en campos sobrepastoreados semi-inundados del sector oeste del poblado de Capitán Solari, dpto. Sargento Cabral, 2,5 km al este del Parque Nacional Chaco, Chaco.

Chubut
Citas: Gatto et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bruno (2016f)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

La Pampa
Citas: Orrego Aravena (1970)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988a); Coconier (2005b); Harris (2008); Imberti (2003, 2005e)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Dabbene (1920, 1920d); Devilliers y Terschuren (1978); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Kovacs et al. (2005); Morrison y Ross (1989)

Malvinas
Citas: Greroty (1994); Strange (1992); Woods (1988, 2006)

Subfamilia: Limosinae

BECASA DE MAR *Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Aguja. Aguja de mar. Batitú. Becada. Becasa. Becasina. Becasina de mar. Caicayén. Chorlaco. Chorlo grande. Percasina. Pircacina. Poroto. Zapatito.

Dique El Chañar. Neuquén. 26-10-2013 Foto: Cynthia Arenas

DESCRIPCIÓN
Largo: 36-42 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 1 (M) 263 g; N= 1 (H) 275,6 g
Salvador (2014a): N= 1 (H) 247 g

Coloración. Pico rojizo en la mitad basal, negro hacia la punta. Ligeramente curvado hacia arriba en la punta. Patas grises azuladas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorso gris pardusco. Cejas, supracaudales y garganta blancas. Cuello, pecho y flancos grises. Resto de la ventral blanquecino.
Primarias pardas oscuras con raquis y base blanca. Cubiertas como el dorso, pero las inferiores con puntas blancas. Cola negra con base blanca. Plumas externas y punta blanquecinas.
Plumaje nupcial.
Cabeza parda grisácea con tinte rojizo. Cejas blancas. Dorsal negra con las plumas orilladas de rojizo. Espalda y lomo negruzcos y ocráceos. Rabadilla blanca. Garganta blanquecina. Resto de lo ventral castaño rojizo, jaspeado en el cuello y barrado de negro y blanco en el resto. Cola negra.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en bandadas. Se mete en el agua.

Alimentación
Bala et al. (1998b). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*)
Hernández et al. (2008). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*), (*Tellina petititana*). **Crustáceos:** (*Cyrtegrapsus altimanus*). **Insectos. Poliquetos:** (*Glycera americana*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** (larvas acuáticas). **Moluscos:** (*Littoridina parchappei*, *Biomphalaria* sp.)
Salvador et al. (2017). **Moluscos:** (*Biomphalaria peregrina*). **Crustáceos:** (*Macrocrachium borellii*)

HÁBITAT
Bañados, costas de lagunas, de ríos y de mares.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Patas largas. Pico largo y ligeramente curvado hacia arriba. Bandas alares, cejas y supracaudales blancas.
Se parece al Pitotoy grande pero tienen diferente color de patas y también son distintos en el pico y en las bandas alares.
Diferenciarlo del Playero ala blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico de Norteamérica.
Llega hasta Tierra del Fuego, tanto por el interior como por la costa. Observada además en Islas Malvinas y Shetland del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migrador Artico de Estados Unidos y Canadá. Llega hasta Tierra del Fuego. Tiene el segundo registro del vuelo sostenido más prolongado entre las aves migratorias con 6.000 millas en 6 días sin parar de Tierra del Fuego a Texas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Gibson (1920); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1883b); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Observaciones: Bodrati, A. De la Peña (2016c)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Dabbene (1920d); Daciuk (1977); Gatto et al. (2005); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995, 2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Puelches, dpto. Curá Co, 28-11-1998)

Mendoza
Citas: Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1989); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Sosa (2005)

Neuquén
Citas: Bianchini (2016e); De Valle et al. (1989); De Valle y Funes (1994); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Bala et al. (1998b); Chebez et al. (1988a); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: Chiale et al. (2015); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Martinez Achenbach (1957); Maugeri et al. (2009); Ordano y Bosisio (1997)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez et al (1998); Clark (1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Keith (1970); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Dabbene (1920d); Wace (1921); Woods (2006)

Shetland del Sur
Citas: Juares et al. (2009)

BECASA CANELA *Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
Largo: 42-48 cm.

Coloración. Pico largo, negruzco con base rosácea.
Coloración general canela grisáceo barrado, manchado y estriado de negruzco.

HÁBITAT
Praderas húmedas, orillas de pantanos y lagunas, costas marinas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limosa fedoa fedoa (Linnaeus, 1758) migratoria de Norteamérica. Observado en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Norteamérica. Migra hasta el norte de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Rodríguez et al. (2010)

Observaciones: Moschione en Camperi et al. (2012)

Subfamilia: Arenariinae

VUELVEPIEDRAS *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito vuelvepiedras. Playero turco. Vira piedras.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-26 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 55 (?) X= 92,1 g (Rango: 57 a 127)

Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Corona y cuello posterior pardos grisáceos jaspeados de negruzco. Espalda parda con las plumas orilladas de blanquecino. Lomo blanco. Mitad anterior de las supracaudales parda oscura, mitad posterior blanca. Cara grisácea blanquecina. Garganta blanca. Cuello y pecho pardos con las plumas orilladas de blanquecino. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con las cubiertas medianas, borde de las escapulares, base de las remeras y últimas secundarias blancas.
Cola parda oscura con la punta blanca.
Plumaje nupcial.
Parte de la cara, lados del cuello, dorso y pecho negros. Corona blanca, salpicada de rayitas negras. Zona escapular castaño y negro. Lorum, garganta, lados de la cabeza y del cuello y resto de lo ventral blancos. Cubiertas alares canelas jaspeadas de pardo y blanco. Resto del plumaje como el de reposo sexual.

COMPORTAMIENTO
Forma pequeños grupos. Arisco.

Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*).

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño de chico a mediano. Banda alar blanca. Cuando vuela muestra dos bandas alares y el lomo blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa desde Buenos Aires a Tierra del Fuego y por el interior a Jujuy, Formosa, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Amplia distribución en el mundo.

Las Lajas. Neuquén. 29-09-2019 Foto: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires

Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Roesler (2001b); Zapata (1998)

Chubut

Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987)

Córdoba

Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979); Yzurieta (1995)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Gorleri y Di Giacomo (2002)

Jujuy

Observaciones: Moschione, F. (17-12-2011, Laguna Pozuelo, Informe 3/12)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2008)

Neuquén
Citas: Bianchini y Arenas (2013a)

Río Negro
Citas: Bianchini y Arenas (2013a); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Jehl y Rumboll (1976)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Luna y Manassero (2010)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Jehl y Rumboll (1976)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

PLAYERO DE ROMPIENTE *Aphriza virgata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Chorlito de las rompientes. Chorlo de las playas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-26 cm.

Coloración. Pico negro. Patas amarillas verdosas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal parda grisácea. Rabadilla blanca. Cejas y garganta blanquecinas. Pecho gris. Resto de ventral blanco con algunas manchas grises.
Alas pardas con banda blanca. Cola blanca con punta negra.
Plumaje nupcial.
Moteado y estriado de oscuro.

HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, banda alar y rabadilla blancos. Cola blanca con ancha banda terminal negra.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aphriza virgata (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del hemisferio norte. Llega a la costa de Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Alaska y Canadá desde donde migra por el Océano Pacífico, hasta Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Imberti (2003, 2005e); Narosky (1983b)

Malvinas
Citas: Curtis (1994); Woods (2006)

PLAYERO ROJIZO *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito rojizo. Chorlo rojizo. Correlimos gordo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-26 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 45 (?) X= 150,3 g (Rango: 114 a 190)

Coloración. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cejas blancas. Partes dorsales pardas grisáceas clara estriadas de negruzco. Rabadilla y supracaudales blancas grisáceas rayadas de pardo. Ventral blanca con estrías negruzcas en la garganta, cuello, pecho y flancos.
Alas pardas con plumas ribeteadas de blanco y las cubiertas inferiores con la punta blanca formando una banda.
Cola gris pardusca.
Plumaje nupcial.
Cabeza, garganta, cuello anterior, pecho y superior del abdomen canelas. Inferior del abdomen, flancos y subcaudales blancos. Partes dorsales pardas grisáceas, canelas y negras. Rabadilla grisácea con barras pardas. Supracaudales blancas con barras pardas. Cola gris pardusca.
Alas como en reposo sexual.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Marelli (1919). Insectos. Larvas.
González et al. (1996). **Moluscos:** Mejillín (*Brachidontes rodriguezi*).
Bala et al. (1998a). **Moluscos:** Almejas (*Darina solenoides*), (*Tellina petitiana*). Poliquetos (*Travisia* sp.).
Brayton y Scheider (2000). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). Mejillón (*Mytilus edulis*).
Sitters et al. (2001). **Moluscos:** Almej*a* (*Darina solenoides*).
Bala et al. (2001). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). Mejillón (*Mytilus edulis*).
Pagnoni (2002). **Moluscos:** Almejas (*Darina solenoides*), (*Tellina petitiana*).
Albrieu et al. (2004). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*)
Hernández et al. (2004). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos.**
Hernández et al. (2008). **Moluscos:** Almejas (*Darina solenoides*), (*Tellina petitiana*). **Crustáceos:** (Anfipodos). (*Cicloleberis pousenii*). Insectos.

HÁBITAT

Costas marinas.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico, cuello y patas cortos. En vuelo, rabadilla barrada, banda alar blanca y dorso "escamado".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego. También a Jujuy, Córdoba y Santa Fe. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Nidifica en el Ártico de Canadá desde donde migra en el invierno boreal a Sud América.

San Antonio Oeste. Río Negro. 26-03-2017 Fotos: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813)

Buenos Aires
Citas: Blanco et al. (1992); Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Gavensky (2013); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chubut
Citas: González et al. (2008); Harris (2008); Hernández et al. (2005b); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-2000)

Córdoba
Citas: Capovilla et al. (2018); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Michelutti en Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b)

Río Negro
Citas: D´Amico (2011); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Morrison y Ross (1989); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016); Tolosa y Gelain (2007)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988a); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Ferrari et al. (2005a); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a); González et al. (2008); Hernández et al. (2004, 2005b);

Santa Fe
Citas: Aica SF06, 02-02-2007. Laguna Melincué, dpto. Gral. López, GCFA Shorebird.

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); D´Amico et al. (2005); D´Amico (2011); González et al. (2004, 2008); Hernández et al. (2005b); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO BLANCO *Calidris alba* (Pallas, 1764)

Otros nombres: Arenero. Chorlito blanco. Chorlito blanco arenero. Chorlito pies roxas. Chorlo blanco. Correlimos blanco. Playero blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 19 (?) X= 56,5 g (Rango: 39 a 80)

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grisáceas claras. Frente, cejas y partes ventrales blancas.
Alas pardas oscuras con banda blanca. Cubiertas superiores negras. Inferiores grises. Cola blanca con las plumas centrales pardas oscuras.
Plumaje nupcial.

Lados de la cabeza y cuello canelas rojizos mezclados con blanco y negro. Partes dorsales pardas grisáceas, estriadas de negro y canela rojizo. Rabadilla gris pardusca. Pecho punteado de rojizo. Resto de ventral blanco. Alas pardas con banda blanca. Cola con plumas centrales pardas, externas blancas.

COMPORTAMIENTO
Forma pequeños grupos. Se suele parar en una pata.

Alimentación
Humphrey et al. (1970). Algas. Crustáceos.
Humphrey et al. (1970). Insectos. Larvas.
Petracci (1998). **Insectos:** Coleópteros (Staphylinidae, Hydrophilidae, Curculionidae). **Crustáceos:** (*Corophium* sp.). **Moluscos:** Pelecypoda (Mytilidae, *Brachidontes rodriguezi*). Pelecypoda (Corbulidae, *Corbula* sp.). **Poliquetos**: (*Glycera* sp.). **Otros:** Algas.
Hernández et al. (2005c). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos:** Cangrejo (*Cyrtograpsus* sp.). **Isópodo:** (*Exosphaeroma* sp.). **Poliquetos:** (*Travisia olens*)

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración general blanca. En vuelo banda alar notable y cola "partida".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris alba (Pallas, 1764) migratorio del Ártico. Llega por la costa e interior, desde Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico. En invierno es cosmopolita hallándoselo en las costas de todos los continentes, pudiéndoselo encontrar en las playas de arena de prácticamente todo el mundo.

San Antonio Río Negro. 26-03-2017 Foto: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Marelli (1924); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Petracci (1998); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Chubut
Citas: Dabbene (1920d); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Hernández et al. (2005c); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Michelutti, P. en Salvador et al. (2017); Torres y Micheluttitorre (2001a); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b)

La Pampa
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005cc); Maceda et al. (2008)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Ferrer et al. (2019); Martínez y Pereyra Lobos (2005); Pereyra (1927e); Sosa (1993b, 1995d, 2003, 2005)

Misiones
Citas: Dabbene (1920d)

Neuquén
Citas: Bianchini y Arenas (2014a); Del valle et al. (1989); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1991, 1996); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz et al. (2004); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2019a)

San Luis
Citas: Bomand (2018)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998a)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (1988, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a); Luna y Manassero (2013); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO ENANO *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chorlito enano. Chorlito semipalmado enano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 214 (M) X= 23,7 g (Rango: 16 a 38); N= 440 (H) X= 27,7 g (Rango: 16 a 41)

Coloración. Pico negro. Patas negruzcas con palmadura. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Corona parda estriada de blanquecino. Cejas superciliares blancas. Dorsal parda oscura con las plumas orilladas de pardo. Ventral blanca. Lados del pecho pardos grisáceos.
Alas pardas oscuras con la parte terminal de la tapadas blanquecina formando una banda.
Cola parda con las plumas laterales grisáceas.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales salpicadas de canela y negro. Pecho grisáceo estriado de negruzco.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos de pocos ejemplares. Relativamente manso.

HÁBITAT
Lagunas, costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ceja y ventral blancos Dorsal parda. Patas semipalmadas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) migratorio del Ártico. Llega por la costa desde Buenos Aires a Chubut. También Jujuy, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Migratorio del Ártico. Nidifica en Siberia (Rusia). Alaska (Estado Unidos) y Canadá. Migra por costa del Océano Pacífico desde Méjico y costas de islas del Caribe y Océano Atlántico hasta Argentina**.**

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Nores et al. (1983); Pereyra (1938b)

Chubut
Citas: Durnford en Dabbene (1920b); Harris (2008); Rost (2018); Seebohn (1888)

Córdoba
Citas: Narosky et al. (1977); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979c, 1980b); Torres y Michelutti (2001a); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Fe
Observaciones: D. Oscar, A. Terán y J. La Grottería. Campo Andino, Laguna Añapiré, dpto. La Capital.

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO MENOR *Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)

Otro nombre: Playero menudo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 35 (?) X= 20,7 g (Rango: 18 a 32)

Coloración.
Plumaje de reposo sexual.
En reposo, pardo grisáceo. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo oscuro.
Plumaje nupcial.
Dorsal parda con gris castaño. Cabeza parda. Pecho pardo estriado más oscuro.

HÁBITAT
Costas marinas, orillas de lagunas, bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pequeño. Partes dorsales y pecho gris-pardusco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris minutilla (Vieillot, 1819) migratorio de América del Norte.
Observado en Orcadas del Sur, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Catamarca, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Norte América, Alaska y Canadá desde donde migra en el invierno boreal llegando hacia el sur hasta Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Martínez-Curci et al. (2018)

Córdoba
Citas: Martínez-Curci et al. (2018); Vergara Tabares y Toledo (2015)

Catamarca
Citas: Bianchini (2019c)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b); Maceda et al. (2008)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Enrique et al. (2020)

Observaciones: D. Oscar, H. Caverzasi, A. Terán, J. La Grottería, L. Caballero, A. Ceconi, M. Schmithalter y P. Capovilla. Campo Andino, Laguna Añapiré, dpto. La Capital.

ECOREGISTROS. 2020. Playerito Menor (*Calidris minutilla*) - Ficha de la especie. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 14/03/2020.

Orcadas del Sur
Citas: Hemmings (1985)

PLAYERITO CANELA *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)

Migratorio de la Tundra de Siberia.

Córdoba
Citas: Toledo (2016). (Observado el 17-10-2013 en Laguna Mar Chiquita)

PLAYERITO RABADILLA BLANCA *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Carachilla. Chorlaco. Chorlito. Chorlito gris. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito pestorejo. Chululú-i de rabadilla blanca. Correlimos lomiblanco. Mbatuituí. Playerito gris.

Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007

DESCRIPCIÓN
Largo: 15-18 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (H) 41 g
Salvador (2014a): N= 2 (M) 43,4 y 46,3 g; N= 1 (H) 40,6 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grises parduscas, poco jaspeadas de pardo. Supracaudales blancas. Frente, cejas, garganta y vientre blancos. Pecho gris finamente jaspeado de pardo. Flancos con estrías pardas.
Alas pardas oscuras con las plumas de cubiertas marginadas de gris claro. Cola parda.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales teñidas de canela y el pecho y abdomen estriados de pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos o en bandadas grandes. Relativamente manso.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros (*Metriona tenella*). Hormigas. **Vegetales:** semillas no determinadas.
Humphrey et al. (1970). Larvas.
Beltzer (1988a). **Vegetales:** Semilla *Cuscuta* sp. **Insectos:** Díptera (Chironomidae, *Chironomus domizii*, *Polypedilum* sp., *Glyptotendipes* sp., *Glyptotendipes* sp., Ceratopogonidae, *Bezzia* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*).
Beltzer (1991a). **Vegetales:** semillas no determinadas. **Insectos:** Díptera (Chironomidae, *Chironomus domizii*, *Polypedilum* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*).
Montalti et al. (2003). **Vegetales:** Semillas de *Chenopodium* sp., Cyperaceae, Fabaceae *Lotus glaber*, *Malva* sp. *Melilotus* sp., *Piptochaetium* sp., *Polygonum* sp., *Scirpus* sp., *Stellaria media*, Ulmaceae.
D´Amico et al. (2004). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Poliquetos:** (*Travisia olens*).
Hernández et al. (2005a). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos. Insectos. Poliquetos:** (*Travisia olens)*
Hernández y Bala (2007). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Insectos. Poliquetos:** (*Laeonereis acuta, Travisia olens*)
Hernández et al. (2008). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*), (*Tellina patitiana*). **Insectos. Crustáceos:** (Anfipodos). (*Cicloleberis pousenii*). **Poliquetos:** (*Glicera americana*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Diptera (larvas y adultos), Diptera (Culicidae: larvas), Dytiscidae, no identificado) **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.).

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo emite una voz de contacto zik.zik.zik..

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas, bañados.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Pereyra (1938b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. En vuelo, las supracaudales blancas. Esto lo diferencia del Playerito unicolor.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Observado en las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico de Norte América, migra hasta Sud América, llegando hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Klimaitis (1975b); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1883b); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Lynch Arribalzaga (1920); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Bó (1958); D´Amico et al. (2004); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Dabbene (1920d); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Hartert y Venturi (1909); Hernández et al. (2005); Pagnoni (1995, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 05-11-1979)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Dabbene (1920d); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011);

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Mamaní et al. (2018)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Parque Luro, dpto. Capital, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Canevari et al (1998); Darrieu et al. (1989); Di Giácomo et al (2007); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Martínez y Pereyra Lobos (2005); Olivera et al. (2009); Sosa (1993b, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Castello et al. (1982); Gelain (1984b, 2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Gonzales (1990, 1991); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Chebez et al. (1988a); Dabbene (1920d) , Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e) ; Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Dabbene (1920d); Scott y Carbonell (1986); Scott y Sharpe (1910); Sharpe (1896); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967, 1969)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c, 1988a, 1991a); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2013)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Ferrari et al. (2016); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Olrog (1948, 1950)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998); Esteban (1953); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)

Islas Malvinas
Citas: Dabbene (1920d); Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011)

PLAYERITO UNICOLOR *Calidris bairdii* (Coues, 1861)

Otros nombres: Chorlito anteado. Chorlito de alas largas. Correlimos unicolor. Playerito de rabadilla parda. Pollito de mar. Pollito piador. Sacha-pollito.

Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-18 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 41,5 g (Rango: 38,8 a 43,6); N= 1 (H) 40,5 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Corona y partes dorsales pardas oscuras con las plumas orilladas de pardo claro. Cara y pecho pardos canelas con jaspeado pardo. Cejas, garganta y resto de lo ventral blancos.
Alas pardas con puntas de las cobijas blanquecinas formando una tenue banda.
Cola parda con las plumas laterales pardas claras.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales jaspeadas de negro y plumas orilladas de ocráceo.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos.

Alimentación
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Dípteros (larvas acuáticas).
Beltzer y Lajmanovich (1990). **Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae, Hydrophilidae, Carabidae) (Curculonidae, Noteridae, Suphisellus sp.). Diptera (Larvas). Lepidoptera (Larvas). **Moluscos:** (Planorbidae). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (Polygonaceae, *Polygonum acuminatum*)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae). Diptera (larvas). Hemiptera (Corixidae). Trichoptera (larvas). Insectos (larvas acuáticas). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (*Scirpus* sp.). **Arácnidos:** arañas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo su voz de contacto es un agudo trinado bidd..biird..bied..

HÁBITAT
Bañados, playas de lagunas y marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pecho jaspeado y supracaudales pardas.
Se parece al Playerito de rabadilla blanca pero se diferencia por el color de las plumas supracaudales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris bairdii (Coues, 1861) migratorio del Ártico. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Observado en las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico desde donde migra en el invierno boreal hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Maugeri (2002a); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Wetmore (1926); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Dabbene (1920d); Vides-Almonacid (1986)

Chaco
Observaciones: Bodrati, A. en De la Peña (2016c)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Pagnoni (1995, 2012b); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (Punta Norte, dpto. Biedma, 04-02-1972; Leleque, dpto. Cushamen, 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Frenzel (1891); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Dabbene (1920d); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Mancini (2011)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018); Olivera (2009)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Camperi et al. (2008); Chebez (2005b); de La Fuente (2002); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Dabbene (1920d); Canevari et al (1998); Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sosa (1993b, 2003, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Christie et al (1998, 2004); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i, 2019a); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1910)

Santa Fe
Citas: Beltzer y Lajmanovich (1990) De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002a); Romano et al. (2005)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Keith (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

PLAYERITO PECTORAL *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de lomo negro. Chorlito escudado. Chorlito manchado. Chorlito pectoral. Playerito escudado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm.
Peso: Contreras (1986a) N= 2 (M) 61,5 y 59,5 g; N= 1 (H) 56,0 g
Salvador (1988): N= 2 (M) 68,0 y 65 g
Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 76,6 g (Rango: 73,5 a 78,8); N= 2 (H) 59,8 y 68,3 g; N= 2 (?) 72 y 76 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 70 g

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas amarillentas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales pardas oscuras con las plumas orilladas de pardo claro. Supracaudales pardas. Cejas y garganta blanquecinas. Cuello y pecho jaspeados y manchados de pardo. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con las cubiertas orilladas de blanquecino. Cola parda.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero más estriado y manchado de negro.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos dispersos o en bandadas.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros. Crisomélidos. Ditíscidos. **Vegetales:** Semilla (*Medicago sativa*).
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros *Gryllus* sp. Ortópteros (*Schistocerca paranensis*). Moluscos. Piedritas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae). **Vegetales:** *Oxalis sp.* (hojas). Minerales. Vegetales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Dytiscidae), (larvas acuáticas). Diptera (larvas). Ephemeroptera (náyades). Lepidoptera (orugas). Trichoptera (larvas). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). Orthoptera (Acridiidae). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (*Scirpus* sp.).

HÁBITAT
Orillas de esteros, bañados.

Depredadores
De adultos: *Falco femoralis* Salvador (2017). Córdoba.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Notable contraste entre el pecho jaspeado y oscuro y el blanco abdominal. En vuelo se ve la rabadilla “partida” por las plumas supracaudales oscuras.

Esperanza. Santa Fe. 08-01-2008

Llambi Campbell. Santa Fe. 14-10-1980

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) migratorio del Ártico. Llega hasta Santa Cruz, islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Alaska y el Ártico Canadiense en Norte América, asi como en Rusia (Siberia). En el invierno boreal migra llegando hasta Argentina y Georgias del Sur.

.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López-Lanús et al. (2013c); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca

Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: Bodrati, A. en De la Peña (2016c)

Chubut

Citas: Dabbene (1920d); Harris (2008); Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); Dabbene (1920d); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1986a); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Laredo (1996); Salvador (1988); Veiga et al. (2014)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al (1989); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Sosa (2005); Wetmore (1926)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Hellmayr y Conover (1948); Navas y Bó (1991a); Pereyra (1950b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Pérez y Petracci (1998); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: Bagnarol et al. (2010); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero

Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

PLAYERITO VIENTRE NEGRO *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

Otro nombre: Playerito de panza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-22 cm.

Coloración. Dorsal rojiza. Abdomen negro. Pecho blanquecino jaspeado de pardo.

HÁBITAT
Costas marinas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) migratorio. Se reproduce en América del Norte, Groenlandia, norte de Asia. Observado en Mar del Plata (Buenos Aires), Salta y en Santa Cruz.
Se desconoce la subespecie.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Nidifica en todo el Ártico en Norte América, Europa y Asia. Durante el invierno boreal migra hacia el sur, raramente alcanzando en el continente americano más allá del sur de Méjico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Kieser (1982)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008)

PLAYERO ZANCUDO *Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)

Otros nombres: Batuirá. Chorlito de patas largas. Chorlito semipalmado de pico largo. Chorlito zancudo.

Campo Andino. Santa Fe. 14-11-2008

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-23 cm.

Coloración. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal gris pardusca, levemente rayada de blanquecino en el cuello. Rabadilla gris pardusca con las plumas orilladas de blanquecino. Supracaudales blancas. Cejas blanquecinas. Ventral blanca jaspeada de gris en el pecho y en los flancos.
Alas pardas oscuras con las plumas de cubierta orilladas de blanquecino. Cola parda y blanquecina.
Plumaje nupcial.
Cejas blancas. Lados de la cara canelas claros. Partes dorsales con las plumas orilladas de blanquecino. Garganta y cuello anterior blanquecinos estriados de pardo. Pecho, flancos y abdomen blanquecinos con barras pardas oscuras. Resto igual al plumaje de reposo sexual.

HÁBITAT
Bañados, orillas de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico largo y algo curvado. Cejas y supracaudales blancas. Patas verdosas.
Se parece al Pitotoy chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) migratorio de Estados Unidos.
Llega hasta Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Migratorio del Ártico, Canadá y Estados Unidos. En el invierno boreal migra a Centro América y toda Sudamérica (excepto Chile) hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gibson (1920); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Petracci et al. (2004); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972)

Catamarca
Citas: Heinonen Fortabat et al. (1992)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Dabbene (1920d)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Moschione et al. (2011)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno y Erro (2010); Cenizo et al. (2019); Siegenthaler (2004)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988, 2011f); Di Giacomo et al. (2001); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Martinez Achenbach (1957)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguax (1925); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO CANELA *Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito canela. Chorlito de garganta blanca acanelada. Chorlito ocráceo. Chorlo de garganta acanelada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.

Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales con estrías oscuras en la corona y el resto jaspeado de canela y negruzco. Ventral ocrácea canela. Subcaudales blanquecinas.
Alas pardas. Cubiertas como el dorso. Ventral de las alas blanca con las puntas oscuras.
Cola parda oscura.
Plumaje nupcial.
Partes dorsales más oscuras y más moteado y rayado de negro. Ventral canela.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros (larvas). Gasterópodos. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Otros:** Vegetales. Arácnidos.

HÁBITAT
Bañados, praderas, cerca o lejos del agua.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral ocre canela, dorso jaspeado. En vuelo, las alas ventralmente son blancas con puntas negras. Patas amarillentas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el extremo Ártico de Alaska y Canadá. Migra en el invierno boreal hasta Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Codesido et al. (2013); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2003); Lanctot et al. (2004); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012, 2017a); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927f, 1938b)

Chaco

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), varios individuos observados entre el 26 y 28 de agosto de 1998 en campos semi-inundados al oeste de la localidad de Capitán Solari, dpto. Sargento Cabral, Chaco.

Córdoba
Citas: Dabbene (1920d); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al (1983); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Abadie (1993)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Narosky (1988); Olivera (2009)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b)

Misiones
Citas: Dabbene (1920d)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c, 2011f); De la Peña et al. (2003); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2010, 2013); Manassero y Luna (2009a)

Subfamilia: Scolopacinae

BECASINA GRIS *Limnodromus griseus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Becasa gris. Becasina migratoria.

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-28 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 68 (?) X= 90 g (Rango: 70 a 155)

Coloración. Pico negro. Patas verdes. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Corona grisácea. Cejas blanquecinas. Garganta blanca. Resto de la cabeza y cuello grisáceos levemente jaspeados. Dorso grisáceo. Rabadilla blanca. Ventral blanquecina.
Alas pardas. Puntas de las secundarias blancas. Cubiertas grisáceas. Cola blanca barrada de negro.
Plumaje nupcial.
Dorsal parda rojiza manchada de negro. Ventral rojiza con barras transversales negras.

HÁBITAT
Costas marinas o de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico largo. Cejas blanquecinas. Rabadilla blanca. Cola barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limnodromus griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega a la costa de Buenos Aires. Observado además en Córdoba, Jujuy y en el oeste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Migrador del Ártico de Norteamérica. Llega a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Limnodromus griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Barbetti et al. (1985); Bertonatti y Sutton (1986); Darrieu y Camperi (2001a); Gandoy et al. (2014); Jaramillo (2000); Narosky (1983b); Pereyra (1938b); Zapata (1998); Zotta (1942c)

Córdoba
Citas: Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

BECASINA DE LOS PÁRAMOS *Gallinago jamesoni* (Jardine & Bonaparte, 1855)

DESCRIPCIÓN
Largo: 29-30 cm.
Coloración. Parecida a la Becasina grande (*Gallinago stricklandii*)

HÁBITAT
Áreas húmedas y pantanosas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago jamesoni (Jardine & Bonaparte, 1855) observada en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se halla en la cordillera de los Andes entre 2.000 y 4.000 m, en áreas húmedas y pantanosas de los páramos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione et al. (2008a)

BECASINA GRANDE *Gallinago stricklandii* (G. R. Gray, 1845)

Otros nombres: Agachadiza grande. Becasina fueguina.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-38 cm.

Coloración. Pico gris amarillento con punta negra. Patas amarillas parduscas. Iris pardo oscuro.
Plumas de las partes dorsales con bandas negras, castañas y ocres, alternadas. Cara blanquecina con puntillado pardo oscuro. Garganta blanquecina. Pecho ocráceo con ondulaciones pardas oscuras y algo de canela en el cuello. Abdomen ocráceo. Flancos ocráceos barrados de pardo oscuro y canela.
Alas pardas con finos rebordes en las primarias. Cubiertas alares y cola como el dorso.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Reynolds (1935). Insectos.

HÁBITAT
Pantanos y turbales en bosques húmedos.

NIDIFICACIÓN
Nido en Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Reynolds (1935). Tierra del Fuego. Nido.

Más información:
Goodall et al. (1951)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Ellis et al. (2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo. “aperdizada”.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago stricklandii (G. R. Gray, 1845) en Islas de los Estados e islotes del canal de Beagle, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Islas Malvinas. Observada en el noroeste de Neuquén y en el oeste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en sur de Chile y Argentina. Migra al norte en invierno.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1998); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Imberti (2003, 2005e)

Tierra del Fuego
Citas: Blendinger (1998); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Islas Malvinas
Citas: Benneat (1926); Woods (1988, 2006)

BECASINA GIGANTE *Gallinago undulata* (Boddaert, 1783)

DESCRIPCIÓN
Largo: 48 cm
Coloración. Pico largo y ancho en la base. Patas verde grisáceo.
Cabeza, cuello y dorsal, rayado de negro y castaño. Ventral blanquecino jaspeado de pardo. Flancos barrados de castaño.Remeras pardo oscuras finamente barradas de blanco.

HÁBITAT
Pantanos, pastizales inundados, orillas de esteros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago undulata gigantea (Temminck, 1826) en Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Colombia, Venezuela, norte y sureste de Brasil, este de Guyanas, este de Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gallinago undulata gigantea (Temminck, 1826)

Corrientes
Citas: López Lanús y Moller Jensen (2012); López-Lanús et al. (2013b)

Más información:
López Lanús y Moller Jensen (2012)

BECASINA DE BAÑADO *Gallinago paraguaiae* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Becasa. Becasina. Agachadera. Agachadiza. Agachadiza común. Agachona. Aguatero. Becada. Becasina. Becasina chillona. Becasina de las sierras. Becasina prima. Becasina primera. Becasina segunda. Busca lluvias. Canasta. Canastica. Canastita. Carrero. Chorlaco. Chorlito. Chorlo agachón. Chula. Percasina. Picasina. Pide lluvia. Porotera. Rayador. Rompeviento. Yacaberé.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-30 cm
Peso: Contreras (1975): N= 6 (M y H) X= 136,4 g (Rango: 111 a 152,2)
Contreras (1979f): N= 1 (M) 111,0 g
Salvador (1988): N= 1 (H) 113,0 g
Navas y Bó (2001): N= 1 (M) 124,5 g; N= 2 (H) 151 y 182,9 g
Salvador (2014a): N= 2 (M) 109 y 118 g; N= 1 (H) 125 g

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas grises verdosas. Iris pardo oscuro.
Cabeza parda oscura con una franja central ocrácea. Partes dorsales pardas oscuras. Escapulares negras con las láminas externas de las plumas marginadas de ocráceo. Cejas y garganta blanquecinas. Cuello y pecho ocráceos jaspeados de pardo. Vientre blanco. Flancos blanquecinos con barras pardas y canelas.
Alas pardas oscuras.
Cola con las plumas centrales negras con puntas blancas y una banda subterminal canela. Laterales barradas de blanquecino y gris con puntas blancas.

COMPORTAMIENTO
Relativamente mansa. Plumaje mimético con la vegetación.

Alimentación
Marelli (1919). Vegetales.
Aravena (1927). **Insectos:** Curculiónidos. Dípteros. Lepidópteros. **Moluscos:** *Ampullaria*.
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. **Otros:** Piedritas. Semillas. Vegetales.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros. Himenópteros. **Moluscos**: (*Planorbis kermatoides*). **Otros:** Semillas. Vegetales. Piedritas.
Olrog (1956a). Oligoquetos.
Humphrey et al. (1970). Larvas.
Klimaitis (1993). Coleópteros. Vegetales.
Lajmanovich y Beltzer (1995). **Insectos:** Coleópteros (Elmidae, Curculionidae, Dytiscidae, Carabidae), (Escabaeidae, Hydrophilidae, *Berosus* sp.). Díptera (Tipulidae, Chironomidae, *Chironomus domizii*). Lepidoptera (Larvas). Hemíptera (Pelocoridae). Orthoptera (Grillidae). **Vegetales:** Semillas (*Polygonum* sp.). (Frutos) (Esporangios, *Salvinia* sp.)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Ephemeroptera (náyades). Hemiptera (Corixidae). Insectos (larvas). **Moluscos:** (Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas). **Anélidos:** (oligoquetos: lombrices de tierra)

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Levanta vuelo sorpresivamente. En veloz vuelo en picada, y como marcación territorial, el macho hace un sonido mecánico con las plumas de la cola al pasar el aire a través de las mismas se produce un fuerte y soplado Fefe.fefe.fefe.fefefefhh.fe..fehh..

HÁBITAT
Bañados, pantanos, pajonales húmedos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Formosa, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, islas Malvinas.
.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N				N	N	N	N	N	N	N	N

En el suelo. Cerca de ambientes acuáticos (campos inundados, bañados, arroceras)
Semioculto. Poco elaborado. Depresión forrada con pastos, a veces con reborde.

Barrows 1884d. Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 16-09-1880 nido con 3 huevos. 12-10-1880 nido con 2 huevos.
Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, un nido junto a una zanja con agua corriente, con 3 huevos.
Crawshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.
Hartert y Venturi (1909). Nidos en Barracas al Sud, Capital Federal, Buenos Aires y en Chaco.
Gibson (1920). Buenos Aires. Nido.
Peters (1923b). Huanu-Luan, 25 de Mayo, Río Negro, 07-10-1920, nido con huevos.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 08-10-1922, 2 huevos. Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 11-11-1926, 3 huevos.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Pereyra (1934a). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires, nidifica desde junio a setiembre. Construye el nido cerca o en la orilla del bañado sobre los mismos pastos o en algún albardón.
Drabble (1953). Gualeguaychú, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 24-09-1951, nido con 2 huevos.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en julio a octubre con 2 huevos. Diámetro externo de 15 a 17 cm.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Baliño (1984). Entre Ríos. Nido.
De Lucca y Saggese (1992). Santa Cruz. Nido.
Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en setiembre y dos nidos en noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Dos nidos, uno en julio y el otro en noviembre, con 2 y 1 huevo respectivamente.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
De la Peña (2013c). Villa San José, dpto. Colón, Entre Ríos, 15-07-1972, 3 huevos; Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 03-08-1973, 3 huevos; Emilia, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 28-07-1978, 3 huevos y 2 huevos;

Alejandra, dpto. San Javier, Santa Fe, 06-08-1991, 2 huevos; Merlo, dpto. Junín, San Luis, 20-01-2001, 2 huevos; Matilde, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 15-06-2002, 2 huevos.
El nido de Alejandra, estaba en una elevación del suelo, en el interior de una arrocera.
Medidas: diámetro total: de 10 a 12 cm, profundidad: 1 a 2,5 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", dos nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 5 nidos.
Grassini, C. M. (2015). Chajarí, dpto. Federación, Entre Ríos, 08-11-2015, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Puente, G. (2016). Costa Uruguay Sur, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, nido con 3 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Velázquez, R. J. (2016). Costa Uruguay Sur, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, nido con 3 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos en agosto y octubre, en proximidades de bañados, en matas de *Cynodon* sp. y matas de *Distichlis* sp., postura 2 huevos.
Salvador en De la Peña (2016c). Cintra, dpto. Unión, Córdoba, 03-09-2001, nido en las proximidades de una laguna, oculto bajo una mata gramínea, con 2 huevos incubados.
Earnshaw en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Sympson en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Moroni en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Bodrati (*in litt*. 2019). Estación Río Luján, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con 3 huevos incubados, el 13 de octubre de 1995, cubierto parcialmente por una mata**.**

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales ó cónicos. De color pardo amarillento o crema con pintas y manchitas pardas claras, pardas oscuras y grises distribuidas por toda la superficie pero más concetradas en el polo mayor. Algunos con manchas y líneas negras.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 37,5 a 42 x 27 a 30
Gibson (1920): 41,0 x 30,0
Smyth (1927): de 40,5 a 42 x 28 a 28,5
Pereyra (1938b): 41,0 a 45,0 x 27,0 a 31,0
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990): X= 35,25 x 24,75 (N=8)
Di Giacomo (2005h): 40,7 a 41,8 x 28,3 a 28,9 X= (N= 2)
De la Peña (2013c): De 38,7 a 42,5 x 27,7 a 32,5 X= 40,1 x 29,5 (N= 10)
Salvador en De la Peña (2016c): 37,9 x 28,9 y 37,8 x 29,1
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 36,2 a 37,9 x 27,4 a 29,6 X= 37,2 x 28,2 (N= 4)

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 15 a 17,5 X= 16,2 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 15,0 y 15,5
De la Peña (2013c): 15,7 a 16 X= 15,85 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,841 a 0,907 X= 0,888 (N= 7)

Anónimo (1933): huevos colectados en Tierra del Fuego por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción
De la Peña (2013c): Pico y patas negros. Cuerpo cubierto de plumón negro.

Observaciones
Christie et al. (2004). Pichones en octubre y noviembre.
De la Peña (2013c): 28-07-73. Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe. Adulto con un pichón.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones
Salvador en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico largo. Cejas y franjas en la cabeza blanquecinas.

Cayastacito. Santa Fe. 03-08-1973

Cayastacito. Santa Fe. 03-08-1973

Cayastacito. Santa Fe. 08-03-1973

Cayastacito. Santa Fe. 28-07-1973

Emilia. Santa Fe. 28-07-1978

La Brava. Santa Fe. 18-11-1983

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago paraguaiae paraguaiae (Vieillot, 1816) desde el norte del país hasta San Juan, San Luis y Buenos Aires; *Gallinago paraguaiae magellanica* (King, 1828) desde Mendoza, Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Migra en el otoño al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se distribuye por toda Sud América hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas.

Algunos autores en base a vocalizaciones y comportamiento consideran en realidad 2 especies.
G. paraguaiae al este de los Andes en gran parte de América del Sur, excepto la Patagonia y *G. magellanica* en el centro y sur de Chile, Argentina al este de los Andes a través de la Patagonia y Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gallinago paraguaiae paraguaiae (Vieillot, 1816)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2013); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Filipello y López de Casenave (1993); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1932)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Straneck (1990c)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1884d), Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); López-Lanús et al. (2013c); De la Peña (2012b, 2013c); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1939)

La Pampa
Citas: Cenizo et al. (2019); De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1910); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1993)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2001); Ortiz et al. (2016)

San Juis
Citas: De la Peña (2013c); Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Lajmanovich y Beltzer (1995); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)

Gallinago paraguaiae magellanica (King, 1828)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Contreras (1980c); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942a); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Wetmore (1926)

Neuquén
Citas: Contreras (1975, 1977b); Christie et al. (1988, 2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979b); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976; Junín de los Andes, dpto. Huiliches, 26-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Contreras (1975); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Earnshaw y Earnshaw (2000); Erize (1983); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Oustalet (1891); Peri (2013); Sclater et al. (1870)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

BECASINA ANDINA *Gallinago andina* Taczanowski, 1875

Otros nombres: Becasina de la puna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.

Coloración. Parecida a *Gallinago paraguaiae*. Más chica, pico más corto. Patas amarillas. Voz diferente.

HÁBITAT
Bañados, pantanos.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N			

Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nido a mediados de setiembre.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago andina Taczanowski, 1875 entre los 2.000 y los 4.000 metros de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza. En invierno baja a las llanuras.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se extiende desde el norte de Perú hacia Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Olrog (1953); Zotta (1936b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Sosa (2003)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Olrog (1959c)

San Juan
Citas: Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Echevarría et al. (2008a); Esteban (1953); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Olrog (1953, 1959c)

Subfamilia: Tringinae

FALAROPO COMÚN *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de tres colores. Chorlito nadador. Chorlito palmado grande. Chorlito pies palmados. Chorlito tarso comprimido. Chorlo blanco. Chorlo blanco nadador. Chorlo de agua. Chorlo de tarso comprimido. Chorlo de tres colores. Chorlo nadador. Chorlo palmado blanco. Chorlo palmado tricolor. Chorlo tricolor. Falaropo blanco. Falaropo de Wilson. Falaropo tricolor. Gordillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-25 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 3 X= 65 g (Rango: 60 a 70)
Salvador (1988): N= 2 (M) 45,0 y 47 g
Christie et al. (2004): N= 1 (H) 45 g
Salvador (2014a): N= 1 (M) 53,7 g; N= 3 (H) X= 55,2 g (Rango: 52,8 a 58,6)

Coloración. Pico negro. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grises claras. Ceja, rabadilla, supracaudales y partes ventrales blancas. Línea ocular oscura. Alas grises oscuras. Cobijas orilladas de blanquecino. Cola grisácea.
Plumaje nupcial.
Hembra. Frente y corona grises. Nuca blanca. Por detrás de los ojos se extiende una línea hasta la base del cuello. Dorso gris azulado con mancha castaña. Rabadilla, cejas, barba y garganta blancas. Anterior del cuello y pecho ocres canelas. Resto de las partes ventrales blanco.
Alas y cola como en reposo sexual.
Macho. Más pequeño y de colores más apagados.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy nadador. Gira sobre sí mismo picoteando el agua.

Alimentación
Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Curculionidae, Tenebrionidae). **Moluscos:** Caracol (huevos) (*Ampullaria* sp.) **Otros:** Minerales. Vegetales.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Corixidae. **Vegetales:** Semillas.

Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. **Otros:** Piedritas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae). Diptera (larvas). Hemiptera (Corixidae). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.) **Vegetales:** Semillas (*Scirpus* sp.)

HÁBITAT
Lagunas, mares.

Depredadores
De adultos: *Falco femoralis* en Jujuy, Laredo (1996)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, rabadilla y ventral blancas.
Dorso gris claro. Muy nadador.

Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008

Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008

Llambi Campbell. Santa Fe. 01-03-1974

Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego y ocasionalmente a las islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Estados Unidos. Migra hasta Tierra del Fuego, islas Malvinas y Georgias del Sur.
Se lo encuentra especialmente en la costa del Pacífico y toda Argentina en lagos alcalinos tanto en los Andes como en otros del interior del continente.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d, 1929a); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995, 2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Entre Ríos
Citas: De la Peña (2012b)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Esteban (1953); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Fiora (1933, 1939); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005); Moschione et al. (2011); Olivera (2009); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Parque Luro, dpto. Capital, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Lobo Allende y Marano (2017)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1920d); Ferrer et al. (2019); Sosa (1995d, 2005); Pereyra Lobos y Martínez (2011); Roig (1965)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1910, 1920d.); Navas y Bó (1993)

Neuquén
Citas: Bianchini (2016e); Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lancelotti et al. (2009); Lange (1981)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); Burger y Howe (1975); Chiale et al. (2015); De la Peña (1988c, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Maugeri et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 06-02-1983)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d, 1929a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

FALAROPO PICO FINO *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito apizarrado de mar. Chorlito palmado chico. Chorlo de mar de pies palmados.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-20 cm.
Coloración. Pico negro. Patas grisáceas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.

Partes dorsales grisáceas con el dorso jaspeado. Corona y franja ocular oscuras. Frente, cejas superciliares, lados de la cabeza y del cuello y partes inferiores blancos. Lados del pecho grisáceos.
Alas pardas. Cubiertas grisáceas con las extremidades blancas. Cola grisácea.
Plumaje nupcial.
Hembra. Partes dorsales grises oscuras, estriado de ocráceo. Barba y garganta blancas. Anterior, lados del cuello y pecho canelas.
Alas grises oscuras con las cubiertas orilladas de ocre. Resto del plumaje como en reposo sexual.
Macho. Semejante a la hembra pero más oscuro y con el pecho blanquecino jaspeado de gris y lavado de canela.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Lagunas, mares.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pico negro. Corona y franja ocular oscuras. Dorso jaspeado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) migratorio de Norteamérica. Observado en Neuquén, Río Negro y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico y área vecina. Migra durante el invierno boreal migra hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Mendoza

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén

Observaciones: Un ejemplar fotografiado por Cecilia de Larminat y un grupo de observadores, el 4 de mayo de 2018 en laguna La Solitaria, dpto. Zapala, Neuquén (https://ebird.org/view/checklist/S45490519). El individuo permaneció al menos un par de días en el sitio.

Río Negro
Citas: Casas y Gelain (1986)

FALAROPO PICO GRUESO *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito de mar. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito palmado castaño. Chorlito palmado rojizo. Chorlo de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-23 cm.
Peso: Christie et al. (2004): N= 1 (H) 45 g

Coloración. Plumaje de reposo sexual.
Pico verde amarillento con punta negra. Patas grises. Iris pardo.
Corona y línea posocular oscuras. Partes dorsales grises. Frente, cejas superciliares, cuello anterior y partes ventrales blancos.
Alas grises parduscas con las cobijas mayores con punta blanca. Cola gris pardusca.
Plumaje nupcial.
Pico amarillo con punta negra. Patas amarillentas.
Frente, corona y lorum pardos oscuros. Lados de la cabeza blancos. Posterior del cuello pardo y canela. Dorsal ocrácea estriada de negro. Cuello y resto de ventral canelas.
Alas grises parduscas oscuras. Cobijas mayores con punta blanca. Cola parda oscura.

HÁBITAT
Mares, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Nuca y línea posocular oscuras. Dorsal gris. Ventral blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Observado en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el extremo Ártico. Migra hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1920d); Olrog (1974); Pereyra (1938b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Chebez et al. (1998); Kovacs et al. (2005); Rubio (2006)

Córdoba
Citas: Cobos et al. (1999)

Formosa
Citas. Contreras et al. (2014)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2006)

Mendoza
Citas: Elías (2008); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Güller et al. (2006); Olivera et al. (2009); Olrog (1974); Pereyra Lobos y Elías (2011); Sosa et al. (2006); Sosa (1995b)

Neuquén
Citas: Argerich (2012); Bianchini (2016e); Contreras (1977b); Kovacs et al. (2005); Matarasso (2007); Olrog (1974); Pérez et al. (2006); Ramilo en Cheheber et al. (1992)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010, 2012b); Povedano (2016); Sosa et al. (2006)

San Juan
Citas: Lucero (2013b); Gelain (2013i, 2014a)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Imberti (2003, 2005e)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Keith (1970)

Malvinas
Citas: Murphy (1936); Woods (2006)

Antártida
Citas: Hayman et al. (1986); Watson (1975)

PLAYERITO PICO CURVO *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1774)

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-25 cm.

Coloración. Pico negro en la punta, amarillento en la base. Curvado. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal gris pardusca. Ventral blanquecina. Lados del pecho finamente estriados.

HÁBITAT
Costas de ríos y marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cuello y pecho estriados, que contrastan con el blanco de las partes ventrales. Dorso gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xenus cinereus (Guldenstadt, 1774) observado en Buenos Aires.
Nidifica en Finlandia, Rusia, Ucrania, Siberia.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Es un chorlito del Viejo Mundo (región paleártica), nidificando desde Finlandia a Siberia e inverna en África y Australasia. En el continente americano hay pocos registros, evidentemente como errante.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali et al. (1988)

PLAYERITO MANCHADO *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito manchado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): 266 (?) X= 36,6 g (Rango: 22 a 62)

Coloración. Pico amarillo en la base, negro en la punta. Patas verdosas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cabeza y partes dorsales pardas oliváceas. Cejas blanquecinas. Ventral blanca.
Alas pardas. Banda alar blanca. Cubiertas como el dorso.
Cola grisácea con las plumas laterales barradas de blanco. Puntas blancas, excepto el par central.
Plumaje nupcial.
Cobijas alares y rabadilla más oscuros. Partes ventrales blancas con puntos negros. Resto igual al plumaje de reposo sexual.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Marelli (1919). Coleópteros (larvas).
Zotta (1934). Coleópteros. Ortópteros. Moluscos. Piedritas.

HÁBITAT
Riberas de ríos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral blanca. Banda alar blanca, visible en vuelo. Cola "partida".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Buenos Aires y Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Norte América. Migra en el invierno boreal a estados sureños de Estado Unidos, Islas del Caribe, Centro América hasta Argentina, incluyendo todos los países de Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Mérida y Bodrati (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pagano et al. (2017a); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), dos individuos el 14 de enero de 1998, en raices emergentes del borde de la costa de la laguna Panza de Cabra, Parque Nacional Chaco, dptos. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral.

Chubut
Citas: Narosky (1983b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991-1994); Yzurieta (1995); Nores (1996); Salvador et al. (2017)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

Mendoza
Citas: P. Isola y A. Elías en Ferrer et al. (2019)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1919a.); Partridge (1954)

Neuquén
Citas: Contreras (1977b)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Peters (1923b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (2008a); Lucero (1983)

PITOTOY SOLITARIO *Tringa solitaria* Wilson, 1813

Otros nombres: Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito pardo menor. Chorlito solitario. Chorlo grande. Chululú-í. Dui-dui. Lavandero solitario. Mbatuitui. Playero solitario. Sacha pollito chico.

Esperanza. Santa Fe. 07-12-2007

DESCRIPCIÓN

Largo: 18-22 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (H) 67,5 g
Salvador (1988): N= 1 (H) 50 g; N= 1 (?) 50 g
Salvador (2914a): N= 1 (M) 56,5 g; N= 2 (H) 51,6 y 54,8 g

Coloración. Pico negro. Patas oliváceas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grisáceas parduscas con suave rayado y manchado de gris y pardo oscuro. Círculo ocular blanco. Lados de la cabeza, cuello y pecho blanquecinos estriados de pardo. Flancos blanquecinos barrados de pardo. Alas pardas oscuras. Las plumas externas de la cola son blancas con barras pardas y las centrales pardas.
Plumaje nupcial.
Similar al plumaje de reposo sexual pero con las partes dorsales más oscuras y manchadas de blanco.

COMPORTAMIENTO
Se lo ve solitario, en los charcos. A veces dentro de los montes.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Hydrophilidae). Diptera (larvas). Hymenoptera (Formicidae). Trichoptera (larvas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*).

HÁBITAT
Bañados, playas de ríos y de lagunas, charcos en montes.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Círculo ocular blanquecino. Solitario.
Cola blanca barrada lateralmente y con el centro oscuro.
Se parece al Pitotoy chico pero difieren en el color de las patas y de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa solitaria cinnamomea (Brewster, 1890) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Neuquén y Río Negro; *Tringa solitaria solitaria* Wilson, 1813 migratorio de Norteamérica. Llega hasta Tucumán, Chaco, Misiones, Buenos Aires. Observado en Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en Alaska y Canadá. Migra en el invierno boreal hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tringa solitaria cinnamomea (Brewster, 1890)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Hartert y Venturi (1909) , Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2001); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Dabbene (1920d); Castellanos (1931); Heredia (2006); Miatello et al. (2003); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Laguna de Pocho, dpto. Pocho, 06-12-1981)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Coconier (2005b); Chebez (2005); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Dabbene (1920d); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras y Fernández (1980); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1997a); Sosa (1993b, 2005); Valenzuela et al. (2013)

Misiones
Citas: Benstead et al. (1998); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Partridge (1954)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1920d); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Torres y Michelutti (2001a)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (2008a); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

Tringa solitaria solitaria Wilson, 1813

Formosa
Citas: López Lanús (1997)

Misiones
Citas: Navas y Bó (1993)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

PITOTOY GRANDE *Tringa melanoleuca* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Batitú. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito zancudo. Chorlo grande. Chorlo grande de patas amarillas. Chorlo mayor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas grande. Chorlo real.

Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007

Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007

Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-35 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 3 (?) X= 141,7 g (Rango: 115 a 172)
Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 160 g (Rango: 149 a 168); N= 4 (H) X= 170,2 g (Rango: 136 a 187)

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal parda salpicada de blanco y pardo oscuro. Supracaudales blancas. Garganta y ceja blanquecinas. Lados de la cabeza, cuello anterior y lateral, pecho y flancos jaspeados suavemente de pardo. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con las secundarias y las cubiertas salpicadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo.
Plumaje nupcial.
Similar al plumaje de reposo sexual pero con el pecho y las partes ventrales más jaspeadas de pardo oscuro. Partes dorsales más oscuras.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos, a veces con otros chorlos. La voz es similar a la del Pitotoy chico pero algo más grave.

Alimentación
Olrog (1956a). Miriápodos.
Beltzer y Lajmanovich (1991). *Salminus maxillosus.*
Klimaitis (1993). Limo. Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (larvas acuáticas). Hemiptera (Corixidae) Insectos (larvas acuáticas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*)

HÁBITAT
Bañados, lagunas, playas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Patas amarillas.
Se parece al Pitotoy chico pero es de mayor tamaño. También a la Becasa de mar, pero ésta tiene el pico curvado hacia arriba, patas grisáceas y bandas alares blancas.
Diferenciarlo del Playero de alas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa melanoleuca (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Canadá y Alaska desde donde migra durante el invierno boreal a toda América llegando en el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Paterlini (2009); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009); Steullet y Deautier (1935-1946)

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Dabbene (1920d); Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Trelew, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Puelches, dpto. Curá Co, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Lobo Allende y Bortnyk (2013); Lobo Allende et al. (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (1989); Ferrer et al. (2013b, 2019); Ferrer (2016); Leybold (1873a); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005); Wetmore (1926); Wolffhuegel (1929)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz et al. (2004); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1969)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (1998, 2008a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERO DE ALAS BLANCAS *Tringa semipalmata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Playero ala blanca. Playero aliblanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-40 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 2 (M) 70 y 72 g

Coloración. Pico negruzco. Patas grises azuladas. Iris pardo odcuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal grisácea. Supracaudales blancas. Ventral blanquecina con gris en la parte anterior del cuello. Loral blanco. Primarias blancas en la mitad basal, resto negro. Secundarias blancas. Cola blanca con banda terminal gris.
Plumaje nupcial.
Estriado oscuro en la cabeza y en el cuello. Barrado en dorsal. Ventral barrada y jaspeada.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja.

HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo. Banda alar blanca.
Se diferencia del Pitotoy grande por tener diferente color de pico y manchas blancas en las alas, y de la Becasa de mar por la forma y color del pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa semipalmata semipalmata (J. F. Gmelin, 1789) migratorio de Norteamérica. Observado en Jujuy, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, este de Chubut y Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en Norte América. En invierno boreal migra por la costa a Islas del Caribe, Centro América y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tringa semipalmata semipalmata (Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Argerich et al. (2011); Roesler et al. (2004); Jaramillo (2000); Straneck en Canevari et al. (1991b)

Catamarca
Citas: Bianchini (2019c)

Chubut
Citas: Escudero et al. (2004)

Córdoba
Citas: Yzurieta (1995); Torres y Michelutti (2001a)

Jujuy

Observaciones: Moschione, F. (19-04-2011, Laguna del Cementerio, Informe 3/12)

Santa Fe
Citas: López-Lanús et al. (2013a)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Olrog (1979b)

PITOTOY CHICO *Tringa flavipes* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Batitú. Batitú chico. Becasina. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito patiamarillo. Chorlito pardo mayor. Chorlito zancudo. Chorlo chico. Chorlo de patas amarillas. Chorlo menor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas chico. Chululú-í. Frailecillo. Patas amarillas menor. Pitotoy. Playero pata amarilla chico. Sacha pollito.

Esperanza. Santa Fe. 02-12-2007

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-28 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 88,2 g (Rango: 86,0 a 91,3); N= 3 (H) X= 85,5 g (Rango: 78,5 a 89,5); N= 2 (?) 83 y 87 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 69 g

Coloración. Pico negro. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Frente, corona, cuello posterior y partes dorsales pardos grisáceos estriados de blanquecino. Supracaudales y garganta blancos. Pecho jaspeado de pardo. Resto de la ventral blanco.
Alas pardo grisáceas con las plumas marginadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales más manchadas de blanco y negro y el pecho y flancos más jaspeados de pardo.

COMPORTAMIENTO
Mueve la cabeza acompasadamente. Anda en bandadas, a veces solitario.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Carábidos. Coccinélidos. Curculiónidos. Coleópteros (*Hidrochares medius*). Dípteros. Hemípteros.
Zotta (1940c). Coleópteros. Minerales.

Humphrey et al. (1970). Crustáceos, Peces, Larvas.
Martínez et al. (1975). **Insectos:** Insectos (larvas). **Moluscos:** (Gatropoda).
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Dípteros (larvas acuáticas). Hemípteros (Corixidae). **Moluscos:** Caracoles acuáticos. **Vegetales:** Semillas.
Beltzer (1986b). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, *Tropisternus* sp.). Hemípteros (Belostomidae, *Belostoma* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*). **Peces.**
Beltzer (1991a). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, *Tropisternus* sp.). Hemípteros (Belostomidae, *Belostoma* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*). **Peces.**
Klimaitis (1993). Minerales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Dytiscidae, Hydrophilidae). Diptera (Culicidae: larvas). Hemiptera (Corixidae). Hymenoptera (Formicidae). Insectos (larvas acuáticas). Trichoptera (larvas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*). **Arácnidos:** arañas. **Vegetales**: Semillas.

HÁBITAT
Orillas del mar, de lagunas, bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Patas amarillas.
Se parece al Pitotoy grande pero difieren en el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico de Norteamérica, desde donde migra durante el invierno boreal a toda América llegando en el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Weller (1967a); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Salinas Grandes, dpto. La Paz, 08-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Presidente Roque Saens Peña, dpto. Cte. Fernández, 03-05-1988)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Camperi (1998); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (2012b); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Dabbene (1920d); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1993); Fiora (1939); Laredo (1996); Mamaní et al. (2018)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923); Lobo Allende y Bortnyk (2013); Lobo Allende et al. (2014)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Dabbene (1920d)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sosa (1993b, 2005); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Hellmayr y Conover (1948); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Eastman et al. (2005); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984b, 2001, 2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1969)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986b, 1991a); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Argentina, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d); Lucero (1983); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999)

Islas Malvinas
Citas: Daguerre (1924b); Woods (2006)

AGACHONAS

FAMILIA: THINOCORIDAE

Aves de patas y cola cortas.
El nido es una simple depresión del suelo, en ocasiones cerca de algún coironal, pero también en zonas sin protección o en arenales vegetados lejos del agua.
Ponen 3 ó 4 huevos, piriformes, oliváceos o blanco crema con manchas pardas y canela oscuro, más concentradas en el polo mayor.
Sólo la hembra incuba, cuando dejan el nido cubren los huevos con pastos.
Se alimentan de granos e insectos.
Frecuentan praderas y estepas.

AGACHONA GRANDE *Attagis gayi* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Otros nombres: Agachona aperdigada. Agachona de la puna. Agachona de vientre rojizo. Chorlo aperdizado mayor. Chorlo perdiz. Colano. Colano de Simón. Corralera. Perdicita cordillerana. Perdigón. Perdiz cordillerana. Perdiz de la cordillera. Perdiz de la sierra. Perdiz real. Torrolón. Tortolón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27-30 cm.
Peso: Navas y Bó (2001): N= 1 (M) X= 297,5 g; N= 2 (H) X= 347,3 y 402,9 g

Coloración. Pico y patas amarillentos. Iris pardo.
Cabeza y cuello dorsal grises cenicientos moteados y estriados de negro. Dorsal oscura con ondulaciones grises, canelas y ocres (aperdizada). Garganta gris blanquecina. Cuello anterior y pecho canelas pálidos con ondulaciones negras. Abdomen y subcaudales ocráceos canelas.

Alas pardas. Cubiertas alares negras jaspeadas de rojizo. Cola parda rojiza con barras negras.

COMPORTAMIENTO
Relativamente mansa. Coloración mimética. Vuelo rápido.

HÁBITAT
Estepas pedregosas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N		N								N	N

Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. En enero se encontraron nidos en arenales vegetados lejos del agua.
Huntsmann y C. Moreno en WFVZ, en Salvador (2016a). Mendoza. Nido.

PICHONES
Observaciones
Barros (1930). Río de las Vacas, Mendoza, dos pollos que empezaban a emplumar.
Christie et al. (2004). Pichones en enero en Neuquén y Río Negro, el noroeste patagónico, observados por S. Vellido.
Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Adulto con pichones.
De Biagi, C. (2018). Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja, 19-12-2018, pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Izasa, F. C. (2019). Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja, 17-02-2019, Adulto con pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.

Más información:
Goodall et al. (1951). Housse (1945)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso “aperdizado”. Ventral canela, sin blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Attagis gayi simonsi Chubb, 1918 en el altiplano de Jujuy y *Attagis gayi gayi* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831 entre los 3500 y los 4500 m de altura, en la Cordillera de los Andes desde Salta hasta Mendoza, y entre los 1000 y los 2000 m desde Neuquén a Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Por la cordillera Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Attagis gayi simonsi Chubb, 1918

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Caziani y Derlindati (1999); Navas y Camperi (2005); Olrog (1963b, 1979b)

Attagis gayi gayi I. Geoffroy Saint-Hilaire y Lesson, 1831

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1953); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2006); Nores (1995)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Navas y Camperi (2005)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Chebez (2005b); Di Giácomo et al. (2007); Nores (1995); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Canevari et al (1998); Chubb (1918b); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Leybold (1873a); Navas y Camperi (2005); Olivera et al. (2009); Pereyra (1950a); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (19395); Reed (1916); Roig (1965); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Christie et al. (1988); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979b); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Camperi (2005); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005); Nores (1995)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al (1997); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Navas y Camperi (2005); Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1913); Di Giacomo et al. (2005c); Hellmayr (1932); Imberti (2005e); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005); Nores (1995)

AGACHONA PATAGÓNICA *Attagis malouinus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Chorlo. Chorlo aperdizado del sur. Chorlo perdiz de la patagonia. Colano de la patagonia. Perdicita cordillerana austral. Perdiz. Perdiz cordillerana de vientre blanco. Perdiz patagónica. Toshti.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27-29 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 308 y 392 g; N= 4 (H) X= 327,2 g (Rango: 308 a 350)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 320 g

Coloración. Pico pardo. Patas grisáceas. Iris pardo claro.
Cabeza y cuello ocráceos con estrías y puntos negros. Cejas y lados de la cabeza grises blanquecinos. Dorsal parda oscura con ondulaciones ocres, castañas y blanquecinas. Garganta blanquecina. Anterior del cuello y pecho castaños con ondulaciones pardas oscuras y blanquecinas. Abdomen y subcaudales blancos.
Alas pardas. Cubiertas alares pardas oscuras, ribeteadas de blanco y con manchas rojizas.
Cola negruzca con barras pardas rojizas y fina punta blanquecina.

COMPORTAMIENTO
Es de vuelo rápido y sorpresivo.

Alimentación
Crawshay (1907). Semillas .Vegetales.
Humphrey et al. (1970). Semillas. Vegetales.

HÁBITAT
Estepas.

NIDIFICACIÓN
Nido en Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Blaauw en Humphey et al. (1970). Tierra del Fuego. Nido.

Más información:
Goodall et al. (1964)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Aspecto “aperdizado” pero con el abdomen blanco. Esto la diferencia de la Agachona grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Attagis malouinus (Boddaert, 1783) desde Neuquén, Río Negro hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémica de Argentina y Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Neuquén
Citas: Contreras (1977b); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Povedano (2016); Wetmore (1926)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Erize (1983); Imberti (2003, 2005e); Lange (1981); Navas y Bó (1996c); Pagano y Salvador (2017); Salvadori (1900); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 30-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Reynolds (1934); Ripley (1950)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

AGACHONA DE COLLAR *Thinocorus orbignyanus* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Otros nombres: Agachona mediana. Agachona de pecho gris. Chorlo agachón de las alturas. Chorlo aperdizado mediano. Chorlo Juancho. Cojón. Corral. Don Juancho. Guancho. Juancho. Pocoí. Perdicita. Perdicita cojón. Perdicita cojón del norte. Porotera. Puco-puco. Pucu pucu.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-24 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 112,5 g (Rango: 110 a 115)
Salvador (1988): N= 1 (H) 110,0 g
Navas y Bó (1997b): N= 6 (M) X= 121,9 g (Rango: 106,8 a 131,3); N= 2 (H) 126,4 y 126,7 g

Coloración. Pico amarillento con punta oscura. Patas amarillas. Iris pardo.
Macho. Frente gris. Cejas y auriculares grises con estrías negras. Nuca y posterior del cuello grisáceos. Resto de la parte dorsal pardo moteado de negro y ocre. Garganta bordeada por una franja negra que se une en el cuello. Lados de la cabeza, del cuello y el pecho, grises. El pecho está separado del abdomen por una línea negra. Abdomen y subcaudales blancos. Flancos con manchas pardas.
Alas pardas con las cubiertas ribeteadas de blanquecino y jaspeadas de negro. Cola parda oscura con las plumas ribeteadas de ocre.
Hembra.
Dorsal similar al macho. Lados de la cabeza, cuello y pecho ocres jaspeados de pardo. Este último separado del abdomen por una línea oscura.
Cola parda oscura con punta blanca y rayas ocres en las plumas centrales.

COMPORTAMIENTO
Es de vuelo rápido y sorpresivo.

Alimentación
Fiora (1939). Vegetales, arena, tierra.
Baldo y Ordano (1993). Semillas de *Mulhenbergia peruviana.*

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En época de reproducción el macho hace un vuelo territorial, desde la madrugada, repitiendo continuamente una voz: Pucú.pucú.pucú.pucú.. o coop. coop.coop.coop.

HÁBITAT
Estepas, turbales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Depresión en el suelo recubierta con pastos y tallos.

Hartert y Venturi (1909). Budín en Cumbres Calchaquíes, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 3 huevos.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Maclean (1969b). Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Contino (1980). Nidifica en la puna jujeña.
Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, nido con 4 huevos.
Pereyra Lobos (2002). Nidifica en el Parque Nacional Aconcagua, Mendoza.
Mora, C. (2013). Laguna Los Horcones, Aconcagua, Mendoza, 30-11-2013, pichón.
Isola, P. (2016). Confluencia, Aconcagua, Mendoza, 08-12-2015, nido 4 huevos
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Uranga en De la Peña (2019b). Cordillera cerca de Tupungato, Mendoza, 08-12-2018. Nido en cercanías de un arroyo, en una loma al respaldo de una piedra, a 3.500 msnm. Depresión simple en el suelo, recubierta y tapada con algunos pastos secos. Tenía 4 huevos.

Tupungato. Mendoza, 08-12-2018.

Laguna del Diamante. Mendoza. 22-12-2017. Fotos: Máximo Uranga

Huevos
Pone 4 huevos. Piriformes u ovoides, oliváceos con manchas pardas y canela oscuro.

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Descripción
Salvador (2015). Iris café oscuro, patas amarillas y pico amarillo con caballete negruzco.
Peso: 72,5

Observaciones
Barros (1930). Cajón de las Vacas, Aconcagua, Mendoza, Marzo de 1922, pichón de 2-3 días de edad.
Fiora (1939). Laguna Colorada, Jujuy, 4.200 m, marzo de 1930, hembra con varios pichones.
Humphrey et al. (1970). Reynold observó el 14-11-1928, pichones en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.
Contino (1980). Jujuy, pichones recién nacidos a fines de febrero.
Salvador (2015). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, una hembra con un pichón emplumado.
Vuilleumier (1993). Chubut. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Uranga en De la Peña (2019b). Laguna del Diamante, dpto. San Carlos, Mendoza, 22-12-2017. Pareja con un pichón.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), en Patagonia, Ellis et al. (2002), en Tierra del Fuego, McNutt (1981)

Más información:
Maclean (1969b). Goodall et al. (1951)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
El macho por una línea negra en la garganta en forma de U y otra en el pecho. La hembra por el pecho jaspeado y una línea oscura en la base.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thinocorus orbignyanus ingae Tschudi, 1843entre los 2700 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán hasta el noroeste de Mendoza y *Thinocorus orbignyanus orbignyanus* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831 por el oeste desde Mendoza y Córdoba y en la llanura desde La Pampa, Río Negro hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego, entre 2.700 y 4.000 metros de altura en sus poblaciones del norte, llegando a la estepa patagónica en el sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thinocorus orbignyanus ingae Tschudi, 1843

Catamarca
Citas: Brodkorb (1928); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995); Steullet y Deautier (1935-1946); Vides-Almonacid (1986)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933, 1939); Mamaní et al. (2018); Salvador (1988, 2015); Straneck (1990f)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Navas y Bó (1997b); Olivera et al. (2009); Pereyra Lobos (2002)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1997b); Nores (1995); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Nores (1995)

Thinocorus orbignyanus orbignyanus I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Chubut
Citas: Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Frenzel (1891); Miatello et al. (1991-1994, 1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco (2016b); Stempelmann y Schulz (1890)

La Pampa
Citas: Cenizo et al. (2019)

La Rioja
Citas: Chebez (2005b); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza

Citas: Barros (1930); Burmeister (1861); Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Gosse (1899); Leybold (1873a); Navas y Bó (1997b); Pereyra (1950a); Pereyra Lobos (2002); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wolffhuegel (1929)

Observaciones: De la Peña (Puente del Inca, dpto. Las Heras, 11-01-1982)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Contreras (1977b); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); González (1991); Llanos et al. (2011); Peters (1923b); Povedano (2016)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Brodkorb (1928); Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Maclean (1969b); Scott y Sharpe (1910)

Observaciones: De la Peña (Comandante Piedrabuena, pdto. Corpen Aike, 28-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); McNutt (1981)

Islas Malvinas
Citas: Couve y Vidal (2003)

AGACHONA CHICA *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829

Otros nombres: Agachadera. Agachera. Agachona. Agachona común. Agachona de corbata. Agachona del Norte. Agachona del Sur. Agachona semillera patagónica. Boliviana. Canastita. Chorlito. Chorlo. Chorlo agachón. Chorlo aperdizado menor. Chorlo perdiz. Corralera. Dormilona. Echadero. Petaquita. Perdicilla. Perdicita. Perdicita agachona. Perdicita común. Perdicita de la sierra. Perdicita del norte. Porotera.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-19 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 5 (M) (Rango: 56,0 a 85,0)
Contreras (1975): N= 15 (M y H) X= 53,1 g (Rango: 48 a 59,9)
Navas y Bó (1990); N= 1(M jov.) 57 g; N= 1(H) 73,3 g, N= 1 (M) 62,1 g
Christie et al. (2004): (M) 60,0 g
Salvador (2014a): N= 2 (M) 57,0 y 58,5 g; N= 2 (H) 54,8 y 61,0 g
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 53, 3 y 57,0 g

Coloración. Pico pardusco. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Macho. Dorsal y supracaudales pardas claras con las plumas ribeteadas de ocre. Garganta blanca.
A cada lado bajan dos franjas negras que se juntan y se ensanchan en el pecho. Lados del cuello y del pecho grises. Abdomen blanco.
Primarias pardas oscuras ribeteadas de blanco, secundarias pardas y blancas.
Cola con las plumas centrales pardas y ocres. Laterales pardas oscuras con puntas blancas.
Hembra. Se parece al macho pero tiene los lados del cuello y del pecho pardos ocráceos y sólo vestigios de las franjas negras del cuello y pecho.

COMPORTAMIENTO
Es relativamente mansa. Levanta vuelo sorpresivamente. Coloración del plumaje mimético con el ambiente.

Alimentación
Crawshay (1907). Semillas.

Marelli (1919). Granos. Vegetales.
Zotta (1934). Semillas. Vegetales. Piedritas.
Philippi et al. (1954). Semillas.
Olrog (1956a). Semillas.
Humphrey et al. (1970). Vegetales. Semillas.
Sérsic y Cocucci (1996). Pétalo de *Calceolaria uniflora*.
Aramburú et al. (2007). Semillas de *Anthemis cotula, Chenopodium* sp., *Hordeum* sp., *Melilotus* sp., *Panicum bergii, Panicum* sp., *Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum* sp., *Scirpus americanus, Scirpus* sp., *Setaria* sp., *Trifolium repens, Triticum* sp.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Semillas de *Arachis hypogaea*, Gramíneas *Sorghum* sp., restos de hojas. Arena.
Paiaro et al. (2017). Néctar de *Anarthrophyllum desideratum*

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En época de reproducción, el macho emite una voz silbada: Jutujutujutu... que suele finalizar con un gutural jurrrjurrrju..

HÁBITAT
Praderas y estepas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Depresión en el suelo recubierta con pastos y tallos.

Peters (1923b). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, 20-12-1920, nido con huevos.
Belcher (1936). Pilcaniyeu, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 05-12-1935, nido con 4 huevos. Entre los pastos, muy oculto. Los huevos enterrados con la punta hacia abajo y cubiertos de pajas.
Maclean (1969b). Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y febrero. El nido es una simple depresión del suelo, en ocasiones cerca de algún coironal, pero también en zonas sin protección.
Uranga en De la Peña (2016c). El Huecú, dpto. Ñorquín, Neuquén, 18-12-2007, nido con 4 huevos.
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Nidos.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.

Huevos
Pone 4 huevos. Ovoidales. De color crema con pintas pardas rojizas, grisáceas y violáceas, distribuidas por toda la supercifie, pero más concentradas en el polo mayor.

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Pichón de 3-4 días de edad. Dorsal gris ocráceo punteado de negro. Ventral blanquecino.

Observaciones
Peters (1923b). Río Negro. Adulto con pichones.
Zapata (1967, 1969). Santa Cruz. Pichones.
Humphrey et al. (1970). Reynold, 17-01-1930, pichones en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego,

Boswall (1973). Chubut. Adulto con pichones.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Estancia La Indiana, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. El 25-01-1975, pichones.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.
Gelain (2012b). Río Negro. Adulto con pichones.
De la Peña (2013c). 25-01-1972. Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz. Pareja con 2 pichones; 30-01-1974. Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz. Varias parejas con pichones; 08-11-1979. Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz. Pareja con 4 pichones; 28-11-2000. Península Valdés. Adulto con 1 pichón chico.
Salvador (2015). Paso San Francisco, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, un hembra con un pichón.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.
Rumboll en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Adulto con pichones.

Generalidades
Maclean (1969b). Período de incubación: 25 días.
Navas y Bó (1997b). Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, una hembra con huevo por poner y tres en formación.
Albrieu et al. (2004). Realizan cortejos característicos, elevándose 40-50 m para dejarse caer con las alas extendidas mientras vocalizan constantemente. Sólo la hembra incuba, cuando dejan el nido cubren los huevos con pastos.

Depredadores
De adultos: *Circus cinereus* en Chubut, Durnford (1877a), *Geranoaetus polyosoma* en Patagonia, Travaini et al. (2012), *Falco sparverius* en Patagonia, Santillán et al. (2009a), *Glaucidium nana* en Santa Cruz, Santillán et al. (2008b), *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), en Patagonia, Ellis et al. (2002), en Santa Cruz, Santillán et al. (2010b), en Tierra del Fuego, Mc Nutt (1981)

Más información:
Maclean (1969b)

Villa Regina. Río Negro. 07-02-2017 Fotos: María Fernanda Gauna

El Huecú. Neuquén. 18-12-2007
Foto: Máximo Uranga

El Huecú. Neuquén. 18-12-2007
Foto: Máximo Uranga

Río Gallegos. Santa Cruz. 30-01-1974. Pichón
Foto: Martín R. de la Peña

Río Gallegos. Santa Cruz. 30-01-1974. Pichón
Foto: Martín R. de la Peña

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración "aperdizada". El macho tiene franjas a los lados de la garganta y collar negros. Abdomen blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thinocorus rumicivorus bolivianus Lowe, 1921entre los 2.000 y los 3.000 m de altura en Jujuy, Salta y Tucumán hasta el noroeste de Mendoza; *Thinocorus rumicivorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829 desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. En invierno, hasta Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Observada además en Malvinas y Shetland del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se encuentra en áreas costeras de Perú, en los Andes más al sur en Bolivia, Chile y Argentina, entre 2.000 y 3.000 metros de altura. Continúa por el oeste de Argentina ocupando incluso la estepa patagónica en las provincias más sureñas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thinocorus rumicivorus bolivianus Lowe, 1921

Catamarca
Citas: Salvador (2015)

Observaciones: Bodrati, A. en De la Peña (2016c)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Laredo (1996); Olrog (1959c); Zotta (1936a)

Mendoza
Citas: Navas y Bó (1997b); Sosa (1993b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Olrog (1949a)

Thinocorus rumicivorus rumicivorus Eschscholtz, 1829

Buenos Aires
Citas: Aramburú et al. (2007); Babarskas et al. (2003); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1994); Gibson (1920); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Durnford (1877a); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Di Giacomo (2014); Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 26-11-1973)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Ferrer et al. (2019); Lucero (2012b); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sosa (1993, 1995d, 2005); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1983a); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steulliet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Río Negro
Citas: Belcher (1936); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Contreras (1975); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Dacuik (1978c); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Ñorquinco, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Bianchini, M. (2017b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005c); Edelaar et al. (2005a); Erize (1983); Hellmayr y Conover (1948b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Maclean (1969b); Oustalet (1891); Paiaro et al. (2017); Peri (2013); Reichenow (1920); Santillán et al. 2008b, 2010b); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939); Straneck (1990a); Travaini et al. (2004); Wetmore (1926a); Zapata (1969)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 26-01-1972)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Manassero et al. (2006); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Kovacs et al. (2005); McNutt (1981); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Shetland del Sur
Citas: Favero y Silva (1999)

JACANA

FAMILIA: JACANIDAE

Aves acuáticas. Tienen los dedos largos. Escudete en la frente.
Construyen el nido en esteros, bañados. Deposita los huevos sobre plantas acuáticas flotantes
Es expuesto. Rudimentario o poco elaborado. En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose un engrosamiento del lugar donde deposita los huevos.
Ponen 4 huevos, raro 5. Ovoidales. De color pardo amarillento u ocre con líneas negras, distribuidas por toda la superficie. Son de cáscaras brillante.
Se alimentan de pequeños caracoles, semillas, vermes y de otros animales acuáticos.
Frecuentan lagunas, esteros y bañados.

JACANA *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)

Otros Nombres: Aguapeazó. Alas amarillas. Burrito. Canasta. Canastica. Canastita. Cocha polla. Gallareta. Gallineta. Gallinita. Gallito. Gallito del agua. Gallito de la isla. Gallito de lata. Pollonita. Sacha pollito. Yacana.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-25 cm
Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 75 y 106,5 g; N= 2 (H) 132 y 144 g
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 81 y 98 g

Coloración. Pico amarillo con escudete frontal rojo. Patas oliváceas. Iris pardo amarillento.
Cabeza, cuello, pecho y vientre negros. Dorso castaño.
Escapulares y cubiertas alares castañas. Primarias y secundarias amarillas verdosas con punta de las plumas y parte de la lámina externa de las primarias, pardas. Espolón rojo.
Cola castaña con punta negra.

Juvenil. Corona parda rojiza. Cejas ocráceas. Posterior del cuello pardo oscuro. Garganta, cuello y vientre blancos. Pecho blanco amarillento. Dorso y cola pardos. Rabadilla castaña. Alas como el adulto.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o formando grupos, a veces de adultos y juveniles. Camina sobre la vegetación acuática.

Alimentación
Marelli (1919). Insectos. Vegetales.
Fiora (1939). Semillas, piedritas, lentejas de agua.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae). Dípteros. Hemípteros (*Zaita* sp.). Hemípteros. Ortópteros. **Moluscos:** (*Planorbis kermatoides*) (Potamolithus) (*Ampullaria*). Caracoles (*Littoridina piscium*). **Vegetales:** Semillas. **Otros:** Limo. Piedritas. Arena.
Zotta (1940c). Coleópteros. Vegetales. Minerales.
Beltzer y Paporello (1984). **Insectos:** Coleoptera (Dysticidae, *Desmopachria* sp.). (Noteridae, *Hydrocanthus* sp.) (Hydrophillidae, *Tropsternus* sp.). (Curculionidae, *Neochetina* sp.). (Elateridae). (Elmidae, Carabidae, Diptera (Chidonomidae, Culicidae). Ephemeroptera. Hemípteros (Corixidae, Pleidae, *Neoplea* sp.). Hemíptero (Belostomidae, *Belostoma micantulum*). Hymenoptera. Lepidoptera. Caenidae (*Caenis* sp.). Odonata (Anisoptera, Zygoptera). Ortoptera. Polimitarcidae (*Campsurus sp.*). **Crustáceo:** Decapoda (Trichoda, *Trichodactylus borellianus*. **Vegetales:** Semillas de *Acacia caven*, *Echinochloa* sp., *Eichhornia crassipes*, *Hydrocotyle ranunculoides*, *Panicum* sp., *Paspalum repens, Plantago* sp., *Polygonum* sp. **Otros:** Amphipoda (Hyalellidae, *Hyalella curvispina*). **Peces:** *Holoshesthes pequira.* **Moluscos:** (Ampullaridae, *Ampullaria* sp. *Marisa* sp.) (Hidrobidae, *Biomphalaris sp., Littoridina* sp., *Piscidium* sp.)

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Suele repetir una voz nasal: Weth, whet, whet, mientras despliega las alas.

HÁBITAT
Lagunas, esteros, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Salta, Tucumán, La Rioja, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N					N	N	N	N

En esteros, bañados. Deposita los huevos sobre plantas acuáticas flotantes
Expuesto. Rudimentario o poco elaborado. En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose un engrosamiento del lugar donde deposita los huevos.

Hudson (1876). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, nidifica en la zona.
Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 17-12-1920, 3 huevos.
Friedmann (1927). Tucumán. Nido.
Girard (Instituto Miguel Lillo). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 4 huevos; 04-02-1932, 2 nidos con 4 huevos cada uno.
Pereyra (1932c)**.** Zelaya, río Luján, pdo. Luján, Buenos Aires, nidos en diciembre de 1931.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Pone 4 huevos.
Contino (Instituto Miguel Lillo). Salta, 17-09-1973, 2 huevos.

Contino (1980). Nidos en el noroeste.
Blendinger (1986). Parque Nacional El Rey, dpto. Anta, Salta, 15-01-1985, 4 huevos.
Narosky y Lozzia (1988). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 10 al 14-09-1987, nido con 4 huevos.
Alaberce y Antelo (1998). Tucumán. Nido.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Babarskas, M. et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se localizaron 25 nidos. Nidifica principalmente desde setiembre a mayo. Los huevos son puestos sobre Repollitos de agua. En algunos casos construye una plataforma simple amontonando materiales vegetales.
Navarro, J. L. (2013). Reserva Los Corbalanes, Santiado del Estero, 17-02-2013, nido 4 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
Prado, W. (2013). Reserva El Cachapé, Chaco, 14-10-2007, nido 4 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 15 nidos: 24-11-1971, 4 huevos; 26-01-1987, 4 huevos, 28-10-1989, 2 huevos y 2 pichones; 22-12-1989, 3 huevos; 03-01-1990, 4 huevos; 12-01-1990, 4 huevos; 11-12-1992, 3 huevos; 25-11-1994, 4 huevos; 21-12-1994, 2 huevos y 3 huevos; 07-12-1996, un huevo; 20-01-1998, 4 huevos; 07-12-2001, 3 huevos; 21-10-2002, 4 huevos y 4 huevos; Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 4 nidos: 01-11-1973, 3 huevos; 15-11-1975, 4 huevos; 22-11-1975, 4 huevos; 03-01-1997, 3 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-01-1979, 2 huevos; Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 05-12-1983, 3 huevos; Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 27-01-1987, 4 huevos y 4 huevos; Cañada Ombú, dpto. General Obligado, Santa Fe, 08-11-1989, 3 huevos; Villa Guillermina, dpto. General Obligado, Santa Fe, 09-11-1989, 2 huevos; Cacique Ariacaiquín, dpto. San Javier, Santa Fe, 08-10-1992, 4 huevos; El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1991, 4 huevos; Río Salado y Ruta 4, dpto. La Capital, Santa Fe, 31-01-1993; 4 huevos; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 2 nidos: 23-10-1995, 4 huevos y 4 huevos, Villa Ocampo, dpto. General Obligado, Santa Fe, 27-11-1995, 4 huevos; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 6 nidos: 13-01-2001, 4 huevos; 28-12-2001, 4 huevos; 14-12-2011, 4 huevos y 3 huevos; 12-12-2012, 4 huevos; 20-01-2013, 4 huevos.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 1 nido.
Durán, G. F. (2014). R.E. UNL, Santa Fe, 03-02-2013, nido 4 huevos.
Rumboll en Salvador (2016a). Presidente de la Plaza, dpto. Presidente de la Plaza, Chaco, 24-19-1972, 2 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 9 nidos entre setiembre y febrero, sobre repollitos del agua y otras plantas acuáticas, posturas de 3 a 4 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c). Intiyaco, dpto. Vera, Santa Fe, 13-12-1982, 3 nidos sobre repollitos del agua, con 3, 3 y 4 huevos; Haumonía, dpto. Tapenagá, Chaco, 16-12-1982, un nido sobre repollitos del agua con 4 huevos incubados.
Salvador en De la Peña (2016c). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-10-1984, un nido sobre repollitos del agua con 3 huevos. Isla Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-12-1988, un nido sobre repillitos del agua con 3 huevos incubador; Ituzaingó, dpto. Ituzaingó, Corrientes, 13-12 1988, dos nidos sobre repollitos del agua, en un bañado junto a un camino, ambos con 3 huevos.
Contino en WFVZ, en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Salta. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-10-1984, un nido sobre repollitos del agua con 3 huevos.
Bodrati en Salvador (2016a). Misiones, Chaco, Corrientes, Buenos Aires. Nidos.
Rumboll en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
De la Peña (2020). Villa Roda. Dpto. La Capital. Santa Fe. 12-09-2017. Nido con 4 huevos. 07-10-2019.Nido con 4 huevos. 10-10-2019. Nido con 2 huevos. 31-12-2019. Nido con 4 huevos. 16-01-2020. Villa Roda. Nido con 3 huevos. 17-01-2020. Villa Roda. Nido con 3 huevos.

Huevos

Pone 4 huevos, raramente 5. Ovoidales. De color pardo amarillento u ocre con líneas negras distribuidas por toda la superficie. Cáscara brillante.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 28,0 a 32,0 x 21,0 a 23,0
Smyth (1927): 30,0 a 31,5 x 23,0 a 23,5
Contino (1980): 31,0 x 24,0

Blendinguer (1986) : 30,8 a 33,1 x 21,9 a 22,6	X= 31,4 x 22,1 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 27,8 a 30,3 x 22,0 a 23,3	X= 29,3 x 22,5 (N= 15)
De la Peña (2013c): 28,8 a 31 x 21,8 a 23	X= 29,6 x 22,4 (N= 17)
Salvador y Salvador en Salvador (2016a): 28,6 a 31,7 x 21,8 a 23,9	X= 30,1 x 22,9 (N= 24)
Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 28,6 a 31,5 x 21,9 a 23,7	X= 29,6 x 22,8 (N= 10)
Salvador en De la Peña (2016c): 28,4 a 30,8 x 22,0 a 23,4	X= 30,1 x 22,2 (N= 6)
Salvador en De la Peña (2016c): 30,5 a 31,6 x 22,7 a 23,3	X= 30,9 x 22,9 (N= 6)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 8,1 a 11,5	X= 9,4	(N= 17)
Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña (2016c): 8,1 a 9,5	X= 8,6	(N= 10)
Di Giacomo (2005h): 5,5 a 8,1 X= 7,2 (N= 15)		
De la Peña (2013c): 7,64 a 8,15	X= 7,90	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,435 a 0,550	X= 0,520	(N= 12)

Un huevo localizado el 11-01-79 en Candioti, era blanco con pocas manchas castañas y grises, en el polo mayor. La cáscara pesó 0,284 grs y no se la tiene en cuenta para los promedios.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Pichón de 1-2 días.
Pico claro. Dorsal franjas pardas y canelas. Corona canela. Línea ocular oscura. Ventralmente blanquecino.

Observaciones

Contino (1980). Pichones desde diciembre a marzo en el noroeste.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se observaron pichones pequeños en junio, julio y agosto.
De la Peña (2013c). Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 22-11-1975, pareja con 3 pichones y otra con 4; 27-01-1987, Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, pareja con 3 pichones y otra con 4; Llambi Campbell, dpto. La Capital, Santa Fe, 27-01-1987, pareja con 3 pichones; Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, 18-03-1988, Adulto con 3 pichones; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 11-01-1989, pareja con 3 pichones; Esperanza, 28-01-1989, adulto con 3 pichones y otro con 4; Esperanza, 23-04-1989, pareja con 3 pichones; Cayastá, Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1989, adulto con 4 pichones; Esperanza, 07-01-1990, pareja con 3 pichones; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 15-12-1990, adulto con 2 pichones; Esperanza, 18-12-1990, dos adultos con 4 pichones cada uno; El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1991, adulto con 3 pichones; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 26-11-1991, pareja con 2 pichones; Yeso Oeste, dpto. La Paz, Entre Ríos, 06-12-1991, pareja con un pichón; Esperanza, 08-02-1992, 4 adultos con 1, 2, 4 y 5 pichones cada uno; Esperanza, 11-12-1992, adulto con 2 pichones; Esperanza, 07-12-1996, pareja con 3 pichones; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 20-11-2001, adulto con 4 pichones; Río Salado y Ruta 4, dpto. La Capital, Santa Fe, adultos con 3,4 y 4 pichores.
Chatellenaz (2008c). Formosa. Adultos con pichones.
Salvador en Salvador (2016a). La Rioja. Adulto con pichones.
Torrano (1986). Entre Ríos. Adulto con pichones.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido. Adulto con pichones.
De la Peña (2020). Villa Roda. Dpto. La Capital. Santa Fe. 24-03-2019. Pareja con 4 pichones. 05-01-2020, Villa Roda. Pareja con 4 pichones. 17-01-2020, Villa Roda, pareja con 3 pichones.

Generalidades

De la Peña (2013c). Período de incubación, de 23 a 25 días. Pone en días alternos; Di Giacomo (2005h). 26 días.
De la Peña (2013c). Una cópula duró un minuto.
Cuando están con los pichones, ante la presencia de un extraño, realizan ceremonias de distracción. Estas consisten en simular estar heridos, abren las alas, se agachan y aletean, emitiendo fuertes y chillonas voces. En ese imomento los pichones se ocultan entre la vegetación o se sumergen, dejando solamente el pico fuera del agua. Cuando desaparece el peligro, los padres con voces de llamado los reúnen nuevamente.

Depredadores

De adultos: Reptiles: Curiyú (*Eunectes notaeus*) en Formosa, Waller et al. (2007).
Aves: *Bubo virginianus* en Formosa, Di Giacomo (2005h), *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004), *Ardea cocoi* en Buenos Aires, Dodyk, L. (2015), EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019., Carancho (*Caracara plancus*), en Corrientes, D´Agostino, C. (2018). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 18/05/2019. *Tyto alba* en Chaco Bodrati (*in litt*. 2019)
De juveniles: *Circus buffoni* en Santa Fe, Beltzer et al. (2001)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y cuello, negros. Alas amarillentas. Patas y dedos largos. Camina sobre la vegetación acuática. El grito.

Esperanza. Santa Fe. 27-10-2005

Candioti. Santa Fe. 11-01-1979

Esperanza. Santa Fe. 25-01-2012

Esperanza. Santa Fe. 25-01-2012. Juvenil

Esperanza. Santa Fe. 20-12-2011

Esperanza. Santa Fe. 30-11-2011

Llambi Campbell. Santa Fe. 27-01-1987

Llambi Campbell. Santa Fe. 27-01-1987

Villa Roda. Santa Fe. 13-12-2012. Alarma

Villa Roda.Santa Fe. 24-01-2013

Villa Roda. Santa Fe. 25-01-2013. Irritado

Villa Roda. Santa Fe. 29-01-2013.
Pichones protegidos

Villa Roda. Santa Fe. 31-01-2013.Adulto y pichones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Jacana jacana jacana (Linnaeus, 1766) desde el norte del país hasta Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Su distribución geográfica se extiende desde Panamá a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920): Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López de Casenave y Filipello (1995); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932c, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Weller (1967a); White (1882)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Catalina, dpto. Totoral, 05-02-1975)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1919f, 1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Waller et al. (2007); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Hayward (1967); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019); Lías (2008); Roig (1965); Sosa (2004)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Arenas y Gauna (2020)

Observaciones: Horacio Matarasso en Tromen (2013)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Herrera et al. (2013); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Beltzer et al. (2001, 2003-2004); Beltzer y Paporello de Amsler (1984); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Straneck (1990e); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Echevarría et al. (2008c); Handford (1983); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

AGUATERO

FAMILIA: ROSTRATULIDAE

Aves acuáticas. El pico es largo y curvo.
Se alimentan de insectos, larvas, moluscos y crustáceos.
Frecuentan esteros, bañados y espartillares cubiertos de agua.
Construyen el nido en el suelo, entre pastos. Plataforma plana de pastos. A veces entremezclados con barro.
Entre pastos, cerca de campo inundado o lejos del agua
Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, cubriendo toda la superficie.

AGUATERO *Nycticryphes semicollaris* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Agachona. Becasina chica. Becasina falsa. Becasina pico curvo. Becasina pintada. Carcarén. Carrerito. Chorlito cabeza y cuello oscuros. Chorlito gola oscura y blanca. Chorlo pintado. Dormilón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 72,4 g (Rango: 68,6 a 77,2); N= 1 (H) 73,8 g

Coloración. Pico curvo hacia abajo, verde claro con base amarilla. Patas verdes. Iris pardo.
Cabeza negra con una banda central blanca hasta la nuca. Finas cejas blanquecinas. Cuello y pecho pardos oscuros. Dos bandas a los lados del pecho que continúan hacia el dorso en una línea canela. Resto de lo ventral blanco. Dorso pardo grisáceo. Supracaudales ocráceas vermiculadas de pardo. Alas grises oscuras con lunares blancos y estrías y franjas castañas. Cola canela vermiculada de pardo.

COMPORTAMIENTO
Levanta vuelo sorpresivamente. A veces se "aplasta" contra el suelo, a pocos metros del observador. Es de vuelo silencioso.

Alimentación
Marelli (1919). **Moluscos:** (*Planorbis*). Peces. Vegetales.

Zotta (1934). **Moluscos:** (*Planorbis*) (*Ampullaria canaliculata*). Vegetales. Frutos.
Klimaitis (1993). Coleópteros. Piedritas. Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, no identificado). Hemiptera (Belostomatidae). Lepidoptera (orugas). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchapei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (*Scirpus* sp.). Semillas (gramíneas). **Anélidos:** (Hirudinidae: sanguijuelas).

HÁBITAT
Bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N				N	N	N	N	N	N	N	N

En el suelo, entre pastos. Plataforma plana de pastos. A veces entremezclados con barro.
Expuesto. Poco elaborado.

Barrows (1884d). Cconcepción del Uruguay, Entre Ríos.18-09-1880 2 nidos con 2 huevos cada uno.
Holland (1891). Buenos Aires. Nido.
Grant (1911). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
Wetmore (1926b). Gral Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, 02-11-1920, nido con 2 huevos.
Pereyra (1927d, 1934). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 13-11-1916, 2 huevos; 05-11-1924, 2 huevos.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Construye el nido sobre las gramíneas, en las orillas de arroyos o lugares con agua. Desde junio a octubre.
Olrog (1965b). Bañados de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, 26-05-1963, huevos.
Rumboll (1967). Cañada de las Víboras, dpto. 9 de Julio, Santa Fe, 04-08-1966, nido con 2 huevos.
López Lanús (1997). Formosa. Nido.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 29-10-1975, 2 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 08-01-1979, 2 huevos.
Medidas promedios de los nidos: diámetro total: de 9 a 10 cm, alto: 2 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 11 nidos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Nores en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.
Nores en Salvador (2016a). Ucacha, dpto. Juárez Celman, Córdoba, 16-08-1976, 2 nidos con 2 huevos cada uno.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos en agosto, diciembre y enero, todos en matas de *Distichlis* sp. Postura 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, cubriendo toda la superficie.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 34 a 37 x 23 a 34,5
Gibson (1920): 35,0 a 37,0 x 24,0
Wetmore (1926): 34,2 a 34,7 x 24,0 a 24,6 X= 34,4 x 24,3 (N= 2)
Smyth (1927): 33,0 a 33,5 x 24,0
Pereyra (1938b): 35,0 x 25,0
De la Peña (2013c): 33,4 a 35,9 x 23,7 a 24 X= 34,6 x 23,8 (N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 30,6 a 34,6 x 22,8 a 24,4 X= 33,1 x 23,5 (N= 6)

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 9,8 a 11,5 X= 10,1 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,650 a 0,733 X= 0,701 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Pereyra (1938b). El pichón tiene plumón castaño grisáceo con la banda de la cabeza negra y rojiza por la nuca; otras dos bandas desde el ojo por al costado del cuello y otras dos más que bajan del pico son paralelas a las anteriores, continúan má anchas por todo lo superior del cuerpo hasta la cola, bajando a los costados de las alas, todas ellas son negras y negras rojizas. Pico y patas negros.

Observaciones
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en La Pampa, Galmes et al. (2008b, en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), *Falco femoralis* en Córdoba, Salvador (2012c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Lunares blancos en las alas. Bandas blancas en los costados del pecho. Pico largo, curvo en la punta.

Candioti. Santa Fe. 08-01-1979

Esperanza. Santa Fe. 11-08-2003

Campo Andino.Santa Fe 24-02-2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816) desde el norte del país hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Ambientes acuáticos poco profundos en sureste de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Vargas et al. (2007); Weller (1967a)

Catamarca

Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), una pareja con dos huevos en el estero Palma Sola, Parque Nacional Chaco, Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, Chaco, 24 de agosto de 1998.

Chubut

Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Navas (1994); Pagnoni (2012b); Pereyra (1923a); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a, 2012c); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1884d), Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1994); Pereyra (1945); Vega y Alzugaray (2020); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016); Reggio y de la Orden (1997)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Höhn (1975); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Quiroga y Hadad (2004); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Meneguax (1925); Nores et al. (1991); Olrog (1965b)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921)

ESCÚAS Y SALTEADORES

FAMILIA: STERCORARIIDAE

Aves marinas de pico grueso. Patas palmeadas
Persiguen a otras aves para hacerles vomitar y luego tomar el alimento que llevan. También se alimentan de pichones de otras aves, de cadáveres de elefantes o de lobos marinos.
Nidifican solitariamente o en colonia con nidos dispersos
En el suelo arenoso o entre piedras.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.
Ponen 1 ó 2 huevos.

ESCÚA CANELA *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857

Otros nombres: Gaviota acanelada. Gaviota asesina. Gaviota parda común. Gran skúa. Págalo grande. Skúa común.

DESCRIPCIÓN
Largo: 53-59 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (H) 1500 g
Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 1193 a 1224,5 g; N= 2 (H) 1433 a 1527 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Dorsal parda con estrías delgadas blanquecinas en el cuello y castañas hacia el dorso. Garganta canela, cuello pardo con suave estriado amarillento. Pecho y abdomen pardos claros y canelas rojizos.
Alas pardas oscuras con notable mancha blanca en la base de las primarias.
Cola parda, corta, con forma de cuña.

COMPORTAMIENTO
Se lanza a gran velocidad sobre otras aves para que suelten las presas. Realiza vuelos rasantes sobre los intrusos que se aproximan a los nidos. Cuando está posada suele levantar ambas alas.

Alimentación
Orgeira (1995b). Krill, Lampreas, omnívoro.
Albrieu et al. (2004). Aves (pichones). Huevos. Carroña. Invertebrados. Peces. Regurgitados.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Aves (pichones). Huevos.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Emite una áspera voz: Kiee.kieekieekieeh..

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut (desde el Golfo San Jorge), Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Nidifica solitariamente o en colonia con nidos dispersos
En el suelo arenoso o entre piedras.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.

Shipton (Instituto Miguel Lillo). Río Gallego, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 18-11-1914, un huevo.

Reynold (1935). Tierra del Fuego. Nido.
Castellanos (1935). Tierra del Fuego. Nido.
Olrog (1948). Nidos en enero, cerca de Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego.
Olrog (1950). Tierra del Fuego. Nido.
Korschenewski (1969b). Chubut. Nido.
Boswal y Prytherch (1972). Chubut. Nido.
Parmelee y Mc Donald (1975). Tierra del Fuego. Nido.
Daciuk (1975, 1977a, 1977b). Chubut. Nido.
Punta (1989). Isla Viana Mayor, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, mediados de 1980, nidos.
Parmelee et al. (1994). Tierra del Fuego. Nido.
Schiavini y Yorio (1995). Tierra del Fuego. Nido.
Gandini y Frere (1998). Isla de los Pájaros, Isla Pingüino, Punta Medanosa, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Isla Leones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islas Becasses, Isla Martillo, Isla Despard, Islote Lucas Mayor, Islote Lucas Este, Islote Willie Mayor, Islote Bertha Este, Isla H, Isla Bridges, Isla Reynolds, Isla Leeloom, dpto. Ushuaia, Tierra del fuego, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b. 1998c). Chubut. Nido.
Frere y Gandini (1998). Santa Cruz. Nido**.**
Albrieu et al. (2004). Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifican entre setiembre y noviembre.
De la Peña (2013c). Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, Chubut, 27-11-1973, 2 nidos con 2 huevos cada uno y 2 con uno y el 05-11-1979, 2 nidos con un huevo cada uno. Un nido mide: diámetro de 20 a 25 cm y 1 a 3,5 cm de profundidad.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas

De la Peña (2013c): 70,6 a 77 x 48,3 a 51	X= 72,5 x 49,8	(N= 4)

Pesos

De la Peña (2013c): cáscaras 5,864 a 7,220	X= 6,953	(N= 4)

Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973	Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973

Pichones

Observaciones

Lorenzo, L. E. (2010). Isla Pingüino, dpto. Deseado, Santa Cruz, 06-01-2010, pichones. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Gionolli, C. (2011). Isla H, Tierra del Fuego, 01-02-2011, picón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Espíndola, D. (2011). Isla Martillo, Tierra del Fuego, 05-02-2011, pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Earnshaw, A. (2014). Isla Martillo, Tierra del Fuego, 31-01-2014, pichones. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.

Más información:
Yorio (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Coloración general parda con mancha blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Stercorarius chilensis Bonaparte, 1857 nidifica en costas e islotes de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Islas Malvinas. En otoño migra hacia el norte. Observado en el río Uruguay y en Isla Victoria (Río Negro).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en costas de Chile y Argentina. En otoño migra al norte llegando hasta .

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Chiurla (1997); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)

Chubut

Citas: Albrieu et al. (2004); Boswall (1973); Daciuk (1977b); De la Peña (2013c); Kovacs et al. (2005); Lucero (1982); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Camarones, dpto. F. Ameghino, 01-02-1974)

Entre Ríos
Citas: Klimaitis (1977b)

Neuquén
Citas: Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr y Conover (1948b); Murphy (1936); Nasca et al. (2004); Oates (1901); Oustalet (1891); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972; Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 10-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Gómez (1988); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Schiavini et al. (1998)

Canal de Beagle
Citas: Olrog (1958a); Stiles (1979a)

Mares
Citas: Orgeira (1995b); Seco Pon et al. (2017)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

ESCÚA POLAR *Stercorarius maccormicki* H. Saunders, 1893

Otros nombres: Gaviota parda antártica. Gaviota parda de cuello amarillo. Gaviota parda de las Orcadas. Skúa del polo sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-55 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 3 (?) X= 1258 g (Rango: 1105 a 1412)

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Partes dorsales pardas oscuras. Cuello ocráceo amarillento. Frente, lados de la cabeza y ventral pardos claros. Alas pardas oscuras con mancha blanca en la base de las primarias. Cola parda, corta, redondeada.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Baker y Barbraud (2001). **Aves:** *Daction capense* (huevos y adultos), *Fulmarus glacialoides* (huevos, pichones y adultos), *Pagodroma nivea* (huevos, pichones y adultos), *Pygoscelis adeliae* (adultos), *Thalassoica antarctica* (adultos).
Malzof y Quintana (2008). **Peces:** *Electrona antarctica*, *Gymnoscopelus nicholsi*, *Pagetopsis* sp., *Pleurogramma antarcticum*, *Protomyctophum choriodon*, *Protomyctophum tenisoni*, *Trematomus* sp. **Otros:** Aves (adultos y pichones). Huevos. Invertebrados. Vegetales.
Montalti et al. (2009). **Peces:** *Chaenocephalus aceratus*, *Electrona antarctica*, *Electrona carlbergi*, *Gymnoscopelus braueri*, *Krefftichthys anderssoni*, *Pleurogramma antarcticum*, *Protomyctophum normani*, *Protomyctophum tenisoni*.

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Península Potter, Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, Isla Media Luna.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.

Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, diciembre de 1989, nidos.
Aguirre (1995). Península antártica. Nido.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
Soave et al. (2000). Península antártica. Nido.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Quintana y Travaini (2000). Península antártica. Nido.
Quintana et al. (2000). Península antártica. Nido.
Favero et al. (2000). Península antártica. Nido.
Quintana et al. (2001). Península antártica. Nido.
Montalti y Soave (2002). Península antártica. Nido.
Coria et al. (2011). Península antártica, Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1994-95, nidificando.
Montalti en De la Peña (2016c). Isla 25 de Mayo, Península Potter, 12-12-1997, nido con un huevo.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas
Montalti en De la Peña (2016c): 65,3 x 48,7

PICHONES
Olrog (1958a). Potter, Isla 25 de Mayo, 20-01-1953, nidos con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda con mancha blanca en las alas.
Se parece al Escúa común pero es menor, ocrácea en el cuello y más pálida ventralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius maccormicki H. Saunders, 1893 nidifica en el continente Antártico e islas adyacentes, Tierra de Graham, Shetland, Georgia y Orcadas del Sur. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el continente antártico e islas adyacentes, Tierra de Graham y Shetland del Sur. Fuera de la época de cría es predominantemente pelágica.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Costa patagónioca
Citas: Orgeira (1997a)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a)

Península Antártica
Citas: Malzof y Quintana (2008); Montalti et al. (1994); Montalti y Soave (2002); Orgeira (1997a, 1997c)

Shetland el Sur
Citas: Coria y Montalti (1993b); García Esponda et al. (2000); Montalti y Coria (1993); Montalti et al. (2009); Olrog (1958a); Orgeira (1997a)

ESCÚA ANTÁRTICA *Stercorarius antarcticus* (Lesson, 1831)

Otros nombres: Escúa parda. Gaviota antártica. Gaviota de las Malvinas. Gaviota parda de las Malvinas. Skúa antártico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 52-64 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 1 (?) 1575 g

Coloración. Pardo oscuro uniforme. Iris pardo oscuro.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Schulz y Gales (2004). **Aves:** *Aptenodytes patagonicus* (pichones y adultos), *Pachyptila* sp., *Pterodroma lessonii, Pygoscelis papua*. **Mamíferos:** *Arctocephalus forsteri, Australophocaena dioptrica, Mirounga leonina, Mus musculus, Orytologus cuniculus, Rattus rattus.* **Crustáceos:** (*Lepas* sp.). (*Lithodes murrayi*). **Moluscos:** (*Plaxiphora aurata*).
Malzof y Quintana (2008). **Peces**: *Electrona antarctica, Gymnoscopelus nicholsi, Pagetopsis* sp., *Pleurogramma antarcticum, Protomyctophum choriodon, Protomyctophum tenisoni, Trematomus* sp. **Aves:** (adultos y pichones) Huevos. **Otros:** invertebrados. Vegetales.

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Península Potter, Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, Isla Media Luna, Península Antártica.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales. En el suelo arenoso o entre piedras.

Bennett (1920). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Daciuk (1983c). Nidifica en Malvinas.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, diciembre de 1989, nidos.
Aguirre (1995). Islas del Atlántico Sur. Nido.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Quintana y Travaini (2000). Península antártica.Nido.
Quintana et al. (2000). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Soave et al. (2000). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Quintana et al. (2001). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Montalti y Soave (2002). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1994-95, nidificando.
Clarke et al. (2012). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Canevari en Salvador (2016a). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Straneck en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Montalti en De la Peña (2016c). Isla 25 de Mayo, Península Potter, 12-12-1997, nido con un huevo.
Torres et al. (2019a). Bahía Esperanza, Península Antártica. Temporada 2017-2018, 28 nidos; temporada 2018-2019, 29 nidos.

Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida. Diciembre 2007. Foto Diego Montalti

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas
Montalti en De la Peña (2016c): 65,3 x 48,7

PICHONES
Olrog (1958a). Potter, Isla 25 de Mayo, 20-01-1953, nidos con pichones.

Más información:
Yorio (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Difícil de diferenciar en el campo de otros Escúas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius antarcticus antarcticus (Lesson, 1831) nidifica en las islas Malvinas. En invierno se desplaza hasta la costa de Buenos Aires y *Stercorarius antarcticus lonnbergi* (Mathews, 1912) nidifica en el norte de la península Antártica, islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, e islas subantárticas de los océanos Pacífico e Indico.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Nidifica en las Malvinas y en el norte de la península Antártica, islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, e islas subantárticas de los océanos Pacífico e Indico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Stercorarius antarcticus antarcticus (Lesson, 1831)

Buenos Aires
Citas: Daguerre (1922); Pagano et al. (2012)

Chubut
Citas: Daciuk (1975, 1977c); Harris (2008); Olrog (1972a); Sainz-Trápaga (2014)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Daciuk (1977c); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Harris (2008); Imberti (2005e); Nasca et al. (2004); Yorio (2005)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920); Dacuik (1983c); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Costa patagónica
Citas: Orgeira (1997a)

Orcadas del Sur
Citas: Orgeira (1997a)

Shetland del Sur
Citas: Bennett (1920); Orgeira (1997a)

Islas subantárticas
Citas: Bennett (1920); Montalti y Soave (2002); Orgeira (1997a)

Mares
Ciras: Savigny (2002c); Seco Pon et al. (2017)

Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)

Península Antártica
Citas: Coria y Montalti (1993b); Malzof y Quintana (2008); Massoia y Navas (1993); Montalti et al. (1994); Montalti y Coria (1993); Novati (1978); Olrog (1958a); Torres et al. (2019a)

Orcadas de Sur
Citas: Castellanos (1927); Coria et al. (2011); Montalti y Coria (1993)

Georgia del Sur
Citas: Carcelles (1931); Prince y Croxall (1996)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); García Esponda et al. (2000); Montalti y Coria (1993); Olrog (1958a)

SALTEADOR GRANDE *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)

Otros nombres: Gaviota de rapiña pomarina. Gaviota pomarina. Págalo pomarino. Salteador pomarino.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-56 cm.

Coloración. Pico pardo con punta negra. Patas negras. Iris pardo oscuro.
Morfo claro. Superior de la cabeza negro. Lados de la misma y semicollar en los lados y en posterior del cuello amarillentos. Dorsal parda. Garganta, cuello anterior y abdomen blancos. Pecho manchado de pardo. Flancos y subcaudales barrados o manchados de pardo. Alas pardas con blanquecino en la base de las primarias.
Cola parda, larga, con forma de cuña y con las plumas centrales alargadas retorcidas.
Morfo oscuro. Las partes ventrales son oscuras como las dorsales.

HÁBITAT
Mares, costas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Plumas alargadas en la cola. Amarillento en el cuello. Capucho negro.
Se parece al Salteador chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) migratorio del Ártico. Llega a la costa argentina, Antártida, Shetland del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico en Norte América, Europa y Asia. Fuera de la época de reproducción es estrictamente pelágico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Río Negro
Citas: Povedano (2016); Rodríguez Astorino et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008)

Antartida
Citas: Massoia y Navas (1993); Sladen (1954); Watson (1975)

Mares
Citas: Brown et al. (1975); Seco Pon (2015)

SALTEADOR CHICO *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Gaviota de rapiña. Págalo parasito. Salteador común.

DESCRIPCIÓN
Largo: 41-46 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (?) 342 g

Coloración. Pico corneo claro. Patas negras o gris oscuras. Iris pardo oscuro.
Morfo claro. Superior de la cabeza, cuello dorsal, dorso y cola pardos oscuros. Lados de la cabeza y cuello amarillentos. Ventral blanca con una banda parda en el pecho. Abdomen y subcaudales pardos.
Alas pardas con base de las primarias blancas. Cola con forma de cuña, larga y con las dos plumas centrales largas, terminadas en punta.
Morfo oscuro. Dorsal parda. Cuello y partes ventrales pardas más pálidas.
Juveniles. Los juveniles de esta especie y los de *Stercorarius pomarinus* son barrados de pardo ventralmente y carentes de plumas alargadas en la cola.
En los adultos en época de muda o por rotura, las plumas alargadas de la cola pueden estar ausentes. Por este motivo y por la semejanza entre los juveniles, es difícil la diferenciación de estos estados en el campo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces.

HÁBITAT
Costas marinas, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral blanca. Collar pectoral pardo. Amarillento en el cuello. Plumas alargadas en la cola.

Diferenciarlo del Salteador grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego. También en Córdoba e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en la tundra Ártica de América, Europa y Asia. Fuera de la época reproductiva es casi exclusivamente pelágico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Grant (1911); Gibson (1920); Isacch y Chiurla (1997); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1958a); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926b)

Chubut
Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Navas (1994); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Michelutti y Torres (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Savigny (2002d)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Mares
Citas: Orgeira (1995b, 2001a); Savigny (2002c)

SALTEADOR COLUDO *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819

Otros nombres: Gaviota de cola larga. Gaviota de rapiña de cola larga. Págalo rabero. Salteador de cola larga.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-58 cm.

Coloración. Pico pardo con punta negra. Patas grises. Iris pardo oscuro.
Parte superior de la cabeza negra. Dorsal parda grisácea. Lados de la cabeza y cuello amarillentos. Ventral blanca, más oscura en los flancos.
Primarias negras, cubiertas pardas. Cola parda con dos plumas alargadas terminadas en punta.
Juvenil. Dorsal parda grisácea. Ventral blanca, poco jaspeada en el pecho.
Sin plumas alargadas en la cola.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Humphrey et al. (1970). Peces.

HÁBITAT
Costas marinas y mares.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Plumas muy alargadas en la cola. Alas con las primarias negras y sin mancha blanca.
Diferenciarlo del Salteador chico y del Salteador grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819 migratorio del Ártico. Llega a la costa argentina. *Stercorarius longicaudus pallescens* Loppenthin, 1932 migratorio del Ártico. Llega a mares argentinos. Accidental en Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en la tundra Ártica circumpolar. Fuera de la temporada reproductiva es casi exclusivamente pelágico

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1929); Jaramillo (2000); Murphy (1936); Olrog (1958a); Pereura (1938b); Prince y Croxall (1996); Wetmore (1926)

Mares
Citas: Brown et al. (1975)

Islas Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

Georgias del Sur
Citas: Naveen (1989)

Stercorarius longicaudus pallescens Loppenthin, 1932

D.G. Migratorio del Ártico. Llega a mares argentinos.

GAVIOTAS Y GAVIOTINES

FAMILIA: LARIDAE

Aves acuáticas, palmípedas. Las alas son largas y estrechas. Buenas voladoras.
Nidifican en colonias de una sola especie o de varias. En rocas, matas de vegetación, dunas.
Emplean en la construcción del nido materiales vegetales, pastos, juncos, tallos, palitos, algas, plumas
Apoyados en embalsados, en el suelo o sostenidos entre juncos, o arbustos emergentes. Expuesto. Elaborado.
Los gaviotines hacen simples excavaciones en el suelo arenoso y en planas marinas entre piedras.

La postura es de 2 a 4 huevos. Período de incubación varía de 29 a 31 días.
Ambos sexos incuban y alimentan a los pichones. Los pichones son nidícolas y nacen cubiertos de plumón.
Los juveniles tienen diferente color al de los adultos.
Se alimentan de peces, insectos, pichones de otras aves, desperdicios.
Frecuentan costas del mar, laguna, ríos, esteros y algunas especies campos.

Subfamilia: Larinae

GAVIOTA ANDINA *Chroicocephalus serranus* (Tschudi, 1844)

DESCRIPCIÓN
Largo: 44-48 cm.

Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo.
Cabeza negra, con semicírculo blanco detrás de los ojos. Dorsal y cubiertas alares grises. Las tres primeras primarias negras, con franja a lo largo del ráquis y una banda subapical blanca. Puntas negras. Las internas blancas grisáceas con ancha punta negra. Secundarias grises. Cuello, ventral del cuerpo y la cola blancos con matices rosados en el pecho.
En invierno presenta la cabeza jaspeada de gris. Mancha grisácea alrededor de los ojos.
Juvenil. Pico y patas pardos.
Cabeza, cuello y dorsal blanquecinos moteados de pardo. Secundarias pardas. Cola con franja subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Sosa (1999). Huevos de *Phoenicopterus chilensis*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Carroña**: Camélidos: (*Vicugna vicugna*).

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Emite un agudo y áspero Kiihe..kiihe..kiihi..

HÁBITAT
Lagunas, ríos, entre los 3500 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Tazón de juncos, palitos y pajitas. Internamente plumas.

Vides Almonacid (1990). Salta. Nido.
Eguia, P. (2015). Laguna de Vilama, Jujuy, 02-12-2015, nido y pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 20/05/2019.
Uranga en De la Peña (2016c). Puesto del Marquez, dpto. Cochinoca, Jujuy, 17-02-2013, nido en un albardón en medio de una pequeña laguna, 2 huevos. Fiambalá, dpto. Tinogasta, Catamarca, 21-01-2015, nido con un huevo y un pichón.
Espíndola, A. (2016). Laguna Blanca, Catamarca, 23-11-2016, nido con un huevo. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 20/05/2019.

Puesto del Marquez. Jujuy. 17-02-2013 Foto: Máximo Uranga

Huevos
Pone de 2 a 3 huevos de base verde oliva con pintas y manchas negras y grises concentdas en el polo mayor.

Pichones
Uranga en De la Peña (2016c). Pichón de 7-10 días, plumón blanco con manchitas negras.

Más información:
Goodall et al. (1951)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza negra. En invierno se parece a la Gaviota capucho café, pero tiene la punta de las alas negras y anillo ocular blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chroicocephalus serranus (Tschudi, 1844) entre los 3500 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Neuquén. Observada en Santa Cruz.
En invierno baja a menor altura.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Lagos andinos en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y oeste de Argentina. En la parte norte de su distribución nidifica en el Altiplano a más de 4.000 metros mientras que en el sur a menos de 2.000. Estas últimas migran en invierno hacia el norte.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: Uranga en De la Peña (2016b). Fiambalá, dpto. Tinogasta, Catamarca, 21-01-2015.

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Mamaní et al. (2018); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 04-02-1977; 10-02-1983)

La Pampa
Citas: Bianchini y Arenas (2013a)

La Rioja
Citas: de La Fuente (2002)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1985); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1985); Nores e Yzurieta (1982b); Olivera et al. (2009); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Bianchini y Arenas (2013a); Chebez et al. (1993); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Matarasso (2007); Pérez et al. (2006); Veiga et al. (2005)

Rio Negro
Citas: Bianchini y Arenas (2013a); Povedano (2016)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain (2008b, 2013h); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1997); Nores e Yzurieta (1981); Ortiz et al. (2016); Zucchino en Nores y Yzurieta (1981)

Santa Cruz
Citas: Roesler et al. (2014)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b, 2020); Echevarría et al. (2008c, 2014); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ *Chroicocephalus maculipennis* (Lichtenstein, 1823)

Otros Nombres: Atí. Caleu caleu. Caulle. Chille. Gaviota. Gaviota blanca. Gaviota capucho negro. Gaviota común. Gaviota de cabeza negra. Gaviota de cabeza parda. Gaviota de capucho. Gaviota de capucho negro. Gaviota de capucho pardo. Gaviotina. Nataquec.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-43 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 305 g
Reynold en Humphrey et al. (1970): N= 2 (H) 396,8 y 453,0 g

Camperi (1992c): N= 2 (M) 400 y 300 g; N= 1 (H) 325 g; N= 5 (H) 300 g cada una.
Salvador (2014a): N=6 (M) X= 312,3 g (Rango 288 a 339); N=5 (H) X= 313,6 g (Rango 297 a 332)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 315 g, N= 2 (H) 362 y 380 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 280 g; N=1 (?) juvenil 310 g

Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo.
Cabeza y garganta pardas oscuras. Semianillo ocular blanco. Dorso y cubiertas alares grises. Cuello, rabadilla, cola y ventral blancos.
Primeras primarias blancas y negras con puntas blancas; las más internas grises. Las dos primeras con ancha banda subterminal blanca. Secundarias grises.
Ventralmente las alas son grises con las primarias oscuras y una mancha subterminal blanca.
En invierno el capuchón es blanco con una manchita parda en anterior de los ojos y otra en la región auricular.
Juvenil. Manchado de pardo en el dorso y en las cubiertas alares. Banda subterminal parda en la cola.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Se la ve detrás de los arados, en tierras recién roturadas.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae) (Scarabaeidae) (Torito) (*Diloboderus*) (*Gromphas lacordairei*) *Phanaeus splendidulus*). Dinastino (*Dyscinetus gagates*). Lepidóptero (*Colias*). Hemíptero. **Arácnidos:** Escorpiones.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros. Hemíptero (*Blastomidae*). Homoptera (*Tettigonia*). Ortópteros (Acridium) (*Schistocerca paranensis*). **Moluscos. Crustáceos:** Langostinos. **Peces:** Anablepidae: (*Jenynsia multidentata*, Characidae: mojarras).
Escalante (1970). Crustáceos. Gusanos. Insectos. Larvas. **Peces:** (Anablepidae: *Jenynsia multidentata*, Characidae: mojarras)
Carman (1987c). Hormigas voladoras (*Pheidole* sp.)
Lizurume et al (1995). Invertebrados marinos. Pelos. Piedritas. Staphylinidae (*Staphylinus fuscicornis*). Huesos. Insectos.
Savigny (2002c). Descartes.
Ghys y Favero (2004). **Insectos:** Cantharidae. Carabidae (*Pelmatellus* sp., *Scarites anthracinus, Paranortes cordicollis*) (*Metius gilvipes, Metius circumfusus, Calosoma retusum*) (*Notaphus brullei, Incagonum lineapunctatum, Laxandrus* sp.) *Trirammatus chalceus, Trirammatus striatulus*) (*Polpochila flavipes, Argutoridius chilensis*) *Argutoridius bonariensis, Argutoridius* sp.). Coleópteros (Scarabaeidae, *Cyclocephala signaticollis*) (larva) (Scarabaeidae, *Philocloenia bonaerensis*) (larva) (Scarabaeidae, *Heterogomphus* sp.) (larva) (Scarabaeidae, *Lygirus* sp., *Dycinetus* sp.,*Aphodinus* sp.). Curculionidae (*Pantomorus* sp.). Chilopoda (Scolopendridae, *Scolopendra* sp.). Elateridae. Hemípteros (Belostomatidae, *Belostoma* sp.). Hymenópteros (Formicidae). Lepidópteros. Ortópteros (Acrididae, Tettigonidae). Tenebrionidae Thysanopteros. **Crustáceos:** Malacostraca (Isopoda). **Anélidos:** Oligochaeta.
Cuello et al. (2005). **Anfibios:** Rana acuática de Laguna Blanca (*Atelognathus patagonicus*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales**: Semillas de *Arachis ypogaea, Glycine max, Helianthus annus, Zea mays,* No determinadas. **Anélidos:** Oligoquetos: (lombrices de tierra). **Insectos:** Coleoptera (Scarabaeidae: adultos y larvas, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Hemiptera (Belostomatidae, Pentotamidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Gryllotalpidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Moluscos:** (Ampullariidae: *Ampullaria canaliculata,* Planorbidae: *Biomphalaria* sp.).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Insectos. Desperdicios, en basurales (carne, pan). Gusanos (en tierra arada).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** (*Odontesthes bonariensis*)
Salvador (2013e). Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Meyer, P. M. (2015). **Peces:** Berberecho austral (*Donax hanleyanus*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Carreyra, E. (2015). **Peces:** Dientudo (*Oligosarcus jenynsii*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Presas, J. (2015). **Peces:** Sábalo (*Prochilodus lineatus*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Cuando está alarmada, su voz es un agudo y nasal Kleerrrrrh..kierrhh..

HÁBITAT
Lagunas, esteros, praderas, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Nidifica en colonias en juncales o islotes.
Apoyados en embalsados, en el suelo o sostenidos entre juncos, o arbustos emergentes.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos o de palitos. Internamente tallos de yuyos o pajas.

Hudson (1871a). Buenos Aires. Nido.
Durnford (1877a, 1878b). Chubut. Nido.
Holland (1890). Estancia El Espartillar, pdo. General Paz, Buenos Aires, nido parasitado por *Heteronetta atricapilla*.
Hartert y Venturi (1909). Cerca de Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca, Buenos Aires, noviembre de 1896, nidos.
Wilson (1923a). Santa Fe. Nido.
Gibson (1920). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 18-11-1920, huevos.
Smyth (1927). Entre Ríos. Nido.
Smyth (1928). Buenos Aires. Nido.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Pereyra (1937b). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1938b). Colonia en General Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, con huevos y con pichones.
Gavio (1944). Buenos Aires. Nido.
Mac Donagh (1944). Buenos Aires. Nido.
Weller (1967). Buenos Aires. Nido.
Narosky (1969a). Azul, pdo. Azul, Buenos Aires, noviembre de 1968, colonia con huevos.
Zuberbühler (1971). Provincia de Buenos Aires. Nidos con huevos.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, dos nidos con huevos.
Burger (1974). Buenos Aires. Nido.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Darrieu et al. (1989). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. En diciembre de 1983, 21 nidos, formando parte de la colonia de *Plegadis chihi*.
Lizurume et al. (1995). Trelew, dpto. Rawson, Chubut, 1992 y 1993, colonias de nidificación. Huevos en octubre, pichones en noviembre.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Vilches y Berasain (1998). Laguna Lacombe, pdo. Chascomús, Buenos Aires, colonia con nidos en octubre de 1997.
González et al. (1998). Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Petracci y Basanta (2002). Laguna Los Patos, pdo. Berisso, Buenos Aires, 27-11-1999, colonia con 10 nidos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifican en el sector oeste de la reserva, en colonias.
Lyon y Eadie (2013). Gral Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, 1993-1997, nido parasitado por *Heteronetta atricapilla*.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Petrelli et al. (2009). Buenos Aires. Nido.

Josens et al. (2009). Buenos Aires. Nido.
Gelain (2012b). Río Negro. Nido.
COA Roca Ñacurutú en eBird (2015c). Río Negro. Nido
De la Peña (2013c). Azul, pdo. Azul, Buenos Aires, 11-12-1972, huevos y pichones; Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, huevos; Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 22-12-1981, huevos y pichones (2 nidos estaban parasitados por *Heteronetta atricapilla*); Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 04-12-1991, colonia con unos 350-400 nidos, con huevos y con pichones. Un nido tenía un huevo de *Heteronetta atricapilla* y un huevo estaba depositado en un nido de *Fulica leucoptera*, Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 07-11-1994, huevos.
En general nidos sobre el agua, construidos con juncos, en la parte interna pajitas. Los nidos de Melincué, estaban construidos únicamente con palitos secos, de 5 a 10 cm. de largos.
Medidas de 5 nidos: diámetro total: de 26 a 30 cm, diámetro interno: de 12 a 16 cm, profundidad: de 3 a 5,5 cm y alto: 14 a 15 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle y Daireaux, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 21 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Moroni y Salvador (2016). Punta Banderas, Estancia La Soledad, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz. Nidos entre 2013 y 2015.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 730 nidos en noviembre y diciembre, en matas de *Typha* sp., postura de 2 a 5 huevos (el 70% de los nidos contenían 3 huevos).
Uranga en De la Peña (2016c). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, colonia con unos 70 nidos y 15 nidos de *Sterna trudeaui* y un nido de *Chroicocephalus cirrocephalus* en construcción, en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná.
Bull en WFVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Sin datos, ANWC, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Canevari en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Sin datos, ANWC, en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Beck en WFVZ, en Salvador (2016a). Islas Malvinas. Nido.
Pemberton en WFVZ, en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Pemberton en MVZ, en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos

Pone 3, a veces 4 o 5 huevos. Ovoidales. De color pardo verdoso o verde oliváceos, con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos presentan líneas y otros tienen las manchas más concentradas hacia el polo mayor.

Medidas

Gibson (1920): 50,0 a 52,0 x 36,0 a 38,0		
Pereyra (1938b): 43,0 a 51,0 x 35,0 a 37,0		
Narosky (1969a): 44 a 58,2 x 33,4 a 38,5	X= 50,5 x 36,5	(N= 10)
Darrieu et al. (1989): 50,7 a 52,2 x 35,4 a 35,9	X= 51,4 x 35,6	(N= 2)
Lizurume et al. (1995):	X= 51,5 x 36,2	(N= 54)
De la Peña (2013c): 47,8 a 54,6 x 34,5 a 38,8	X= 51,3 x 36,2	(N= 14)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 48,3 a 58,1 x 34,9 a 36,9	X= 52,1 x 36,1	(N= 41)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 31,5 a 42	X= 35,4	(N= 36)

De la Peña (2013c): cáscaras 1,569 a 2,478 X= 1,988 (N= 14)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Dorsalmente ocráceo amarillento con manchas y estrías oscuras. Ventral blanquecino.

Generalidades

Lizurume et al. (1995). Período de incubación, 23 días.

Depredadores

De adultos: Mamíferos: Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) en Buenos Aires, Canepuccia et al. (2007)
Aves: *Caracara plancus* en Santa Fe, Burger (1974a)
De pichones: *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)
De huevos: *Caracara plancus* en Santa Fe, Burger (1974a), *Milvago chimango* en Córdoba, Salvador (2016b)

Más información:
Lizurume et al. (1995)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Capucho pardo. En invierno se parece a la Gaviota de capucho gris.

Morteros. Córdoba. 22-12-1981
Parasitado por *Heteronetta atricapilla*

Arias. Córdoba. 04-12-1991

Arias. Córdoba. 04-12-1991

Azul. Buenos Aires. 11-12-1972

Esperanza. Santa Fe. 27-11-2006

Morteros. Córdoba. 22-12-1981
Parasitado por *Heteronetta atricapilla*

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein, 1823) desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Observada en Georgias del Sur.
En invierno se desplaza al norte hasta Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípioca. Nidifica en el sur de Sud América hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas, Georgias del Sur. Se distribuye por Chile, Uruguay y costa del extremo sur Brasi. En invierno migra a provincias norteñas de Argentina y costas del norte de Chile y centro de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Canepuccia et al. (2007); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880b, 1920); Ghys y Favero (2004); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y leveau (2004b); Lucero (1982); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Straneck (1990b); Suárez et al. (2014);Weller (1967a); White (1882); Zapata (1965, 1998); Zuberbhüler (1971)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Gatto et al. (2005); Hecker y Vidoz (1998); Lizurume et al. (1995); Pagnoni (2012b); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 02-02-1976)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Nores y Cerana (2010); Salvador (1983a, 2013e, 2016b); Salvador et al. (2017); De la Peña en De la Peña y Salvador (2010); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999, 2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Darrieu et al. (1989); Ferrer et al. (2019); Reed (1914); Roig (1965); Sosa (1993b, 2005)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988, 2004); Daciuk (1968, 1983a); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Dacuik (1978c); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2011b, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González (1990, 1991); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina, 03-11-1979)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Gandini y Frere (1998b); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Murphy (1936); Scott y Sharpe (1910); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); Burger (1974a); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1923a, 1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Quiroga (2019a)

Observaciones: De la Peña (Argentina, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 30-01-1972)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Mares
Citas: Savigny (2002c)

Georgias del Sur
Citas: Delany et al. (1988)

GAVIOTA CAPUCHO GRIS *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Gabriela. Gaviota cenicienta. Gaviota de cabeza gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 38-46 cm
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 450 g (Rango: 440 a 460)

Coloración. Pico y patas rojos. Iris amarillo.
Cabeza y garganta grises. Cuello, rabadilla, cola y partes ventrales blancos. Dorso y cubiertas alares grises. Las dos primeras primarias negras con mancha blanca subterminal; en las tres siguientes la mancha es basal y se continúa en parte de las cubiertas. Resto de las primarias y de las secundarias gris.
En el período de reposo sexual presenta un capuchón gris y línea en la nuca.
Juvenil. Cabeza y dorsal blanquecinas moteadas de pardo. Alas pardas. Cola blanca con banda subterminal parda.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy gritona. Se la suele ver en tierras recién roturadas y en basurales.

Alimentación
Marelli (1919). Vegetales.
Pereyra (1923b). Larvas de escarabajos.
Aravena (1927). Coleópteros (*Aphodios*).
Zotta (1932). Crustáceos. Peces.
Silva et al. (2005). Carroña. Desperdicos (pesqueros).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Desperdicios, en basurales (carne, pan). Gusanos (en tierra arada).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** (*Odontesthes bonariensis*).

HÁBITAT
Lagunas, esteros, costas marinas, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Nidifica en colonias, en esteros o en islas.
En el suelo, en islote.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos de yuyos, pajas.

Holland (1893). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, se reúnen en grandes cantidades para nidificar.
Pereyra (1938b). Povincia de Buenos Aires, nidifica en colonias.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, colonia con huevos y pichones.
Los nidos estaban construidos sobre el suelo o entre una cubierta de tréboles o también bajo la protección de gruesas ramas secas, caídas, de Quinoa (*Chenopodium* sp.).
El nido tiene forma de cráter chato, de 25 cm de diámetro exterior promedio, por 16 de diámetro interior y 4 cm de profundidad. Hechos con tallos y gramíneas secos.
Petrelli et al. (2009). Buenos Aires. Nido.
Josens et al. (2009). Buenos Aires. Nido.
De la Peña (2013c). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, colonia con unos 1.200 nidos, en una isla. Un nido construido con palitos finos y pajas gruesas. Huevos y pichones.
Los nidos están próximos unos de otros. Medidas: diámetro total: de 20 a 24 cm y profundidad: 1 a 3 cm.
Uranga en De la Peña (2013c). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, nido en construcción en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná. Había además una colonia con unos 70 nidos de *Chroicocephalus maculipennis* y 15 nidos de *Sterna trudeaui*.
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c). Dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos en diciembre en el medio de una colonia de *Chroicocephalus maculipennis*, en matas de *Typha* sp., con 2, 3 y 3 huevos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color ocre verdoso con pintas y manchitas grises y castañas, distribuidas por toda la superficie. En algunos más concentradas hacia el polo obtuso formando corona y otros presentan líneas.
No existe uniformidad en el color de base y algunos carecen de manchas.

Medidas

Pereyra (1938b): 55,0 a 57,0 x 40,0

Narosky e Yzurieta (1973b): 51,2 a 56,2 x 37,2 a 40 X= 54,3 x 38,9
De la Peña (2013c): 51,8 a 55 x 39,5 a 40,5 X= 53,3 x 39,8 (N= 6)
Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 51,7 a 55,8 x 35,3 a 36,8 X= 54,51 x 35,92 (N= 8)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2016c): 35,0 a 40,5 X= 38,6 (N= 8)
Narosky e Yzurieta (1973b): 30 a 40
De la Peña (2013c): cáscaras 2,530 a 2,719 X= 2,531 (N= 6)

PICHONES

Descripción

Narosky e Yzurieta (1973b). Pico y patas liláceos. Iris pardo.
De la Peña (2013c). Dorsal crema amarillenta con manchas pardas. Ventral blanquecino.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cabeza gris. En el período de reposo sexual y los juveniles se parecen a los de la Gaviota de capucho café.

Esperanza. Santa Fe. 21-08-2011

Esperanza. Santa Fe. 25-09-2011

Esperanza. Santa Fe. 28-08-2011

Esperanza. Santa Fe. 29-06-2008

Melincué. Santa Fe. 25-10-1974

Esperanza. Santa Fe. 27-11-2006

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818) en el norte del país, sur de Misiones, hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Observada además en el oeste de Río Negro y en Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Esta especie se encuentra en África y en Sud América presentando a su vez 2 poblaciones separadas una en costas de Ecuador y Perú y otra en Argentina, Uruguay y extremo sur Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Straneck (1990c); Zapata (1998)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes

Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Gorleri y Di Giacomo (2002)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933, 1939); Zotta (1932)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Tejerina et al. (2006)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Daneri (1959); Darrieu et al. (2008); Scott y Sharpe (1910)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Gastaudo et al. (2019); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Narosky e Yzurieta (1973b); Pautasso (2002b); Wilson (1923, 1926)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguax (1925); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 03-12-1977)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTA GRIS *Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823)

Otros nombres: Gaviota austral. Gaviota cenicienta. Gaviota del sur. Gaviota de pico rojo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-46 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 621 g; N= 1 (?) 621 g
Yorio et al. (1996): N= 42 (?) X= 524 g

Coloración. Pico y patas rojos. Iris gris claro.
Cabeza, cuello y ventral, grises. Dorsal y cubiertas alares negras.
Primarias y secundarias negras con punta blanca. Ventral de las alas gris. Cola blanca.
Juvenil. Pico pardo con la punta negruzca. Patas pardas.
Cabeza, cuello y superior del pecho pardos. Supracaudales, inferior del pecho y abdomen blancos.
Alas pardas oscuras. Cola blanca con franja subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en grupos. Carroñera. Se la ve en las colonias de pingüinos y de cormoranes.

Alimentación
Castellanos (1935). Materias fecales.

Devillers (1977). Materias fecales.
Milat (1987). **Moluscos:** Mejillones. **Otros:** Desperdicios.
Yorio et al. (1996). Huevos.
Albrieu et al. (2004). Aves (pichones) Huevos.
Suárez y Yorio (2005). Materias fecales. Regurgitados.
Gandini et al. (2008). **Peces:** *Engraulis anchoita, Gerypterus blacodes, Merluccius hubbsi, Patagonotothen cornucola, Patagonotothen ramsayi, Patagonotothen sima, Pinguipes brasileanus, Salilota australis, Sprattus fuegensis.* **Crustáceos:** Anfípodos *Balanus* sp. Cangrejos *Cyrtograpsus angutatus, Pleoticus muelleri.* Isópodos *Paralomis granulosa,* **Moluscos:** *Aulocomya atra atra, Loligo gabi, Mytilus edulis platenses, Octopus* sp., *Perumytilus purpuratus.* **Otros:** Algas (*Enteromorpha* sp., *Ulva* sp., *Ulothrix* sp., *Porfira* sp., *Coralinna* sp., *Gigartina* sp., *Ceramium* sp.), Fanerógamas (*Salicornia* sp.). Poliquetos (*Aphrodita* sp.).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Carroña (Pingüinos). Huevos.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Huevos.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Su voz es un agudo y áspero Chieh.chieh.chieh.chieh.

HÁBITAT
Costas e islas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Empleas pastos, algas y plumas.

Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Castellanos (1935). Isla Observatorio, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, pichones el 14-01-1934.
Olrog (1948). Cabo Peñas y Puerto de Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, colonias con nidos.
Olrog (1950). Tierra del Fuego. Nido.
Zapata (1965). Cabo Blanco, dpto. Deseado, Santa Cruz, 01-01-1965, 7 nidos.
Korschenewski (1969b). Chubut. Nido.
Humphrey et al. (1970). Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, nidos.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 15-11-1971, 6 nidos con un huevo cada uno.
Boswall (1973). Chubut. Nido.
Parmelee y Mc Donand (1975). Tierra del Fuego. Nido.
Parmelee et al. (1984). Tierra del Fuego. Nido.
Daciuk (1977a, 1977b). Chubut. Nido.
Daciuk (1977b). Santa Cruz. Nido.
Manriquez (1988). Chubut. Nido.
Schiavini y Yorio (1995). Tierra del Fuego. Nido.
Yorio et al. (1996). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1983-1987, nidos en noviembre-diciembre.
Woods y Woods (1997). Diciembre y enero, nidos en Malvinas.
Yorio et al. (1998a). Isla Cumbre, Isla Blanca, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Moreno, Isla Arce, Península Lanaud, Isla Buque, Islote Puente, Isla Este, Isla Gran Robledo, Isla Lobos, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Quintano, Isla Ceballos, Isla Vernaci Este, Isla Vernaci Oeste, Isla Viana Menor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998). Cabo Blanco, Isla Larga, Isla Pingüino, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.

Frere y Gandini (1998). Isla Leones, Isla de Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islas Becasses, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y marzo. Forma colonias laxas, con nidos dispersos.
Nidos semiesféricos, tapizado con algas, plumas, ramas delgadas y guano, apoyado sobre una plataforma de ramas más gruesas.
Suárez y Yorio (2005). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidos.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Otlaey et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Agulián, C. (2012h). Isla Pingüino, Santa Cruz, 13,11.2012, nido.
Masello et al. (2013). Islas Malvinas. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Chubut. Nido.

Huevos
Pone 3-4 huevos. Gris oliváceos con manchas y puntos pardos oscuros.

Medidas
Yorio et al. (1996): X= 60,9 x 42,3 (N= 136)

Peso
Yorio et al. (1996): X= 55,6 (N= 136)

Generalidades
Yorio et al. (1996). Período de incubación, 24-27 días.

Más información:
Yorio et al. (1996). Yorio et al. (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración gris en la cabeza y ventralmente. Negra en dorsal. Ventral de las alas gris. Pico y patas rojos.
El juvenil pardo con franja negra en la cola.

Península Valdés. Chubut. 16-11-2019
Foto: María Fernanda Gauna

Punta Tombo.Chubut. 05-11-1979

Puerto Deseado. Santa Cruz. 02-02-2016 Foto: Cynthia Arenas

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leucophaeus scoresbii (Traill, 1823) nidifica en las costas e islas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y las islas Malvinas. Observada en Georgias del Sur.

En otoño migra hacia Buenos Aires y Entre Ríos por el río Uruguay. Observada además en el norte de Córdoba y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípioca. Su distribución comprende las costas del extremo sur del continente en Chile, Argentina e Islas Malvinas y Georgias del Sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Olrog (1979b)

Córdoba

Citas: Michelutti y Torres (2006)

Chubut

Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Daciuk (1977b, 1977c); Gatto et al. (2005); Humphrey y Bridge (1970); Lucero (1982); Manriquez (1988); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1996, 1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 27-11-1973)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006)

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Paz, D. (1991b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Gould y Darwin (1838-1841); Humphrey y Bridge (1970); Murphy (1936); Oustalet (1891); Renard (1931); Sclater y Salvín (1871); Steullet y Deautier (1939); Yorio et al. (2005); Zapata (1965a, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950, 1958a); Pereyra (1950a); Schiavini et al. (1998)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 01-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Bourne y Curtis (1985,1986)

GAVIOTA GARUMA *Leucophaeus modestus* (Tshudi, 1843)

Otro nombre: Gaviota gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-46 cm.

Coloración. Pico y patas negros. Iris negro.
Gris plomizo más oscuro en las alas. Cabeza blanca. Secundarias con punta blanca.
Cola gris con franja negra
En invierno la cabeza es parda.
El **inmaduro** es pardo.

HÁBITAT
Costas marinas, ambientes desérticos en montañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucophaeus modestus (Tshudi, 1843) se reproduce en Perú y norte de Chile.
Observada en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el desierto de nitratos en em norte de Chile (Atacama). Llegando hasta Perú y Ecuador. Aparece en costas vecinas en esa época y en toda la costa de Sudamérica migrando fuera de la temporada reproductiva.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Salta
Citas: Carrillo (2015)

Islas Malvinas
Citas: Cawkell y Hamilton (1961); Olrog (1979b); Woods (2006)

GAVIOTA CHICA *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831)

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-38 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 233 g

Coloración.
Plumaje de reposo sexual.
Pico y patas pardos. Iris pardo.
Frente y anterior de la corona blancos. Resto de la corona pardo jaspeado de blanco.
Dorso y cubiertas alares grises. Garganta, cuello anterior y base posterior del mismo, rabadilla, cola y partes ventrales blancos. Secundarias y terciarias grises con puntas blancas. Las cinco primeras primarias negras con puntas blancas, las restantes grises con puntas blancas.
Plumaje nupcial. Pico rojo. Patas rojizas.
Cabeza negra. Resto del cuerpo igual al plumaje de reposo sexual.
Juvenil. Pico y patas pardos.
Frente blanca. Corona, lados de la cabeza, partes dorsales pardo grisáceo. Cola gris con ancha banda subterminal negra.

HÁBITAT
Lagunas, ríos y costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona negruzca con frente blanca y dorso gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucophaeus pipixcan (Wagler, 1831) migratoria de Norteamérica. Observada en Jujuy, Catamarca, Córdoba, Mendoza, oeste de Río Negro, Neuquén, costas de Chubut y de Santa Cruz. También en islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el interior del continente en Norteamérica. Migra durante el invierno boreal se hace muy marina apareciendo en las costas del Pacífico de Chile, Perú y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Devillier y Terschoren (1978)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores e Yzurieta (1980b); Nores (1996); Olrog (1979); Salvador y Di Giacomo (2014); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Canevari et al (1998); Darrieu et al (1985, 1999); Darrieu (2014); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Lucero y Chebez (2011); Martínez et al. (1985); Olivera et al. (2009, 2010); Olrog y Pescetti (1991); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Bianchini y Arenas (2013a); Chebez et al. (1993); Christie et al. (2004); Veiga et al. (2005); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i); Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2003, 2005e)

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Islas Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

Georgias del sur
Citas: Reid (1998)

Estrecho Magallanes
Citas: Olrog (1979b)

GAVIOTA PERUANA *Larus belcheri* Vigors, 1829

Otros nombres: Gaviota de Belcher. Gaviota de Simeón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 48-51 cm.

Coloración. Pico amarillo con franja negra y punta roja. Patas amarillas. Iris pardo.
En verano, cabeza, cuello, partes ventrales y rabadilla blancos. Dorsal y cubiertas alares negras. Primarias negras, secundarias grises con punta blanca.
Cola blanca con franja negra
En invierno la cabeza es negra pardusca.
El **inmaduro** es moteado de pardo. Primarias negras. Ventral blanquecina.
Pico amarillo con punta negra. Patas grisáceas.
Cola negra con punta blanca.

HÁBITAT
Costas marinas, lagos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Larus belcheri Vigors, 1829 observada posiblemente en Mendoza y en el lago Nahuel Huapi (Río Negro). Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Restringida a las costas de Perú y Chile. Se dispersa a Ecuador.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Chebez (2009); Sympson en Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTA CANGREJERA *Larus atlanticus* Olrog (1958)

Otros nombres: Gaviota cocinera de cola blanca y negra. Gaviota de cola negra. Gaviota de Olrog. Gaviota garuma. Gaviota gris. Gaviotón de cola blanca y negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 49-56 cm.

Peso: Devillers (1977): N= 2 (M) 900 y 960 g; N= 3 (H) X= 763 g (Rango: 750 a 790)
Camperi (1992c): N=3 (M) X= 1017 g (RA: 950 a 1100); N= 2 (H) 850 y 900 g

Coloración. Pico amarillo con una franja negra y punta roja. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Cabeza, cuello, partes ventrales y rabadilla blancos. Dorsal y cubiertas alares negras.
Primarias negras. Secundarias grises con puntas blancas.
Cola blanca con una ancha banda negra subterminal.
En invierno la cabeza es pardusca y los párpados blancos.
Juvenil. Pico amarillo con punta negra. Patas grisáceas.
Partes dorsales moteadas de pardo. Ventral blanquecina jaspeada de pardo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Olrog (1967a). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*), (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*).
Jehl y Rumboll (1976). Carnada (carne, langostinos).
Devillers (1977). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*)
Spivak y Sanchez (1992). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*). Peces. Aves.
Martínez e Isacch (1995). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*).
Carrete et al. (1996a). **Crustáceos:** Cangrejo (*Chasmagnathus granulata*), (*Balanus* sp.).
Carrete y Delhey (1997). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*). (*Balanus glandula*). Peces. Moluscos. Carnada (carne, langostinos).
Martínez et al. (2000). Aves. Insectos.
Copello y Favero (2001). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*).
Savigny (2002c). Descartes de *Loligo* sp.
Berón (2003). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Uca uruguayensis*), (*Chasmagnathus granulata*). Peces. Moluscos. Insectos.
Petracci et al. (2005). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*). Camarones. **Peces. Moluscos. Insectos:** (Himenópteros, Hemípteros, Ortópteros). **Vegetales:** Granos (maiz).
Silva Rodríguez et al. (2005). Peces. Moluscos. Insectos. Crustáceos.
Berón et al. (2005). Peces. Moluscos. Insectos. Desperdicios.
Seco Pon y Favero (2011). Descarte pesquero.
Castaing, G. (2016). **Moluscos:** Caracol negro (*Adelomelon brasiliana*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Fernández, H. B. (2016). **Crustáceos:** Cangrejo granuloso (*Neohelice granulata*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Martín, L. (2017). **Crustáceos:** Cangrejo granuloso (*Neohelice granulata*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Prina, A. (2019). **Crustáceos:** Cangrejo granuloso (*Neohelice granulata*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

Voces

Straneck en De la Peña (2016c). Emite un gutural Guchu..guouhh..guchu.. entre otras voces más agudas.

HÁBITAT

Costas marinas, estuarios, lagunas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Buenos Aires, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Construye el nido en general en zonas desprovistas de vegetación o muy baja, cerca del agua.
Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Empleas pastos y plumas.

Daguerre (1933). Banco Noreste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1932.
Olrog (1967a). Isla Arroyo Jabalí Oeste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1963.
Devillers (1977). Posiblemente en banco Nordeste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1975.
Yorio y Harris (1992). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Puestos, Isla Gama, Isla Arroyo Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Islas Vernaci, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18 de noviembre a 5 de diciembre de 1990, colonias de nidificación con huevos y con pichones.
Rábano et al. (1996). Isla Embudo, Bermejo, Trinidad, islote entre isla Colonia de los Riachos e isla Morro de Indio, noviembre de 1995, pdo. Villarino, Buenos Aires, colonias nidificantes.
Yorio et al. (1997). Isla Brightman, pdo. Villarino, Isla Puestos, isla Gama, isla Arroyo Jabalí. pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990, nidificando; Islas Trinidad, pdo. Villarino, 1995 nidificando; Isla Laguna, dpto. Florentino Ameghimo, Isla Felipe, dpto. Escalante, 1993-94, nidificando; Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-93-94, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Isla Trinidad, Islote Norte de Isla Morro de Indio, Isla Puestos, Islote Arroyo Jabalí Oeste, pdo. de Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islote Laguna, Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Delhey et al. (2001c). Isla del Puerto, pdo. Villarino, Buenos Aires, 21-10-1999, colonia con 1635 nidos.
Yorio et al. (2001c). Islote Arroyo Jabalí Oeste y Banco Nordeste, dpto. Patagones, Buenos Aires, colonias con nidos en octubre de 1998.
Rábano et al. (2002). Islote Canal Ancla, pdo. Villarino, Buenos Aires, 16-11-2001, colonia de nidificación.
La Sala et al. (2004). Buenos Aires. Nido.
Yorio et al. (2004). Chubut. Nido.
Herrera et al. (2005). Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, dpto. Escalante, Chubut, colonias de nidificación en 1994.
García Borboroglu y Yorio (2007). Buenos Aires. Nido.
Harris (2008). Chubut. Nido.
Petracci et al. (2008). estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, 26-12-2006, colonia con nidos.
Yorio et al. (2013). Isla del Puerto, 2004, 2007 y 2009, nidos; Islote Tres Brazas, 2007, nidos; Isla Golfada Chica, 2007 y 2009, nidos; Isla Luana, 2007 y 2009, nidos; Islote Canal Ancla, 2007, nidos; Isla Embudo, 2004, nidos; Islas Trinidad, (Islote Norte, 2007, nidos; Islote Rodondo, 1009, nidos); Isla Brightman, 2007, nidos; pdo. Villarino. Buenos Aires; Isla Gaviota, 2004, 2007 y 2009, nidos; Islote Arroyo Jabalí Oeste, 2004, 2007 y 2009, nidos; Banco Nordeste, 2004, 2007 y 2009, nidos, pdo. Patagones, Buenos Aires.
Yorio et al. (2013). Islas Laguna (Islote Luisoni, 2004, nidos); dpto. Florentino Ameghimo, Chubut. Islas Vernacci (Isla Vernacci Sudoeste, 2004, nidos; Isla Vernacci Oeste Noroeste, 2007 y 2009, nidos). Isla Felipe, 2007 y 2009, nidos; dpto. Escalante, Chubut.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color oliváceo con pintas y manchas pardas, castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
La Sala et al (2011): 69,0 a 73,3 x 48,0 a 49,1

Observaciones
La Sala et al. (2011). Período de incubación: 27 días

Depredadores
De pichones: *Larus dominicanus* en Buenos Aires, La Sala y Martorelli (2010)

Más información:
Yorio et al. (2005). Yorio et al. (2012). La Sala et al (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral y rabadilla blancas. Dorsal negra.
Se parece a la Gaviota cocinera, pero es más chica y tiene una franja negra en la cola y en el pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Larus atlanticus Olrog (1958) por la costa desde Buenos Aires a Santa Cruz. Se reproduce en islas e islotes del sur de Buenos Aires y en Chubut. Observada además en Córdoba, Santa Fe e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se reproduce en islas e islotes del ***s*** Argentina (costa de Buenos Aires y Chubut). En invierno se dispersa a costas de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y hacia el norte por la costa misma de la provincia de Buenos Aires, llegando a las de Uruguay y sur de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Berón (2003); Camperi (1992c); Casares (1939); Coconier (2005a); Daguerre (1933); Darrieu y Camperi (2001a); De Francesco (2005); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gasparri et al. (2018); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); La Sala et al. (2011, 2013); La Sala y Martorelli (2010); Narosky y Di Giacomo (1993); Olivera (2011); Olrog (1958a, 1967a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Petracci et al. (2007, 2008); Pugnali y Chamorro (2008); Rábano et al. (1996); Savigni y Favero (2005); Seco Pon y Favero (2011); Straneck (1990c); Suárez et al. (2008, 2014); Yorio y Harris (1992); Yorio et al. (1998c, 2001, 2012, 2013), Zapata (1998)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Herrera et al. (2005); Gatto et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1998a, 2005, 2012); Yorio y Harris (1992)

Córdoba
Citas: Nores (1996); Torres y Micheluti (2001a, 2005); Yzurieta (1995)

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); González (2005); Llanos et al. (2011); Masello y Quillfeldt (2005b); Paz (1991b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Imberti (2003, 2005e); Olrog (1948); Savigny et al. (2005)

Santa Fe
Citas: Luna y Manassero (2010)

Santa Cruz
Citas: Ferrari et al. (2005); Gelain y Tolosa (2011); Olrog (1948)

Tierra del Fuego
Citas: Savigny et al. (2005b)

Islas Malvinas
Citas: Alexander (1921); Woods (1998)

GAVIOTA COCINERA *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823

Otros nombres: Cole. Gaviota dominicana. Gaviota de espalda negra. Gaviota gigante. Gaviota mayor. Gaviotón.

DESCRIPCIÓN

Largo: 54-65 cm.
Peso: Zapata (1967): N=1 (M) 1070 g
Humphrey et al. (1970): N= 3 (M) X= 1223,3 g (Rango: 1130 a 1326)
Jehl (1974): N= 6 (M) X= 952 g (Rango: 850 a 1130); N= 8 (H) X= 865 g (Rango: 680 a 1040)
Contreras (1975): N= 1 (H) 1112 g
Camperi (1992c): N= 2 (M) 1100,0 y 900,0 g; N= 3 (H) 775,0, 750,0 y 800 g
Christie et al. (2004): N= 1 (H) 650 g
Salvador (2014a): N= 1 (M) 1021 g
Pagano y Salvador (2017): N=3 (H) 810, 900 y 920 g; N=1 (H) juvenil 740 g; N=1 (?) 1140 g

Coloración. Pico amarillo con una mancha roja en la punta de la mandíbula inferior. Patas amarillas verdosas. Iris blancuzco o amarillento.
Cabeza, cuello, partes ventrales, borde anterior de las alas, rabadilla y cola blancos. Dorsal del cuerpo y de las alas negras.
Primarias y secundarias negras con puntas blancas. La primera primaria tiene una mancha subterminal blanca.
Juvenil. Pico negruzco. Pardo jaspeado de ocráceo en las partes dorsales y ventrales. Rabadilla y supracaudales barradas de pardo y blanco. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Andan solitaria o en grupos. Muy bullanguera. A veces se la ve lejos de ambientes acuáticos.

Alimentación
Philippi et al. (1954). Aves (pichones). Cefalópodos. Desperdicios.
Orgeira (1995b). Carroña, peces.
Giaccardi et al. (1997). Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Bertellotti y Yorio (1998). Descartes (pesqueros). Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Bertellotti et al. (1998a). **Moluscos:** (*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*).
Silva et al. (2000). Algas. Anélidos. Cangrejos. Carroña. **Moluscos:** Caracoles (*Adelomedon* sp. (Mejillín, *Brachidontes rodriguezi*), (Mejillón, *Mytilus platensis*)
Yorio y Bertellotti (2002). Basura (nylon, papel, huesos). Aves (pichones). Carroña. **Crustáceos:** (*Leucippa pentagona*), (*Pilumnoides hassieri)*, (*Halicarcinus planatus*), (*Pachycheles chubutensis*), (*Balanus glandula*), (*Idotea baltica*), (*Libina spinosa*), (*Artemesia longinaris*), (*Pleoticus muelleri*), (*Peltarion spinosulum*), (*Lepidurus* sp.). Equinodermos. Huevos. Insectos. **Moluscos:** (*Aulacomya atra*), (*Perumytilus rodriguezi*), (*Brachidontes purpuratus*), (*Mytilus edulis*), (*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*). (*Diodora patagonica*), (*Lucapinella hanseli*), (*Trophon geversianus*), (*Epitonium georgetina*), (*Paraeuthria plumbea*), (*Nacella magellanica*), (*Tegula patagonica*), (*Olivela* sp.), (*Buccinanops globulosum*), (*Anachis isabellei*). Placóforos. **Poliquetos:** (*Eunica* sp., *Aphrodita* sp., *Nereis* sp.) **Vegetales. Peces:** *Engraulis anchoita, Genypterus* sp., *Merluccius hubbsi, Odontesthes* sp. *Paralichthys* sp., *Raneya fluminensis, Ribeiroclinus eigenmanni, Triathalassothia argentina.*
Bertellotti et al. (2003). **Crustáceos:** (*Balanus glandula*), (*Halicarcinus planatus*), (*Leucippa pentagona*). **Moluscos:** Gasterópodos: (*Olivella tehuelcha*), (*Paraeuthria plumbea*), (*Tegula patagonica*), (*Trophon*

geversianus). **Equinodermos. Insectos. Moluscos**: (*Perumytilus purpuratus*), (*Brachidontes rodriguezi*), (*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*), (*Mytilus edulis*), (*Aulacomya atra*), Peces. Poliquetos. Quitones (Poliplacóforos).
Giaccardi y Yorio (2004). Aguas servidas. Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Albrieu et al. (2004). Moluscos.
Petracci et al. (2004b). Aceitunas. Aves. Basura. **Crustáceos:** (*Balanus glandula*), (*Balanus amphitrite*), (*Libinia spinosa*), (*Artemesia longinaris*). Carroña. **Insectos:** (Trichoptera, Coleópteros, Ortópteros) (Hymenópteros, Lepidópteros, Dípteros). **Mamíferos:** (Muridae), (*Microcavia australis*). **Granos. Moluscos:** (*Crepidula* sp.) (*Heleobia australis*), (*Olivella* sp.), (*Corbula patagonica*), (*Tagelus plebeius*), (*Brachidontes rodriguezi*). **Vegetales. Peces:** *Cynoscion guatucupa, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Porichthys porosissimus.*
Silva et al. (2005). **Crustáceos:** Cangrejo (*Platyxanthus crenulatus*). Desperdicios. **Peces:** *Acanthistius brasilianus, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Mugil liza, Porichthys porosissimus, Raneya fluminensis, Trachurus lathami, Urophysis brasiliensis, Odontesthes argentinensis.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Carroña. **Peces:** (*Odontesthes bonariensis*).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Descartes (en frigoríficos). Desperdicios (pesqueros y en basurales). Huevos. Aves (pichones).
Frixione et al. (2012). **Insectos:** Coleoptera. **Desperdicios**. **Peces**: *Galaxias maculatus*, *Percichtys* sp., salmónidos (no ident.). **Crustáceos**: *Aegla abtao riolimayana*, *Samastacus spinifrons***. Aves:** pichones (no ident.). **Moluscos:** gasterópodos (*Pseudosuccinea columella*).
Bianchini (2014a). **Peces.**
Meyer, P. M. (2015 Meyer, P. M. (2018). **Mamíferos:** Lobo marino de un pelo (*Otaria flavescens*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Olejnik, N. (2016). **Mamíferos:** Franciscana (*Pontoporia blainvillei*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Earnshaw, A. (2017). **Crustáceos:** Langostino de los canales (*Munida subrugosa*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Meyer, P. M. (2017). **Mamíferos:** Ballena franca austral (*Eubalaena australis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Meyer, P. M. (2018). **Mamíferos:** Ballena franca austral (*Eubalaena australis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Meyer, P. M. (2018). **Mamíferos:** Lobo marino de un pelo (*Otaria flavescens*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). Emite varias voces, una muy común es un repetido Keeeehh.kieh.keeh.keeh.

HÁBITAT
Lagunas, ríos, costas marinas, lagos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Nidifica en colonias.
En el suelo, en playas marinas, islotes en lagunas o isla marinas.
Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Emplea algas, pastos, plumas.

Durnford (1878). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, diciembre de 1877, colonia, nidos con 2 o 3 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.

Gibson (1920). Buenos Aires. Nido.
Bennet (1920). Islas de Atlántico Sur. Nido.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 05-12-1923, huevos.
Reynold (1934). Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Nido.
Pereyra (1938b). Anida en colonias en bañados y cangrejales de la costa este de Buenos Aires.
Olrog (1958). Tierra del Fuego. Nido.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Zapata (1965). Cabo Blanco, 01-01-1965 y Fitz Roy, Punta de los Pájaros, 29-12-1964, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidos.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 20-10-1961, colonia con 30 nidos con huevos en la isla Quiroga y el día 28 en la isla Larga, otra colonia con 30 nidos.
Korschenewski (1969b). Chubut. Nido.
Humplrey et al. (1970). Tierra del Fuego. Nido.
Boswall y Prytherch (1972). Chubut. Nido.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, nidos.
Boswall (1973). Chubut. Nido.
Parmelee y Mc Donald (1975). Tierra del Fuego. Nido.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Los Flamencos, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, colonia el 31 de octubre.
Daciuk (1977a, 1977b). Chubut. Nido.
Daciuk (1977b). Santa Cruz. Nido.
Devillers (1977). Buenos Aires. Nido.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Malacalza (1987). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1981-1983, nido en octubre y noviembre.
Yorio y Harris (1992). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Puestos, Isla Gama, Isla Arroyo Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Islas Vernaci, dpto. Escalante, Chubut, 18 de noviembre a 5 de diciembre de 1990, colonias de nidificación con huevos y con pichones.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, noviembre de 1989 a enero de 1990, nidos.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1991, colonias con nidos.
Parmelee et al (1994). Tierra del Fuego. Nido.
Schiavini y Yorio (1995). Tierra del Fuego. Nido.
Yorio et al. (1995). Chubut. Nido.
Aguirre (1995). Islas de Atlántico Sur. Nido.
Coria et al. (1996). Península Antártica. Nido.
Yorio y Quintana (1997). Chubut. Nido.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Yorio y Harris (1997). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Gama, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990, colonia de nidificación.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
Yorio et al. (1998d). Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Nidos.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Quintana y Yorio (1998b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989-1990, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Islotes al oeste del canal del Embudo, Isla Trinidad, Islote Norte de Isla Morro de Indio, Isla Puestos, Banco Nordeste, Islote Arroyo Jabalí Este y Oeste, dptos. Villarino y Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
González et al. (1998). Isla Novaro, Islotes del Canal Escondido, Isla La Pastosa, Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, Islas de la Caleta, Isla Gaviota, Punta Delgada, Playa La Pastosa, Punta Pirámide, dpto. Biedma, Punta León, dpto. Rawson, Chubut, Punta Clara, Punta Gutiérrez, Cabo San José, Isla Acertada, Isla Cumbre, Islas Blancas, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Moreno, Isla Sola, Isla Aguilón del Norte, Isla Rasa, Península Lanaud, Isla Buque, Isla Pan de Azúcar, Islotes Arellano, Islotes Massa, Islas Laguna, Islote Galfráscoli, Islote Luisoni, Isla Patria, Islote frenta a la Isla Patria, Isla Blanca, Isla Tova, Isla Tovita, Isla Gaviota, Isla Este, Isla Sur, Islotes Goëland, Isla Gran Robredo, Isla Pequeño Robledo, Isla Lobos, Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Felipe, Islas Isabel, Isla Ceballo, Islas Vernaci, Islas Viana, Isla Quintano, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.

Gandini y Frere (1998). Monte Loayza, Cabo Blanco, Punta Guanaco, Isla Chaffers, Isla Larga, Isla Quiroga, Islote Burlotti, Isla de los Pájaros, Islote de Cañadón del Puerto, Isla del Rey, Isla Pingüino, Isla Schwarz, Isla Liebres, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Islote del Bajío, Isla Rasa Chica, Islote Sin Nombre, Banco Cormorán, Banco Justicia I y II, Isla Leones, Isla de Monte León, Isla Deseada, Cabo Vírgenes, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islote al norte de Lucas Este, Isla H, Isla Bridges, Isla Reynolds, Isla Leeloom, Isla Mary Ann, Isla Chata, Isla Conejo, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Quintana y Travaini (2000). Península Antártica. Nido.
Quintana et al. (2000). Península Antártica. Nido.
Favero et al. (2000). Península Antártica. Nido.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Soave et al. (2000). Islas de Atlántico Sur. Nido.
Bertellotti et al. (2001). Islote La Pastosa, Islote Redondo, dpto. San Antonio, Río Negro, Islote de los Pájaros, Islote Notable, Estancia San Lorenzo, Isla Primera, Playa La Pastosa, Punta Pirámide, Punta León, dpto. Rawson, Chubut.
Quintana et al. (2001). Península Antártica. Nido.
Delhey et al. (2001c). Isla del Puerto, pdo. Villarino, Buenos Aires, 21-10-1999, colonia de nidificación.
Bertellotti et al. (2001). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, colonia de nidificación.
Yorio y García Borboroglu (2002). Chubut. Nido.
Montalti y Soave (2002). Península Antártica. Nido.
Rábano et al. (2002). Islote Canal Ancla, pdo. Villarino, Buenos Aires, 16-11-2001, colonia de nidificación.
Petracci et al. (2004). Buenos Aires. Nido.
Christie et al. (2004). Huevos en diciembre en el noroeste patagónico.
Albrieu et al. (2004). Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz. Nidifica en el suelo o en matas. El número de parejas reproductoras fue estimado en 12.200.
Petracci et al. (2004a). Isla del Puerto, estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2003, colonia con nidos.
García Borboroglu y Yorio (2004a). Río Negro. Nido.
García Borboroglu y Yorio (2004a, 2004b). Chubut, Santa Cruz. Nidos.
Yorio et al. (2005a).Isla Puestos, Banco noreste de Isla del Jabalí, Isla Arroyo Jabalí Este, Isla Arroyo Jabalí Oeste, pdo de Patagones, Buenos Aires, (2000). Punta Tombo, Islote Puente, Islotes Arellanos, Islotes Massa, Islote Laguna, Islote Laguna, Islote Galfráscoli, Islote Luisoni, Isla Tovita, Isla Gaviota, Isla Este, Isla Sur, (2001). Isla Mayor, Isla Menor Oeste, Isla Menor Este, Isla Moreno, Isla Sola, Isla Leones, Península Lanaud, Isla Buque, (2002). Isla Norte, Isla Central, Isla Sur, Isla Ceballo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, Isla Ezquerra, Islas Vernaci, dpto. Escalante, Chubut, (2003), nidificando.
Mauco et al. (2007). Isla de la Ría San Clemente, San Clemente del Tuyú, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, colonia de nidificación el 03-09-2005.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Suárez et al. (2010). Islas Conejo y Bridges, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 2005, colonias con nidos.
Coria et al. (2011). Península Antártica. Nido.
Coria et al. (2011). isla Laurie, Orcadas del Sur, 1993-94 y 1994-95, nidificando.
Frixiore et al. (2012). Neuquén. Nido.
Clarke et al. (2012). Islas de Atlántico Sur. Nido.
Agulián, C. (2012). Isla Pingüino, dpto. Deseado, Santa Cruz, 13-11-2012, nido con 3 huevos. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, 2, 3 y 4 huevos; Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 27-11-1973, 2 y 3 huevos; Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, huevos y pichones; Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 04-11-1979, de uno a 3 huevos.
Medidas: diámetro total: de 18 a 25 cm, profundidad: 1 a 4 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 4 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Lisnizer et al. (2014). Chubut. Nido.
Svagelj et al. (2015). Chubut. Nido.
Motta et al. (2015). Neuquén.Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Neuquén.Nido.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18 y 19 de noviembre de 1983, colonia con aproximadamente 1500 nidos, construídos en acantilados bajos, restingas, áreas pedregosa y en la arena. La mayoría de los nidos con 3 huevos.

Rumboll en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Zamoral en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Islas de Atlántico Sur. Nido.
Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Canevari en Salvador (2016a). Islas de Atlántico Sur. Nido.

Huevos
Pone 3, a veces 4 huevos. Ovoidales. De color oliváceo u ocre oliváceo con pintas y manchas pardas, castañas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos con líneas oscuras.

Medidas

Gibson (1920): 73,0 x 51,0		
Pereyra (1938b): 75,0 x 53,0		
Malacalza (1987): 65 a 77,1 x 41,2 a 49,4	X= 70,4 x 46,6	(N= 27)
De la Peña (2013c): 69,2 a 75,8 x 47 a 50,2	X= 72,2 x 48,9	(N= 10)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 65,5 a 74,1 x 45,3 a 50,1	X= 70,2 x 48,2	(N= 9)

Pesos

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 76 a 95	X= 86,8	
Malacalza (1987):	X= 86,8	(N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 5,892 a 6,813	X= 6,249	(N= 10)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Pico oscuro con punta clara. Plumón grisáceo amarillento. Cabeza ocrácea con manchas y puntos pardo oscuro. Ventral blanquecino.

Observaciones
Reynolds (1934). Lago Yehuin, pichones.
Olrog (1958a). Potter, Isla Rey Jorge, 20-01-1953, nidos con pichones.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.
Agulián, C. (2012). Río Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 14-11-2012, pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Juliano, R. (2016). Bahía Laura, Santa Cruz, 20-12-2016, pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

Generalidades
Malacalza (1987); Yorio y García Borboroglu (2002). Período de incubación: 26-27 días.
De la Peña, (2013). 07-11-79. Puerto Deseado. Pobladores locales sacaban huevos para consumo.

Otros
Petracci et al (2001). Albinismo en Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*).

Depredadores
De adultos: Mamíferos: Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) en Buenos Aires, Canepuccia et al. (2007)

Aves: *Caracara plancus* en Santa Cruz, Salvador (2017a), en Punta Rasa, Buenos Aires, Di Mauro, S. (2017). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Falco peregrinus en Santa Cruz, Santillán et al. (2010b), en Chubut, García et al. (2014)

Más información:
Malacalza (1987). Yorio y García Borboroglu (2002). Yorio et al. (2005a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Dorsal negra con el borde de las alas blanco. Ventral y cola blancas. El juvenil, pardo jaspeado de blanquecino.
Se diferencia de la Gaviota cangrejera por ser más grande y no tener franja negra en la cola.

Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973

Isla de los Pájaros. Chubut. 26-11-1973

Isla de los Pájaros. Chubut. 26-11-1973

Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973

Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973

Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein, 1823 costas e islas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, las islas Malvinas, por el interior desde San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a Santa Cruz; *Larus dominicanus austrinus* Fleming, 1924, Antártida e islas antárticas, Georgias, Shetland, Orcadas, Sandwich del Sur y archipiélago Antártico.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Costas del Pacífico de Ecuador, Perú y Chile. Costas del Atlántico de Brasil, Uruguay y Argentina. Por el interior en Argentina. Una subespecie nidifica en la Antártida. Se encuentra también en Australia, Nueva Zelanda, sur de África, Madagascar e islas del Océano Indico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein, 1823

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Canepuccia et al. (2007); Castro y Cicchino (1992); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); La Sala et al. (2013); Lucero (1982); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Silva et al. (2000); Suárez et al. (2014); Weller (1967a); Yorio et al. (1998c); Zapata (1965, 1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)

Chubut

Citas: Bertellotti et al. (2001); Bó (1958); Boswall (1973); Camperi (1998); Contreras et al. (1980b) ; Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); García et al. (2014); Gatto et al. (2005); Giaccardi et

al. (1997); Giaccardi y Yorio (2004); Grigera y Rubullis (1985); Lucero (1982); Malacalza (1987); Pagnoni (2012b); Parera (1992); Quintana y Yorio (1998a, 1998b, 1999); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1994b, 1998a)

Observaciones: De la Peña (Esquel, 02-02-1976)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2001); Narosky et al. (1990); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019); Sosa (1995d, 2003, 2005); Valenzuela et al. (2013)

Neuquén
Citas: Bianchini (2014a); Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1968, 1978, 1983a); Giai (1942); Gollán (1951); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliche, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Bergkamp (1995a); Bianchini (2014a); Camperi (1998); Casas (1992a); Contreras et al (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977, 1978c); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2007b, 2011b, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Paz (1991b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2009a)

Santa Cruz
Citas: Albrieu y Navarro (1997); Albrieu et al. (2004); Arrighi y Navarro (1998); Coconier (2005b); Daciuk (1977); Daneri (1959); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Erize (1983); Frere et al. (2000); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Goodall et al. (1991); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e) ; Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Lucero (1982); Nasca et al. (2004); Oates (1901); Oustalet (1891); Pagano y Salvador (2017); Roesler et al. (2013a); Salvador (2017a); Santillán et al. 2010b); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939); Yorio et al. (2005a); Zapata (1965, 1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Wilson (1926)

Santiago del Estero

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019). "Paso de los Oscares", dpto. Salavina, Santiago del Estero, 22-02-2015, varios individuos en vuelo sobre bajos y bañados inundados por crecida de los rios Dulce y Utis (A. Bodrati y C. Ferrari obs. pers)

Tierra del Fuego

Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Ripley (1950); Schiavini et al. (1998); Suárez et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, 31-01-1972; Ushuaia, 01-01-1972)

Canal de Beagle
Citas: McGehee y Eitniear (2007); Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920); Dacuik (1983c); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Larus dominicanus austrinus Fleming, 1924

Islas subantárticas
Citas: Bennett (1920); Castellanos (1927); Coria y Montalti (1993b); Daciuk (1983a); Massoia y Navas (1992, 1993); Montalti y Soave (2002); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c, 2004); Silva et al. (1998b)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Bennett (1920); Coria et al. (2011); Orgeira (1997a); Paz (1990a); Silva et al. (1998b)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); Bennett (1920); García Esponda et al. (2000); Montalti y Orgeira (2001); Olrog (1958a); Orgeira (1997a); Orgeira y Montalti (1998); Shuford y Spear (1988); Silva et al. (1998b)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998); Orgeira (1995b, 2001a); Savigny (2002c)

Subfamilia: Sterninae

GAVIOTÍN CHICO BOREAL *Sternula antillarum* Lesson, 1847

Otros nombres: Charrancito americano. Gaviotín chico menor.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-24 cm.

Coloración. Pico negruzco en reposo sexual. Amarillo con punta negra en período nupcial. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente blanca. Corona, nuca y cuello posterior blancos moteados de oscuro. Dorsal y superior de las alas grises. Ventral y cola blancas.
Alas grises con las primarias externas negras.
Plumaje nupcial.
Frente blanca. Corona, cuello posterior y una línea desde el pico hasta los ojos negros. Resto del plumaje semejante al de reposo sexual.
Juvenil. Nuca blanquecina jaspeada de oscuro. Mancha oscura detrás de los ojos. Dorsal grisácea jaspeada de ocráceo. Pico negro. Patas amarillas.

HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Se parece al Gaviotín de río pero tienen diferente color de pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847 migratorio de Norteamérica. Observado en la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Nidifica desde Estados Unidos a Honduras en Centro América. Durante el invierno boreal migra a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Narosky y Sutton (1991); Olrog (1969); Pugnali y Chamorro (2008)

GAVIOTÍN DE RÍO *Sternula superciliaris* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Atí ceja blanca. Atí maculado. Gaviotín chico. Gaviotín chico mayor. Gaviotín de ceja blanca. Martincito pescador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23 cm
Peso: Contreras (1986a): N= 2 (M) 71,0 y 62,78g; N= 2 (H) 63,0 y 66,5 g

Coloración. Pico y patas amarillos. Iris pardo.
Corona, nuca y cuello posterior negros. Franja desde el pico a los ojos negra. Frente y línea hacia los ojos blancas. Dorsal y superior de las alas grises. Ventral blanca. Las cuatro primarias externas negras, orilladas de blanco en la lámina interna; las restantes grises. Secundarias grises con puntas blanquecinas. Cola gris, ahorquillada.
Plumaje de reposo sexual.
Nuca y posterior del cuello blancos, moteados de oscuro.
Juvenil. Corona jaspeada de oscuro. Dorsal moteada de parda.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en grupos.

Alimentación
Olguín et al. (2013b). **Peces:** *Holoshestes pequira, Astyarax* sp., *Cheirodon* sp., *Cnesterodon decenmaculatus.* **Insectos:** *Belostoma micantulum, Belostoma elongatum*, Coleoptera no identificados. **Crustáceos:** *Macrobrachium borellii*

HÁBITAT
Ríos, lagos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Nidifica en colonias, a veces solitario. Forma colonias junto a otras especies.
En el suelo. En arenales en islas o en bancos de arena en los ríos.
Expuesto. Poco elaborado. Escavación.

Hartert y Venturi (1909). Bella Vista, setiembre de 1903, nidos.
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 19-09-1926 y 03-10-1926, huevos.
Klimaitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 3 nidos con 2 huevos, 2 huevos y un pichón, en una colonia de *Charadrius collaris* y *Rynchops niger.*
Povedano (1999). Mar Chiquita, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, 29-01-1994, nido con 3 huevos.
Maugeri (2005) Río Paraná inferior, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 27-01-2001, colonia de nidificación junto al Chorlito de collar (*Chadrius collaris*) en banco de arena, con huevos. El 23-01-2003, en otro arenal otro nido con 2 huevos.
De la Peña (2013c). Reconquista, dpto. General Obligado, Santa Fe, 4 nidos: 15-11-1975, 2 huevos y 3 huevos; 28-11-1975, un huevo y 3 huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-10-1977, colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger*, huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, colonia junto a nidos de *Rynchops niger*, huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 22-11-1977, colonia con 20 nidos con huevos; El Cerro, dpto. Paraná, Entre Ríos, 23-10-1981, 2 huevos; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger* con pichones; Río Paraná. (La Paz), dpto. La Paz, Entre Ríos, 10-11-1994, con huevos.
Total de colonias: 4 Total de nidos solitarios: 6
Medidas: diámetro total: de 10 a 13 cm, profundidad: 2 a 3 cm.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, 6 nidos en depresiones en la arena de 14 a 15 cm de diámetro y de 4 a 5 cm de profundidad, postura de 2 ó 3 huevos.
De la Peña (2019b). Saladillo y ruta 62. (Emilia-Cayastá). Dpto. San Justo. Santa Fe. 15-11-2016. Nido con 2 huevos en un arenal. Andaban 6 ejemplares.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 30,0 a 44,0 x 24,0 a 25,0
Salvador y Narosky De la Peña (2016c): 30,8 a 33,8 x 22,9 a 24,6 X= 32,5 x 23,7 (N= 11)
Klimaitis y Moschione (1984): 30, 4 a 32,8 x 23,3 a 24,1 X= 31,8 x 23,7 (N= 4)
De la Peña (2013c): 30,4 a 34 x 23,5 a 25 X= 31,6 x 24,1 (N= 13)

Pesos
Salvador y Narosky De la Peña (2016c): 11,3
De la Peña (2013c): cáscaras 0,520 a 0,614 X= 0,566 (N= 7)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Plumón dorsalmente ocráceo o crema con escasas estrías y manchitas oscuras. Ventralmente blanquecino.

Destrucción
De la Peña (2013c). Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, en esta colonia un pescador recolectó casi todos los huevos para consumo.
De la Peña (2013c). Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, la creciente del río la destruyó a esta colonia.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Pico y patas amarillos. Capucho negro, con frente blanca.
Se parece al Gaviotín chico boreal pero se diferencia por el color del pico.

Colón. Entre Ríos.10-01-2005

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Colón. Entre Ríos.10-01-2005

La Paz. Río Paraná. Isla Curuzú Chalí. Entre Ríos.10-11-1994

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. En Sud América, al este de los Andes, desde el norte, Colombia, Venezuela hasta Argentina, en ríos y lagos. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Maugeri (2005); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pereyra (1938b); Poverano (1999); Pugnali y Chamorro (2008)

Córdoba

Citas: Cobos et al. (1999); Dardanelli (2016e); Durando (2016a); Klavins (2016)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), observada como una especie común en el dpto. 1º de Mayo, Libertad y Bermejo (zona de acceso y Puerto) de la Isla del Cerrito, en mayo, octubre, noviembre de 1999 y enero de 2001.

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); López-Lanús et al. (2013a); White (1882)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1979j, 2011f, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Olguín et al. (2013b)

ATÍ *Phaetusa simplex* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Atí cabeza negra. Atí pico corto. Gaviotín. Gaviotín de pico grande. Gaviotín de pico grueso.

DESCRIPCIÓN
Largo: 37-39 cm.
Peso: Contreras (1986a) N= 2 (H) 242,0 y 226,5 g

Coloración. Pico amarillo. Patas amarillas verdosas. Iris pardo oscuro.
Superior de la cabeza negro. Estrecha línea blanca por encima del pico. Dorsal y cola grises. Garganta, cuello y ventral blancos.
Primarias negras. Secundarias blancas. Cubiertas grises.
En el plumaje de reposo sexual tiene la corona grisácea con la nuca y banda posocular más oscuras.
Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual pero con las partes dorsales grisáceas moteadas de pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en parejas o en grupos dispersos. Emite un grito fuerte.

Alimentación
Beltzer (1984c). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae). Hemípteros (*Belostoma* sp., *Ranata* sp.). Odonatos anisópteros. Ortópteros. **Peces:** *Aparеiodon affinis, Astyanax* sp., *Auchenipterus nuchalis, Cichlaurus bimaculatus, Corydoras hastatus*, *Crenicichla* sp., *Cheirodon* sp., *Eigenmannia virescens, Gymnotus carapo, Holoshesthes pequira, Hyphessobrycon luetkenii, Pachyurus* sp., *Pimelodella* sp., *Salminus maxillosus, Serrasalmus nattereri.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.
Carmona, C. (2015). **Peces:** Sábalo (*Prochilodus lineatus*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 20/05/2019.

HÁBITAT
Ríos, lagunas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.
En el suelo, en bancos de arena.
Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Hartert y Venturi (1909). Bella Vista, 15-09-1903, nidos
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 15-10-1922, 19-10-1926 y 03-10-1926, huevos.
De la Peña (2013c). Proximidades de la isla Chapetón, Río Paraná, dpto. Paraná, Entre Ríos, 22-11-1977, nidos junto a una colonia de *Sternula superciliaris y Rynchops niger*, un huevo, otro, 2 pichones; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 3 nidos: 3 huevos, 2 pichones y un pichón; Río Paraná, Isla Curuzú Chalí, dpto. La Paz, Entre Ríos. La creciente destruyó muchos nidos, 10-11-1994, huevos y pichones; Río Paraná, Isla Yaguareté, dpto. Goya, Corrientes, colonia con unos 200 nidos, con 1 a 3 huevos, algunos con 4 y uno con 5. Había además unos pocos nidos de *Rynchops niger*, 26-08-1995, huevos y pichones.
Excavación en el suelo arenoso. Medidas: diámetro total: de 21 a 23 cm.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, un nido en una depresión en la arena con un pichón.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido

Huevos
Pone 2 ó 3, a veces 4 ó 5 huevos. Ovoidales. De color crema o verdoso con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 46,0 a 51,5 x 35,0 a 37,0
De la Peña (2013c): 48,0 a 49,5 x 36,0 a 37,0 X= 48,5 x 36,3 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 1,80 a 1,90 X= 1,85 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Salvador y Narosky De la Peña (2016c). Plumón acanelado, con patas y pico amarillentos.
De la Peña (2013c). Pico claro. Cuerpo cubierto de plumón crema (color arena).

Generalidades
De la Peña (2013c). A las mojarritas que traían para alimentar a los pichones, les cortaban la cabeza, antes de dárselas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grande, amarillo. Cola cuadrada. Gris, blanco y negro a las alas.

Campo Andino. Santa Fe. 11-12-2007

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Esperanza. Santa Fe. Río Salado. 05-03-2014

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phaetusa simplex chloropoda (Vieillot, 1819) en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en ríos y lagos en Sud América desde el norte hasta Argentina y Uruguay. Comprende: Cuba, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phaetusa simplex chloropoda (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Bodrati et al. (1997a, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Dunford (1877); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Lynch Arribálzaga (1878); Mérida y Bodrati (2006); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), A. Bodrati y E. Sierra han observado en forma regular a la especie entre los años 1998 y 2019, sobre las costas de los partidos bonaerenses de Ramallo, San Pedro y Baradero.

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 26-09-1972)
Bodrati (*in litt*. 2019), común en las costas del río Paraná y Paraguay en departamentos como 1º de Mayo, San Fernando, Bermejo y Libertad.

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Olrog (1979); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1986a); De la Peña (2013c); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), A. Bodrati y E. Sierra han observado en forma regular a la especie entre los años 1998 y 2019, en lagunas y arroyos interiores de las Islas Lechigunas, dpto. Gualeguay, Entre Ríos.

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005)

Salta
Citas: Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1984, 1986); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Lucero (1983)

GAVIOTÍN DE PICO GRUESO *Gelochelidon nilotica* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Gaviotín de pico negro. Gaviotín de pico y patas negros. Gaviotín pico grueso. Gaviotín pico de gaviota.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-43 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 2 (M) 280 y 300 g; N= 3 (H) X= 216,7 g (Rango: 200 a 250)
Salvador (2014a): N= 1 (M) 188 g; N= 1 (H) 173 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Corona, nuca y lados de la cabeza negros. Dorsal, cola y cubiertas alares grises. Ventral blanca. Primarias grises, con parte de la lámina interna blanca.
En el período de reposo sexual presenta la frente y anterior de la corona blancas. Resto de la corona y nuca grises con finas rayitas negras. Franja ocular u auricular negra.
Juvenil. Semejante al adulto en invierno, pero jaspeado de pardo en la cabeza y dorso y con la banda ocular poco notable. Patas pardas rojizas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o a veces en grupos.

Alimentación
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** (Anablepidae: *Jenynsia multidentata*, Poeciliidae: *Cnesterodon decenmaculatus*).

HÁBITAT
Lagunas, ríos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Excavación recubierta de palitos o pajas.

Nores e Yzurieta (1979b). Laguna de Mar Chiquita, desembocadura del río Segundo, dpto. San Justo, Córdoba, mediados de diciembre de 1976, en un islote, colonia con unos 70 a 100 nidos con huevos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. El 16-01-1991 se localizaron nidos en una isleta, con cáscaras de huevos y pichones muertos. Al año siguiente en la misma zona se registraron 8 nidos activos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, durante 2007 y 2008, se registraron nidos.

Huevos
Pone 3 huevos. Base amarillenta oliváceo con manchas pardo oscuro, pardo rojizo y violeta diluido.
Hay variación en el color de base.

Medidas
Nores e Yzurieta (1979): 46,0 x 33,0

PICHONES
Descripción
Nores e Yzurieta (1979b). Superior del cuerpo leonado claro con manchas negras, que se disponen formando tres bandas longitudinales en el lomo y una en las alas. Partes inferiores blancas. Iris negro.
Mandíbula inferior córnea con base negruzca. Mandíbula superior, comisura e interior de la boca, naranja. Patas anaranjadas, más ocuro en los nudillos y más naranja en las membranas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grueso. Capucho negro. Cola gris poco ahorquillada.
En el período sexual puede confundirse con el Gaviotín lagunero.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gelochelidon nilotica groenvoldi (Mathews, 1912) en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Se encuentra tanto en el Viejo como Nuevo Mundo. Nidifica en Europa, Asia, Australia, ambas costas de Norte América y Centro América. En Sud América, nidifica en la costa noroeste del Pacífico y en el este Atlántico, en Guayana Francesa, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gelochelidon nilotica groenvoldi (Mathews, 1912)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Deveillers (1977); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Maugeri (2002a); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Suárez et al. (2014)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979b, 1980b); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

Entre Ríos

Observaciones: E. Sierra (obs. pers) 06-02-1999, Islas Lechiguanas, dpto. Gualeguay, Entre Ríos, entre canal 1 y río Lechiguanas, un individuo junto a una bandada de Gaviota Capucho Gris (*Larus cirrocephalus*). En el mismo sector un individuo el 14-10-1999. Río Paraná km 274,5, Islas Lechiguanas, un individuo solitario atravesando el río Paraná hacia la pcia de Buenos Aires.

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno (2009); Bruno et al. (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Chebez et al. (1993); Ferrer et al. (2019); Sosa (1995d, 2005)

Río Negro
Citas: Canevari (1979); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Echevarría et al. (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Di Giacomo et al. (2001); Fandiño y Pautasso (2011); Pautasso (2002a); Romano et al. (2005)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

GAVIOTÍN NEGRO *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758)

Otro nombre: Fumarel.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-28 cm.
Peso: Contreras (1979c): N=1 (M) 64,5 g

Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Línea ocular, corona posterior, nuca y parte del cuello posterior negras. Frente, corona anterior, lados de la cabeza, garganta, parte del cuello posterior y todo lo ventral, blancos. Dorsal, alas y cola color gris plomizo. Margen blanco delgado en la parte anterior de las alas.
Plumaje nupcial.
Cabeza, cuello, pecho y ventral, negros. Dorsal, alas y cola color gris pizarra. Subcaudales blancas. Ventral de las alas gris clara.
Juvenil. Se parece a los adultos en reposo sexual pero con la cabeza y el dorso moteados de pardo.

HÁBITAT
Costas marinas, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Frente y anterior de la corona blancos. Posterior de la corona negro. Ventral blanca. Cola corta, poco ahorquillada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chlidonias niger surinamensis (J. F. Gmelin, 1789) migratorio de Norteamérica.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se lo encuentra tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo (holoartico). En América nidifica en Canadá y Norte de Estados Unidos, migrando hacia las costas atlánticas y del Pacífico de Centro América y Sud América. Existen numerosos reportes de su presencia en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlidonias niger surinamensis (J. F. Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (2006b); Camperi et al. (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Ferrari y Henschke (2002); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); León y Diaz Neto (1988)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras y Contreras (1984)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Olrog (1969); Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras (1979c); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al. (1985); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (1985)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: Quiroga et al. (2015)

GAVIOTÍN GOLONDRINA *Sterna hirundo* Linnaeus 1758

Otros nombres: Charrán común. Gaviotín agolondrinado. Gaviotín de norteamérica. Gaviotín de Wilson. Gaviotín golondrina chico. Gaviotín golondrina cosmopolita. Golondrina de mar de pico y dedos bermejos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-40 cm.
Peso: Haverschmidt (1968): N= (?) Rango: (M) de 122 a 131 g; (H) de 111 a 128 g

Coloración. Pico rojo con punta negra. En el período de reposo sexual pasa a ser negro con algo de rojo en la base. Patas rojas. Iris pardo oscuro.

Plumaje de reposo sexual.

Frente y anterior de la corona blancos. Posterior de la corona y nuca negros, jaspeados de blanco. Dorsal gris. Alas grises con lámina externa de las primarias gris oscura, las internas grises y blancas. Secundarias grises y blancas. Cubiertas alares superiores grises oscuras. Borde de las alas, rabadilla y parte ventral blancos. Cola gris, con la lámina externa de las plumas externas gris y la interna blanca.

Plumaje nupcial.

Superior de la cabeza negro. Ventral gris clara.

Juvenil.

Semejante al plumaje de reposo sexual pero con las partes dorsales moteadas de pardo. Cubiertas superiores pardas formando una banda.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Mauco y Favero (2004). **Insectos:** Coleópteros (*Dyscinetus rugifrons, Dyscinetus gagates*). (Scarabacidae, *Cyclocephala signaticollis*). Hemípteros (Bellostomidae, *Belostoma elegans*). Lepidópteros. Odonata (Aeshnidae, *Aeshna* sp.) .Ortópteros (Grillidae, Tettigoniidae) (Grillotalpidae, *Scapteriscus* sp.). **Peces:** *Anchoa marinii, Brevoortia aurea, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Pomatomus saltatrix, Urophysis brasiliensis.*

Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Paralonchurus brasiliensis, Pimelodella gracilis, Rhamdia quelen, Sorgentinia incisa.*

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.

HÁBITAT

Lagunas, costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Pico fino, cola ahorquillada que no pasa la longitud de las alas plegadas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sterna hirundo hirundo Linnaeus 1758 migratorio Norteamérica. Llega por la costa atlántica hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En el interior, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Misiones y Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Nidificación holoártica, circumpolar, en Europa, Asia y Norte América. En América inverna a lo largo de toda la costa de Sud América hasta Tierra del Fuego e islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sterna hirundo hirundo Linnaeus 1758

Buenos Aires

Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mauco y Favero (2004); Mauco et al. (2001); Narosky y Di Giacomo (1993)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b, 1981); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

La Pampa
Citas: Cenizo et al. (2019)

Mendoza
Citas: Martínez y Calí (2013)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero

Observaciones: Salvador, S. (Río Dulce, cerca de Loreto, pdto. Loreto, octubre 2007)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTÍN ÁRTICO *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763

Otros nombres: Charrán ártico. Golondrina ártica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-38 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 108 g

Coloración. Pico y patas negros. En el período de reproducción son rojos. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente blanca. Corona y nuca negras moteadas de blanco. Dorsal gris. Rabadilla y partes ventrales blancas. Alas grises con blanco en las secundarias. Cola gris claro con las plumas más externas grises oscuras.
Plumaje nupcial.
Superior de la cabeza negro. Franja blanca por debajo del negro, desde la base del pico hasta el cuello. Dorsal y partes ventrales grises.
Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual, pero con las partes dorsales pardas cenicientas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces, krill.

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano a grande. Cola muy ahorquillada y un poco más larga que las alas plegadas.
Diferenciarlo del Gaviotín golondrina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 migratorio del Ártico. Llega hasta Tierra del Fuego y costa patagónica hasta Buenos Aires, las islas Malvinas, el archipiélago Antártico, Georgia del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en áreas cercanas al Océano Ártico y fuera de la epoca reproductiva viaja hasta la Antártida en un viaje anual ida y vuelta de 40.000 Km

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Murphry (1936); Olrog (1979b); Pereyra (1938b)

Neuquén
Citas: Bianchini y Gonzalo González (2017)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Povedano (2016)

Tierra del Fuego
Citas: Humphrey et al. (1970); Keith (1970)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Archipiélago Antártico y Antártida
Citas: Blendinger (1998); Montalti y Soave (2002); Olrog (1958a); Orgeira (1997, 2004)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a)

Mares
Citas: Orgeira (1995b, 2001a)

GAVIOTÍN SUDAMERICANO *Sterna hirundinacea* Lesson, 1831

Otros nombres: Charrán colilargo. Gaviotín de cola larga. Gaviotín de lomo blanco. Gaviotín golondrina. Gaviotín golondrina grande. Golondrina de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-43 cm.
Peso: Zapata (1967): N=1 (M) 235 g; N=1 (H) 190 g
Reynold en Humphrey et al. (1970): N= 1 (H) 184,0 g; N= (?) 198,4 g
Lisnizer et al. (2014): N= 18 (M) X= 176 g (Rango: 160 a 200); N= 20 (H) X= 178 g (Rango: 150 a 198)
Pagano y Salvador (2017): N= 2 (H) 170 y 220 g; N=1 (M) juvenil 140 g

Coloración. Pico y patas rojos en el período nupcial. Negros en reposo sexual. Iris pardo.
Superior de la cabeza negro. Partes dorsales y cubiertas alares grises. Supracaudales y cola blancos. Garganta y pecho grisáceos. Resto de lo ventral blanco.
Primarias y secundarias grises con margen blanco. Primarias más externas con lámina externa gris pizarra.
En el período de reposo sexual tiene la frente y todo lo ventral blancos.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy bullanguero.

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces, krill.
Favero et al. (1998a). **Crustáceos. Peces:** Pejerreyes (Atherinidae), *Cysnoscion striatus, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri.*
Favero et al. (2000b). **Crustáceos:** (Decapoda). **Insectos:** (Coleoptera). **Peces:** *Cynoscion guatupuca, Engraulis anchoita, Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Sorgentinia incisa, Anchoa marinii.*
Albrieu et al. (2004). Peces.
Gatto y Yorio (2005). **Peces:** *Engraulis anchoita, Odontethes* sp.
Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Anchoa marinii, Engraulis anchoita, Paralonchurus brasiliensis, Sorgentinia incisa, Trachurus lathami.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.

Voces
Straneck en De la Peña (2016c). En vuelo repite un agudo y nasal Kerp..kierp..

HÁBITAT
Costas marinas y de ríos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Nidifica en colonias.
En el suelo. En islotes o playas marinas.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, a veces aporta palitos, tallos de yuyos o fibras vegetales.

Durnford (1878). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, diciembre de 1877, colonia de unos 67.000 nidos, con 1, 2 o 3 huevos.
Crawshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.

Hartert y Venturi (1909). Leones, Río Santa Cruz, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidos.
Anónimo (1933). Tierra del Fuego. Nido.
Olrog (1948 y 1950). Colonias en el Canal de Beagle.
Zapata (1965). Fitz Roy, Punta de los Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, 29-12-1964, nidos.
Zapata (1967). Isla Larga e Isla Quiroga, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidos en 1961.
Korschenewski (1969). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando.
Humphrey et al. (1970). varias colonias a lo largo del Canal de Beagle, en diciembre de 1960.
Boswall y Pytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1969.
Daciuk (1973a). Punta Cero, dpto. Biedma, Chubut, nidos en 1969 y 1970.
Daciuk (1977). Punta Pardelas, dpto. Biedma, Chubut y Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, colonias de nidificación.
Woods (1982, 2006). Islas Malvinas. Nido.
Salvador y Narosky (1987). Altura de Sierra Grande, dpto. San Antonio, Río Negro, 21-11-1983, colonia.
Sutton et al. (1988). Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, nidos en 1986.
Punta (1989). Isla Viana, dpto. Escalante, Chubut, nidifican en la década de 1980.
Paz (1992b). Punta Pozos, dpto. San Antonio, Río Negro, 08-12-1990, colonia con huevos.
Parmelee et al. (1994). Tierra del Fuego. Nido.
Schiavini y Yorio (1995). Tierra del Fuego. Nido.
Pérez et al. (1995). Isla Chaffers y Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidificando en 1986 y 1987 y en Punta Bustamante, dpto. Escalante, Chubut en 1986.
Zalba y Belenguer (1996). Isla del Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Bahía San Blas, 11-01-1994
Scolaro et al. (1996a). Punta Loma, dpto. Biedma, Chubut, colonia en 1992.
Petracci y Pérez (1997). Viedma (45 km río arriba del río Negro). dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 15-01-1997, colonia con 11 nidos, uno con un pichón, uno con un huevo y otro con 2 huevos.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Blanco et al. (1998). Chubut. Nido.
Yorio et al. (1998c). Isla del Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
González et al. (1998). Islote frente a Punta Verde, Islotes del Canal Escondido, Punta Pozos, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998a). Caleta Olivia (La Lobería). Punta Pájaros, Monte Loayza, Punta Guanaco, Isla Larga, Islote de Cañadón del Puerto, Isla Pingüino, Punta Médano Negro, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Península El Páramo, Islote Faro Sur, Isla Casco, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Punta Conos, Punta Buenos Aires, La Armonía, Punta Norte, Punta Cero, Punta Pardelas, Punta Loma, dpto. Biena, Chubut, Playa El Pedregal, dpto. Rawson, Chubut, Punta Tombo, Punta Gutiérrez, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islas Aguilón, Islote Luisoni, Isla Galiano Norte, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Ezquerra, Isla Vernaci Este, Isla Viana Mayor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Cuevas de Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Río Negro. Nido.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz, nidifica en playas de grava o en zonas rocosas. También en repisas en acantilados.
Yorio (2005a). Punta Conos y Punta Norte, dpto. Biedma, Chubut, G. Harris observó colonias en 1985 y 1987 en el primer lugar y en 1979 en el segundo.
Yorio (2005a). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, R. Manríquez observó colonias en 1985 y 1987.
Yorio (2005a). Isla Aguilón del Norte, dpto.Florentino Ameghino, Chubut, G. Punta observó nidos.
Imberti (2005e). Nidifica en lagunas de la estepa patagónica.
Harris (2008). Chubut. Nido.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.
Tolosa y Gelain (2012). Gral. Conesa, dpto. Conesa, Río Negro, 31-01-2007, colonia.
De la Peña (2013c). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, 30-01-1972, huevos; Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
En Río Grande, la colonia estaba entre piedras, a 30 metros del mar, con unos 50 nidos. Nidos muy próximos unos de otros (aproximadamente a 1 m.). Algunos nidos no tenían materiales y los huevos estaban puestos sobre las piedritas.
Medidas: diámetro total: de 9 a 10 cm.

Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, entre 450 y 500 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 13 a 18 cm de diámetro y de 2 a 4 cm de profundidad, postura de 2 huevos; Isla Pingüino, puerto San Julián, dpto. Magallanes, Santa Cruz, 12-02-1986, colonia de unos 100 nidos, en pequeñas depresiones en canto rodado, el 40% de los nidos con 2 huevos, los restantes con pichones de distintas edades.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Chubut. Nido.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.
No hay uniformidad en el color de base ni en la forma y distribución de las manchas.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 43,0 a 44,0 x 33,0		
Petracci y Pérez (1997): 42,0 a 44,0 x 33,0 a 34,4	X= 42,6 x 33,6	(N= 3)
De la Peña (2013c): 47,5 a 50,3 x 32,7 a 35,7	X= 48,8 x 34,1	(N= 5)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 45,2 a 50,8 x 32,3 a 35,5	X= 47,8 x 33,4	(N= 8)

Pesos

De la Peña (2013c): cáscaras 1,757 a 1,937	X= 1,847	(N= 2)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Descripción
Petracci y Pérez (1997). Plumón crema jaspeado de negro.
De la Peña (2013c). Dorsalmente pardusco con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.

Generalidades
Perído de incubación. Scolaro et al. (1996a). 21,5 días.

Más información:
Yorio (2005a). Bertellotti et al. (1995). Suárez et al. (2014)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Peres y Peres (1985), en Chubut, Salvador (2017a)
De pichones y de huevos: *Larus dominicanus* en Santa Cruz, Salvador (2016b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cola muy ahorquillada que sobresale de las alas cuando están plegadas.

Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972

Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972
Ubicación de la colonia.

Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972
Incubando.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sterna hirundinacea Lesson, 1831 nidifica en la costa atlántica desde Río Negro a Tierra del Fuego y las islas Malvinas e interior. En invierno llega hasta Buenos Aires. Observado además en el oeste de Río Negro, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en las costas del sur de Perú y Chile. En el Atlántico desde este de Brasil hasta Tierra del Fuego e islas Malvinas. En el invierno austral migran hacia el norte llegando a Uruguay, Brasil y Ecuador.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Favero et al. (1998a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Klimaitis (1975b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1958a); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998c); Zalba y Berenguer (1996)

Chubut
Citas: Blanco et al. (1998); Bó (1958); Boswall (1973); Couve y Vidal (2003); Daciuk (1972a, 1977b, 1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Pagano y Salvador (2017); Pagnoni (2012b); Parera (1992); Quintana y Yorio (1998b); Salvador (2017a); Scolaro et al. (1996a); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-2000)

La Pampa
Citas: Bianchini (2016d)

Mendoza
Citas: P. Isola en Ferrer et al. (2019); Bianchini (2016d)

Neuquén
Citas: Bianchini (2016d)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz (1992); Petracci y Pérez (1997); Povedano (2016); Salvador y Narosky (1987); Tolosa y Gelain (2012)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Daciuk (1977); Darrieu et al. (2008); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1932); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Nasca et al. (2004); Oustalet (1891); Salvador (2016b); Saunders (1896); Yorio et al. (2005a); Zapata (1965, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); De la Peña (2013c); Devereux (2012); Humphrey et al. (1970); Keith (1970); Olrog (1948, 1950); Schiavini et al. (1998)

Canal de Beagle
Citas: Olrog (1958a); Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Islas subantárticas
Citas: Orgeira (1997a)

Georgias del Sur
Citas: Castellanos (1927)

Shetland del Sur
Citas: Bennett (1920); Orgeira (1997a)

Orcadas del Sur
Citas: Bennett (1920); Castellanos (1927); Hartert y Venturi (1909); Orgeira (1997a)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998); Orgeira (1995b, 1997a, 2001a); Savigny (2002c)

GAVIOTÍN ANTÁRTICO *Sterna vittata* J. F. Gmelin, 1789

Otros nombres: Charrán antártico. Gaviotín de Georgia.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-40 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 2 (?) 154 y 166 g

Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo oscuro.
Frente, corona y nuca negras. Dorso y alas grises. Rabadilla blanca. Ventral gris blanquecina. Subcaudales blancas. Cola furcada, blanca.
Juvenil. Corona jaspeada de negro. Pico y patas negros.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Casaux et al. (2008). **Peces:** *Bovallia gigantea, Euphausia superba, Eurimera monticulosa, Electrona antarctica, Notothenia coriiceps.*
Jazdzewski y Konopacka (1999). **Peces:** *Abyssorchomene plebs, Cheirimedon femoratus, Hippomedon kergueleni, Orchomenella rotundifrons, Waldeckia obesa.*

HÁBITAT
Costas marinas, islas, mares.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Shetland del Sur, Orcadas del Sur, Península Antártica.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Nidifica en colonias. Depresión en el suelo.

El nido es una depresión en el suelo. Mide15-20 cm. de diámetro y 3,5-4 cm. de profundidad.

Bennet (1920). Islas del Atlántico Sur.Nido.
Carcelles (1931). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, Decepción, Rey Jorge, Bahía Esperanza, Melchior, Isla Laurie, 11 y 17 de enero de 1953, nidos con huevos. El día 20 de enero, los primeros pichones.
Poretti (1993). 25 de Mayo, Shetland del Sur, colonias entre octubre de 1991 y febrero de 1992
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, noviembre de 1989 a enero de 1990, nidos.
Aguirre (1995). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Coria et al. (1996). Península Antártica. Nido.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
Soave et al. (2000). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Quintana et al. (2000). Península Antártica. Nido.
Favero et al. (2000b). Península Antártica. Nido.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Montalti y Soave (2002). Península Antártica. Nido.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1993-94 y 1994-95, nidificando.
Clarke et al. (2012). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Canevari en Salvador (2016a). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Islas del Atlántico Sur. Nido.
Casaux y Ramón en De la Peña (2016c). Isla Nelson, Shetland del Sur, 2001 a 2005, nidificando.
Montalti en De la Peña (2016c). 25 de Mayo, Shetland del Sur, 20-12-1996 y 12-12-1997, nidos.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos, ovoidales. Oliváceos con manchas pardas y grises.

Medidas
Montalti en De la Peña (2016c): 43,0 a 45,0 x 31,4 a 33,5
Straneck en De la Peña (2016c): 43,0 a 45,0 x 31,5 a 34,0

Peso
Straneck en De la Peña (2016c): 23

Generalidades
Poretti (1993). Período de incubación, 22 a 26 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cola muy ahorquillada. Ventral gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna vittata georgiae Reichenow, 1904 nidifica en Georgias del Sur. En otoño se desplaza a la costa argentina. *Sterna vittata gaini* Murphy, 1938 nidifica en Sandwich, Orcadas, Shetland del Sur y en el archipiélago Antártico. En otoño migra a las costas argentinas. También islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Esta especie es parecida al Gaviotín Ártico (*Sterna paradisaea*) y se encuentran en la Antártida durante el verano austral.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sterna vittata georgiae Reichenow, 1904

Sterna vittata gaini Murphy, 1938

Buenos Aires
Citas: Savigny y Favero (2005)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a); Paz (1990a)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); García Esponda et al. (2000); Montalti y Orgeira (2001); Olrog (1958a); Orgeira (1997a); Shuford y Spear (1988)

Archipiélago Antártico y Antártica
Citas: Coria y Montalti (1993b); Massoia y Navas (1992, 1993); Montalti y Soave (2002); Novati (1978); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c, 2044)

GAVIOTÍN LAGUNERO *Sterna trudeaui* Audubon, 1838

Otros nombres: Gaviotín cabeciblanco. Gaviotín común. Gaviotín de caperuza y nuca blancos. Gaviotín de corona blanca. Gaviotín de laguna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-35 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 160 g; N= 1 (H) 146 g
Camperi (1992c): N= 1 (M) 200 g; N= 1 (H) 200 g

Coloración. Pico amarillo con una banda negra en el medio. En el período de reposo sexual el pico es negro con punta amarilla. Patas naranjas. Iris pardo oscuro.
Superior de la cabeza, garganta y rabadilla blancos. Banda ocular negra. Resto de la cabeza, partes dorsales y ventrales grises. Subcaudales blancas grisáceas.
Primarias y secundarias grises. Las secundarias con bordes blancos. Ventral de las alas blanco.
Cola gris, con las plumas externas blancas.
Plumaje de reposo sexual.
Superior de la cabeza con tinte gris. Banda ocular más clara.
Juvenil.
Semejante al adulto en reposo sexual pero con las partes dorsales y las cubiertas alares jaspeadas de pardo. Frente blanca. Pico negruzco. Patas amarillentas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Garcia, G y L. Josens, en Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Brevoortia aurea, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes* sp., *Pomatomus saltatrix, Paralichthys* sp., *Sorgentinia incisa.*
García y Mariano-Jelicich (2005). **Peces:** *Odontesthes* sp., *Paralichthys* sp.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces.** *Odontesthes bonariensis.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** *Paralichthys* sp.
Palonsky, R. A. (2018). **Peces:** Pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
De Ciria, L. (2018). **Peces:** Pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.
Tolosa, H. (2018). **Peces:** Pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

HÁBITAT
Lagunas, ríos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Nidifica en colonias, a veces solitariamente.
Sobre embalsados, en lagunas.
Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Emplea tallos y hojas de plantas acuáticas.

Holland (1890, 1892). Buenos Aires. Nido.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 1890, nidos.

Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, nidos con huevos y pichones.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
Pereyra (1937b). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1938b). Nidos en General Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, con huevos
Darrieu et al. (1989). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Diez nidos en un totoral, formando parte de la colonia de Cuervillo de cañada y uno solitario en la zona periférica de la colonia de *Podiceps occipitalis*.
Nidos construidos con totora seca formando una plataforma de 90 cm de diámetro, elevada 10 cm sobre el nivel del agua, con una cavidad central en forma de taza de 15 cm.
En algunos casos fueron utilizados nidos abandonados de Cisne de cuello negro.
González et al. (1998). Islote Rodondo, pdo. Villarino, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
González et al. (1998). Río Negro. Nido.
De la Peña (2013c). Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 01-11-1974, colonia con 10 nidos, seis con 3 huevos, tres con 2 y uno con 1; Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 22-12-1981, 2 huevos.
Los nidos estaban construidos sobre un embalzado flotante de plantas acuáticas. Miden promedio, diámetro total: de 22 a 30 cm, diámetro de la depresión central: de 7 a 10 cm, profundidad: de 1,5 a 3 cm, alto: de 9 a 10 cm.
Total de colonias: 1 Total de nidos solitarios. 1
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 14 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Salvador en De la Peña (2016c). Jovita, dpto. Gral. Roca, Córdoba, 10-01-1993, 3 nidos en un extenso bañado, construídos sobre matas de *Scirpus californicus*, con 3 huevos cada uno.
Uranga en De la Peña (2016c). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, colonia con unos 15 nidos y de 70 nidos de *Chroicocephalus maculipennis* y un nido de *Chroicocephalus cirrocephalus* en construcción, en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná.
Bull en MVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Bull en UF, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color pardo castaño o pardo oliváceo, con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas

Gibson (1920): 43,0 a 44,0 x 29,0 a 31,0		
Pereyra (1938b): 45,0 x 32,0		
Darrieu et al. (1989): 44,1 a 46 x 29,8 a 31,7	X= 45,0 x 30,6	(N= 5)
De la Peña (2013c): 39,4 a 43 x 29,5 a 32,2	X= 41,6 x 30,8	(N= 8)
Salvador en De la Peña (2016c): 41,6 a 42,7 x 29,9 a 31,7	X= 42,1 x 30,6	(N= 9)

Pesos

De la Peña (2013c): cáscaras 1,002 a 1,248	X= 1,145	(N= 5)

PICHONES
Descripción
Bó et al. (1995). Dorso ocráceo moteado y estriado con manchitas parduscas. Parte ventral ocrácea más pálida y sin manchas. Pico ocráceo con el ápice negro. Patas y dedos ocráceos verdoso.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Corona blanca. Banda ocular oscura. Pico amarillo con banda negra.

Monte Hermoso. Buenos Aires. 29-01-2016 Fotos: Víctor Merlino

Morteros. Córdoba. 22-12-1981

Aguará Grande. Santa Fe. 01-11-1974

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna trudeaui Audubon, 1838 en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén.
Ocasionalmente Chubut, Santa Cruz e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se lo encuentra por la costa desde Río de Janeiro hasta la costa de Argentina, llegando hasta Chubut. Tambien en el interior del este de Argentina. Nidifica asimismo en la costa del Pacífico en Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gasparri et al. (2018); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b) , Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990c); Suárez et al. (2014); Weller (1967a); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972)
Bodrati (*in litt.* 2019). A. Bodrati y E. Sierra, el 27-09-1998, observaron varios individuos asentados sobre un banco de arena y en vuelo, junto a un grupo de Gaviotas capucho gris, a 300 metros de la ribera del río Paraná, Bañados de Castro, Estancia Río Paraná, Vuelta de Obligado, Buenos Aires.

Chaco
Citas: Linch Arribalzaga (1920)

Observaciones: Bodrati (*in litt.* 2019), dos individuos el 12 -11-1997, sobrevolando campos inundados aledaños al arroyo o río Tapenagá, dpto. Tapenaga, Chaco.

Chubut
Citas: Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); De la Peña (2013c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Salvador (1983a); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. Miramar, 19-07-2007)

Corrientes

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)
Bodrati in litt. (2019); el 11-10-09, E. Sierra observó un individuo sobre el puente que une el poblado de Colonia Pellegrini con el área operativa de la Reserva Provincial Iberá.

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (1996, 2012); Mancini (2011); Serié y Smyth (1923)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019). E. Sierra observó el 06-02-1999, en el km 261 del río Paraná, dos parejas zambullendo en la ribera de la Isla Lechigunas, dpto. Gualeguay, Entre Ríos.
El 28-08-2002, E. Sierra observó tres individuos atravesando el río Paraná en el km 274, desde las Islas Lechiguanas, dpto. Gualeguay, Entre Ríos hacia la Isla 2 de Oro, provincia de Buenos Aires.
E. Sierra, 13-11-2007, km 238 río Paraná, arroyo El Francés, Islas Lechiguanas, dpto. Gualeguay, tres individuos volando hacia el sur. En el mismo sector se observó un individuo el 24-07-2010.

Formosa
Citas: Di Giacomo (2005h)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno (2009); Bruno et al. (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Darrieu et al. (1985, 1989); Ferrer et al. (2019); Lucero y Chebez (2011); Martínez et al. (1985, 1997a); Sosa (2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras et al. (1980b); Del Valle et al. (1989); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Contreras et al (1980b); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Gelain y Diez Peña (2006); González (1991); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Nores e Yzurieta (1982b); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016); Tolosa y Gelain (2012)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2012h, 2013i)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTÍN PICO AMARILLO *Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1787)

Otros nombres: Gaviotín de copete y pico negros. Gaviotín de México. Gaviotín grande de pico negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 36-46 cm.
Peso: Lisnizer et al. (2014): N= 25 (M) X= 345 g (Rango: 214 a 270); N= 11 (H) X= 241 g (Rango: 212 a 310)

Coloración. Pico negro con punta amarilla. Patas negras. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Frente blanca. Corona jaspeada de blanco y negro. Dorsal gris.
Alas grises con las primarias con los márgenes blancos en las barbas internas. Ventralmente, supracaudales y cola, blancás.
Plumaje nupcial.
Frente, corona, cresta nucal y cuello posterior negros.
Juvenil.
Frente y corona jaspeadas de blanco y negro. Partes dorsales moteadas de blanco y negro. Pico y patas negros.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Quintana y Yorio (1997a). **Peces:** *Engraulis anchoita, Odontesthes* sp., *Sprattus fuegensis, Stromateus brasiliensis.*
Favero et al. (2000a). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis.* **Crustáceos. Insectos.**
Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis, Stromateus brasiliensis.*
Gatto y Yorio (2009). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Odontesthes nigricans, Seriolella porosa, Sprattus fuegensis.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces**.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** *Engraulis anchoita.*
Duran, G. F. (2016). **Peces:** Cornalito (*Odontesthes incisa*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 28/05/2019.

HÁBITAT
Costas marinas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Buenos

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Aires, Chubut, Santa Cruz.

Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.
En el suelo. Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Zapata (1965). Fitz Roy, Punta de los Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, 29-12-1964, 18 nidos.
Korschenewski (1969). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando.
Boswall y Pytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1968.
Daciuk (1972a). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, nidos en 1970.
Daciuk (1973a). Punta Cero, Caleta Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 19-01-1970, colonia con huevos.
Daciuk (1976b). Puerto Melo. Dpto. Florentino Ameghino, Chubut, colonia con nidos en 1971 y 1972.
Devillers (1977). Sur de Bahía Anegada (posiblemente, Banco nordeste). Pdo. Patagones, Buenos Aires. Tres nidos en 1975.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1990, colonias con nidos.
Pérez et al. (1995). Punta Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidificando en 1991.
Quintana y Yorio (1996a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, colonias de nidificación.
Yorio y Harris (1997). Banco Culebra, Dpto. Patagones, Buenos Aires, nidificando en 1990.
Quintana y Yorio (1997a). Chubut. Nido.
Yorio y Quintana (1997). Chubut. Nido.
Quintana y Yorio (1997a). Santa Cruz. Nido.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Banco Culebra, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). La Armonía, dpto. Biedma, Chubut, Punta León, dpto. Rawson, Chubut, Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Chubut. Nido.
Yorio et al. (1998a). Buenos Aires. Nido.
Yorio et al. (1998b). Islote Luisoni, Isla Chata, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Ezquerra, Isla Isabel Norte, Isla Viana Mayor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998). Punta Pájaros, Monte Loayza, Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Yorio (2005a). G. Harris observó nidos en 1988 en Punta León, dpto. Rawson, Chubut, y en Ensenada Medina, dpto. Biedma, Chubut en 1979, 3 nidos.
Harris (2008). Chubut. Nido.
Yorio (2005a). G. Punta observó nidos a fines de la década de 1980 en Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
Medidas: diámetro total: de 11 a 15 cm y profundidad: de 1,5 a 2 cm.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, se hallaron entre 500 a 600 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 13 a 20 cm de diámetro y de 2 a 4 cm de profundidad, postura de 1 ó 2 huevos (el 80% de los nidos con uno).
Marinao et al. (2015). Buenos Aires. Nido.

Huevos
Pone 1 huevo. Ovoidales. De color blanco o crema blanquecino con pintas y manchas grises y pardo oscuro, distribuidas por toda la superficie.

Medidas

Daciuk (1973a). 50,0 a 56,4 x 36,1 a 40,0	X= 53,5 x 37,0	(N= 31)
De la Peña (2013c): 52,8 x 35,5		(N= 1)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 50,3 a 54,7 x 35,2 a 38,7	X= 53,7 x 37,3	(N= 7)

Pesos

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 39,5
De la Peña (2013c): cáscaras 2,242 (N= 1)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Plumón blanquecino amarillento con puntos y estrías oscuras, dorsalmente. Ventralmente blanquecino.

Generalidades

Quintana y Yorio (1996). Período de incubación, 29 días.

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* en Chubut, García et al. (2014)
De pichones: *Larus dominicanus* en Chubut, Silva et al. (2010)
De huevos: *Larus dominicanus* en Chubut, Yorio y Quintana (1997)

Más información:
Yorio et al. (1999). Quintana y Yorio (1997a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Plumas nucales alargadas. Pico negro con punta amarilla.

Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Thalasseus sandvicensis acuflavidus (Cabot, 1848) migratorio de Norteamérica. Llega a las costas de Buenos Aires. *Thalasseus sandvicensis eurygnatha* (Saunders, 1876) por la costa, desde Buenos Aires a Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Se la encuentra en Europa, África, Asia y América donde nidifica desde Virginia a Texas, en la Península de Yucatan, en las Antillas menores. En Sud América nidifica en las costas de Venezuela, Guayana Francesa, del este de Brasil y de Argentina. Una subespecie nidifica en Argentina y otra es migratoria de Estados Unidos a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalasseus sandvicensis acuflavidus (Cabot, 1848)

D.G. Migratorio de Norteamérica. Llega a las costas de Buenos Aires.

Buenos Aires

Citas: Fiameni (1994); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Savigny y Favero (2005)

Thalasseus sandvicensis eurygnatha (Saunders, 1876)

Buenos Aires

Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Deveillers (1977); Favero et al. (2000a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Olrog (1979b); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998c); Yorio (2005a)

Chubut

Citas: Boswall (1973); Bradley et al. (1985); Daciuk (1972a, 1973a, 1976b, 1977b, 1977c); De la Peña (2013c); García et al. (2014); Gatto et al. (2005); Quintana y Yorio (1999); Sainz-Trápaga (2014); Silva et al. (2010); Yorio (2005); Yorio et al. (1994b, 1998a); Yorio y Quintana (1997)

Río Negro
Citas: Daciuk (1972a); Gelain y Tolosa (2011); González (1991); Llanos et al. (2011); Povedano (2016); Yorio (2005a)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Junge y Voous (1955); Nasca et al. (2004); Olrog (1979b); Saunders (1896); Yorio (2005a); Zapata (1965a, 1969)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998)

GAVIOTÍN REAL *Thalasseus maximus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Gaviotín mayor de pico anaranjado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-51 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 1 (M) 500,0 g; N= 1 (H) 500,0 g
Lisnizer et al. (2014): N= 9 (M) X= 477 g (Rango: 445 a 510); N=10 (H) X= 454 g (Rango: 405 a 510)

Coloración. Pico rojo. Patas negras. Iris pardo oscuro.
Corona y plumas nucales alargadas, negras. Frente, rabadilla, partes ventrales, borde de las alas y cola blancos.
Partes dorsales grises.
Alas grises con las primarias más externas gris oscuro.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Grita fuerte.

Alimentación
Favero et al. (2000a). **Peces:** *Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Paralonchurus brasiliensis.* **Insectos. Crustáceos.**
Quintana y Yorio (1997a). **Peces:** *Engraulis anchoita, Odontesthes* sp., *Pleoticus muelleri, Seriolella porosa, Sprattus fueguensis, Stromateus brasiliensis.*
Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Netuma barbus, Paralonchurus brasiliensis.*
Gatto y Yorio (2009). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Odontesthes nigricans, Raneya fluminea, Stromateus brasiliensis.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** *Engraulis anchoita.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces**.
Oscar, D. (2017). **Peces:** Pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 20/05/2019.
Palonsky, R. A. (2018). **Peces:** Pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 20/05/2019.

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.
En el suelo. Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Korschenewski (1969b). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1967.
Boswall y Pytherch (1972). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, nidificando en 1969.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1990, colonias con nidos.
Quintana y Yorio (1996a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, colonias de nidificación.
Devilliers (1977). Buenos Aires. Nido.
Yorio y Quintana (1997). Chubut. Nido.
Yorio et al. (1998c). Banco Culebra, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islote Luisoni, Isla Chata, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Ezquerra, Isla Isabel Norte, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio (2005a). G. Harris, observó nidificando en 1988, en Punta León, dpto. Rawson, Chubut. G. Punta observó nidos a fines de la década de 1980 en Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
Harris (2008). Chubut. Nido.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
Medidas: diámetro total: de 12 a 15 cm y profundidad: 1,5 a 2 cm.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.
Marinao et al. (2015). Buenos Aires.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c.). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, se hallaron entre 45 a 50 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 25 a 30 cm de diámetro y de 3 a 4 cm de profundidad, postura de 1 huevo.

Huevos
Pone 1 huevo. Ovoidales. De color crema o verde pálido con pintas y manchitas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
De la Peña (2013c): 60 a 65,1 x 43,6 a 45,8 X= 62,5 x 44,7 (N= 2)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 62,1 a 65,6 x 42,6 a 43,5 X= 63,8 x 43,1

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 3,969 a 4,846 X= 4,407 (N= 2)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Dorsalmente blanquecino con manchas negras. Ventral blanco.

Generalidades
Quintana y Yorio (1996a). Período de incubación, 29 días.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Chubut, García et al. (2014)
De pichones: *Larus dominicanus* en Chubut, Silva et al. (2010)
De huevos: *Larus dominicanus* en Chubut, Yorio y Quintana (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grueso, rojo. Copete. Cola ahorquillada.

Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thalasseus maximus maximus (Boddaert, 1783) por la costa desde Buenos Aires a Patagonia. Nidifica en Chubut, Santa Cruz y en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en América y en la costa Atlántica de África.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalasseus maximus maximus (Boddaert, 1783)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Devillers (1977); Favero et al. (2000); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2017a);

Pereyra (1938b); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998)

Chubut
Citas: De la Peña (2013c); García et al. (2014); Gatto et al. (2005); Quintana y Yorio (1998b, 1999); Savigny et al. (2005b); Sainz-Trápaga (2014); Silva et al. (2010); Straneck (1990a); Yorio et al. (1994b); Yorio y Quintana (1997)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1991); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Gandini y Frere (1998b); Yorio (2005a)

Tierra del Fuego
Citas: Savigny et al. (2005b)

Malvinas
Citas: Wood (1988)

Mares
Citas: Savigny (2002c)

RAYADOR

FAMILIA: RYNCHOPIDAE

Aves acuáticas de pico característico: la parte superior es más corta que la inferior.
Las alas son largas y estrechas. Las patas cortas, con membrana interdigital.
Se alimentan de peces y de insectos acuáticos.
Nidifican en colonias.

RAYADOR *Rynchops niger* Linnaeus, 1758

Otros nombres: Cortador de agua. Pico tijera.

DESCRIPCIÓN
Largo: 44-50 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 7 (?) X= 285,6 g (Rango: 195 a 380)

Coloración. Pico rojo en la base, resto negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Frente, cara y parte ventral blancas. Partes dorsales negras.
Alas negras con puntas de las secundarias blancas. Ventralmente las alas son grisáceas.
Cola parda con las plumas más externas blancas.
Plumaje de reposo sexual.
Las partes dorsales son pardas oscuras y un collar blanco en dorsal del cuello.
Juvenil. Moteado de pardo en las partes dorsales.
La raza *R. r. cinerascens*, se diferencia de la anterior por tener la franja alar muy angosta, ventral de las alas parda y la cola parda sin blanco.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Vuela a ras del agua con la mandíbula semisumergida, para capturar peces.

Alimentación
Mariano-Jelicich et al. (2003). **Peces:** *Anchoa marinii, Engraulis anchoita, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Pomatomus saltatrix.*
Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Odohesthes incisa.*
Mariano-Jelicich y M. Favaro. (2005). **Peces:** *Odontesthes argentinensis, Odonhesthes incisa.*

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces.**

HÁBITAT
Ríos, lagunas, lagos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Entre Ríos, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.
En el suelo. En bancos de arena, en ríos. Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 21-10-1922, 17-11-1922, 19-09-1926, 03-10-1926, huevos.
Kliamitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, una colonia junto a *Charadrius collaris* y *Sternula superciliaris.*
De la Peña (2013c). Total de colonias: 12. Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-10-1977, nidos junto a *Sternula superciliaris* y *Phaetusa simplex,* huevos y pichones; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, un huevo; 22-11-1977, Pueblo Brugo, Río Paraná, dpto. Paraná, Entre Ríos, 5 nidos: 4 huevos, 2 pichones, 4 huevos, 3 huevos y un pichón; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-11-1978, huevos (10 nidos); Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 23-10-1981, huevos (3 nidos); Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, colonia junto a *Sternula superciliaris* y *Phaetusa simplex,* huevos y pichones; Río Paraná (La Paz), dpto. La Paz, Entre Ríos, 10-11-1994, pichones; Río Paraná (Goya), dpto. Goya, Corrientes, 26-08-1995, colonia junto a *Phaetusa simplex,* huevos y pichones. Medidas: diámetro total: de 15 a 25 cm, profundidad: 3 a 5 cm.
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, se halló una colonia compuesta de 18 nidos, en un extremo de un banco de arena, 5 nidos contenían 2 ó 3 pichones de pocos días de vida: Los 13 restantes tenían de 2 a 4 huevos.

Huevos
Pone 4 huevos. Ovoidales. De color crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Uno de los huevos tiene base amarillenta.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 45,0 a 46,5 x 30,0 a 34,0
Klimaitis y Moschione (1984): 42, 6 a 45,8 x 31,8 a 34,5 X= 44,0 x 33,3 (N= 6)
De la Peña (2013c): 42,5 a 45,7 x 30,8 a 34,5 X= 44,7 x 33,2 (N= 13)
Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 32,1 a 34,1 x 40,6 a 45,9 X= 42,9 x 32,9 (N= 24)

Pesos

Salvador y Narosky en De la Peña (2016c): 21,6 a 25,5 X= 23,8 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,225 a 1,698 X= 1,528 (N= 12)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Pico rojizo. Dorsalmente crema amarillento moteado de negruzco. Ventral blanquecino.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Alas largas. Plumaje negro y blanco. Pico comprimido lateralmente, con el maxilar superior más corto que el inferior. Forma de capturar a los peces.

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Colón. Entre Ríos. 10-01-2005

Río Paraná. Pueblo Brugo. Entre Ríos. 22-11-1977

Isla Yaguareté. Goya. Corrientes. 26-08-1995

Campo Andino. Santa Fe. 01-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Rynchops niger cinerascens Spix, 1825 nidifica en el norte de Sudamérica. Observado en Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y *Rynchops niger intercedens* H. Saunders, 1895 desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y por la costa hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. A las dos subespecies sudamericanas se les suma *Rynchops niger niger* que nidifica en Estados Unidos por la costa en Golfo de Mejico, Peninsula de Florida y costa Atlántica.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Rynchops niger cinerascens Spix, 1825

Buenos Aires
Citas: Delhey et al. (2001c); Olrog (1979b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador et al. (2017); Torres y Michelutti (2001a)

Santa Fe
Citas: Hartert y Venturi (1909)

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Rynchops niger intercedens H. Saunders, 1895

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mariano-Jelicich, et al. (2003); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1882)

Catamarca
Citas**:** Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019), Isla del Cerrito, noviembre y diciembre de 1998 y 1999, arroyo Tragadero y Puerto Antequera, dpto. 1º de Mayo, Isla del Cerrito, costa del río Paraguay, dpto. Bermejo.

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador et al. (2017); Torres y Michelutti (2001a); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); De la Peña (2013c); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: Bruno y Erro (2010); Maceda et al. (1999)

Mendoza
Citas: Lucero y Chebez (2011); Sosa (1995d, 2003)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Luna et al. (2008); Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Humphrey y Bridge (1970)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2017); Torres y Michelutti (2001b)

Observaciones: Salvador, S. (Río Dulce, cerca de Loreto, dpto. Loreto, octubre 2007)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Imberti (2003); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)

AMBIENTES, LUGARES, EXCURSIONES

1977-1978

1977. Cachipampa. Salta

1977. La Quiaca. Jujuy

1977. Cuesta de Miranda. La Rioja

1977. Patquía. La Rioja

1977. Arroyo Leyes. Santa Fe



1977. Arroyo Leyes. Santa Fe. Nido Martín pescador

1977. Esperanza. Santa Fe

1977. Esperanza. Santa Fe. Filmación

1977. Monte Vera. Santa Fe. Colonia de Biguá.

1978. Cachipampa. Salta. Nido de Cacholote

1978. Tartagal. Santa Fe. Busqueda nido de Guaicurú.

1978. Esperanza. Santa Fe.