Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2020 | N° 8 | Pág. 1-294| ISSN 0325-3856

AVES ARGENTINAS

Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución

(ACTUALIZACIÓN)

Martín R. de la Peña

TOMO 8

Furnariidae

MUSEOAMEGHINO

Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2020 | N° 8| Pág. 1-293| ISSN 0325-3856

Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución
(ACTUALIZACIÓN)

TOMO 8

Furnariidae

2020

Martín R. de la Peña

Colaborador: Alejandro Bodrati

CAMINERAS, BANDURRITAS, REMOLINERAS, CANASTEROS, ESPINEROS

FAMILIA: FURNARIIDAE

Aves que generalmente tienen el pico y la cola, largos. Las alas cortas. Algunas especies se parecen a los Carpinteros por su manera de trepar por los troncos y ramas de los árboles.
Varias especies tiene el pico largo, a veces muy curvo.
De hábitos arborícolas o terrícolas.
Se alimentan de arañas, larvas e insectos.
Construyen el nido en cuevas, grietas, huecos en árboles o en las barrancas, arbustos, pajonales, juncales.
Frecuentan praderas arboladas, áreas rurales, parques y jardines en áreas urbanas, serranías, montañas, montes y selvas.

Subfamilia: *Sclerurinae*

RASPAHOJAS *Sclerurus scansor* (Ménétriés, 1835)

Otros nombres: Ogaraití. Raspa-hojas ogaritĺ.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Darrieu (1986): N= 2 (H) 35 y 39,3 g

Coloración. Pico negro con la base de la mandíbula blanquecina. Patas pardas oscuras. Iris pardo.
Cabeza negruzca. Dorsal negruzca con tono castaño. Rabadilla castaña. Garganta blanquecina punteada de pardo oscuro. Ventral castaña con leves estrías ocráceas en el pecho. Alas pardas oscuras. Cola negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

En Brasil:
Duraes y Marini (2005). **Insectos:** Blattaria (ootecas), Coleoptera (larvas y adultos), Heteroptera, Hymenoptera (Formicidae), Lepidoptera (larvas), Neuroptera (larvas). **Arácnidos:** Araneae.
Manhaes et al. (2010). **Insectos:** Blattaria, Coleoptera, Dermaptera, Hymenoptera (Formicidae), Isoptera, Mantodea, Orthoptera. **Arácnidos:** Araneae, Opilionida.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Nido en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Niifica en huecos.

Bodrati, A. en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019), Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones. Tres nidos. Nido, 14-09-2008, túnel excavado en la pared vertical del borde de un viejo camino vehicular en medio de la selva, 2 huevos incubados. Nido encontrado en construcción el 27-10-2014, y con dos huevos blancos el 31-10- 2014. En la misma pared que el nido anterior, la entrada bastante oculta por vegetación que cuelga de la pared o la que crece al pie de la misma. La entrada del nido está a 61 cm de altura respecto al suelo, 23-11-2014 tenía 2 pichones, un adulto estaba junto a la entrada con una pupa de Lepidóptera. El 02-12-2014 aún contenía dos pichones. El 15-09-2016, otro nido en el sector del nido anterior, túnel en la pared 2 huevos incubados, el 28-09-2016 los pichones recién nacidos con restos de huevos dentro de la cámara.

Huevos
Pone 2 huevos blancos. Bodrati (*in litt.* 2019)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Oscuro con la garganta blanquecina. Pecho y rabadilla castaños. Pico largo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sclerurus scansor scansor (Ménétriés, 1835) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Poblaciones separadas, una en en el noreste de Brasil y la otra en el centro y sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sclerurus scansor scansor (Ménétriés, 1835)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Castia et al (2008); Darrieu (1986)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Contreras et al. (1994a); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2008-2009); Navas y Bó (1988b); White (1882)

CAMINERA ESTRIADA *Geositta cunicularia* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Alondra minera. Barranquera. Caminante. Caminera. Caminera del Este. Caminera del Sur. Caminera picolargo. Carreritas. Caserita. Correcaminos. Meneacola. Minera. Minerita común. Minero argentino. Mujer del zorro chico. Pampita. Zanjeadora.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 8 (?) X= 29,5 g (Rango: 28,9 a 30,2)
Navas y Bó (1987a): N= 1 (M) 33,8 g (*titicacae*)
Salvador (1988): N= 1 (M) 27 g
Salvador (1990a): N= 3 (?) 30,5, 30,5 y 31,5 g
Camperi (1992c): N= 2 (M) 25,0 y 29,0 g; N= 2 (H) 31,0 y 31,0 g
Christie et al. (2004): N=1 (M) 29 g; N= 1 (H) 26 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 26 g
Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 29, 4 g (Rango: 28,2 a 30,3)

Coloración. Pico: maxila gris negruzca, mandíbula gris negruzca con base parda. Patas pardas negruzcas. Iris pardo oscuro.
Dorso pardusco. Corona con estrías oscuras. Cejas blancas. Ventralmente ocráceo. Pecho "escamado" de pardusco. Alas canelas con las puntas pardas oscuras. Secundarias y cubiertas orilladas de ocráceo. Cola negra con base canela.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos terrícolas como otras del género. Es muy caminadora. Canto suave, posada o en vuelo.

Alimentación

Zotta (1936g). **Insectos:** Coleópteros. Hormigas.
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Coleoptera. Moscas.
Contreras (1979e). **Insectos:** Hemiptera (Lygacidae). Hormigas. **Vegetales:** Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Dermaptera. Hymenoptera (Formicidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres).

Voces

Straneck en De la Peña (2016d). Su canto, que generalmente complementa con un vuelo de despliegue, es un sostenido y poco musical trino Chrrrrirrrriirr.....

HÁBITAT

Estepas, praderas, arenales, terrenos montañosos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N

Construye el nido en cuevas o túneles, en barrancas, en el suelo o en grietas o huecos.
Acolcha la base de la cámara con pastos. Oculto. Elaborado.

Partridge (MACN), en Fraga y Narosky (1985). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, 27-09-1961, 2 huevos.
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas desde agosto a noviembre.
Holland (1892). Buenos Aires. Nido.
Hartert y Venturi (1909). Dinelli encontró en noviembre, en Jujuy, nido con pichones.
Hartert y Venturi (1909). Tucumán, Buenos Aires. Nidos.
Grant (1911a). Cabo San Antonio, pdo. de la Costa, Buenos Aires, 23-12-1909, 3 huevos.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos. Nidos en cuevas, pone 5 huevos.
Wilson (1926). Santa Fe. Dpto. Gral. López. Nido en un túnel de 1,50 m de largo.
Wetmore (1926a). Río Negro. Nido.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica en cuevas.
Pereyra (1937c). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, nidos en barrancas, 22-09, un huevo y 12-10, 3 huevos.
Pereyra (1937b). La Pampa, nidifica.
Humphrey et al. (1970). Reynolds en Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, 12-10 y 29-10, pichones.
Masramón (1971). San Luis, nidifica en cuevas.
Narosky (1975). Pdo. San Vicente, Buenos Aires, 17-09-1971, 3 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre agosto y enero.
Contreras (1979e). Río Collón Curá. dpto. Collón Curá, Neuquén, nido en cueva en la barranca, 09-12, pichones.
Höy (1980b). Cachipampa, dpto. Cachi, Salta, 16-11-1975, 2 huevos.

Darrieu y Camperi (1990). Corrientes. Nido.
Masramón en Narosky et al. (1983). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 26-10-1969, un huevo.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Pdo. Roque Pérez, Buenos Aires, 09-10-1970, pichones. La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, Córdoba, 18-08-1972, cavando cuevas.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz. Nidifica entre noviembre y enero, en cuevas o grietas.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nidifica en noviembre-diciembre.
De la Peña (2013c). La Esperanza, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 10-11-1979, cueva en el suelo, 3 huevos; Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 3 nidos: 06-12-1981, hueco en una barranca, sin postura; 06-12-1981, hueco en una barranca, 2 huevos y 21-11-1982, hueco en pared pedregosa, 3 pichones. Medidas de nidos: Diámetro del túnel: de 8 a 10 cm. Largo del túnel: de 38 a 70 cm. Diámetro de la cámara: de 8 a 9 cm.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 5 nidos. Se reproduce de setiembre a diciembre. Posturas de 2 a 3 huevos.
Bodrati en Salvador (2016a). San Juan. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
WFVZ, sin datos colector en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
WFVZ, Pemberton, J. en Salvador (2016a). Río Negro, Santa Cruz. Nidos.
Rumboll, M. en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.



La Esperanza. Santa Cruz. 10-11-1979

Los Gigantes. Córdoba. 06-12-1981 Ubicación nido	Los Gigantes. Córdoba. 21-11-1982

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Smyth (1928): 25,0 x 18,0		
Pereyra (1938b): 25,0 x 19,0		
Masramón (1971): 25,0 x 18,0		
Narosky (1975): 24,0 a 24,3 x 18,2 a 18,8	X= 24,1 x 18,5	(N= 3)
Höy (1980b): 24,9 a 25,0 x 19,0 a 19,6	X= 24,9 x 19,3	(N= 2)
De la Peña (2013c): 23,4 a 24 x 19,0	X= 23,7 x 19	(N= 3)
Salvador (2013b): 23,7 a 24,9 x 18,1 a 19,2	X= 24,2 x 18,6	(N= 12)

Peso

Salvador (2013b): 4,2 a 4,8	X= 4,5	(N= 9)
De la Peña (2013c): cáscara 0,19 a 0,20	X= 0,195	(N= 3)

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris pardusco. Comisuras blancas. Interior de la boca amarillo.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 4,1 y 4,2 g

Generalidades
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres.
Darrieu y Camperi (1990). Dos hembras con huevo para poner en setiembre y octubre.

Depredadores
De adultos: *Tyto alba* en Chubut, Noriega et al. (1990), *Falco peregrinus* en Santa Cruz, Santillán et al. (2010b)

Más información:
Holland (1892). Gibson (1918). Hudon (1974). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas notables. Pecho “escamado”. Cola negra con base canela.
Se parece a la Caminera puneña, pero es más oscura la parte dorsal y tiene el pecho jaspeado.
De la Caminera patagónica se diferencia por tener el pico más largo, más “escamado” ventralmente y más rojizo en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Geositta cunicularia titicacae Zimmer, 1935 desde el oeste de Jujuy y de Salta hasta Mendoza; *Geositta cunicularia contrerasi* Nores & Yzurieta, 1980 en las sierras grandes de Córdoba; *Geositta cunicularia hellmayri* J. L. Pepers, 1925 en regiones montañosas del oeste de Río Negro, Neuquén y Chubut. En invierno en zonas llanas de Río Negro, Mendoza y San Juan; *Geositta cunicularia cunicularia* (Vieillot, 1816) desde regiones llanas del este de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes hacia el sur, hasta Tierra del Fuego por el este patagónico.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Amplia área de distribución en diferentes habitats desde centro de Perú ysur de Brasil hasta Tierra del Fuego. Comprende: Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geositta cunicularia titicacae J. T. Zimmer, 1935

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995); Vides Almonacid (1999) (*)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 18-12-1999)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Antelo (2001); Budin (1931); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2020); Chebez et al. (1998); Esteban (1951); Hartert y Venturi (1909); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Navas y Bó (1987a)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras y Höy (1980); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Höy (1980b); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, dpto, Cafayate, 08-12-1972)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i, 2020c)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

Geositta cunicularia contrerasi Nores e Yzurieta, 1980

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1980a); Partridge (1953c); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003)

Observaciones: De la Peña (La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, 24-06-1972)

Geositta cunicularia hellmayri J. L. Pepers, 1925

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Daguerre (1922); Fiameni (1994)

Chubut
Citas: Contreras (1979e); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Vuilleumier (1993b)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Burmeister (1861); Contreras (1979g); Contreras y Höy (1980); Darrieu y Segura (2015); Esteban (1951); Martinez et al. (1997a); Navas y Bó (1987a); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Chehebar et al. (1992) (*); Contreras (1974, 1975, 1977b, 1979f) (*); Esteban (1951); Heredia y Funes (1987) (*); Horváth y Topal (1963) (*); Matarasso (2007); Navas y Bó (1987a) (*); Pereyra (1945) (*); Fiori y Zalba (1999) (*); Veiga et al. (2005) (*); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Contreras (1975, 1979b); Dacuik (1978c); Gelain (2001, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Gelain et al. (2003); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Las Bayas, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Esteban (1951); Lucero (2013f); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Tucumán
Citas: Capllonch et al. (2011b, 2020); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Geositta cunicularia cunicularia (Vieillot, 1816)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Camperi (1992a); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Esteban (1951); Grant (1911a); Hartert y Venturi (1909); Marelli (1933); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1937b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Bolívar, pdo. Bolivar, 02-11-1979)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Camperi (1998); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990)

Chubut
Citas: Noriega et al. (1990)

Observaciones: De la Peña (Puerto Madryn, dpto. Biedma, 04-11-1979)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Esteban (1951); Muzzachiodi et al. (2003); Serié y Smyth (1923)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998) (*); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001) (*); Tejerina et al. (2006) (*); Siegenthaler (2004 (*)

Mendoza
Citas: Contreras y Höy (1980); Lucero (2013f)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1979e); Gorgoglione (2005)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b); Piacentini et al. (2003)

Observaciones : De la Peña (Las Bayas, dpto. Ñorquinco 04-02-1976)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Salvador (1990a)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Dabbene (1919c); Darrieu et al. (2009); De la Peña (2013c); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Esteban (1951); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Santillán et al. 2010b)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Clark (1986); Earnshaw (1973); Esteban (1951); Olrog (1948); Humphrey et al. (1970)

CAMINERA PICUDA *Geositta tenuirostris* (Lafresnaye, 1836)

Otros nombres: Agachadera de pico largo. Caminera de pico largo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Krabbe (1992): N= 7 (M) X= 34,3 g (Rango: 29 a 42,5); N= 3 (H) X= 33,2 g (Rango: 32 a 35,5).

Coloración. Pico negro con la base de la mandíbula más clara. Patas negras. Iris pardo.
Cejas claras. Dorsal parda con la corona jaspeada de oscuro. Ventral ocrácea jaspeada de pardo a los lados del cuello y en el pecho. Alas canelas y pardas oscuras. Cola canela con las plumas centrales y la punta pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Olrog (1956a). Insectos. Arácnidos.

HÁBITAT
Estepas pedregosas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Construye el nido en túneles, en barrancas de tierra.

Salvador et al. (1984). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22-12-1983, nido en una barranca de tierra y piedras, en un camino ripiado. El nido estaba a 0,80 m del suelo y la barranca tenía 1,20 m de altura. El túnel mide 60 cm de largo y la cámara tiene 14-15 cm de diámetro. El lecho del nido es un casquete chaco de gramíneas y pelos de vacunos. Tenía 2 huevos.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15-11-2003, nido con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Salvador et al. (1984): 27,0 a 27,6 x 20,0 a 20,1 (N= 2)
Salvador (2015): 26,9 x 19,8 y 27,2 x 19,9

Peso
Salvador et al. (1984): 5,5 y 5,7

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo y curvo. Cola corta. Corona, lados del cuello y del pecho levemente jaspeados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geositta tenuirostris tenuirostris (Lafresnaye, 1836) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geositta tenuirostris tenuirostris (Lafresnaye, 1836)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Esteban (1951); Monteleone y Roesler (2005)

La Rioja
Citas: Lobo Allende et al. (2014); Nores y Yzurieta (1981)

Mendoza
Citas: Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Martínez et al. (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Esteban (1951); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador et al. (1984); Salvador (2015)

CAMINERA PATAGÓNICA *Geositta antarctica* Landbeck, 1880

Otros nombres: Caminera. Caminera antártica. Caminera austral. Caminera de diadema. Caminera de pico corto. Caminera flancos rufos. Minera.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm
Peso: Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 36,5 g; N=1 (H) 32 g

Coloración. Pico negro, mandíbula más clara. Patas negruzcas. Iris pardo.
Cejas blanquecinas. Dorsal pardusca. Ventral ocrácea "escamada" de pardo. Alas pardas con tono canela. Puntas más oscuras. Banda ocrácea con tono canela en las supracaudales. Cola negruzca con la base y las plumas externas ocre con tono canela.

COMPORTAMIENTO
Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una sucesión de sílabas yrec.. yrec.. yrec.. yrec.. yrec.. agudas y ásperas.

HÁBITAT
Estepas patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Nidos y pichones en Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Construye el nido en túneles en barrancas. Acolcha la cámara con pastos.

Olrog (1948). Tierra del Fuego. Nido.

Woods (1982). Islas Malvinas. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 24,2 a 25,4 x 17,7 a 18,0

PICHONES
Observaciones
Pagano, L. en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.

Más información:
Goodall et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico corto.Ventral ocrácea con "escamado" poco notable.
Alas pardas, sin destacarse tanto el canela como en otras camineras. Cola negruzca con la base y las plumas externas ocráceas.
Diferenciarla de la Caminera estriada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geositta antarctica Landbeck, 1880 en Tierra del Fuego, Santa Cruz y las islas Malvinas. En invierno migra hasta Mendoza y San Juan.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el sur de Chile y de Argentina. Migra hacia el norte en invierno.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Bianchini y Arenas (2013b); Vidoz (1995)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Darrieu y Segura (2015); Esteban (1951); Ferrer et al. (2019); Lucero (2011c); Pereyra (1927e, 1942a); Contreras y Höy (1980)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Chehebar et al. (1992); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Ralph (1985); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

San Juan

Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2011c, 2013i)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Di Giacomo et al. (2005); Esteban (1951); Imberti (2005e); Pagano y Salvador (2017); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 30-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Esteban (1951); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

CAMINERA GRANDE *Geositta isabellina* (R. A. Philippi y Landbeck, 1864)

Otros nombres: Caminera baya. Caminera de alas largas. Caminera grande pálida. Caminera isabelina. Caminera morada. Caminera negra. Pachurra amarillenta.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 7 (M) X= 41,9 g Rango: 38,4 a 45,0), N= 9 (H) X= 41,7 g (Rango: 35,2 a 47,5)
Coloración. Pico negruzco. Patas gris negruzcas. Iris pardo oscuro.
Cejas claras. Dorsal pardusca con tono ocráceo. Ventral blanquecina. Alas canelas con puntas pardas. Supracaudales ocráceas. Cola negra con la base y las plumas externas ocre con tono canela.

HÁBITAT
Estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Mendoza.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Construye el nido en cuevas o cavidades. Acolcha la cámara con pastos y plumas.

Uranga, M. en De la Peña (2019b). Reserva Natural Laguna del Diamante, dpto. San Carlos, Mendoza, 22-12-2017. A 3600 msnm, bajo una roca en un valle el cual era atravesado por un arroyo. El nido se encontraba a 10 m del agua. Cueva o cavidad natural bajo una piedra de 80 cm de largo aproximadamente. El túnel presentaba mucho material vegetal suave, tipo pelusa. La cámara era simplemente este material y plumas. Contenía 3 pichones recién nacidos.

Observaciones
Navas y Bó (1987a). Las Cuevas, Mendoza, diciembre de 1963, hembra con un huevo por poner.

Más información:
Goodall et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico y alas relativamente largos. Ventral blanquecina uniforme. Supracaudales ocráceas. Cola negra con la base y las plumas externas ocráceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geositta isabellina (R. A. Philippi y Landbeck, 1864) entre los 2000 y los 3500 m de altura en Mendoza y San Juan. También Neuquén. Posiblemente también más al norte, hasta La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Centro de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Koslowsky (1895b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Camperi et al. (2013); Dabbene (1919d); Monteleone y Roesler (2005)

La Rioja
Citas: Canevari et al. (1991b); Spinuzza (2012)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Canevari et al. (1991b); Chebez et al. (1993); Contreras y Höy (1980); Dabbene (1919d); Darrieu y Segura (2015); Esteban (1951); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Fitzgerald (1899); Martínez et al. (2009); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942a); Reed (1916); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Veiga et al. (2005)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Canevari et al. (1991b); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2016)

CAMINERA PUNEÑA *Geositta punensis* Dabbene, 1917

Otrps nombres: Caminera chica. Caminera de la puna. Caminera pálida. Pizcarra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2010): N= 6 X= 27,5 g (Rango: 35 a 25)

Coloración. Pico: maxila negra. Mandíbula negruzca con fina base crema. Patas pardo grisáceas. Iris pardo oscuro. Cejas claras. Dorsal parda. Ventral blanquecina grisácea. Alas canelas con banda subterminal parda oscura. Cola canela con ancha banda subterminal parda oscura.

HÁBITAT
Estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									

Construye el nido en cuevas o túneles.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1995, 3 pichones. El nido se hallaba en una pequeña barranca de tierra sobre un cauce seco, en un túnel a 1,2 m de altura, con una boca de 9 x 11 cm y una profundidad de 55 cm, casquete de gramíneas y finos tallos de 10 cm de diámetro y 1,5 cm de altura.
De la Peña (2013c). Abra Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 04-02-1977, cueva en el suelo, pichones.
Un pichón estaba parado en la entrada del nido.
Salvador (2015). Cortaderas, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, nido con un pichón.

Huevos
Pone 2 o más huevos, blancos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 22,7 a 26,4 x 16,9 a 18,8

Pichones
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Le estaban apareciendo algunas plumitas, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo.

Abra Pampa.Jujuy. 04-02-1977. Ubicación nido

Paso de Jama. Jujuy. 09-02-2018. Foto: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal parda. Ventral blanquecina. Alas canelas. Cola canela con banda subterminal oscura.
Diferenciarla de la Caminera estriada y de la Caminera colorada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geositta punensis Dabbene, 1917 entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Entre 3000 y 4000 metros de altura en Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Cory y Hellmayr (1925); Esteban (1951); Salvador (2015); Vides-Almonacid (1986)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1998); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2020); Chebez et al. (1998); Cory y Helmman (1925); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Esteban (1951); Mamaní et al. (2018); Mogensen (1930); Navas y Camperi (1999); Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca 22-02-1979; Cieneguillas, dpto. Sta. Catalina 10-02-1983)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007)

Salta
Citas: Blendinger (1998); Esteban (1951); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz et al. (2013, 2016)

CAMINERA COLORADA *Geositta rufipennis* (Burmeister, 1860)

Otros nombres: Barranquera. Caminante. Caminera andina. Caminera grande. Caminera grande colorada. Caminera rojiza. Caminera sombrerera. Minera bandas rufas. Minerita de las piedras. Pachurra. Palomita. Quesero. Sombrerero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 74 X= 47,4 g (Rango: 41,2 a 54,5)
Contreras (1976): N= 41 (M) X= 47,4 g (Rango: 41,2 a 54,5), N= 34 (H) X= 47,4 g (Rango: 41,5 a 43,5) (*giaii*)
Contreras y Davies (1980): N= 7 (M) X= 38,9 g (Rango: 31,4 a 46,5), N= 8 (H) X= 36,7 g (Rango: 27,0 a 41,9)
Navas y Bó (1987a): N= 13 (M) X= 46,5 g (Rango: 41,5 a 51,6); N= 4 (H) X= 46,67 g (Rango: 45,0 a 47,9) (*ottowi*)
Navas y Bó (1987a): N= 6 (M) X= 46,8 g (Rango: 40,9 a 51,4), N= 2 (H) X= 45,6 g (Rango: 44,0 a 47,2) (*giaii*)
Navas y Bó (1987a): N= 7 (M) X= 40,8 g (Rango: 36,2 a 43,3), N= 8 (H) X= 42,1 g (Rango: 35,8 a 56,7) (*hoyi*)
Navas y Bó (1990); 4 (M) 45,1, 49,5, 50,6 y 51,3; N= 1 (H) 44,0 g
Salvador (1990a): N= 2 (M) 44,5 y 48,0 g; N= 1 (H) 46,2 g
Christie et al. (2004): N= 1 50,0 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 58 g (*giaii*)

Coloración. Pico: maxila negruzca, mandíbula negruzca con base córnea. Patas gris pizarra. Iris pardo oscuro. Cejas blanquecinas. Dorsal pardusca. Ventral ocrácea blanquecina. Alas canelas con pardo oscuro y puntas ocráceas. Cola canela con ancha banda subterminal parda oscura.

COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja. En invierno en grupos.

Alimentación
Contreras (1980b). **Vegetales:** Compuestas (hojitas tiernas). Gramíneas (hojitas tiernas).
Christie et al. (2004). **Vegetales:** Semillas.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semillas (no determinadas). Verbenáceas (semillas).

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una potente y áspera serie de agudas notas, Yrrrit..Yrrrrit..yrrrrit..

HÁBITAT
Estepas altoandinas y terrenos rocosos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Construye el nido en cuevas excavadas en barrancas terrosas o rocosas, en grietas o entrepiedras. Acolcha la base con pajitas, pelos, lanas, plumas. Oculto. Elaborado.

Pemberton (W.F.). Arroyo Curnallo, Río Negro, 17-01-1912, en una grieta, 3 huevos.
Reed (1919). Casa de Piedra, dpto. Las Heras, Mendoza, nido.
Narosky en Narosky et al. (1983). Chorrillos, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-01-1979, 2 huevos.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Las Cuevas, dpto. Iturbe, Jujuy, 28-02-1983, un pichón volador; Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, 2 huevos.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 17-12-1983, 2 nidos con pichones. 20-12-1986, nido con 2 pichones. Los 3 nidos en grietas entre las rocas.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nido en diciembre.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 24-02-1995, 3 huevos. El nido se hallaba en una barranca de tierra sobre un cauce seco, a 3 m de altura en un túnel de 8 cm de boca y 1,05 m de profundidad, casquete bien elaborado de finas gramíneas y recubierto en su interior de abundantes pelos de roedores y de cabras, con un diámetro de 13 cm y una altura de 2,5 cm.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, entre los años 1982 y 2006 se localizaron 9 nidos, desde octubre a diciembre.
De la Peña (2013c). 4 nidos: 06-12-1977, Cachipampa, dpto. Cachi, Salta, cueva en una barranca, 3 huevos; 23-02-1979, Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, cueva en una barranca, 3 huevos; 07-02-19-1983, Humahuaca, cueva entre piedras, 1 huevo; 25-11-1990, Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, grieta en la piedra, en construcción.
Medidas: Diámetro del túnel: de 8 a 11 cm. Largo del túnel: de 0,95 a 1,15 m. Diámetro de la cámara: de 15 a 17 cm. Diámetro total del casquete: de 14 a 17 cm. Diámetro interno: de 9 a 12 cm. Profundidad: 1 cm. Alto: 5 cm.
Salvador (2015).Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 2 pichones. Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 24-02-1995, 3 nidos: uno con 3 huevos, los otros con 2 huevos cada uno. Cerro Famatina, dpto. Famatina, La Rioja, 04-11-1985, nido con 2 pichones.
WFVZ. Goodall, J. en Salvador (2016a). Mendoza. Nido.

Salvador, S. en Salvador (2016a). Mendoza. Nido.
MVZ Pemberton, J. en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.



Cachipampa. Salta. 06-12-1977. Ubicación nido

Cachipampa. Salta. 06-12-1977

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Narosky en Narosky et al. (1983): 25,6 a 26,2 x 19,9 a 20,6	X= 25,9 x 20,3	(N= 2)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 26,5 a 27,1 x 19,8 a 20,2	X= 26,8 x 20,0	(N= 2)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 25,3 a 26,6 x 18,9 a 19,3	X= 26,0 x 19,1	(N= 3)
Salvador y Salvador (2012): 26,6 a 27,4 x 19,3 a 19,9	X= 27,2 x 19,5	(N= 3)
De la Peña (2013c): 25,2 a 27,8 x 18,7 a 19,2	X= 26,0 x 18,9	(N= 4)
Salvador (2015): 25,2 a 27,1 x 18,8 a 19,9	X= 26,2 x 19,1	(N= 7)

Peso

Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 5,7		
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 5,0 a 5,3	X= 5,1	(N= 3)
Salvador y Salvador (2012): 5,1 a 5,7	X= 5,4	(N= 9)
De la Peña (2013c): 4,7	X= 4,7	(N= 1)
De la Peña (2013c): cáscara 0,260 a 0,272	X= 0,267	(N= 4)
Salvador (2015): 5,0 a 5,6	X= 5,3	(N= 7)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Tienen las comisuras amarillas y el interior de la boca amarillo fuerte.

Observaciones

Salvador y Salvador (1988, 2012). Ambos integrantes de la pareja alimentan a los pichones.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones

Depredadores
De adultos. Aves: Halconcito colorado (*Falco sparverius*). 20-08-2018. Reserva Natural Villavicencio, Mendoza. Ecoregistros 2019. Perez, E. M. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico corto. Cola rojiza con ancha banda subterminal oscura.
Se diferencia de la Caminera puneña por ser de mayor tamaño y tener más marcado el pardo de las alas y más rojiza la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geositta rufipennis rufipennis (Burmeister, 1860) hasta los 3500 m de altura desde Jujuy, Salta y Tucumán hasta San Juan; *Geositta rufipennis giaii* Contreras, 1976 en el centro y oeste de Río Negro, Neuquén, Chubut y noroeste de Santa Cruz. Posiblemente Mendoza como migrante, *Geositta rufipennis ottowi* Höy, 1968 en Córdoba y San Luis; *Geositta rufipennis fragai* Nores (1986) en La Rioja; *Geositta rufipennis hoyi* Contreras, 1980 en San Juan, Mendoza y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Bolivia, Chile y Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geositta rufipennis rufipennis (Burmeister, 1860)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1951); Navas y Bó (1987); Nores (1995)

Jujuy
Citas: Bruch (1904); Budin (1931); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Helmman (1925); Dabbene (1916-1917, 1919c); Darrieru y Camperi (2006); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Esteban (1951); Harter y Venturi (1909); Mamaní et al. (2018); Narosky et al. (1983); Navas y Camperi (1999); Navas y Bó (1987a); Salvador (2015); Straneck (1990f)

Salta
Citas: De la Peña (2013c); Navas y Bó (1987a); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b); Esteban (1951); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

Geositta rufipennis giaii Contreras, 1976

Chubut
Citas: Navas y Bó (1987a); Vidoz (1995); Vuilleumier (1993b)

La Pampa
Citas: Cenizo et al. (2019) (sin determinación de subespecie)

Mendoza
Citas: Esteban (1951); Ferrer et al. (2019); Navas y Bó (1987a)

Neuquén
Citas: Camperi (1998); Contreras (1975, 1977b); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Navas y Bó (1987a); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras y Davies (1980); Contreras (1976); Esteban (1951); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1987a, 1990); Povedano (2016); Vuilleumier (1993b)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2005e)**;** Pagano y Salvador (2017)

Geositta rufipennis ottowi Höy, 1968

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c); Heredia (2006); Höy (1968a); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Olrog (1979); Ordano (1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, dpto. San Alberto, 14-11-1980)

San Luis
Citas: Chebez et al. (1985); Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Salvador (1990a)

Geositta rufipennis fragai Nores (1986)

La Rioja
Citas: Nores (1986a, 1995); Salvador (2015)

Geositta rufipennis hoyi Contreras, 1980

Catamarca
Citas: Contreras (1980j); Navas y Bó (1987a)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Darrieu y Camperi (2006); Di Giácomo et al. (2007); Nores (1986a, 1995)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Bianchini y Arenas (2013b); Calí et al. (2008); Contreras (1980j); Contreras y Höy (1980); Contreras y Davies (1980); Darrieu y Camperi (2006); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2011); Ferrer (2016); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1942a); Reed (1919), Roig (1965)

Observaciones: De la Peña (Puente del Inca, dpto. Las Heras, 11-01-1982)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Contreras (1980j); Contreras y Davies (1980); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a); Nores (1995)

Subfamilia: Dendrocolaptinae

TAREFERO *Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Trepadorcito común. Trepatronco oliváceo. Verdón. Verdón del norte.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras (1983b): N=2 (M) 13,0 y 12,7 g; N= 2 (H) 11,2 y 12,4 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 1 (M) 12,7 g
Di Giacomo (2005h): N= 4 X= 11,4 (Rango: 10,5 a 12,0)
Alderete y Capllonch (2010): N= 50 X= 13,1 g (Rango: 10 a 20 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 (?) X= 12,6 g (Rango: 11,1 a 14,2)
Capllonch et al. (2015b): N= 2 (?) X= 11 g (Rango: 10 a 12)

Coloración. Pico: maxila pardo negruzca, mandíbula córnea con tinte celeste. Patas grises violáceas. Iris pardo oscuro.
Cabeza parda oscura con tono oliváceo. Dorso pardo con tono castaño. Garganta canela. Pecho y abdomen canelas con tono oliváceo. Alas pardas y castañas con banda canela. Cubiertas internas canelas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario por el estrato medio y alto de los árboles. Trepa por los troncos y ramas.

Alimentación
Esteban (1948): **Arácnidos:** (arañas), (Acaro: garrapata). **Insectos:** Coleoptera (Bruchidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, larvas). Dermaptera (Forficulidae). Hemiptera. Hymenoptera (hormigas). Lepidoptera (larvas y crisálidas).
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattaria (ootecas). Coleoptera. Hemiptera. Hymenoptera. Lepidoptera (larvas y adultos). **Arácnidos:** Pseudoscorpiones. Araneae.
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:** Isoptera (Termitas).
Bodrati et al. (2012a). **Insectos:** Blattaria, Coleoptera (Cerambicidae, Lampyridae, Coccinellidae), Diptera (moscas), Hemiptera (chinches), Hymenoptera (Formicidae, Apidae, Vespidae), Lepidoptera (orugas, crisálidas, polillas y mariposas), Mantodea (Mantidae), Odonata, Orthoptera (langostas y grillos). **Arácnidos:** Arachnida. **Chilopoda:** ciempiés. **Crustáceos:** no determinados. **Diplopoda:** milpiés.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una sucesión de silbos algo espaciados con ligera modulación de frecuencia descendente Jiup..juip..juip..juiep..juep.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nidifica en huecos en los árboles o construcciones. Lecho de cortezas y/u hojas.

Hartert y Venturi (1909). Nidos en el Chaco santafesino.
Capllonch (1997). Tucumán. Nido.
Partridge, W. H. en Chebez (1997a). Misiones. Nido.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, en octubre de 1989, nido en el techo de una vivienda, entre las chapas y el cielo raso, pichones.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Cockle et al. (2011). Misiones. Nido.
Bodrati et al. (2012a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, 16–18 de Noviembre de 1998, nido con pichones; Parque Nacional Chaco, Chaco, 26-11-1998, nido con pichones; Parque Nacional Chaco, 28-11-1998, nido con huevos; Embarcación, dpto. Gral. San Martín, Salta, 08-11-2004, nido con pichones; Tobuna, dto. San Pedro, Misiones, 03-12-2007, nido con pichones; Parque Provincial Cruce Caballero, dto. San pedro, Misiones, 28-11 a 14-12 de 2011, nido con pichones.
Bodrati y Klavins en Salvador y Bodrati (2013a). Misiones. Nido. Pichones con larvas de Moscas *Philornis.*
Cockle et al. (2015). Misiones. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Uranga en De la Peña (2016d). Eva Perón, dpto. Bermejo, Chaco. 30-11-2008, nido en un hueco en un árbol, a un metro del suelo. Profundidad 35 cm. La base acolchada con cortezas de árboles. Tenía 3 huevos.

Huevos
Pone de 2 a 3 huevos blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 20 a 20,5 x 14,5 a 15,0

Observaciones
Bodrati et al. (2012a). Un solo integrante de la pareja atendió a los pichones.

Otros
Bodrati y Klavin en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Esteban (1948). Bodrati et al. (2012a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración ventral canela con tono oliváceo. Banda alar canela. Cola castaña. Pico corto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sittasomus griseicapillus griseicapillus (Vieillot, 1818) en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y *Sittasomus griseicapillus sylviellus* (Temminck, 1821) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Quince subespecies. Amplio Rango: de distribución en Centro América y Sudamérica, desde Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, noreste de Uruguay y norte de Argentina.

Foto: Martín Mastropaolo

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sittasomus griseicapillus griseicapillus (Vieillot, 1818)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores e Yzurieta (1982a, 1983a)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Moschione y Bishels (2004) Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Pagano, L. en Salvador et al. (2017)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Esteban (1948); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Contreras (1983b); Cory y Hellmayr (1925); Di Giacomo y López Lanús (1998); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Moschione y Segovia (2005); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvadori (1897)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Bodrati et al. (2012b), Camperi (1988, 1990); Chebez et al. (1998); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Esteban (1948); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d);

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch y Ortiz (2006); Coria et al. (2013); López de Casenave et al. (1998); Olrog (1959c)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Esteban (1948); Fanjul y Echevarría (2015); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Malizia et al. (1998);

Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Rougés y Blake (2001)

Sittasomus griseicapillus sylviellus (Temminck, 1821)

Corrientes
Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983b, 1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a, 1997a); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014); Saibene et al. (1996); Short (1975); Straneck (1990g)

ARAPASÚ *Dendrocincla turdina* (M. H. K. Lichtenstein, 1820)

Otros nombres: Falso zorzal. Trepador de pico corto. Trepador pardo. Trepador picocorto común.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Oniki (1981): N= 22 (?) X= 39 g (Rango: 31 a 45,3)

Coloración. Pico gris oscuro con base de la mandíbula más claro. Patas pardas. Iris pardo.
Pardo. Cabeza estriada de ocre. Garganta más clara. Alas pardas.Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Bodrati et al. (2018). Fuera de la época reproductiva, forrejea siguiendo grupos de monos Kaí (*Sapagus nigritus*) y eventualmente siguiendo grupos de Coatí (*Nasua nasua*).

Alimentación
Willis (1972). **Reptiles:** (lagartijas).
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera (larvas y adultos). Diptera. Hymenoptera. Lepidoptera. **Arácnidos:** Opilliones. Araneae.
Bodrati et al. (2018). **Insectos:** Coleoptera (larvas y adultos). Blattodea. Dermaptera. Diptera. Hemiptera. Hymenoptera. Isoptera. Lepidoptera. Mantodea. Odonata. Orthoptera. Phasmid. Neuroptera. **Arácnidos:** Opilliones. Araneae. **Miriapoda**: Geophilomorpha. Scolopendromorpha. **Amphibios:** Anura. **Mamíferos:** Chiroptera.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nido en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nidifica en huecos pre-existentes en árboles.

Bodrati et al. (2018). Parque Nacional Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 18-10-2015, nido con 2 huevos y 18-11-2016, nido con 2 pichones. Ambos nidos en huecos en árboles.

Comentarios
Bodrati et al. (2018). El cuidado del nido (incubación, alimentación de los pichones e higiene de la cámara) es llevado a cabo solamente por un individuo, presuntamente la hembra.
El adulto trajo líquenes y otros materiales al nido a lo largo del período de incubación, utilizándolo para tapar los huevos. Los pichones abandonaron el nido a los 26–27 días de edad.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

PICHONES
Descripción
Ver Bodrati et al. (2018)

Más información:
Esteban (1948). Willis (1972). ffrench (1973). Bodrati et al. (2018)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Coloración general parda. Pico corto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Dendrocincla turdina turdina (M. H. K. Lichtenstein, 1820) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se lo encuentra en un área de Selva Atlántica en el noreste y este de Brasil, este de Paraguay noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1904); Bodrati et al. (2010b, 2012b, 2018); Chebez (1996a); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Saibene et al. (1996); Straneck (1990g)

TREPADOR COLORADO *Dendrocolaptes picumnus* (M.H.K. Lichtenstein, 1820)

Otros nombres: Ipecú. Tarefero. Trepador grande rojizo. Trepador mediano común. Trepador mediano de pico claro. Trepador mediano rojizo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 61 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 2 X= 69,5 g (Rango: 67 a 72 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 74 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 68 g

Coloración. Pico negro con base de la mandíbula más claro. Patas pardas. Iris pardo.
Cabeza parda estriada de ocráceo. Dorsal parda rojiza. Rabadilla, cola y alas castañas. Garganta blanquecina con estrías oscuras. Cuello anterior y pecho castaños rojizos estriados de ocre. Abdomen pardo rojizo barrado de pardo oscuro.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Willis (1982). **Insectos:** cucarachas, escarabajos, hormigas aladas, langostas, larvas y orugas. **Arácnidos:** arañas y escorpiones. **Reptiles:** lagartijas.
Quiroga (2020c). **Insecto:** Chicharra.

HÁBITAT

Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Nido en Jujuy

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Ruggera et al. (2016). Jujuy. Nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Ventral castaña rojiza. Dorsal parda. Jaspeado en la cabeza, garganta y pecho. Abdomen barrado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Dendrocolaptes picumnus casaresi Steullet y Deautier, 1950 en Salta, Jujuy y Tucumán. Observado en el este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Diez subespecies. Amplia área de distribución por Centro América, centro y oeste de Sud América hasta el norte de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Dendrocolaptes picumnus casaresi Steullet y Deautier, 1950

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Chebez y Heinonem (1987a); Contreras (1987c); López Lanús (1997); Chebez (2009)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Moschione y Segovia (2005); Quiroga (2020c); Salvador (1988); Salvadori (1897); Steullet y Deautier (1950); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Bruch (1904); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Esteban (1948); Moschione et al. (2013); Pagano y Salvador (2017); Salvador y Di Giacomo (2014); Steullet y Deautier (1950)

Tucumán
Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2013c); Steullet y Deautier (1950)

TREPADOR OSCURO *Dendrocolaptes platyrostris* Spix, 1824

Otros nombres: Arapasú. Ipekú. Se acabó el día. Tarasca. Trepador cabecinegro. Trepador chico de pico negro. Trepador mediano ocráceo. Trepador ocráceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm
Peso: Darrieu y Camperi (1990): N= 3 (M) 55,1, 59,3 y 62,9 g; N= 3 (H) 58,7, 64,5 y 68,9 g
Di Giacomo (2005h): N= 1 61,0 g
Cockle y Bodrati (2009): N= 2 (?) X= 62,5 g (Rango: 60 a 65)
Capllonch et al. (2015b): N= 2 (?) X= 65,5 g (Rango: 64 a 67)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (H) 60 g

Coloración. Pico negro con base de la mandíbula más claro. Patas pardas verdosas. Iris pardo.
Cabeza negra estriada de ocre. Dorsal parda con tono castaño y largas estrías ocres. Rabadilla y supracaudales castañas. Garganta blanquecina. Pecho pardo oliváceo con estrías ocres. Abdomen castaño claro barrado de pardo oscuro. Alas castañas con puntos pardos oscuros. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Esteban (1948). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Cucurlionidae: *Naupactus* sp, Scarabaeidae). Dermaptera (Forficulidae). Diptera. Hemiptera. Hymenoptera (hormigas). Odonata. **Otros:** Plumas.
Cockle y Bodrati (2009). **Arácnidos:** Arañas. **Insectos:** Larvas. Lepidoptera (larvas). Pupas. **Reptiles:** Serpiente pequeña.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Bodrati (*in litt*. 2019). Pichón de ave sin plumas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su canto, emitido al alba y al atardecer, es una serie de sílabas descendentes en modulación de amplitud y silbadas, Ji.ji.ji.ji.jie.je.je.....

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chaco, Misiones.

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Nidifica en huecos pre-existentes en árboles.

Saibene (1995). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 07-09-1991, nido en construcción, a 8 m de altura en un hueco.
Cockle et al. (2008b, 2011, 2015). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2009). Parque Provincial de la Araucaria, Parque Provincial Cruce Caballero y Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, observaciones entre octubre y enero de 1997, 2006 y 2007, se localizaron 16 nidos; Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, 08-10-1997, un nido.
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Norris et al. (2010). Misiones. Nido.
Uranga, M. en De la Peña (2016d). El Soberbio, dpto. Guaraní, Misiones, 12-11-2010, nido en un hueco de un árbol a 4 m de altura, 2 huevos.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos blancos.

Medidas
Cockle y Bodrati (2009): X= 31,4 x 23,5 (N= 39)

Pesos
Cockle y Bodrati (2009): X= 9 (N= 32)

PICHONES
Descipción
Cockle y Bodrati (2009). Piel rosada. Plumón gris en cabeza, lomo y patas.

Peso
Cockle y Bodrati (2009): X= 8,3 (N= 14)

Observaciones
Di Giacomo (2005h). El 20-01-2003 se observó un volantón que era alimentado por un adulto.
Cockle y Bodrati (2009). El período de incubación es de 14 a 16 días. Los pichones permanecen en el nido de 16 a 18 días.

Otros
Cockle y Bodrati (2009). Norris et al. (2010). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Esteban (1948). Cockle y Bodrati (2009)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general parda. Cabeza, dorsal y pecho jaspeados. Garganta blanquecina. Pico negro, grueso.
Se diferencia del Trepador garganta blanca por ser de menor tamaño, con pico más corto, garganta más oscura y más jaspeado en la parte dorsal.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Dendrocolaptes platyrostris platyrostris Spix, 1824 en Misiones, norte de Corrientes, Chaco y Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se extiende por el noreste de Brasil hasta suroeste de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Cockle y Bodrati (2009); Esteban (1948)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Nores (1992); Pagano y Salvador (2017)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Chebez (1996a); Chebez et al. (1998); Cockle et al. (2008b); Cockle y Bodrati (2009); Esteban (1948); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014); Norris et al (2010); Pereyra (1951); Saibene et al. (1996); Saibene (1995); Straneck (1990g)

TREPADOR GARGANTA BLANCA *Xiphocolaptes albicollis* (Vieillot, 1818)

Otros nombres : Arapasú. Capatáz. Trepador de cuello blanco. Trepador grande cuelliblanco. Trepador grande de pico negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 119 g

Coloración. Pico negro. Patas grises oliváceas. Iris pardo castaño.
Cabeza parda oscura con estrías ocráceas. Cara más clara. Garganta blanca. Dorsal parda olivácea con largas estrías ocráceas. Rabadilla y supracaudales castañas. Pecho pardo oliváceo estriado de ocráceo. Abdomen y muslos pardos oliváceos barrados de pardo oscuro. Alas, láminas externas pardas oliváceas, internas castañas con las puntas pardas oscuras. Álulas, ocráceas moteadas de pardo oscuro. Cubiertas alares internas ocráceas barradas de pardo. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Esteban (1948). **Insectos:** Coleoptera (Elateridae: larvas, Tenebrionidae, no identificados). Dermaptera (Forficulidae). Hymenoptera (hormigas). **Moluscos:** Gastrópoda.
Lopes et al. (2005). Coleoptera. Diplopoda. Diptera (larvas).
Bodrati (2003). **Aves:** Pichones.
Olson y Alvarenga (2006). Isoptera (Termitas)

Cockle y Bodrati (2013). **Insectos:** Blattaria (cucarachas), Coleoptera (escarabajos), Diptera (mosca), Hemiptera (cigarras y chinches), Hymenoptera (avispa), Lepidoptera (larvas, pupas, polillas y mariposas), Odonata, Orthoptera (langostas y grillos). **Arácnidos:** arañas y escorpiones. **Chilopoda:** ciempiés. **Diplopoda:** milpiés. **Anfibios:** ranas pequeñas. **Reptiles:** víbora pequeña. **Aves:** huevos, pichones.
Salvador y Bodrati (2013c): **Reptiles:** pequeños ofidios.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto que hace preferentemente al atardecer y al amanecer es una serie de fuertes silbos emitidos en forma algo espaciada y con un marcada modulación de frecuencia y amplitud descendente, bisilábicos Tieee....Jichiií.... .jichiií.... .jichiií.... .jichiee.... .jiche....

HÁBITAT
Selvas y bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Mogensen en Dodge (1968). Bonpland, dpto. Candelaria, Misiones, 16-01-1912, pichones.
Dodge (1968). Misiones. Nido. Pichones con larvas de Moscas *Philornis.*
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Cockle et al. (2011, 2012a, 2015). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2013). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, 2005-2012, 16 nidos, de setiembre a noviembre.
Bodrati, A. en Salvador y Bodrati (2013a). Misiones. Nido. Pichones con larvas de Moscas *Philornis.*

Huevos
Pone de 2 a 4 huevos blancos.

Medidas
Cockle y Bodrati (2013): 32,7 x 24,5 y 34,0 x 23,3

Observaciones
Cockle y Bodrati (2013). El período de incubación es de 17 días. Los pichones permanecen en el nido de 18 a 22 días.

Otros
Mogensen en Dodge (1968). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Esteban (1948). Cockle y Bodrati (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general parda. Cabeza y pecho jaspeados. Garganta blanca. Abdomen barrado. Pico largo y grueso.
Diferenciarlo del Trepador oscuro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Xiphocolaptes albicollis albicollis (Vieillot, 1818) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Desde el noreste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Cockle y Bodrati (2013); Chebez (1996a); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Mogensen en Dodge (1968); Pereyra (1951); Saibene et al. (1996); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990g); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1973; 07-02-1975; 21-09-1993)

TREPADOR GIGANTE *Xiphocolaptes major* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Carpintero. Picapalo grande. Trepador grande. Trepador grande colorado. Vinchuquero grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 8 X= 157,4 g (Rango: 142,0 a 160,0)
Contreras (1983b): N=2 (M) 155,4 y 158,3 g; N= 2 (H) 154,2 y 156,1 g
Salvador (1988): N= 1 (H) 135 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 (M) 145 g; N= 1 (H) 125 g
Pagano y Salvador (2017): N=2 (M) 143 y 150,6 g; N=1 (H) 148 g

Coloración. Pico córneo. Patas gris verdosas. Iris pardo.
Cabeza y posterior del cuello canelas. Dorsal, alas y cola castañas. Garganta blanquecina con tono canela. Superior del pecho canela con tenues estrías blanquecinas. Abdomen castaño claro.

COMPORTAMIENTO
Trepa por los troncos y ramas, entre los 4 y los 10 m. de altura.

Alimentación
Friedmann (1927). **Insectos:** Hymenoptera (hormigas) no determinadas.
Zotta (1936g). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Ortópteros.
Esteban (1948). **Insectos:** Coleoptera (Carabedae: *Calostoma* sp, Melolonthidae, Tenebrionidae). Lepidoptera.
Hayes y Escobar Argaña (1990). **Anfibios:** ranas. **Reptiles**: culebras.
Carrizo (1991). **Anfibios:** (*Eleutherodactylus* sp.)
Haene (1996b). Anfibios.

Bodrati (2003). **Insectos:** Coleópteros. **Anfibios:** (*Hylidae*). **Mamíferos:** Murciélago (*Tadarida brasiliensis*). **Aves:** huevos y pichones.
Güller y Pugnali en Bodrati (2003). **Mamíferos:** Murciélago.
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Coleópteros (no determinados). **Anfibios:** Rana trepadora (*Hyla raniceps*). **Reptiles:** Culebra (*Sibynomorphus turgidus*)
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Orthoptera (Acridiidae).
Salvador y Bodrati (2013c). **Reptiles:** culebras pequeñas.
Klavins en Salvador y Bodrati (2013c). **Reptiles:** víbora de regular tamaño.
Bodrati (*in litt*. 2019): **Mamífero:** Rosario de la Frontera Salta, 10-04-2016, murciélago grande.

HÁBITAT
Bosques, montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Nidifica en huecos en los árboles o en troncos. En la base de la cámara coloca hojas, estiércol, pajas, cortezas.

Hartert y Venturi (1909). Chaco santafesino, nidos en huecos o en nidos abandonados de carpinteros. Lecho de hojas secas, 2 huevos.
Gil y Gómez (1990). Parque Nacional Pilcomayo, Formosa, nidifica citado en López Lanús (1997).
Capllonch (1997). Tucumán. Nido.
Chebez et al. (1998). Parque nacional Río Pilcomayo, Formosa, nidifica.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Bodrati (2003). Parque Nacional Chaco, Chaco, 23-12-1999, nido con 3 pichones; Reserva Natural Estricta Colonia Benítez, Chaco, noviembre de 1998, un nido; Parque Provincial Pampa del Indio, enero de 2001, 2 nidos.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a diciembre. Principalmente huecos en palmeras entre los 2 y 7 m de altura. Se localizaron 8 nidos.
Berkunsky y Reboreda (2009). Chaco. Nido.
De la Peña (2013c). La Gallareta, dpto. Vera, Santa Fe, 15-11-1971, sin postura, hueco en Ombú, a 4 m de altura, profundidad de 1,60 m; Reserva La Loca, dpto. Vera, Santa Fe, 15-11-1974, hueco en tronco seco, la boca de entrada a 1,60 m del suelo, la base acolchada con cortezas de árboles, 2 huevos.
Ruggera et al. (2016). Jujuy. Nido.



Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 34,0 a 37,0 x 25,5 a 26,0		
Esteban (1948): 35,0 x 27,5 (Shipton)		
Di Giacomo (2005h): 34,3 a 37,2 x 25,9 a 27,2	X= 35,9 x 26,5	(N= 13)
De la Peña (2013c): 36,2 a 37 x 26,7 a 27,3	X= 36,6 x 27	(N= 2)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 10,0 a 13,8	X= 12,6	(N= 9)
De la Peña (2013c): cáscaras de 1,08 a 1,13	X= 1,10	(N= 2)

La Loca. Santa Fe. 15-11-1974

Colonia Benitez. Chaco 15-08-2012 Foto: Cynthia Arenas

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 16 a 17 días y la permanencia de los pichones en el nido es de 25 a 27 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Esteban (1948). Bodrati (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general castaña. Lorum oscuro. Pico largo, grueso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xiphocolaptes major castaneus Ridgway, 1896 en el norte de Salta y sureste de Jujuy; *Xiphocolaptes major estebani* da Silva y Oren, 1991 en Tucumán y *Xiphocolaptes major major* (Vieillot, 1818) desde Jujuy, Salta y Formosa hasta el norte de Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Paraguay, Bolivia y adyacente de Brasil (Mato Grosso) y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Xiphocolaptes major castaneus Ridgway, 1896

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Salvador (1988)

Salta
Citas: Bruch (1904); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Esteban (1948); Moschione et al. (2013); White (1882)

Xiphocolaptes major estebani da Silva y Oren, 1991

D.G. Tucumán.

Xiphocolaptes major major (Vieillot, 1818)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Esteban (1948)

Chaco
Citas: Bodrati (2003); Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Contreras (1983b); Esteban (1948); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Cobos et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al. (1983); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Chatellenaz (2004)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo (2005h); Esteban (1948); Haene (1996b); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Fiora (1933); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897)

La Rioja
Citas: Lobo Allende et al. (2014)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Chebez et al. (1998); Fiora (1933)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); Manassero y Luna (2009a); Straneck (1990e)

Santiago del Estero
Citas: Coria et al. (2017); Esteban (1948); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch y Ortiz (2006) (*); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Lucero, M. M. (1983) (*); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007) (*); Ortiz et al. (2011b) (*); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b)

CHINCHERO ENANO *Xiphorhynchus fuscus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Mielero. Trepador enano. Trepador menor. Trepador oscuro. Trepador pequeño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 19 y 21,5 g; N=1 (H) 19,5 g
Storer (1989): N= 3 (M) X= 18 g (Rango: 17 a 19)

Coloración. Pico córneo oscuro con base de la mandíbula más claro. Patas grises oliváceas. Iris pardo.
Corona, nuca y posterior del cuello pardos con estrías ocres. Dorso pardo rojizo, con la parte superior de la espalda estriada de ocre. Rabadilla y cola castañas. Ceja, garganta y parte superior del pecho ocráceas. Resto de ventral ocre estriado de castaño.

COMPORTAMIENTO
Alimentación

En Brasil
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattaria (oostecas), Coleoptera. Diptera (larvas). Hemiptera. Homoptera. Hymenoptera (Formicidae). **Arácnidos:** Aranea. Pseudoescorpiones.**Chilopoda.**
Manhaes et al. (2010). **Insectos:** Blattaria (ootecas), Coleoptera, Hymenoptera (Formicidae), Orthoptera. **Arácnidos:** Aranea.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Más información:
Euler (1900). Esteban (1948). Belton (1984). Marini et al. (2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Cabeza oscura, jaspeada. Ceja y garganta ocráceas. Ventral jaspeada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xiphorhynchus fuscus fuscus (Vieillot, 1818) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Este y sureste de Brasil (desde Ceará), este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Xiphorhynchus fuscus fuscus (Vieillot, 1818)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Esteban (1948); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Saibene et al. (1996)

PICAPALO COLORADO *Campylorhamphus trochilirostris* (M. H. K. Lichtenstein, 1820)

Otros nombres: Picapalo. Picapalo común. Picapalo de pico largo. Picapalo de pico rojizo. Trepador. Trepador de pico largo. Trepador picocurvo común.

DESCRIPCIÓN
Largo: 29 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 55 g
Di Giacomo (2005h): N= 4 X= 45,2 g (Rango: 43 a 51g)
Alderete y Capllonch (2010): N= 4 X= 48,7 g (Rango: 47 a 50 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 43,5 y 44,0 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 46,8 g

Coloración. Pico rojizo con punta negruzca. Patas gris verdoso. Iris pardo.
Cabeza castaña con estrías blanquecinas. Dorsal, alas y cola, castaños. Garganta blanquecina con estrías castañas. Pecho castaño claro con estrías blanquecinas.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Moojen et al. (1941). **Insectos:** Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera.
Di Giacomo (2005h). **Arácnidos:** Arañas.
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** rana arborícola. **Reptiles:** cría de *Tropidurus spinolosus*.

HÁBITAT
Bosques, sabanas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en huecos en los árboles.

Girard (MLP). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 09-10-1933, 2 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 24-10-1905, nido en un hueco a 3,50 m del suelo. Lecho de hierbas y hojas, 2 huevos.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. El 20-12-2000 se localizó un nido en un hueco en un Guabiyú (*Myrcianthus purigens*) a 2 m del suelo. Tenía 2 huevos.
Girard en Segura et al (2014a). Tucumán. Nido.
Bodrati et al. (2015a). Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero y Parque Nacional Chaco, dpto. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, nidos con huevos y con pichones, en noviembre-diciembre.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

Medidas:
Girard (MLP): 28,1 x 21,0 y 29,0 x 21,1 X= 28,5 x 21,0 (N= 2)
Hartert y Venturi (1909): 30,0 x 21,0
Di Giacomo (2005h): 26,0 a 26,7 x 20,0 a 20,1 X= 26,3 x 20,5 (N= 2)
Bodrati et al. (2015a): 28,9 x 20,4 y 28,2 x 20,7

Peso
Di Giacomo (2005h): 5,4

Más información:
Esteban (1948). Bodrati et al. (2015a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general castaño. Pico muy largo y curvado, rojizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Campylorhamphus trochilirostris hellmayri Laubmann, 1930 desde Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta hasta La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. Observado en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Doce subespecies. Amplio Rango: de distribución en Panamá y gran parte de Sud América hasta Argentina. Comprende: Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

P. N. Pre-Delta. Diamante. Entre Ríos. 09-05-2015
Foto: Pablo Capovilla

Bañado La Estrella. Formosa. 19-08-2019
Foto: Cynthia Arenas

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri Laubmann, 1930

Buenos Aires
Citas: Gasparri et al. (2018)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati et al. (2015a); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 03-05-1988)

Córdoba
Citas: Micheluti, P. en Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); Short (1971)

Entre Ríos

Citas: Alvarado y La Grotteria (2011); Mancini (2011); Muzzachiodi et al. (2003)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Esteban (1948); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013); Salvador (1988)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Esteban (1948); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Bodrati et al. (2015a); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Esteban (1948); Fraga y Narosky (1985); Lucero (1983); Mamaní et al. (2017); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

PICAPALO OSCURO *Campylorhamphus falcularius* (Vieillot, 1822)

Otros nombres: Picapalo. Picapalo de pico corto. Picapalo de pico negro. Trepador picocurvo oscuro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 26 cm.
Peso: Contreras et al. (1994): N= 1 (H) 42,6
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 41 g

Coloración. Pico pardo. Patas grises verdosas. Iris pardo.
Cabeza negra estriada de ocre. Dorsal castaña rojiza. Rabadilla, cola y alas castañas. Garganta blanquecina estriada de pardo oliváceo. Resto de la parte ventral pardo oliváceo estriado de ocre.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera (Formicidae), Orthoptera. **Arácnidos:** arañas y escorpiones.
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** Hylidae.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es un agudo y sostenido Jri.jri.jri.jri.jri.jri..

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Nido en huecos en árboles.

Partridge (MACN). Arroyo Uruguaí, km. 30, dpto. Iguazú, Misiones, 28-11-1960, nido en hueco en árbol, lecho de trozos de corteza, 2 huevos.
Bodrati et al. (2015a). Parque Nacional Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, nido con 2 huevos en noviembre de 2013. En hueco, base con cortezas y hojas.
Cockle et al. (2015, 2016). Misiones. Nido.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

Medidas
Partridge (MACN): 28,1 a 29,0 x 21,6 a 21,8 X= 28,5 x 21,7 (N= 2)

Peso
Partridge (MACN): cáscara 0,5

Más información:
Esteban (1948). Bodrati et al. (2015a)

Depredadores
De huevos: Mamíferos: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Misiones, Cockle et al. (2016)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general parda olivácea y castaña. Cabeza oscura, jaspeada. Pico muy largo y curvado, negro

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlantica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Castia et al. (2008); Contreras (1987b); Contreras et al. (1994b); Dabbene (1914a); Darrieu y Camperi (1990); Navas y Bó (1988b); Short (1971)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b, 2915a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Castía et al. (2008); Chebez (1996a); Chebez et al. (1998); Cockle et al. (2016); Contreras et al. (1994b); Dabbene (1914a); Esteban (1948); Giai (1950); Krauczuk (2008-2009); Krauczuk, y Baldo (2004); Navas y Bó (1988b); Saibene et al. (1996); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990h)

CHINCHERO GRANDE *Drymornis bridgesii* (Eyton, 1850)

Otros nombres: Arañero grande. Bil-bil. Carpintero. Gil-gil. Picapalo. Picapalo grande. Ruiz. Trepador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1990): N= 1 (M) 90 g; N= 2 (H) 87,3 y 97,3 g
Camperi (1992a): N= 1 (M) 102,8 g; N= 1 (H) 96,3 g
Blendinger (2005): X= 82,3 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 5 X= 85 g (Rango: 80 a 98 g)
Salvador (2014a): N= 6 (?) X= 94,8 (Rango: 93,6 a 102,0)

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula corneo clara con ápice pardo oscuro. Patas pardas oscuras. Iris pardo.
Cabeza castaña oscura. Cara y nuca castañas claras. Dos líneas, una por arriba y otra por debajo de los ojos, blanquecinas. Dorsal castaño claro con tono pardo. Garganta blanquecina. Pecho y abdomen blanquecinos con las plumas orilladas de castaño. Alas, primarias pardas oscuras, secundarias castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Trepa por los troncos y ramas y es bastante terrícola. Hurga debajo de las materias fecales de animales y escarba en los hormigueros. Se lo vio cavar hasta 5-6 cm de profundidad en el suelo para extraer larvas de coleópteros y arañas.
Recolecta y hurga, hasta 4 m. de altura.

Alimentación
Friedmann (1927). **Insectos:** Langostas.
Esteban (1948). **Insectos:** Coleoptera (Tenebrionidae) (larvas). **Miriápodos:** (Diplopodos). **Arácnidos:** (escorpiones). **Otros:** Plumas.
Olrog (1956). **Insectos:** Langostas.
Partridge (1953c). Insectos.
Bodrati (2003). **Reptiles:** Huevos de reptiles. Reptiles (lagartijas).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleópteros, larvas. **Arácnidos:** Arañas. **Moluscos:** Babosas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Anfibios:** Rana (*Leptodactylus* sp.). **Arácnidos:** (Opiliónidos). **Insectos:** Coleoptera (Elateridae, larvas, Scarabaeidae.Tenebrionidae.). Hemiptera (Pentatomidae). Hymenoptera (Formicidae: adultos y larvas). Lepidoptera (Sphingidae). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae).
Carmona, C. (2012). Escorpión chaqueño (*Bothirius chacoensis*). EcoRegistros 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Salvador y Bodrati (2013c). **Reptiles:** víbora de cristal (*Ophiodes vertebralis*), pequeña culebra (no determinada). **Aves:** pichones de Passeriformes.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Carmona, C. (2015). Chorito (*Bulimulus apodemetus*). EcoRegistros 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Prina, A. (2016). **Insecto**: Torito (*Diloboderus abderus*). EcoRegistros 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
De la Peña (2019b). Los pichones son alimentados con arañas, grillos, ranitas, ninfas de Chicharras, arañas negras, chicharras y gusanos.
También cáscara de huevos, uno blanco parece de paloma y otro con pintas.
De la Peña (2020). Los pichones son alimentados con arañas, grillos.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Emite una serie de voces agudas con modulación de frecuencia descendente, es un áspero y sonoro Chill..chil..chil..chil..

HÁBITAT
Áreas rurales, montes, sabanas, praderas arboladas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron huevos y/o pichones en Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Nidifica en huecos en los árboles. Ocupa nidos abandonados de Carpinteros (*Colaptes*). Construcciones, postes o pilares de luz. Acolcha la base con hojas y cortezas. Expuesto. Rudimentario. A baja y mediana altura y altos.

Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-10-1926 y 21-11-1926, 2 huevos en cada nido.
Pereyra (1937b). Nidifica en el norte de La Pampa.
Contino (1980). En el Chaco salteño se encuentran nidos con pichones a fines de diciembre.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 12-10-1971 nido con pichones.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 14-12-1982, nido a 30 cm del suelo con 2 pichones.
Zelich en Narosky et al. (1983). Entre Ríos. Nido.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 8 nidos.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Nidifica.
Esteban (1948). Nidifica en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 8 nidos. Se reproduce de setiembre a diciembre. Posturas de 2 a 3 huevos.
Salvador (2012c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005 se localizó un nido en uno abandonado de *Colaptes* sp.
De la Peña (2013c). Se localizaron 13 nidos: 8 en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, desde el 14-10-1972 al 03-12-2012, con huevos y con pichones. Rincón de Ávila, dpto. La Capital, Santa Fe, 15-11-1995, pichones; Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, 06-11-1999, pichones; Las Tunas, dpto. Paraná, Entre Ríos, 25-10-2002, pichones; Jesús María, dpto. Colón, Córdoba, 24-10-2004, pichones. Todos en huecos o nidos abandonados de Carpinteros, excepto 2 en columnas de hormigón de luz.
Salvador, S. en Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a).Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba. J. Heredia, en diciembre de 2012, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Espíndola, A. (2015). 28-11-2015. Laguna de Plata, dpto. Río Primero, Córdoba. Nido con pichones. EcoRegistros 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
IML Lillo, M. en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Straneck a Rumboll en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.
Bodrati en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). San Luis. Nido.

Wilson, D. en Salvador (2016a). Corrientes. Nido.
Salvador et al. (2017). Nidos en Córdoba.
De la Peña (2019b). Pujato Norte, dpto. Las Colonias, Santa Fe. 28-08-2015, nido en un pilar de luz de 1 m de alto. Internamente mide 25x25 cm. Profundidad 45 cm. Base acolchada con cortezas de árboles y hojas.
3 huevos. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 17-09-2015. Nido en Poste de luz a 7,50 m de alto. Pujato Norte, 08-11-2015. En el mismo nido de 28-08-2015, había tres pichones chicos. Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 17-11-2015. Nido a 5,80 m del suelo en una chimenea metálica de una estufa. Pichones.
De la Peña (2019b). Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, 17-09-2016, nido en construcción en hueco en Paraíso a 4 m del suelo, traían hojas. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. 19-09-2017, nido en uno de Carpintero real, en tronco seco de Algarrobo, a 1,60 m del suelo, 3 huevos. (Localizado junto a Pablo Capovilla). 20-11-2018. Nido en construcción en uno de Carpintero campestre en Paraíso a 4,50 m de altura.
De la Peña (2019b). Esperanza. 22-12-2018. Nido en uno de Carpintero real en poste de luz a 5 m. Tiene pichones
Bodrati (*in litt*. 2019). Gualeguaychú, 04-11-1994, bordes del río Uruguay, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, en hueco natural de Paraíso (*Melia azedarach*) seco, 2,2 metros de altura al suelo, entrada 6x19 cm, dos pichones grandes. Parque Nacional El Palmar, dpto Colón, Entre Ríos, 23-10-1995, hueco natural a 1,7 m del suelo en Ñandubay (*Prosopis algarrobilla*), entrada 7x9 cm, profundidad 35 cm., 3 huevos.
Salto de Mendez, dpto Gualeguaychú, Entre Ríos, 19-10-1996, ranura en la pared de un tanque de agua, entrada 5 x 20 cm, pichones alimentados por adultos.
De la Peña (2020). Cavour. Dpto. Las Colonias, Santa Fe, 27-10-2019. Nido sobre un camino rural, en uno abandonado de *Colaptes melanochloros*, a 1,50 m del suelo. Pichones.



Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

(IML): 31,0 a 35,0 x 23,0 a 24,0	X= 33,0 x 23,7	(N= 4)
Smyth (1928): 28,5 a 31,0 x 24,0 a 24,5		
Contino (1980): 32,0 x 25,0		
Narosky en Narosky et al. (1983): 31,8 a 32,9 x 24,8 a 25,3	X= 32,2 x 25,0	(N= 3)
Salvador (2013b): 28,7 a 34,5 x 21,4 a 24,8	X= 31,4 x 23,4	(N= 14)
De la Peña (2013c). 31,5 a 32,4 x 24,9 a 25,5	X= 31,9 x 25,1	(N= 3)

Pesos

Salvador (2013b): 8,5 a 10,4	X= 9,4	(N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,816 a 0,828	X= 0,819	(N= 3)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 días.
Mezquida (2001b). Los huevos son puestos en días corridos. Período de incubación 14 días.

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris pardusco. Comisuras amarillentas. Interior de la boca amarillo.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 7,0 a 9,0 g X= 8 (N= 3)

Observaciones
Contino (1980). Ambos progenitores alimentan a los pichones.
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 16 a 17 días.

De la Peña (2013c). La pareja construye. Por momentos realizan viajes cada 2 a 5 minutos y se van hasta 40-50 m. del nido, en busca de alimentos. La pareja alimenta a los pichones.
Un nido en Esperanza, del 06-10-2000, fue ocupado por varias especies: *Colaptes campestris* el (02-10-1999), luego fue ocupado por *Melanerpes candidus* (28-11-2000) y el (10-10-2002) por *Colaptes campestris.*
En la columna de cemento entraban por la parte superior al interior de la misma.
Los pichones cuando son grandes emiten fuertes gritos de llamada, los que son contestados por los padres. Estos traen como alimento larvas blancas, cascarudos (coleópteros) y otros insectos. También se los observó llevar babosas y arañas negras, grandes, que extraían escarbando en el suelo, hasta 4-5 cm. de profundidad.
De la Peña (2019b). En el nido de Pujato Norte, le traen de comer a los pichones, arañas, grillos, orugas, ranita. Permanecieron en el nido 20-21 días.
En el nido del 22-12-2018, en Esperanza, les traen de comer ninfas de Chicharras, arañas negras, Chicharras y gusanos.
También cáscara de huevos, uno blanco, parece de paloma (posiblemente de Torcaza) y otro con pintas.

Otros
Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información
Mezquida (2001b). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cejas y bandas malares, blanquecinas. Dorsal castaño pardusco. Ventral “escamado”. Pico largo, curvado. El grito.

Esperanza. Santa Fe. 17-11-2012. Construyendo

Esperanza. Santa Fe. 14-10-1972

Esperanza. Santa Fe. 22-11-2003

Esperanza. Santa Fe. 11-12-2007

Cayastá. Santa Fe. 27-09-2000

Pujato. Santa Fe. 17-09-2015

Pujato. Santa Fe. 17-09-2015

Pujato Norte. Santa Fe. 27-08-2015

Villa Roda. Santa Fe. 17-11-2015

Esperanza. 19-09-2017
Nido en uno de Carpintero real.

Esperanza. 19-09-2017
Nido en uno de Carpintero real. Foto: Pablo Capovilla

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Drymornis bridgesii (Eyton, 1850) desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Neuquén y Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área de distribución predominantemente chaco y monte que se extiende por el oeste de Paraguay, oeste de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (2001b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Maugeri (1999); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); White (1882)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Fontana (1908); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Las Pirquitas, dpto. Fray Esquiú, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Moschione y Bishels (2004); Zotta (1936)

Córdoba
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006b); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Narosky et al. (1983); Salvador (1983, 2012c, 2013b); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Bodrati (2014); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Taninga, dpto. Pocho, 06-12-1981; La Cumbrecita, dpto. Calamuchira, 30-04-2000; Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002; Jesús María, dpto. Colón, 14-03-2003; Cañada del Río Pinto, dpto. Isquillín, 18-02-2007; Ascochinga, dpto. Colón, 28-11-2009)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987a, 1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Barrows (1883a); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Chebez et al. (1998); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Esteban (1948); López-Lanús y Mencia (2017)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Navas (1970b); Navas y Bó (1986); Pereyra (1927e, 1937b); Siegenthaler (2004); Sztoleman (1926); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Calí et al. (2008); Contreras (1979); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave (2001); Marone (1991, 1992a, 1992b); Mezquida (2001b); Milesi et al. (2002); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Rodríguez Moulín (1985)

Río Negro
Citas: Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Narosky et al. (1990); Navas (1970b); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016); Rodríguez Moulín (1985)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capurro y Bucher (1988); Chalukian (1989); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Casares (1944b); Chebez et al. (1998); Esteban (1948); Masramón (1983);

Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Navarro (2017); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Esteban (1948); López de Casenave et al. (1998); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1991); Olrog (1956)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Esteban (1948); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983), Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2013c)

CHINCHERO CHICO *Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Arañero. Arañero chico. Carpintero. Carpintero colorado. Picapalo. Picapalo chico. Trepador. Trepador chico común. Trepador común. Trepador chico picolargo. Vinchuquero chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 40,0 g (Rango: 30,0 a 45,0)
Contreras (1979f): N= 4 (M) 27,8, 30,2, 29,8 y 29,5 g; N= 2 (H) 31,5 y 33,5 g
Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 27,4 (Rango: 25,2 a 28,7 g)
Camperi (1992a): N= 2 (M) 37,0 y 37,5 g; N= 4 (H) X= 37,3 (Rango: 33,3 a 40,7) (*praedatus*)
Blendinger (1999): 25,3 g
Blendinger (2005): X= 27,2 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 4 X= 30,2 g (Rango: 25 a 35 g) (*angustirostris*)
Alderete y Capllonch (2010): N= 2 X= 37,5 g (Rango: 35 a 40 g) (*praedatus*)
Alderete y Capllonch (2010): N= 54 X= 26,5 g (Rango: 20 a 32 g) (*dabbenei*)
Alderete y Capllonch (2010): N= 2 X= 33,5 g (Rango: 30 a 37 g) (*certhiolus*)
Salvador (2014a): N= 5 (?) X= 29,7 g (Rango: 28,7 a 31,2) (*dabbenei*)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 4 X= 29,2 g (Rango: 28,2 a 30,5) (*angustirostris*)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 27,8 g (*angustirostris*)

Coloración. Pico: maxila pardo clara o corneo blancuzca con culmen crema pardusco, mandíbula crema pardusca con ápice pardo claro. Patas pardo grisáceas o corneo grisáceas. Iris pardo oscuro.
Cabeza negra estriada de ocre. Cejas blanquecinas. Posterior del cuello pardo oscuro con estrías blanquecinas. Dorsal parda con tono castaño. Garganta blanca. Pecho y abdomen blanquecinos con estrías pardas. Alas y cola castañas.

COMPORTAMIENTO
Recolecta y sondea. Recorre troncos y ramas desde 0,20 hasta 5 m. de altura.
Emite un grito fuerte.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:** Hormigas. Larvas. Ortópteros.
Friedmann (1927). **Insectos:** Coleoptera.
Zotta (1932). **Insectos:** Formicidae. Vespidae.
Esteban (1948). **Insectos:** Blattaria. Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, no identificado). Dermaptera (*Forfucula sp*). Hemiptera (*Nezara viridula*). Lepidoptera (larvas). **Crustáceos:** (Isópodo).
Klimaitis (1983). **Insectos:** Lepidópteros (polillas). Moscas.
Hayes y Escobar Argaña (1990). Anfibios (ranas).
Blendinger (1999). **Vegetales:** *Prosopis flexuosa* (Savia).
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Hymenópteros (Formicidae, *Pheidole* sp., *Acromyrmex* sp.). Hymenópteros (Formicidae, *Camponotus* sp.)
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Hemípteros. Hymenópteros (Formicidae).

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae). Hemiptera (Reduviidae). Homoptera (Membracidae). Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (termitas aladas). **Arácnidos:** (arañas).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Arañas. Insectos.
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** Hyla sp. **Reptiles:** lagartijas.
Fraga en Salvador y Bodrati (2013c). **Aves:** huevos de *Passer domesticus*.
La Grottería, J. (2013). **Arácnido:** Araña de los timbres (*Kukulcania hibernalis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Oscar, D. (2015). **Insecto:** Cucaracha negra (*Blatta orientalis*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Salvador et al. (2017). **Anfibio:** Ranita del zarzal (*Boana pulchella*)
Carus, D. (2018). **Insecto:** Cucaracha roja (*Periplaneta americana*). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

HÁBITAT
Bosques, selvas, sabanas, praderas arboladas, áreas rurales, parques y arboledas en áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En huecos naturales en los árboles, parantes de puentes, columnas de cemento, interior de un transformador de luz, huecos diversos, o en nidos abandonados de carpinteros, de hornero.
Expuesto. Rudimentario. Puede acolchar la base con hojas, cortezas o palitos.

Pereyra (1937b). Conhello, dpto. Conhello, La Pampa, nido en huecos en noviembre, pone hasta 3 huevos.
Höy (1971). Orán, dpto. Orán, Salta, 05-12-1968, en un nido de carpintero, 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Tres nidos: Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 15-10-1968, en nido de carpintero, 3 huevos. Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 13-10-1971, en hueco, pichones, 14-10-1971 en hueco, casi a nivel del suelo, pichones.
Beltrán en Narosky et al. (1983). El Palmar, dpto. Colón, Entre Ríos, 14-11-1982, hendidura en un árbol, pichones.
Earnshaw en Fraga y Narosky (1985). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos Aires, 29-10-1979, nido en tubo de cemento, 3 huevos; en caño de ventilación, 14-01-1980, pichones.
Contino en Fraga y Narosky (1985). Jujuy. Nido.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Colección Contino, Yuto, dpto. Ledesma, Jujuy, 19-11-1963, 2 huevos.
Babarskas y López Lanús (1993). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires, 03-11-1990, nido con 3 huevos; Chascomús, pdo. de Chascomús, Buenos Aires, 29-12-1990, nido con 3 huevos.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, noviembre, nido con pichones.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a diciembre. Ocupa huecos desde 0,50 a 5,0 m de altura
Bodrati et al. (2006b). Buenos Aires. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019). Nidificando en nido de *Furnarius rufus*, con dos pichones propios 16-12-1997, Reserva Natural e Historica, Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, Buenos Aires.

Berkunsky y Reboreda (2009). Chaco. Nido.
Berkunshy et al. (2011). Chaco. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 8 nidos. Se reproduce de setiembre a diciembre. Posturas de 3 a 4 huevos.
Salvador (2012c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005 se localizaron 2 nidos en nidos abandonados de *Colaptes* sp.
De la Peña (2013c). Total de nidos: 12. Ocho en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, desde el 12-10-1976 a 24-11-2007; Cacique Ariacaiquín, dpto. San Javier, Santa Fe; 07-11-1981, 2 huevos y 2 pichones, hueco en un parante de un puente; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 15-11-1981 y 30-11-1981, con 4 y 3 huevos; Malabrigo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 13-12-1991, 3 huevos; Villa Roda, dpto. La Capital, 03-12-2001, en el interior de un transformador, pichones.
Bodrati, A. en Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido. Pichones con larvas de Moscas *Philornis.*
Salvador, S. en Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido. Pichones con larvas de Moscas *Philornis.*
Girard, P. en Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 2 huevos cada uno.
La Grottería, J. (2013). Sur de Entre Ríos, 14-12-2013, nido con pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
Ruggera et al. (2016). Jujuy. Nido.
IML Girard, P. en en Salvador (2016a). Salta. Nido
Lillo, M. en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Zelich en De la Peña (2016d). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, diciembre de 1969, nido en uno de Hornero (*Furnarius rufus*), lecho de cortezas y astillas. Otro en el codo de una chimenea en desuso con 3 huevos. El 21-09-1970 en un hueco de un Tala (*Celtis* sp.) con pichones. El 22-09-1970 hueco en algarrobo con 2 pichones.
Salvador en Salvador (2016a). Corrientes, La Pampa, San Luis, Córdoba. Nidos.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
DECB 2011, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Montero, R. (2016). Reserva Ecológica de Costanera Sur. Buenos Aires. 24-01-2016, nido con pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.
De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 05-11-2014, nido en un hueco de un Fresno (*Fraxinus* sp.) en una calle del centro de la ciudad. Estaba a 5,5 m de altura, pichones.
De la Peña (2020). Esperanza. 23-11-2019. Nido en construcción en un poste de cemento de la luz a 6 m de altura. La pareja trae materiales.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 24,0 a 27,0 x 17,5 a 19,0
Höy (1971): 25,1 a 25,7 x 18,9
Narosky en Narosky et al. (1983): 25,4 a 25,6 x 18,7 a 19,0 X= 25,5 x 18,8 (N= 2)
Babarskas y López Lanús (1993): 26,4 a 26,9 x 19,2 a 20,0 X= 26,7 x 19,7 (N= 6)
Di Giacomo (2005h): 25,5 a 27,3 x 17,5 a 17,7 X= 26,2 x 17,6 (N= 3)
Salvador (2013b): 25,2 a 26,9 x 18,1 a 19,2 X= 25,9 x 18,5 (N= 16)
De la Peña (2013c): 24,2 a 25,9 x 18,6 a 19,8 X= 25,1 x 19,0 (N= 9)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 3,9 a 4,2 X= 4,0 (N= 3)
Salvador (2013b): 4,6 a 5,3 X= 4,9 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,31 a 0,37 X= 0, 34 (N= 9)

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es color carne rosada, con plumón dorsal gris pardusco. Comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 3,8 a 4,1 X= 3,9 (N= 4)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 15 a 16 días.

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 15 a 17 días.
De la Peña (2013c). La pareja construye. Alimentan a los pichones con insectos y arañas.

Otros
Salvador y Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Esteban (1948). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

Depredadores
De pichones: Serpientes arborícolas en Chaco, Berkunsky et al (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cabeza oscura. Cejas y garganta blancas. Ventralmente jaspeado.

Esperanza. Santa Fe. 09-11-2014. Nido en hueco

Esperanza. Santa Fe. 28-11-2007. Nido

Esperanza. Santa Fe. 19-06-2007	Esperanza. Santa Fe. 29-09-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Lepidocolaptes angustirostris certhiolus (Todd, 1913) en el norte de Salta y sureste de Jujuy; *Lepidocolaptes angustirostris angustirostris* (Vieillot, 1818) en el este de Salta, Formosa, centro-este de Chaco, norte de Santa Fe y de Corrientes; *Lepidocolaptes angustirostris praedatus* (Cherrie, 1916) en el sur de Misiones, centro-este de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, norte de Río Negro, este de Mendoza, San Juan, este de La Rioja, Catamarca, Tucumán, oeste de Chaco, sur de Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Ocho subespecies. Amplia zona de distribución que se extiende por noreste y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lepidocolaptes angustirostris certhiolus (Todd, 1913)

Jujuy

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Darrieu (1985); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Esteban (1948); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897); Zotta (1932)

Salta

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Darrieu (1985); Esteban (1948); Fiora (1933); Höy (1971)

Lepidocolaptes angustirostris angustirostris (Vieillot, 1818)

Chaco

Citas: Berkunsky et al (2011); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987b); Darrieu (1985); Esteban (1948); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010) (*); Contreras (1987b, 1979f); Darrieu (1985); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Ordano et al. (2008)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Darrieu (1985); Di Giacomo (2005h); Esteban (1948); Grant (1911); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Bruch (1904); Capurro y Bucher (1988); Chebez et al. (1998); Darrieu (1985); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez, E. D. (2012b)

Santa Fe
Citas: Darrieu (1985)

Lepidocolaptes angustirostris praedatus (Cherrie, 1916)

Buenos Aires
Citas: Babarskas y López Lanús (1993); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez et al. (1998); Chimento et al. (2012); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Darrieu (1985); Darrieu y Camperi (2001a); Fraga y Narosky (1985); Esteban (1948); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Klimaitis (1977c); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999b)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Darrieu (1985); Fontana (1908)

Observaciones: De la Peña (Las Pirquitas, dpto. Fray Esquiú, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Bodrati y Pietrek (2000); Darrieu (1985); Esteban (1948)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Darrieu (1985); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983, 2012c, 2013b); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (18889); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); White (1883a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa Santa Isabel, Embalse, dpto. Calamuchita, 26-11-1990; Carlos Paz, dpto. Punilla, 26-05-2001; Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002; Jesús María, dpto. Colón, 24-07-2010)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987b); Darrieu (1985); Esteban (1948); Klimaitis (1983); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Baliño (1984); Barrows (1883a); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Chebez et al. (1998); Darrieu (1985); De la Peña (2012b); Esteban (1948); Fandiño et al. (2010); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1983); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Salvador y Bodrati (2013a); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fraga y Narosky (1985); Darrieu (1985); Fiora (1933); Lucero (1982)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu (1985); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937b); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b); Zotta (1944)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Darrieu (1985); Esteban (1948); Giacomelli (1923); Harward (1967)

Mendoza
Citas: Alderete y Callonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Contreras (1979); Darrieu (1985); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Hartert y Venturi (1909); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 199b); Milesi et al. (2002); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014)

Río Negro
Citas: Povedano (2016)

San Juan
Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Darrieu (1985); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909)

San Luis
Citas: Bó (1965b); Casares (1944b); Chebez et al. (1998); Darrieu (1985); Esteban (1948); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Darrieu (1985); Esteban (1948); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Darrieu (1985); López de Casenave et al. (1998); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1991); Soria et al. (2010)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Alabarce (2002); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Darrieu (1985); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2017); Navarro et al. (2007); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b)

CHINCHERO ESCAMADO *Lepidocolaptes falcinellus* (Cabanis y Heine, 1859)

Otros nombres: Trepador chico manchado. Trepador chico escamado. Trepador escamado. Trepador manchado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Contreras (1983b): N=1 (M) 29,2 g
Capllonch et al. (2015b): N=1 (?) 20 g

Coloración. Pico gris con base de la mandíbula más claro. Patas grises verdosas. Iris pardo.

Cabeza y posterior del cuello canelas con las plumas ribeteadas de pardo oscuro. Garganta blanquecina. Dorsal parda canela con tenues estrías ocráceas. Pecho y abdomen blanquecinos con las plumas ribetedas de pardo oscuro. Alas, barbas externas pardas oliváceas, internas castañas, puntas pardas oscuras. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Bodrati y Cockle (2011). **Insectos:** Blattaria (cucarachas), Coleoptera (escarabajos adultos), Diptera (moscas), Hemiptera (chicharras), Hymenoptera (hormigas, avispas y abejas), Isoptera (termitas), Lepidoptera (gusanos, pupas, adultos de nocturnas y diurnas, Hesperidae, Nymphalidae: *Dynamide postverta*, *Doxocopa* sp., *Adelpha* sp., *Taygetis* sp.), Orthoptera (grillos y langostas). **Arácnidos:** arañas y opiliónidos. **Chilopoda:** ciempiés. **Crustáceos:** Malacostraca (bichos bolita). **Diplopoda:** milpiés.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT

Selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Nido en huecos o grietas en árboles. Acolcha la base con cortezas.

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Bodrati y Cockle (2011). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 6-8 de octubre nido en construcción en una larga grieta vertical a 2,5 m de altura en el tronco de un cedro (*Cedrela fissilis*). Los dos adultos llenaron el fondo del hueco con pedazos de corteza hasta una altura de 11 cm.
Cockle et al. (2012a, 2015). Misiones. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Rumboll, M. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Huevos

Pone 3 huevos, blancos.

Observaciones

Bodrati y Cockle (2011). La pareja se turnó para incubar durante 15 a 16 días y alimentaron a los pichones con artrópodos, especialmente larvas de lepidópteras.

Más información:
Esteban (1948). Belton (1984). Bodrati y Cockle (2011).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Garganta blanca. Pecho “escamado”. Corona, nuca y cuello posterior oscuros, “escamados”. Diferenciarlo del Chinchero enano.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis y Heine, 1859) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En región sur de la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay, noreste de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1983b, 1987b); Darrieu (1986); Darrieu y Camperi (1990); Short (1971)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Cockle (2011), Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Chebez et al. (1998); Dabbene (1919a); Esteban (1948); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1951); Saibene et al. (1996)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1973)

Subfamilia: Furnariinae

PICOLEZNA CHICO *Xenops minutus* (Sparrman, 1788)

Otros nombres: Pico lezna bayo. Picolezna enano. Picolezna oscuro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Magalhaes et al. (2007): N= 10 (?) X= 11,2 g (Rango: 9,5 a 17)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas grises oscuras.
Dorsal parda olivácea con leves estrías ocres en la corona. Ventral gris olivácea con manchas blanquecinas en la garganta. Alas negras con banda canela. Cola negra y castaña.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Nido en Misiones

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido

Más información:
Remsen (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico corto levemente curvado hacia arriba. Dorsal parda olivácea. Alas y cola negras y castañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xenops minutus minutus (Sparrman, 1788) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diez subespecies. Amplia zona de distribución desde Méjico hasta Brasil y Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Xenops minutus minutus (Sparrman, 1788)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1996a); Chebez et al (1998); Esteban (1952); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Saibene et al. (1996)

PICOLEZNA ROJIZO *Xenops rutilans* Temminck, 1821

Otros nombres: Pico lezna. Picolezna común. Picolezna grande. Pico lezna jaspeado. Picolezna manchado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Darrieu (1986): N= 3 (H) X= 11,9 g (Rango: 11,9 a 12,7)
Contreras et al. (1994): N= 1 (M) 11,5 g

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas grises oscuras.
Cabeza negruzca con estrías ocráceas. Cejas ocráceas. Dorsal parda con tono rojizo y algunas estrías ocráceas en la espalda. Rabadilla y cola castañas. Garganta blanquecina. Ventral parda grisácea con estrías ocráceas. Alas negras con banda canela.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:** Isoptera (Termitas).
Manhaes et al. (2010). **Insectos:** Coleoptera, Dermaptera, Hymenoptera (Formicidae). **Anfibios.**

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Nidos en Salta y Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N		N	

Nidifica en huecos en árboles.

Coconier (2006). Salta. Nido.
Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019), Parque Provincial Caá Yarí, dpto. Guaraní, Misiones, 25-11-2007, en un hueco de un tronco de árbol seco y quemado, en un bosque que se había quemado poco tiempo antes. El hueco parecía la típica excavación de un carpintero del género *Picumnus* y contenía un pichón grande que fue alimentado varias veces por un adulto en la entrada.
Cockle et al. (2012a). Misiones. Nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico corto levemente curvado hacia arriba. Corona, espalda y ventral estriadas. Garganta blanquecina. Alas negras con banda castaña. Cola castaña.
Diferenciarlo del Picolezna estriado (*Heliobletus contaminatus*)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xenops rutilans connectens Chapman, 1919 en Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, hasta los 1500 m de altura y *Xenops rutilans rutilans* Temminck, 1821 en Misiones y noreste de Corrientes

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Once subespecies. Amplia área de distribución en Centro América y Sudamérica. Se extiende por Costa Rica y Panama, siguiendo hacia el sur por el oeste en los Andes tropicales hasta noroeste de Argentina, comprendiendo: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia. Además presenta una extensa zona en el centro y sur de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Xenops rutilans connectens Chapman (1919)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2015a); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

Xenops rutilans rutilans Temminck, 1821

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu (1986); Derna y Allende (2011)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Pereyra (1951); Straneck (1990g); Zotta (1938)

PICOLEZNA PATAGÓNICO *Pygarrhichas albogularis* (P. P. King, 1831)

Otros nombres: Comesebo. Comesebo grande. Corre árboles. Falso carpintero. Picolezna de garganta blanca. Picolezna del bosque. Trepador garganta blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): 21 g
Contreras (1975): N= 13 (?) X= 24 g (Rango: 19,5 a 27)
Christie et al. (2004): N= 1 (H) 20 g; N= 2 (?) 14 y 21 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula blanquecina. Patas pardas. Iris pardo.
Dorsal parda oscura. Rabadilla castaña. Cubiertas alares pardas oscuras, ribeteadas de castaño. Garganta y pecho blancos. Abdomen pardo oscuro con lunares blancos. Alas pardas con banda castaña. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Trepa por los troncos y ramas de los árboles.

Alimentación
Crawshay (1907). **Insectos:** Coleopteros (larvas).

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es una serie de agudos: tsisisis .. tsisisi .. tsisisi ...

HÁBITAT
Bosques patagónicos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en huecos en los árboles.

Reynolds, P. W. (1934). Tierra del Fuego. Nido
Radboone (1935). Lago San Martín, Santa Cruz, nidos en huecos.
Olrog, C. C. (1948). Tierra del Fuego. Nido.
Giacchino en Narosky et al. (1983). Nahuel Huapi, Río Negro, 30-10-1970, nido en hueco. En el mismo lugar el 14-12-1980 había 2 pichones. Lecho de plumón.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nido en noviembre.
De la Peña (2013c). Lago Huechulafquen, dpto. Huiliches, Neuquén, 27-11-1998, nido en un hueco de un Coihue, a 5,50 m del suelo. Tenía pichones.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos blancos.

Medidas
Goodalll et al. (1946): 21,9 a 22,8 x 17,1 a 17,7

Valle Las Trancas. Chile. 22-02-2018 Fotos: María Fernanda Gauna

Lago Huechulafquen. Neuquén. 27-11-1998. Ubicación nido

PICHONES
Observaciones
Peters (1923b). Río Negro. Adulto con pichones

Depredadores
De adultos: *Buteo albigula* en Río Negro, Trejo et al. (2006b)
De pichones: *Campephilus magellanicus* Ojeda y Chazarreta (2006)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Mandíbula curvada hacia arriba. Garganta, pecho y lunares en el abdomen blancos. Trepa por ramas y troncos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pygarrhichas albogularis (P. P. King, 1831) desde el sur de Mendoza y Neuquén por el oeste hasta Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Bosque Araucano centro y sur de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977)

Mendoza
Citas: Reed (1916); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Cory y Hellmayr (1925); De la Peña (2013c); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979); Pereyra (1945); Short (1969); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 30-01-1976)

Río Negro
Citas: Becerra Serial y Grigera (2005); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gaicchino en Narosky et al. (1983); Gelain (2001, 2005); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Ippi y Trejo (2003); Povedano (2016); Trejo et al. (2006b); Vuilleumier (1967)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2009); Peri (2013); Radboone (1935)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Pereyra (1951); Reynolds (1934); Ripley (1950)

BANDURRITA COLA CASTAÑA *Ochetorhynchus andaecola* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Bandurrita de las piedras.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18, 5 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2010): N= 4 X= 35,6 g (Rango: 34 a 39)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal parda canela. Cejas ocráceas. Garganta blanquecina. Resto de lo ventral ocráceo con jaspeado pardo. Alas castañas y pardas. Cola castaña.

HÁBITAT
Estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Nidifica en cuevas o túneles en barrancas o laderas terrosas. Acolcha la base de la cámara con fibras vegetales y plumas.

Höy (1980b). Cachipampa, dpto. Cachi, Salta, 16-11-1975, 2 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1995, 2 pichones. El nido se hallaba en una barranca de tierra sobre un cauce seco, a 3,8 m de altura en un túnel de 11 cm de boca y de 1,2 m de profundidad, casquete poco elaborado de gramíneas de unos 12 cm de diámetro.

De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana. Salta, 29-11-1978. Nido en una cueva, en la tierra de la ladera de una roca, a 1,20 m. del suelo. Diámetro del túnel de 6 cm. y profundidad de 40 cm. En la cámara una plataforma de fibras vegetales y algunas plumas. Mide 9 x 10 cm. de diámetro. Tenía 2 pichones.
Otro nido, en un hueco entre piedras, a 1,50 m. del suelo con 1 huevo. El túnel de 1m y 7 cm de diámetro.
Salvador (2015). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 24-02-1995, 2 huevos.
Pagano en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Valle Encantado. Salta. 29-11-1978

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy (1980b): 26,1 x 20,5 a 20,9 X= 26,1 x 20,7 (N= 2)
Salvador (2015): 26,3 x 20,7 y 26,6 x 21,1

Peso
Höy (1980b): 5,64

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Emplumados, comisuras blancas, interior de la boca amarillo.

Observaciones
De la Peña (2013c). Quebrada de Escoipe, dpto. Chicoana. Salta. 05-12-1977, pareja con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, algo curvado. Ventral jaspeada. Cola castaña.
Se diferencia de la Bandurrita pico recto, por tener más "jaspeado" ventralmente, pico algo curvado y la cola sin negro.
De la Bandurrita patagónica, por ser de mayor tamaño y por el color de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ochetorhynchus andaecola (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 3500 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En los Andes de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1998); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); Esteban (1951); Lillo (1909); Mamaní et al. (2018); Monteleone y Roesler (2005); Salvador (2015)

Salta
Citas: De la Peña (2013c); Höy (1980b); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Quebrada de Escoipe, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

BANDURRITA PICO RECTO *Ochetorhynchus ruficaudus* Meyen, 1834

Otros nombres: Bandurrita picorrecta. Bandurrita de cola castaña. Bandurrita de cola roja. Bandurrita de la puna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Navas (1971b): N= 12 (M) X= 36,2 g (Rango: 31,9 a 40); N= 5 (H) X= 36,6 g (Rango: 33,8 a 41)
Contreras y Davies (1980): N= 4 (M) X= 35,4 g (Rango: 30,0 a 37,9); N= 6 (H) X= 34,50 g (Rango: 32,8 a 37,9)
Salvador (1990a): N= 1 (?) 37,3 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 31 g

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal parda canela. Cejas, garganta y pecho blanquecinos. Resto de la ventral ocráceo. Alas castañas. Cola negruzca con las láminas externas de las plumas más externas, castañas.

HÁBITAT
Estepas altoandinas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Nidifica en cuevas o túneles en barrancas o grietas en laderas de montañas. A baja altura.
Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pajitas y plumas.

De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca. Jujuy, 23-02-1979. Nido en una grieta en la montaña, en la orilla de la ruta, a 3 m. de altura. Mide 50 cm. de profundidad. En la cámara platito de pajitas y algunas plumas. Tenía 2 pichones. Otro nido en una grieta en la montaña, a 2,60 m. del suelo. Tenía 2 huevos.
Salvador (2015). Sierra de Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 05-03-1986, nido con 2 huevos. Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, 2 pichones.
Salvador en Salvador (2016a). La Rioja. Nido.
Höy en De la Peña (2016d). Cordillera de Salta, 25-11-1980, nido a 1,30 m del suelo, en el fondo de un túnel de 0,70 m de profundidad, en una barranca. Lecho de pastos, lana y plumas, 2 huevos.

Azul Pampa. Jujuy. 23-02-1979

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy en De la Peña (2016d): 26,2 a 26,8 x 20,2 a 20,5 X= 26,5 x 20,3 (N= 2)

PICHONES
Salvador (2015). Comisuras amarillentas e interior de la boca amarillo intenso.

Observaciones
Navas (1971b). Las Flores, San Juan, captura de una hembra con un huevo formado y otra con dos.
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas, garganta y pecho blanquecinos. Cola con negro y castaño. Pico largo, recto.
Diferenciarla de la Bandurrita cola castaña y de la Bandurrita patagónica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ochetorhynchus ruficaudus montanus (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 3500 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán; *Ochetorhynchus ruficaudus famatinae* (Nores 1986) en La Rioja y *Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus* Meyen, 1834 por el Oeste desde San Juan hasta Santa Cruz.

Observada en La Pampa y Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Cordillera de los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ochetorhynchus ruficauda montanus (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1951); Navas (1971b); Nores (1995); Salvador (2015)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Esteban (1951); Mamaní et al. (2018); Narosky et al. (1983); Salvador (2015)

Salta
Citas: Höy en Narosky et al. (1983); Moschione et al. (2013); Navas (1971b); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Esteban (1951); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lillo (1905); Lucero (1983); Navas (1971b); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

Ochetorhynchus ruficauda famatinae (Nores 1986)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Chebez (2005); Nores (1986, 1995); Salvador (1990a)

Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus Meyen, 1834

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Navas (1971b); Vuilleumier (1993b)

Córdoba
Citas: Pagano, L. en Salvador et al. (2017)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Tejerina et al. (2006); Tittarelli y Tiranti (2002)

Mendoza
Citas: Burmeister (1861); Contreras y Davies (1980); Darrieu y Segura (2015); Esteban (1951); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Navas (1971b); Olivera et al. (2009); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Chehebar et al. (1992); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1971b); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Canevari et al. (1991a); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas (1971b); Povedano (2016)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Contreras y Davies (1980); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas (1971b); Navas y Bó (1971b); Nores (1995); Ortiz et al. (2013, 2016)

Santa Cruz
Citas: Pagano y Salvador (2017); Roesler et al. (2014)

BANDURRITA PATAGÓNICA *Ochetorhynchus phoenicurus* (Gould, 1839)

Otros nombres: Bandurrita de cola negra. Bandurrita turca. Patagón. Turca. Turco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (M) 34 g
Navas (1971b): N= 3 (M) X= 30,9 g (Rango: 29 a 33,6); N= 3 (H) X= 29 g (Rango: 27,9 a 29,6)
Contreras y Davies (1980): N= 10 (M) X= 31,6 g (Rango: 28,8 a 34,8); N= 6 (H) X= 29,40 g (Rango: 27,9 a 30,4)
Christie et al. (2004): N= 2 (M) 31 y 33 g

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal parda. Cejas blancas. Ventral ocrácea con leve jaspeado de pardo oscuro. Alas pardas con banda canela. Cola castaña con el tercio terminal negro.

COMPORTAMIENTO
Anda entre los matorrales.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es un agudo y chirriante Chiirrrrrrrrrrr seguido de varias notas ti..ti..ti..ti..

HÁBITAT
Estepas arbustivas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Construye el nido con palitos. En la cámara coloca materiales suaves y plumas. Tiene forma globular alargada.

Peters (1923b). Río Negro. Nido.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.
Vaurie (1980). Pemberton, en Río Negro, 5 nidos. Todos en matas de arbustos entre 0,90 y 1,80 m del suelo. De estos nidos 2 estaban en Cabeza de Vaca, con 2 y 3 huevos; 3 en Corral Chico, el 22-09-1911, 26-09-1911 y 27-09-1911, con 3, 2 y 4 huevos respectivamente.
Narosky en Narosky et al. (1983). Dpto. Rawson, Chubut, 25-01-1971, pichones.

Straneck en Narosky et al. (1983). Punta Tombo, dpto. Ameghino, Chubut, 05-11-1982, nido terminado sin postura. Estaba en un Piquillín (*Condalia*) a 1,20 m del suelo. Forma oval con tubo de entrada. Largo 60 cm de los cuales 25 corresponden al tuvo, altura 24 cm. Cámara de 11 cm bien revestida de plumas y ootecas de arañas.
Kiff en Narosky et al. (1983). Río Negro. Nido.
De la Peña (2013c). Villavivencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 12-01-1982, nido en un arbusto a 1,60 m del suelo, 4 huevos.
Medidas: Largo total: 35 cm. Ancho: 15 cm. Alto: 17 cm. Diámetro de la boca 3,5 cm. Largo del túnel: 25 cm. Diámetro interno de la cámara 8 cm.
Uranga, M. en De la Peña (2016d). Camarones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 03-12-2013, 2 nidos con 2 y 3 huevos cada uno.

Huevos
Pone de 2 a 4 huevos blancos.

Medidas

Kiff, L. en Narosky et al. (1983): 22,1 a 26,3 x 16,7 a 17,8	X= 23,9 x 17,3	(N= 14)
De la Peña (2013c): 24,0 a 24,2 x 16,8 a 17,2	X= 24,0 x 17,0	(N= 4)

Peso

Kiff, L. en De la Peña (2016d) en Narosky et al. (1983): cáscara 0,215		
De la Peña (2013c): cáscaras 0,189 a 0,200	X= 0,195	(N= 4)

Camarones. Chubut. 03-12-2013 Foto: Máximo Uranga

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Ellis et al. (2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, recto. Ceja blanca. Ventral con leve jaspeado. Cola castaña en la base, resto negro.
Diferenciarla de la Bandurrita cola castaña.
De la Bandurrita pico recto se diferencia por ser de menor tamaño, más jaspeada en ventral y con toda la base de la cola castaña.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ochetorhynchus phoenicurus (Gould, 1839) desde Mendoza, Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Contreras y Davies (1980); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Esteban (1951); Harris (2008); Narosky et al. (1983); Navas (1971b); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Vuilleumier (1993)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 04-11-1979)

La Pampa
Citas: Di Giacomo et al. (2005)

Mendoza
Citas: Darrieu y Segura (2015); De la Peña (2013c); Ferrer et al. (2019); Navas y Bó (1987a); Salvador y Narosky (1987); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1976, 1977b); Contreras y Davies (1980); Del Valle et al. (1989); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1971b); Navas y Bó (1987a); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Christie et al. (2004); Contreras y Davies (1980); Esteban (1951); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas (1971b); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1990); Partridge en Navas (1971c); Peters (1923b); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Esteban (1951); Gould y Darwin (1838-1841); Humphrey et al. (1985); Imberti y Albrieu (2001); Navas (1971b); Olrog (1948); Sclater (1890); Scott (1900b); Stone (1928); Zapata (1967)

Tierra del Fuego
Citas: Esteban (1951)

BANDURRITA BOLIVIANA *Tarphonomus harterti* (Berlepsch, 1892)

Otro nombres: Bandurrita valluna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.

Coloración. Iris pardo. Pico largo, ligeramente curvado, negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas oliváceas.
Cejas superciliares blanquecinas. Corona parda. Rabadilla rojiza. Garganta y región malar blancas. Resto de lo ventral ocráceo-rojizo. Alas con la base rojiza. Cola redondeada, parda con la base rojiza.

COMPORTAMIENTO

HÁBITAT
Zonas áridas montañosas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tarphonomus harterti (Berlepsch, 1892) observada en el norte de Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Bolivia y zona adyacente del noroeste de Argentina, por encima de los 2500 metros de altura

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

BANDURRITA CHAQUEÑA *Tarphonomus certhioides* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Adivino. Bandurrita chica. Bandurrita enana. Chaguanera. Misinol. Picatierra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 1 (M) 26,2 g
Navas y Bó (1987a): N= 13 (M) X= 22,3 g (Rango: 24,4 a 28,3); N= 8 (H) X= 28,0 g (Rango: 24,7 a 34,3) (*luscinia*)
Navas y Bó (1987a): N= 1 (M) X= 27,3 g; N= 1 (H) X= 26,8 g (*certhiodes*)
Salvador (1988): N= 2 (?) 23,0 y 31,0 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 3 (H) 21,8, 24,8 y 26,4 g
Camperi (1992a): N= 1 (M) 32,0 g; N= 1 (H) 28,1 g
Blendinger (1999): 22,6 g
Blendinger (2005): X= 23,4 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 18 X= 22,6 g (Rango: 17 a 27 g) (*luscinia*)
Alderete y Capllonch (2010): N= 10 X= 23,9 g (Rango: 21 a 26 g) (*certhioides*
Salvador (2014a): N=3 (?) X= 28,3 g (Rango: 27,2 a 29,8) (*estebani*)

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula corneo clara con ápice pardo. Patas pardas oscuras. Iris pardo oscuro.
Dorsal parda. Frente castaña. Garganta blanca. Ventral parda canela. Flancos pardos. Alas castañas. Frente del ala una mancha blanquecina. Cola parda con tono castaño.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en pareja, en la parte baja o media de los árboles o en los matorrales. Inquieta. Canta fuerte.

Alimentación
Zotta (1940). **Insectos:** Orthópteros.
Kratter et al. (1993). **Insectos:** Dípteros. Escarabajos. Orthópteros.
Cueto y Mezquida (2001). **Aves:** Huevos.
Laguna et al. (2005). **Aves:** Huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Buprestidae). Hymenoptera (Vespidae).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Salvador et al. (2017). Arácnidos, savia.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su canto es una sucesión de sílabas con una ligera modulación de amplitud ascendente y descendente: TititiTititititi....titiTitititit.. Otra voz es un irregular tiu..tio..tie..tiu...

HÁBITAT
Montes en llanuras o en serranías.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Tucumán, Mendoza, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Construye el nido en huecos en ramas o troncos, en grietas, en cajas-nidos o en nidos abandonados de Hornero. Acolcha la cámara con pelusas vegetales suaves, pelos, exuvias, papeles, plásticos.

Partridge (MACN), en Fraga y Narosky (1985). San Luis del Palmar, dpto. San Luis del Palmar, Corrientes, 26-11-1961, 2 huevos.
Partridge (MACN). Alta Gracia, dpto. Santa María, Córdoba, 10-12-1963, 3 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral Obligado, Santa Fe, 3 de diciembre, nido en un hueco de un tronco, 2 huevos.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Febrero de 1919 nido con un pichón.
Pereyra (1942a). La Cumbre, dpto. Punilla, Córdoba, nidos en octubre en huecos y hendiduras.
Masramón (1962). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, febrero, nido entre las chapas de un techo y la pared de una casa, 4 huevos.
Masramón (1971). San Luis, nidifica en oquedades, pone 4 huevos.
Narosky (1975). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 03-11-1970, 3 huevos.
Masramón en Narosky et al. (1983). Cuatro nidos: Cerro del Moro, San Luis, diciembre de 1975, pichones; Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 06-12-1976, 4 huevos; 04-12-1979, pichones; 13-10-1980, 2 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Dos nidos: Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 13-10-1971, entre las chapas y las tejas de un rancho, pichones. La Banda, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 15-10-1971, en un nido de Hornero (*Furnarius rufus*), pichones.
Darrieu y Camperi (1990). Provincia de Corrientes, en noviembre un nido con 2 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 2 nidos.
Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005, 2 nidos en nidos de *Colaptes* sp. y uno en *Furnarius rufus*.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 3 nidos.
De la Peña (2013c). Arauz, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 07-10-1972. Nido en un hueco en un tronco de Algarrobo, a 3 m. del suelo. La boca mide 4,5 cm. de diámetro y la profundidad es de 35 cm. Diámetro interno: 10 cm. La base de la cámara acolchada con pelusas vegetales, pelos de cuís y "exuvias" de víboras. Este día tenía un huevo. El día 13 había puesto más exuvias y huevos. 22-10-1976, Vaquerías, dpto. Punilla, Córdoba. Nido en un hueco entre piedras de un cerco, a 50 cm. del suelo. Tenía pichones. 04-10-1989, Morteros, dpto. San Justo, Córdoba. Nido en construcción a 70 cm. del suelo, en un hueco en un Chañar seco. Otro en nido abandonado de *Furnarius rufus* en un Chañar, a 4,80 m. de alto. El ave entraba por un hueco en la parte posterior del nido, no por

la entrada principal. La cámara acolchada con algunas pajitas, había además un trocito de exuvia de lagartija, un pedacito de papel y otro de plástico. Tenía 4 huevos.
Otro en uno de *Furnarius rufus*, a 3,50 m. El nido estaba integro. Acolchó la base con Barba de viejo y pelos de Cuis. Tenía 2 pichones con mediano desarrollo y 2 huevos. 03-12-2010, Jesús María, dpto. Colón, Córdoba. Nido en caja-nido, colocada a 2,70 m del suelo, 4 huevos. Colocó en la cámara algunos "exuvias" de víboras. Nacieron y volaron 3 pichones.
Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 3 huevos.
Girard en Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 3 huevos.
Girard en MVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a). Chaco. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, celeste verdosos.

Medidas

Partridge (MACN): 23,1 a 23,2 x 18,3 a 18,6	X= 23,1 x18,4	(N= 2)
Hartert y Venturi (1909): 24,5 a 25,5 x 18,3 a 18,8	X= 25,0 a 18,5	(N= 2)
Pereyra (1942a): 22,0 x 18,0		
Masramón (1971): 23,0 x 17,0		
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 23,1 a 25,0 x 17,9 a 18,5	X= 24,2 x 18,3	(N= 3)
De la Peña (2013c): 22,4 a 24 x 17,5 a 18,0	X= 22,6 x 17,7	(N= 5)

Pesos

De la Peña (2013c): 3,4	X= 3,4	(N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,246 a 0,300	X= 0,273	(N= 5)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 17 a 18 días.

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. Implumes y la piel es color rosado. Comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 4,5 a 6,3 X= 5,4 (N= 9)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 19 a 21 días.

Otros

Salvador y Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.* Salvador (2013b). Salvador y Bodrati (2014a). Es parasitado por *Molotrhus bonariensis*.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, noviembre de 1998, Bodrati observó un adulto alimentando un pichón de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Parda con las alas y la cola, castañas. Notable garganta blanca. El canto.

Jesús María. Córdoba. 02-12-2010

Jesús María. Córdoba. 15-12-2010

J. Arauz. Santa Fe. 07-10-1972

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tarphonomus certhioides luscinius (Burmeister, 1860) en Mendoza, San Juan, Córdoba; *Tarphonomus certhioides estebani* (Wetmore y J.L. Peters, 1949) desde Jujuy y Salta, por el oeste, hasta San Luis, Córdoba, La Pampa, suroeste de Buenos Aires y Río Negro; *Tarphonomus certhioides certhioides* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) desde el este de Jujuy y de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Corrientes hasta el centro de Entre Ríos y de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Este de Bolivia, Paraguay y en una importante extensión de Argentina (ambiente árido de Chaco y Monte) hasta la Patagonia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tarphonomus certhioides luscinius (Burmeister, 1860)

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Pereyra (1942); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019)

Observaciones: De la Peña (Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1986); Di Giácomo et al. (2007); Esteban (1951); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895); Nores y Cerana (1990)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979); Contreras y Davies (1980); Contreras y Fernández (1980); Esteban (1951); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida (2001b); Navas y Bó (1987a)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995) (*); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Navas y Bó (1987a); Salvador (1988)

Tarphonomus certhioides estebani (Wetmore y J.L. Peters, 1949)

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (1997); Bodrati y Salvador (2015a); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1987b); Maugeri (2002a); Morici (2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Roesler (2001a)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Esteban (1951); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Chaco
Citas: Esteban (1951)

Córdoba
Citas: Cabanis (1878); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Narosky (1975); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (2012c); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa Albertina, dpto. Ischillín, 19-09-2002; Jesús María, dpto. Colón, 03-12-2010)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Esteban (1951); López Lanús (1997); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Di Giacomo et al. (2007); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990) (*); Bruno et al. (2007) (*); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a) (*); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005) (*); Maceda et al. (2001) (*); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004) (*)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Pérez et al. (2006); Povedano (2016)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Esteban (1951); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Salvador (1988)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Esteban (1951); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2020); Esteban (1951); Hartert y Venturi (1909)
Lucero (1983)

Tarphonomus certhioides certhioides (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Buenos Aires
Citas: Esteban (1951)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Esteban (1951); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Navas y Bó (1987a); Salvador (2013b); Salvador y Bodrati (2013a); Straneck (1990d)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Pereyra (1951)

Formosa
Citas: Esteban (1951); López Lanús (1997)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, dpto. Cafayate, 07-02-1977)

San Luis
Citas: Navas y Bó (1987a)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Esteban (1951); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero

Citas: Narosky et al. (1983)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch y Ortiz (2006); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

HORNERO *Furnarius rufus* (J.F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Albañil. Alonsito. Alonso. Alonso García. Caserita. Casero. Catalina. Hornerillo. Hornero común.

DESCRIPCIÓN

Largo: 19 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 10 X= 43,7 g (Rango: 42,0 a 48,0)
Contreras (1979f): N= 4 (M) 57,5, 50,5, 57,0 y 59,0 g; N= 1 (H) 48,5 g
Contreras y Davies (1980): N= 8 (M) X= 53,1 g (Rango: 49,3 a 59,5 g); N= 13 (H) X= 54,4 g (Rango: 49,3 a 59,5)
Navas y Bó (1987a): N= 5 (M) X= 53,6 g (Rango: 46,4 a 55,4); N= 7 (H) X= 56,6 g (Rango: 45,0 a 64,2) (*rufus*)
Salvador (1988): N= 2 (?) 58,0 g y 56,5 g
Navas y Bó (1990); 3 machos 54,3, 55,8, 55, 9 X= 55,3
Darrieu y Camperi (1990): N= 2 (M) 51,0 y 55,4 g; N= 2 (H) 54,5 y 58,1 g
Camperi (1992a): N= 1 (H) 55,4 g
Di Giacomo (2005h): N= 9 X= 44,1 g (Rango: 41,5 a 47,5)
Blendinger (2005): X= 45,0 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 4 X= 40,6 g (Rango: 36,5 a 45 g) (*comerson*i)
Alderete y Capllonch (2010): N= 15 X= 23,1 g (Rango: 22 a 26 g) (*paraguayae*)
Alderete y Capllonch (2010): N= 35 X= 46,6 g (Rango: 39 a 60 g) (*rufu*s)
Salvador (2014a): N=3 (?) X= 57,7 g (Rango: 53,2 a 61) (*paraguayae*)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 28 X= 56,5 (Rango: 51,0 a 66,0) (*rufus*); N= 9 X 45,1 g (Rango: 42,5 a 48,0) (*paraguayae*)
Pagano y Salvador (2017): N=4 (?) X= 60 g (Rango: 57 a 63); N=1 (?) 52 g

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula pardo oscura con base crema pardusca o pardo clara. Patas pardas oscuras. Iris pardo anaranjado.
Dorsal parda con tono castaño. Garganta blanca. Ventral gris ocrácea. Alas pardas con banda canela. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Canta fuerte, tanto de día como de noche.
Recolecta alimentos en el suelo.

Alimentación
Marelli (1919). Insectos. Arena.
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Cassidae, Carabidae) (Curculionidae, Chrysolelidae). Hormigas. Lepidópteros. Ortópteros. **Arácnidos.**
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Chrysolelidae) (Curculionidae, Chrysolelidae, Elatiridae). Hormigas (*Pheidole, Crematogaster, Acromyrmex*). **Moluscos:** *Planorbis* sp. **Minerales. Vegetales**.
Williamson (1975). **Insectos:** Chinches verdes (Pentatomidae).
Martínez et al. (1975). **Insectos. Crustaceos:** (Isopoda).
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto de Paraíso *Melia azedarach*.
Mason (1985). **Insectos:** Curculionidae. Gryllidae. Gryllotalpidae.
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae: *Gonipterus* sp., Tenebrionidae). Homoptera (Cercopidae). Orthoptera (Acridiidae). **Arácnidos:** Araneae.
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Hidrophylidae, Curculionidae). Homópteros. Hymenópteros (Formicidae, *Pseudomyrmex* sp., *Acromyrmex* sp., *Camponotus* sp.). **Vegetales:** Semilla *Solanum* sp.
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.). **Crustáceos:** Cangrejo (*Dilocarcinus pagei*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas, no identidicado). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Tettigonidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*). **Anélidos:** Oligoquetos. **Arácnidos:** (arañas).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Cucaracha *Blatta orientalis*, Grillo *Gryllus argentinus*.**Otros:** Lombrices. Carne. Pan.

Heredia et al. (2010). **Peces:** Mojarras. **Anfibios:** Renacuajos.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** Renacuajos.
Acosta (2013). **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
De la Peña y Pensiero (2017): Fruto de Mora (*Morus alba*)
Quiroga (2017b). Insectos.
De la Peña (2019b). Esperanza: Sebo vacuno, 10-09-2016, 15-09-2016, 25-08-2018; Pan, 10-09-2016; Maiz (partido), 15-09-2016; Arroz cocido, 27-08-2018; Villa Roda: 11-10-2017. **Anfibio:** Rana criolla (*Leptodactylus latrans*)

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto lo hacen a dúo los integrantes de una pareja. Mientras uno de ellos realiza un largo Tiriritititiitit.ti.ti.Ti.Ti.Ti.., el otro intercala agudos y sonoros Ti.ti ti..tie..ti ti ti.

HÁBITAT
Áreas rurales, praderas, sabanas, montes, parques y jardines en áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, San Luis, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N

Construye el nido con barro y pajitas entremezcladas. A veces también estiércol. Tiene forma redondeada, con entrada ovalada, corto túnel separado de la cámara por un tabique. En ésta coloca algunas pajitas y cerdas. Lo ubica en postes, ramas de árboles, molinos, tranqueras, edificios, también en el suelo o dentro de recipientes.
En oportunidades nidos superpuestos, uno arriba de otro, hasta cuatro. A veces nidos anómalos, con la boca hacia arriba, con dos bocas, con bocas clausuradas o deformes.

Girard (IML). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 28-10-1931, 2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*.
Sternberg (1869). Buenos Aires. Nido.
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas desde setiembre a diciembre. Pone 4 huevos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Barrows (1883). Entre Ríos. Nido.
Holland (1892). Buenos Aires. Nido
Miller (1917). Rosario de Lerma, dpto. Rosario de Lerma, Salta, 10-01-1915, 2 pichones y 2 pichones de *Molothrus bonariensis*; 13-01-1915, un huevo de hornero y 4 de *Molothrus bonariensis*; 16-01-1915, un huevo de hornero y 37 de *Molothrus bonariensis* podridos y/ abandonados.
Gibson (1918). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas desde setiembre a diciembre.
Daguerre (1920, 1922, 1924). Buenos Aires. Nido.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos. Nidificando.
Castellanos (1926). Buenos Aires. Nido.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
Wetmore (1926b). Buenos Aires, es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Friedmann (1927, 1929). Tucumán, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Friedmann (1927). Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Nidos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. Santa Elena, Entre Ríos, 08-12-1922, 3 huevos; Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 16-12-1919, 4 huevos, 10-12-1917, 5 huevos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica.
Pereyra (1934c). Zelaya, pdo. del Pilar, Buenos Aires, nido en un hoyo.

Albornoz (1936). La Paz, dpto. La Paz, Entre Ríos, nido dentro de una vasija en el suelo, 3 huevos.
Pereyra (1937b). Nidifica en La Pampa.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos.
Pereyra (1940a). Buenos Aires. Zelaya, pdo. del Pilar, Buenos Aires, nido en el suelo.
Davis (1940c). Entre Ríos. Nido.
Mac Donagh (1953). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos Aires, nido en el suelo.
Partridge (1953c). San Luis. Nido.
Drabble (1953). Gualeguaychú, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, nido en el suelo.
Mac Donagh (1953). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos Aires, nido en el suelo.
Masramón (1962). San Luis, nidifica.
Höy y Ottow (1964). Salta, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Herman y Meise (1965). Las Rosas, dpto. Belgrano, Santa Fe, posturas desde el 10 de seteimbre a 29 de noviembre, 3 ó 4 huevos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires, nido con 3 huevos.
Masramón (1971). Nidifica en San Luis.
Burger (1976). Venado Tuerto y Murphy, dpto. Gral. López, Santa Fe, octubre-noviembrede 1972, nidos.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidos en Eucaliptus.
Wilson (1979). Corrientes. Nido.
Fraga (1979b). Buenos Aires. Nido.
Burger (1979). Buenos Aires. Nido.
Fraga (1980). Pdo. Lobos, Buenos Aires, entre 1970 y 1976, desde el 31-08 al 06-12, 17 nidos con 3 huevos y 16 con 4 huevos.
Contino (1980). Nidifica en el noroeste.
Masramón en Narosky et al. (1983). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 30-11-1976, 4 huevos.
Salvador en Narosky et al. (1983). Ballesteros Sud, dpto. Unión, Córdoba, 06-11-1982, 4 huevos de *Furnarius rufus* y 1 de *Molothrus bonariensis*, manchado; 04-12-1982, 3 huevos de *F. rufus*, un pichón de *Molothrus bonariensis* y 2 huevos de *Molothrus bonariensis.*
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 12,8 % (5 de 39) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (1984). Villa María, dpto. Gral. San Martín, 08-11-1981, 4 huevos propios y 5 de *Molothrus bonariensis*; 12-12-1982, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; Ballesteros Sud, dpto. Unión, Córdoba, 06-11-1992, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 04-12-1982, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 04-12-1982, 3 huevos propios, 2 de *Molothrus bonariensis* y un pichón de esta especie; Monte Yucat, dpto. San Martín, Córdoba, 18 huevos de *Molothrus bonariensis* (aparentemente abandonado; Las Mojarras, dpto. San Martín, Córdoba, 3 huevos propios y 5 de *Molothrus bonariensis*; Tío Pujio, dpto. Córdoba, 3 huevos propios y 3 de *Molothrus bonariensis.*
Mason (1985). Buenos Aires. Nido.
Mason (1986). Buenos Aires, parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Mason y Rothstein (1986). Buenos Aires. Nido.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 4 nidos.
Haro y Gutierrez (1992). Cçórdoba. Nido.
Babarskas et al. (1995). Salta. Nido.
López Lanús (1997). Formosa. Nido.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, octubre de 1992, 2 nidos con huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nidifica.
Leiva et al. (2004). Misiones, Santa Fe, Córdoba. Nidos.
ldatz et al. (2005). Buenos Aires. Nido.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a diciembre. Se estudiaron 59 nidos.
Tajer et al. (2007). Buenos Aires. Nido.
Turienzo y Di Iorio (2010). Córdoba y Buenos Aires, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Turienzo y Di Iorio (2010). Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa. Nidos.
De Mársico et al. (2010b). Buenos Aires, Massoni y Reboreda, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Gelain (2012e). San Juan. Nido.

Massoni et al. (2012). Buenos Aires. Nido.
Salvador (2012f). Corrientes, Jujuy, La Rioja, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 231 nidos. Se reproduce de agosto a enero. Posturas de 3 a 5 huevos.
De la Peña (2013c). Total de nidos: 196. Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 6 nidos el resto en provincia de Santa Fe.
Esperanza, 02-10-1974, nido con dos bocas. Una estaba clausurada. Rincón de Ávila, dpto. La Capital, Santa Fe, 02-10-1978, 4 nidos superpuestos. Esperanza, 10-09-1979, nido con dos bocas. Esperanza, 24-10-1979, nido con la boca hacia arriba. Esperanza, 31-10-1986, 2 nidos superpuestos. Cacique Ariacaiquín, dpto. San Javier, Santa Fe, 08-12-1990, nido con la boca redonda en la parte media del nido. Cayastá, dpto. Garary, Santa Fe, 12-09-1912, nido sobre un tacurú (hormiguero).
Medidas: Alto: de 15 a 22 cm. Ancho: de 23 a 25 cm. Largo: de 23 a 25 cm. Alto de la boca: de 7 a 8 cm. Ancho de la boca: de 3 a 4 cm. Diámetro de la cámara: de 13 a 15 cm. Alto del tabique: 5 cm. Grosor de las paredes: de 3 a 5 cm.
Altura: el nido más bajo estaba en el suelo y el más alto a 11 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 6 nidos con 3, 3, 3,2, 2 y 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 4 nidos.
Di Giacomo en Salvador y Bodrati (2014a). Buenos Aires. Nido.
Pintos et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Miquel et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Chaco, Corrientes, Salta, Formosa, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires. Nidos.
Salvador en Salvador (2016a). Río Negro, Chaco, Corrientes. Nidos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Quiroga (2017b). Tucumán, nido.



Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 27,0 a 35,0 x 19,0 a 23,0	X= 29,2 x 21,5 (N= 4)
Smyth (1928): 27,0 a 30,0 x 20,5 a 22,0	
Zapata y Cabrera (1969): 28,2 a 28,5 x 22,3 a 22,7	X= 28,3 x 22,5 (N= 3)
Masramón (1971):	X= 29,0 x 22,0
Contino (1980): 28,0 x 22,0	
Fraga (1980): 26,8 a 30,9 x 20,7 a 22,3	X= 29,2 x 21,5 (N= 23)
Narosky en Narosky et al. (1983): 25,7 a 28,4 x 20,5 a 21,9	X= 27,0 x 21,5 (N= 7)
Alabarce y Antelo (1998): 26,0 x 19,8	
Di Giacomo (2005h): 25,1 a 29,9 x 19,3 a 22,6	X= 27,3 x 20,8 (N= 73)
Salvador (2013b): 26,3 a 29,9 x 20,1 a 22,5	X= 27,9 x 21,4 (N= 161)
De la Peña (2013c): 26,9 a 31,5 x 20,4 a 23,9	X= 28,6 x 21,7 (N= 29)

Pesos
Fraga (1980): 7,1
Di Giacomo (2005h): 4,9 a 7,5 X= 6,0 (N= 71)
Salvador (2013b): 5,2 a 7,8 X= 6,8 (N= 122)
De la Peña (2013c): 6,4 a 7,2 X = 6,8 (N= 9)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,400 a 0,600 X= 0,450 (N= 20)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Implumes. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. Pico y piel color natural. Punta del pico más oscura.
4 días.
Ojos entreabiertos. Comisura amarilla. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillentos.
Aparecen las vainas en las zonas ptéridas. Alas y cola con vainas grises. Ventralmente vainas claras.
5 días.
Ojos abiertos, pardos. Pico grisáceo. Piel rosada. Patas grises.
10 días.
Las láminas de las plumas dorsales pardas con tono castaño. Ventralmente blanquecinas-grisáceas con ocráceo en los flancos. Aparecen las láminas de las plumas alares, de la cola y en la cabeza.
16 días.
Plumaje de adulto. Gritan fuerte.

Generalidades
Fraga (1980). Período de incubación de 16 a 17 días. Los pichones permanecen en el nido 24 a 26 días
Contreras (1990b). El período de incubación es de 13 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos son puestos en días alternos. El período de incubación es de 16 ó 17 días. Los pichones permanecen en el nido de 19 a 23 días. Ambos padres alimentan a los pichones. El 59,3 % de los nidos estudiados fueron parasitados por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 15-20 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación 16-17 días. Permanencia de los pichones en el nido 20-23 días
Gibson (1880a). Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Quiroga (2017b). Tucumán, nido. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Otros
De la Peña (2003a). En la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza se realizó un estudio de la nidificación simultánea y dio como resultado en el año 1998, 0.71 nidos por hectárea y en el año 2002, 1,53 nidos.
De la Peña y Bruno (2008). Un ejemplar Albino parcial (M. de la Peña) y un Albino (F. Bruno)
Turienzo y Di Iorio (2010). Antoniazzi et al. (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (2013b). Se hallaron 57 nidos (24.7%) parasitados por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2003a). 12 nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Bodrati (2014a). Capital Federal y Carmen de Patagones, pdo. Patagones, Buenos Aires, A. Di Giacomo observó adultos de esta especie alimentando pichones de *Molothrus bonariensis.*
Quiroga y Alderete (2015). Picoteando un Moloso común.
Thomann et al. (2018). Ejemplar con plumaje ino.
De la Peña (2019b). El 13-02-1997 en Esperanza un adulto tenía las dos alas blancas. Andaba con uno de coloración normal.

Observaciones
Bianchini en Salvador (2016a). Neuquén. Adulto con pichones parásitos

Depredadores
De adultos: *Rupornis magnirostris* en Buenos Aires, Morici (2010), *Tyto alba* Morici en Buenos Aires, (2009e), en Córdoba, Salvador (2017a), *Glaucidium brasilianum* en Buenos Aires, Pereyra, C. B. de. (1927), en La Pampa, Santillán et al. (2008a), *Glaucidium nana* en Santa Cruz, Santillán et al. (2008b), *Athene cunicularia* en Buenos Aires, Sánchez et al. (2008), *Asio clamator* en Buenos Aires, Baladrón y Bó (2017), *Falco sparverius* en Córdoba, Salvador (2017a), *Falco femoralis* en Buenos Aires, Bó (1999), Salvador y Salvador en Córdoba, en De la Peña y

Salvador (2010), en Córdoba, Salvador (2012h), en Buenos Aires, Fraga en Salvador (2017a), en La Pampa, Liébana (2015), *Falco rufigularis* en Formosa, Di Giacomo (2005h)
Mamífero: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Buenos Aire, Fraga (1980)
De volantones: *Rupornis magnirostris* en Córdoba, Salvador (2016b)
De pichones: Culebra del pastizal (*Philodryas patagoniensis*) en Santa Fe, De la Peña (1990a), *Geranoaetus melanoleucus* en Santa Fe, Hermann y Meise (1965), Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) en Buenos Aires, Fraga (1980)
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Córdoba, Salvador (2011)

Más información:
Durnford (1876). Barrows (1883a). Doello-Jurado (1919). Serié (1919). Daguerre (1921). Sathicq (1921). Basterreix (1923a, 1923b). Castellanos (1926). Fraga (1980). Friedmann (1927, 1929). Cordero (1931). Agrelo (1933). Harper (1934). Burghi (1937). Gavio (1938). Pereyra (1939, 1940a). Anónimo (1940). Mac Donagh (1942b). Diesselhorst y Hermann (1958). Carman (1973, 1977a). Hudson (1974). Fraga (1979b). Salvador (1983b, 2013b). Salvador y Salvador (1984). Mason y Rothstein (1986). Mason (1985, 1986). Aldatz et al (2005). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración pardo castaña con la garganta blanca y la cola rojiza. El canto.

Esperanza. Santa Fe. 01-11-2009

Esperanza. Santa Fe. 04-11-2011. Bañándose

Esperanza. Santa Fe. 12-12-1998

Esperanza. Santa Fe. 14-03-2008

Esperanza. Santa Fe. 27-08-2007

Esperanza. Santa Fe. 29-03-2008

Laguna Paiva. Santa Fe. 15-12-1981

Esperanza. Santa Fe. 24-10-1979. Boca arriba

Esperanza. Santa Fe. 11-11-2002

Monte Vera. Santa Fe.11-11-1995. Nido en el suelo

Recreo. Santa Fe. 25-04-2000

Esperanza. Santa Fe. 31-10-2008
Alimentando a *Molothrus bonariensis*

Esperanza. Santa Fe. 10-09-1979

Jesús María. Córdoba. 10-06-2010

Rincón de Ávila. Santa Fe. 02-10-1978

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Furnarius rufus commersoni Pelzeln, 1868 en el norte de Salta y sureste de Jujuy; *Furnarius rufus paraguayae* Cherrie y Reichenberger, 1921 en el norte del país, al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y La Rioja y *Furnarius rufus rufus* (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones, Corrientes, Entre

Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, y San Luis, hasta Neuquén, Río Negro, Chubu y Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Amplia área de distribución en centro y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay hasta el sur de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Furnarius rufus commersoni Pelzeln, 1868

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi et al. (2013); Cherrie y Reichenberger (1921); Chebez et al. (1998); Esteban (1951); Fiora (1933); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 11-02-1983)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Esteban (1951); Miller (1917); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 04-12-1977)

Furnarius rufus paraguayae Cherrie y Reichenberger, 1921

Catamarca
Citas: Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Navas y Bó (1987a); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Esteban (1951); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2014)

Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 03-05-1988)

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); Frenzel (1891); Nores (1996); Salvador (1983, 2016b); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Esteban (1951); Grant (1911a); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Esteban (1951); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Pereyra (1944b)

Observaciones: De la Peña (Pinto, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández et al. (2018); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2020); Echevarría et al. (2011b); Esteban (1951); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2010, 2017); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2018b); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 03-01-1977)

Furnarius rufus rufus (J. F. Gmelin, 1788)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Baladrón y Bó (2017); Bauni et al. (2017); Bó (1999); Bodrati et al. (2006b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Esteban (1951); Fiameni (1994); Fraga (1980, 1979b); Gasparri et al. (2018); Gibson (1880a, 1918); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Leveau y Leveau (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009e, 2010, 2012b); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas (1970b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pagano y Salvador (2017); Pereyra (1923b, 1934a, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Fraga en (Salvador 2017); Sánchez et al. (2008); Serié (1919); Smyth (1928); Soave et al. (1999b); Straneck (1990b); Turienzo y Di Iorio (2010); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Harris (2008); Nores y Yzurieta (1981); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Gaiman, dpto. Gaiman, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Baldo y Ordano (1993); Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Esteban (1951); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Ordano (1996); Partridge (1953c); Salvador (1988, 2011, 2013b, 2013e, 2016b, 2017); Sferco y Nores (2003); Torres et al. (2019); Turienzo y Di Iorio (2010); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (San Francisco, dpto. San Justo, 14-08-1972; Río Primero, dpto. Río Primero, 13-06-2004; Chaján, dpto. Río Cuarto, 13-10-2004)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1990); Esteban (1951); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Heredia et al. (2010); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (1999, 2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baez (1919); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2012b); Esteban (1951); Fandiño et al. (2010); Hartert y Venturi (1909); Heredia et al. (2010);

Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al (1998); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas (1970b); Navas y Bó (1986); Pereyra (1937); Santillán et al. (2008a); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al (1990); Tejerina et al. (2006); Turienzo y Di Iorio (2010); Williamson (1975)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Hayward (1967)

Mendoza,
Citas: Blendinger (2005); Calí et al. (2008); Contreras y Davies (1980); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Navas y Bó (1987a); Roig (1965); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-2004)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Esteban (1951); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Santo Pipó, dpro San Ignacio, 10-10-1981)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras y Davies (1980); Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Navas (1970b); Navas y Bó (1990); Nores e Yzurieta (1982b, 1982); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Gazari (1967); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Llanos y García (2005); Navas (1970b); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Ortiz et al. (2016, 2018e)

Gelain (2008a, 2014a; Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1987a); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (Matagusanos, dpto. Ullún, 15-12-1981)

San Luis
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Casares (1944b); Masramón (1971, 1983); Navas y Bó (1987a); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpro. Mercedes, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Santillán et al. (2008b**)**

Santa Fe
Citas: Antoniazi et al. (2011); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (1990a, 2003a, 2011f, 2013c); Esteban (1951); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Herman y Meise (1965); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Thomann et al. (2018); Wilson (1926)

HORNERITO COPETÓN *Furnarius cristatus* Burmeister, 1888

Otros nombres: Caserito copetudo. Hornero copetón. Hornero de copete.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15,5 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 2 (M) 26,0, 26,2 g
Salvador (1990a): N= 1 (?) 25,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 11 X= 23,6 g (Rango: 22 a 29 g)
Pagano y Salvador (2017): N=2 (?) 24,8 y 26,2 g

Coloración. Pico oscuro o castaño, con base de la mandíbula más clara. Patas grises oscuro o negruzcas. Iris pardo rojizo.
Copete, dorsal y alas pardos. Frente castaña. Garganta blanca. Ventral gris ocrácea. Abdomen blanquecino. Cola rojiza.

COMPORTAMIENTO
El canto es similar al del Hornero, pero más agudo.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Montes chaqueños.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N					N	N	N	N

El nido es redondeado, parecido al del Hornero. Es construido con barro, entremezclado con pajitas, a veces con estiércol. Lo ubica en arbustos o en árboles. Tapiza la cámara con pajitas.

Friedman (1927). Gastona, dpto. Chicligasta, Tucumán, 2 huevos.
Smyth (1928). Suncho Corral, dpto. Matará, Santiago del Estero, 15-12-1905, 2 huevos.
Masramón (1962, 1971). San Luis, nidifica.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 4 nidos: Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1968, 2 huevos; 04-11-1970, pichones y otro con un huevo; Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 12-10-1971, pichones.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 13-10-1982, 3 nidos, 2 con 3 huevos y uno con 2.
Nellar Ramonella (1993). San Luis, nidifica, hasta 3 nidos en el mismo árbol.

Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019), Parque provincial Pampa del Indio, dpto. Libertador San Martín, una pareja con nido activo (llevaban alimento) en noviembre de 1998, sobre la rama horizontal de un Guayacán, 5 m. de altura, sector de acampe.
En noviembre y diciembre de 1999, posiblemente la misma pareja en el sector antes señalado con otro nido, en un Quebracho Colorado (*Schinopsis balansae*), cerca del lugar anterior, altura de 7 metros. El 06-01-2001, nido en el mismo sector con 2 huevos propios y uno de *Molothrus bonariensis.*
Parque Nacional Chaco, Sargento Cabral, Chaco, una pareja construyendo el nido-6-9-1998, rama horizontal y exterior de un algarrobo, 4,6 m de altura, en bosque con predominio de ese árbol, sector norte de la Laguna Panza de Cabra.
Leiva et al. (2004). Chaco. Nido.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a diciembre. Seis nidos observados. Acolcha la cámara con pastos secos y cerdas.
Turienzo y Di Iorio (2010). Chaco. Nido.
Berkunshy et al. (2011). Chaco. Nido.
De la Peña (2013c). Villa Carlos Paz, dpto. Punilla, Córdoba, 14-11-1980. Nido en un arbusto, a 3 m. del suelo. Construido con barro y pajitas. Forma de pelota, similar al de *Furnarius rufus*, pero más chico. Mide 16 cm. de alto, 20 cm. de ancho, 16 cm. de largo. Boca de 5 cm. de alto y 3 cm. de ancho. Cámara de 10 x 10 y 8 cm. de alto. En la base unas pajitas. Gato Colorado, dpto. 9 de Julio, Santa Fe, 16-09-1988, 2 nidos, uno abandonado y el otro sin postura.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 2 nidos con 3 huevos cada uno.
Salvador en Salvador (2016a). Santiago del Estero. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Salta, Chaco. Nidos.
Lillo, M. en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
MVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Shipton, S. en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Dinelli, L. en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
E. Sierra (com. Pers.), A. Bodrati (*in litt*.), 21-04-2015, Cerro Colorado, Establecimiento El Desmonte, intersección dptos Tulumba, Rio Seco y Sobremonte, Córdoba. Nido en construcción sobre un Algarrobo blanco (*Prosopis alba*)



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Smyth (1928): 23,0 x 18,0 a 18,5
Masramón (1971): 23,0 x 18,0

Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 22,3 a 25,0 x 17,9 a 18,0	X= 23,6 x 17, 9 (N= 2)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 23,1 a 24,4 x 17,1 a 18,4	X= 23,7 x 17,9 (N= 8)
Di Giacomo (2005h): 22,0 a 23,7 x 16,6 a 17,7	X= 22,6 x 17,1 (N= 7)
De la Peña (2013c): 22,3 a 25,0 x 17,9 a 18,0	X= 24,1 x 17,9 (N= 3)

Pesos

Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 4,1		
Di Giacomo (2005h): 3,0 a 3,6	X= 3,2	(N= 7)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,210 a 0,255	X= 0,238	(N= 3)

Generalidades

Di Giacomo (2005h). La postura ocurre en días alternados. El período de incubación de 16 días y los pichones permanecen en el nido 18 días. Ambos padres alimentan a los pichpones.
Salvador en Narosky et al. (1983). La postura ocurre en días alternados.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Friedmann (1927). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredadores

De adultos: *Accipiter striatus* en Santiago del Estero, Salvador (2017a)
De pichones: Serpientes arborícolas en Chaco, Berkunsky et al. (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Se parece al Hornero, pero es de menor tamaño y tiene copete.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Furnarius cristatus Burmeister, 1888 desde Salta y Formosa hasta el noroeste de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Bolivia, Paraguay y Argentina.

Gato Colorado. Santa Fe. 16-09-1988

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Berkunsky et al. (2011); Bodrati y Pietreck (2000); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Cabanis (1878); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Narosky et al. (1983); Pagano y Salvador (2017); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1888); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Mina Clavero, dpto. San Alberto, 13-08-1973; 20-11-1997; Chancani, pdo. Pocho, 30-03-2002; Nono, dpto. San Alberto, 08-01-2010)

Entre Ríos
Citas: Canavelli et al. (2004); Olrog (1979b)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Esteban (1951); Laubmann (1930); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Capurro y Burcher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2010); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Esteban (1951); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a)

San Juan
Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1994b); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1971); Navas y Bó (1987a); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Coria et al. (2017); Esteban (1951); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Salvador (2017a); Smyth (1928)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Esteban (1951); Friedmann (1927); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

MACUQUITO *Lochmias nematura* (M. H. K. Lichtenstein, 1823)

Otro nombre: Macuquiño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15,5 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 6 X= 28,9 (Rango: 27,0 a 31,5)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Pardo negruzco. Cejas blanquecinas. Ventral negruzca con "escamado" blanco. Alas pardas negruzcas. Cola negra.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattaria (ootecas), Coleoptera (larvas y adultos), Diptera (larvas y adultos), Hemiptera, Hymenoptera (Formicidae), Lepidoptera (larvas y adultos). **Arácnidos:** Araneae y Pseudoscorpiones. **Anfibios:** Anura. **Moluscos:** Gastropoda. **Vegetales:** Semillas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es una larga serie de trinos similares a los de la Remolinera araucana: Chiiirrrriiirrrrhh ..

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en orillas de arroyos selváticos.

NIDIFICACIÓN
Nidos en Jujuy, Misiones

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.
Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Más información:
Remsen (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negruzco con notable escamado ventralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Lochmias nematura obscuratus Cabanis, 1873 entre los 1000 y los 1700 m de altura en el sureste de Jujuy y norte de Salta; *Lochmias nematura nematura* (M. H. K. Lichtenstein, 1823) en Misiones, norte de Corrientes y este de Entre Ríos. También observado en la isla Martín García (Buenos Aires)

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. En poblaciones separadas en norte de Sud América, otra por el oeste asociada a ríos y arroyos pedregosos en Los Andes llegando hasta el noroeste de Argentina y por último otra población en Selva Atlántica en el este de Paraguay, este y sureste de Brasil, noreste de Argentina y Uruguay. Comprende: Panamá, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lochmias nematura obscuratus Cabanis, 1873

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Olrog (1972c, 1979a)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Lochmias nematura nematura (M. H. K. Lichtenstein, 1823)

Buenos Aires
Citas: De Francesco (2005); Moschione (1993a)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b)

Misiones
Citas: Benstead et al. (1998); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954); Straneck (1990h)

JUNQUERO *Phleocryptes melanops* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Abadejo. Aguatero. Chorreado. Cola aguda. Cola espinosa. Escapulario chorreado. Junquerito. Matraca. Reyezuelo. Siete cuchillas. Tejedor. Trabajador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 35,0 g
Contreras (1975): N= 1 (M) 16,0 g
Contreras y Davies (1980): N= 13 (M) X= 15,4 g (Rango: 14,8 a 16,18); N= 11 (H) X= 13,80 g (Rango: 12,8 a 14,2)
Navas y Bó (1987a): N= 3 (M) 14,5, 15,7, 16,4 g; N= 1 (H) 13,8 g
Camperi (1992a): N= 1 (M) 18,3 g
Salvador (2014a): N=7 (?) X= 14,4 g (Rango: 13,8 a 15,3)

Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula negra con base pardo acanelada. Patas gris oscuras. Iris pardo oscuro. Dorsal parda estriada de negro y blanquecino. Cejas blanquecinas. Ventral blanquecina con tono canela. Alas castañas manchadas de negro. Cola parda y negruzca con las plumas externas orilladas de canela.

COMPORTAMIENTO
Inquieto. La voz es un fuerte repiqueteo, audible desde lejos.

Alimentación
Mason (1985). **Insectos:** Coenagrionidae. Hymenoptera (probablemente Braconidae). Noctuidae (Amphipyrinae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Dytiscidae, no identificado). Diptera (Culicidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (polillas). **Moluscos:** (Hydrobidae: *Littoridina parchappei*)
Klimaitis (1993). **Insectos. Moluscos:** Caracolitos. **Vegetales:** Semillas.
Lara et al. (2011). **Insectos:** Diptera (náyades), Neuroptera, Odonata (Anisoptera: ninfas y náyades) y (Zygoptera: ninfas y náyades), Orthoptera (Acridiidae). **Anélidos:** Oligochaeta. **Arácnidos:** arañas.

HÁBITAT
Juncales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N					N	N	N	N	N

El nido es redondeado, alargado en sentido vertical. La boca en la parte lateral superior, con alero. Emplea fibras de juncos. Internamente plumas. Lo ata a juncos, raramente a otras plantas. A veces está superpuestos a restos de nidos viejos. Expuesto. Elaborado.

White (1883a). Buenos Aires. Nido.
Holland (1892). Buenos Aires. Nido.
Gibson (1918). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1923b). Buenos Aires. Nido.
Wetmore (1926b). Buenos Aires. Nido.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
San Martín (1927). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1928). Entre Ríos. Nido.
Smyth (1928). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 20-10-1920 y 26-11-1924, nidos con 2 huevos.
Mac Donagh (1933). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos en setiembre-octubre.
Pereyra (1938b). Noreste Pereyra (1937b). La Pampa. Nido.
de Buenos Aires, nidos en setiembre-octubre.
Partridge (MACN). El Borbollón, dpto. Las Heras, Mendoza, 27-11-1963, sin postura.
Weller (1967a). Buenos Aires. Nido.
Zapata y Cabrera (1969): Laguna de Chasicó, pdo. de Villarino, Buenos Aires, nido con 3 huevos.
Friedmann et al. (1977). Buena Esperanza, dpto. Pedernera, San Luis, 14-12-1912, 2 huevos y uno de *Molothrus bonariensis.*
Marateo (1977). Buenos Aires. Nido.
Orians et al. (1977). Buenos Aires. Nido.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y diciembre.
Zelich en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 25-09-1970, un huevo.
Masramón en Narosky et al. (1983). Dpto. San Martín, San Luis, 15-12-1978, un huevo.

Gallegos y Beltrán en Narosky et al. (1983). Partido Las Heras, Buenos aires, 12 al 15-10-1977, 6 nidos, uno sin postura, uno con 2 huevos y 4 con 3 huevos.
Salvador en Narosky et al. (1983). Luca, dpto. Tercero Abajo, Córdoba, 23-10-1982, 2 huevos; Etruria, dpto. Tercero Abajo, Córdoba, 3 huevos.
Clavero Bonilla y Aguilar en Narosky et al. (1983). Hudson, pdo. de Berazategui, Buenos Aires, 28-11-1982, 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Los Talas, pdo. de Berisso, Buenos Aires, desde 16-09 al 24-11-1970, 2 y 3 huevos; Lobos, pdo. Lobos. Buenos Aires, desde el 17-09- nido sin postura- al 29-01-1967, varios nidos con 2 y 3 huevos o pichones; Mar del Plata, pdo. Gral. Pueyrredón, Buenos Aires, 05-11-1967, pichones.
Gallegos y Beltrán en Narosky et al. (1983). Partido Las Heras, Buenos aires, 12 al 15-10-1977, 6 nidos, uno sin postura, uno con 2 huevos y 4 con 3 huevos.
Clavero Bonilla y Aguilar en Narosky et al. (1983). Hudson, pdo. de Berazategui, Buenos Aires, 28-11-1982, 3 huevos.
Mason (1985). Buenos Aires. Nido.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, setiembe y octubre, nidos con 1 a 3 huevos.
Morici en Babarskas et al. (2003). Nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nidos en noviembre.
Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.
Gelain et al. (2006). Laguna Los Juncos, dpto. Bariloche, Río Negro, 14-03-2005, nido abandonado.
Tajer et al. (2007). Buenos Aires. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 241 nidos. Se reproduce de agosto a marzo. Posturas de 2 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Nidos observados: 33. Cinco en Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba y 28 en provincia de Santa Fe. El 09-01-1992 en Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, había varios nidos con 1 a 3 huevos y otros con 2 pichones. El 31-10-2000 en Wildermuth, dpto. San Martín, Santa Fe, muchos nidos con 1, 2 y 3 huevos. Algunos con pichones. Medidas: Alto: de 12 a 15 cm. Ancho: de 9 a 11 cm. Diámetro interno: de 4,5 a 6 cm. Diámetro de la boca: de 3 a 4 cm. De la boca al fondo de la cámara: de 8 a 9 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 2 nidos con 3 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.
Chiaradia et al. (2015). Sudeste de la región pampeana, temporada 2013-2014 y 2014-2015, se localizaron 245 nidos. Posturas entre setiembre a fines de diciembre.
Moroni y Salvador (2016). Punta Banderas, Estancia La Soledad, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz. Nidos entre 2013 y 2015.
Giarard en IML, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Burtis, P. en MVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
DECB 2011, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Rumboll en Salvador (2016a). Salta. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Sympson, P. a M. Rumboll en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nidos.
De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 07-10-2016, nido con 2 huevos; 20-11-2016, nido con 2 huevos; 12-12-2016, nido en construcción; 30-03-2019, nido con 2 huevos, una culebra en el interior.



Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, celeste verdosos o turquesa.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 18,5 a 21,5 x 14,0 a 16,5		
Smyth (1928): 20,0 a 22,0 x 15,0 a 17,0		
Pereyra (1938b): 21,0 a 23,0 x 16,0 a 18,0		
Salvador en Narosky et al. (1983): 18,9 a 20,3 x 15,3 a 15,9	X= 19,6 x 15,6	(N= 5)
Gallegos y Beltrán en Narosky et al. (1983): 18,7 a 20,8 x 15,2 a 16,4	X= 20,2 x 15,8	(N= 12)
Narosky en Narosky et al. (1983): 18,7 a 21,3 x 14,7 a 15,8	X= 20,9 x 15,3	(N= 11)
Salvador (2013b): 18,8 a 21,6 x 15,1 a 16,9	X= 20,2 x 15,9	(N= 83)
De la Peña (2013c): 19,4 a 21,9 x 15,0 a 17,4	X= 20,2 x 15,7	(N= 14)

Pesos

Salvador en Narosky et al. (1983): 2,6		
Salvador (2013b): 2,4 a 3,2	X= 2,8	(N= 58)
De la Peña (2013c): 2,3 a 2,6	X= 2,4	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,167 a 0,231	X= 0,195	(N= 14)

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. Piel de color rosado, con escaso plumón dorsal color gris. Pico negruzco con base amarillenta, comisuras amarillas. Interior de la boca amarillo anaranjado.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 2,0 a 2,5 X= 2,3 (N= 8)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 14 a 16 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a10 días. Período de incubación16 días. Permanencia de los pichones en el nido de 15 a 16 días.
Mason, P. en Narosky et al. (1983). El período de incubación es de 16 días y los pichones permanecen en el nido 15 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 días.

Otros
Friedmann et al. (1977). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Fernández (2002). Localizó ranas del género *Scinax* en nidos abandonados.

Depredadores

De adultos: *Circus buffoni* en Buenos Aires, Bó et al. (1996), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (2009e), *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004)
De huevos: Culebra en Esperanza, De la Peña (2019b)

Más información:
Hudson (1974). Mac Donagh (1933). Chiaradia et al. (2015). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blanquecinas. Dorso estriado. La voz (fuerte repiqueteo).

Esperanza. Santa Fe. 05-12-2007

Esperanza. Santa Fe. 08-12-2007

Esperanza. Santa Fe. 25-01-2005

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phleocryptes melanops schoenobaenus Cabanis y Heine, 1859 en la puna de Jujuy y *Phleocryptes melanops melanops* (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se encuentra una población en las alturas de la Puna en los Andes de Perú, oeste de Bolivia y noroeste Argentina. Además en sur de Brasil, Chile, Uruguay y toda la Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phleocryptes melanops schoenobaenus Cabanis y Heine, 1859

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Fiora (1933); Mazar Barnett (1999a); Olrog (1979b); Zotta (1938)

Salta
Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Phleocryptes melanops melanops (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bó et al. (1996); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fernández (2002); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Leveau y Leveau (2005); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009e, 2012b); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Smyth (1928); Straneck (1990b); Weller (1967a); White (1883a); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Gaiman, dpto. Gaiman, 30-11-2000). Schupbach, Z. A. (Trelew, ruta 7, km. 19, dpto. Rawson, 12-01-2017) adulto con pichón. EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 08/05/2019.

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); De la Peña (2013c); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Frenzel (1891); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983, 2013b); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Arias, dpto. M. Juárez, 07-11-1994)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Muzzachiodi (2001a, 2011b); Narosky et al. (1983); Navas (1982); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo (2005h)

La Pampa

Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Pereyra (1937); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Davies (1980); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al. (1984); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2015, 2019); Ferrer (2016); Lucero (2013f); Navas y Bó (1987a); Martínez et al. (1997a); Narosky et al. (1983); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (2004 Contreras (1975, 1977b); Doering (1881); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Lago Huechulafquen, dpto. Huiliches, 27-04-1998)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003, 2006); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1987a); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Friedman et al. (1977); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2009); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Mazar Barnett et al. (1998); Stone (1928)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Echevarría et al. (2019; Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

PAJONALERA PICO CURVO *Limnornis curvirostris* Gould, 1839

Otros nombres: Pajera de pico curvo. Pajera pico curvo. Pajerita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 29 g; N= 3 (H) de 27 a 30 g

Olson et al. (2005): N= 10 (?) X= 29 g (Rango: 26,7 a 33,3)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas grises.
Dorsal castaña. Cejas blanquecinas. Garganta blanca. Ventral blanquecina con tono ocráceo. Alas pardas y castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae).
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros. Himenópteros (Formicidae). Orthópteros (Acridiidae).

HÁBITAT

Juncales, espadañales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Nido cerrado, redondeado u ovoidal, con entrada lateral. Emplea fibras vegetales. Acolcha la base de la cámara con materiales suaves.

Venturi (MACN). Barracas al Sur, Buenos Aires, 22-10-1899, 3 huevos.
Pereyra (1938b). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, noviembre y diciembre, 3 nidos, dos con 2 huevos; Escobar, pdo. Pilar, Buenos Aires, 20 de noviembre, 2 huevos.
Carman en Narosky et al. (1983). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires, 01-11-1970, 2 huevos y uno de *Molothrus bonariensis.*
Klimaitis, Yzurieta y Narosky en Narosky et al. (1983). Dos nidos: Los Talas, pdo de Berisso, Buenos Aires, 16-09-1970, 2 huevos; 23-09-1970, 2 huevos (coleccionados) y en el mismo nido el 02-10 un huevo, abandonado. Este nido, ovoidal, mide 15 cm de ancho máximo (en la parte suprior), 12 cm en la parte media y 8 cm en lo inferior. Profundidad de 12 cm. Altura 23 cm. Tiene como el nido del Junquero, un alero sobre la boca de entrada. Construído con tiras de espadañas, el fondo de la cámara forrado con trozos de polietileno con algo de hule, algodón y fibras desmenuzadas de espadañas.
Earnshaw en Narosky et al. (1983). Tres nidos: Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, 07-11-1937, 2 huevos; pdo. Magdalena, Buenos aires, 14-10-1938, 3 huevos; 02-10-1939, 2 huevos.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, se localizaron 18 nidos con 1 a 3 huevos en octubre.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.
Uranga en De la Peña (2016d). Brazo Largo, dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos, 19-12-2010, nido con 3 huevos.
DECB. Buenos Aires. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Huevos

Pone 2, a veces 3 huevos verde azulados.

Medidas

Venturi (MACN): 22,7 a 23,0 x 17,2 a 17,4	X= 22,9 x 17,4 (N= 3)
Hartert y Venturi (1909): 23,4 a 29,5 x 16,5 a 19,0	X= 25,5 x 18,2 (N= 9)
Pereyra (1938b): 23,0 a 24,0 x 19,0 a 20,0	
Narosky en Narosky et al. (1983): 24,4 a 25,0 x 17,6 a 17,8	X= 24,6 x 17,7 (N= 3)

Otros
Carman en Narosky et al. (1983). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredadores
De adultos: *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (2009e)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo y curvo. Cejas blanquecinas. Dorsal y cola castañas. Cola redondeada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limnornis curvirostris Gould, 1839 desde el sur de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Áreas pantanosas y humedales en sur de Brasil, Uruguay y angosta franja este de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas (1990); Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Esteban (1951); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009e); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990c); Zotta (1932)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Chebez et al. (1990); Serié y Smyth (1923)

Misiones
Citas: Heinonen et al. (1989)

BANDURRITA DE BOSQUE *Upucerthia saturatior* Scott, 1900

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-21 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 3 (?) X= 43,9 g (Rango: 36,8 a 48,4)
Christie et al. (2004): N= 2 (?) 43 y 44 g

Coloración. Iris pardo. Pico negro. Patas pardas.
Difiere de la Bandurrita esteparia por la voz, por ser más pequeña y oscura, y por tener el pico negro y corto.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Veiga (2020). **Insectos:** saltamontes, hormigas.

HÁBITAT

Bordes de bosques

NIDIFICACIÓN
Nidos en Neuquén y Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Christie et al. (2004). Neuquén. Nido.
Christie et al. (2004). Río Negro. Nido.

Observaciones
Christie et al. (2004). Neuquén. Adulto con pichones.
Christie et al. (2004). Río Negro. Adulto con pichones.
Salvador en Salvador (2016a). Neuquén. Adulto con pichones.
Veiga (2020). Parque Provincial Copahue, dpto. Ñorquín, Neuquén, adulto con juveniles.

Depredadores
De adultos: *Buteo albigula* en Río Negro, Trejo et al. (2006b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Upucerthia saturatior Scott, 1900 en el oeste de Neuquén y de Río Negro y noroeste de Chubut. Migra al norte en otoño.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Bosque Araucano de Chile y Argentina. En invierno migran al norte de ambos paises, permaneciendo a menor altura.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Areta y Pearman (2009); Navas (1971b)

Neuquén
Citas: Contreras (1975, 1977b); Esteban (1951); Navas (1971b); Pereyra (1945, 1951); Veiga (2020); Veiga et al. (2005); Veiga y Bianchini (2017); Wetmore (1926b); Zotta (1938)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Navas (1971b); Povedano (2016); Trejo et al. (2006b)

BANDURRITA ESTEPARIA *Upucerthia dumetaria* I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832

Otros nombres: Adivino. Bandurrilla. Bandurrita. Bandurrita de la cordillera. Bandurrita de los cerros. Cachirla. Carpintero. Churrete. Minera de las piedras. Picada. Picudo. Remolinera. Remolinera de pecho escamado. Remolinera meneacola.

DESCRIPCIÓN

Largo: 22 cm.
Peso: Navas (1971b): N= 13 (M) X= 49,8 g (Rango: 47,2 a 53,7); N= 8 (H) X= 48 g (Rango: 44,4 a 54,5)
Contreras (1975): N= 3 (M) X= 46,0 g (Rango: 43,2 a 48,2) (dumetaria); N= 3 (?) X= 43,9 g (Rango: 36,8 a 48,4) (*saturatior*)
Salvador (1988): N= 1 (?) 48,5 g
Camperi (1992c): N= 3 (M) 50,0, 48,0 y 49,0 g; N= 1 (H) 46,0 g; Christie et al. (2004): N= 3 44,0, 31,0 y 43,0 g; Blendinger (2005): X= 44,2 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 4 X= 44,2 g (Rango: 39,5 a 49)
Salvador (2014a): N= 3 (?) X= 46,9 g (Rango: 44,7 a 49,3)

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula crema con ápice pardo. Patas pardo grisáceas. Iris pardo oscuro. Dorsal parda. Cejas blanquecinas. Garganta blanca. Pecho ocráceo "escamado" de pardo. Resto de la parte ventral blanquecino. Flancos pardos. Alas castañas y pardas. Cola parda con las láminas externas de las plumas externas, ocre canela.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria o en pareja. Corredora. Levanta la cola.

Alimentación

Christie et al. (2004). **Insectos. Vegetales:** Frutos.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*). **Crustáceos:** Isópodos terrestres.
Salvador y Bodrati (2013c). **Peces:** *Jenynsia multidentata*
Bianchini (2014a). **Arácnidos:** Alacranes (*Bothriurus burmeisteri*)
Veiga (2020). Insectos, recacuajos.

Voces

Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una serie de notas agudas y sonoras:
Cliclilclilclilclilclil....clilclilclilclilclil.. que hace con un despliegue levantando las alas.

HÁBITAT

Estepas arbustivas, altoandinas y patagónicas. Áreas montañosas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Construye el nido en túneles o cuevas en barrancas o en el suelo, o en huecos entre piedras. Tapiza la base de la cámara con pastos. A baja altura. Oculto. Elaborado.

Pemberton (W. F.). Río Belgrano, Santa Cruz, 08-11-1914, 4 huevos.
Navas (1971b). Durnford el 7 de noviembre localizó un nido en el valle inferior del río Chubut, 3 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y diciembre.
Narosky en Narosky et al. (1983). Tres nidos: pdo. Patagones, Buenos Aires, 09-10-1974, pichones; Trelew, dpto. Rawson, Chubut, 11-10-1974, pichones; Punta Tombo, dpto. Ameghino, Chubut, 13-10-1974, 2 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Vallecitos, dpto. Luján, Mendoza, 17-11-1982, pichones; 18-12-1982, 2 nidos con pichones.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz. Nidifica en cuevas o grietas.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 06-12-1977, hueco entre piedras, no observado; Comodoro Rivadavia, dpto. Escalante, Chubut, 11-11-1979, hueco en una barranca, 2 pichones; nido en un hueco en una barranca, en la orilla de una ruta. Cueva de 10 cm. de diámetro y 1 m. de longitud. En la cámara un platito de pastos. Ubicado a 1,10 m. del suelo. Puente del Inca, dpto. Las Heras, Mendoza, 11-01-1982, hueco en una barranca, 2 huevos; El Alamito, dpto. Andalgalá, Catamarca, 16-12-1999, nido en un hueco en una barranca de un río seco, a 2,20 m. de altura. El túnel mide 1,20 m. de largo, 2 pichones.
Bianchini (2014). Zapala, dpto. Zapala, Neuquén, 14 km al norte de la ciudad, 02-11-2013, nido, en una cueva excavada al borde de la ruta, a baja altura. Pichones.
Lucero (2019a). 22-01-2018, Reserva de la Biósfera San Guillermo, dpto. Iglesia, San Juan. Nido en hueco de una barranca.

Gral. Conesa. Río Negro. 05-10-2019 Foto: Cynthia Arenas

Puente del Inca. Mendoza. 11-01-1982

Huevos
Pone de 2 a 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Narosky en Narosky et al. (1983): 27,6 a 28,0 x 20,9 a 21,0 X= 27,8 x 20,9 (N= 2)

Observaciones
Veiga (2020). Parque Provincial Copahue, dpto. Ñorquín, Neuquén, adulto con juveniles.

Depredadores
De adultos: *Tyto alba* en La Pampa, Noriega et al. (1993), en Río Negro, Trejo et al. (2010), *Falco peregrinus* en Patagonia, Ellis et al. (2002), en Santa Cruz.Santillán et al. (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, curvo. Pecho muy "escamado". Canela en las plumas externas de la cola.
Se diferencia de la Bandurrita andina por tener el pecho "escamado".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Upucerthia dumetaria hypoleuca Reichenbach, 1853 hasta los 3000 m de altura desde Jujuy, Salta, Catamarca y oeste de Tucumán por La Rioja, Córdoba, San Juan y Mendoza hasta Neuquén y norte de Río Negro; *Upucerthia dumetaria dumetaria* I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832 desde Córdoba y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En otoño migra al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Desde Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego.En invierno migra a provincias del noreste y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Upucerthia dumetaria hypoleuca Reichenbach, 1853

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2013c); Navas (1971b); Nores (1995)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1888); White (1883a); Zotta (1944a)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Di Giacomo et al. (2007) ; Esteban (1951); Helmay (1932); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Navas (1971b); Zotta (1938)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Barros (1930); Blendinger y Alvaraz (2002); Blendinger (2005); Calí et al. (2008); Contreras (1979); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); De la Peña (2013c); Esteban (1951); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Fitzgerald (1899); Hartert y Venturi (1909); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Mezquida (2001b); Mezquida y Marone (2002); Milesi et al. (2002); Navas (1971b); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1942a); Reed (1916); Sanzín (1918)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Neuquén
Citas: Bianchini (2014a); Contreras (1977b); Matarasso (2007); Navas (1971b); Veiga (2020); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Becerra Serial y Grigera (2005); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Dacuik (1978c); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Povedano (2016)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); De la Peña (2013c); Esteban (1951); Moschione et al. (2013); Navas (1971b); Nores (1995)

San Juan
Citas: Blendinger (2005); Camperi y Darrieu (2004); Chapman (1919); Esteban (1951); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i, 2019a); Moschione y Banchs (1992); Navas (1971b); Ortiz et al. (2016)

Santiago del Estero
Citas: Navas (1971b)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b); Esteban (1951); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navas (1971b); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Upucerthia dumetaria dumetaria I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Esteban (1951); Maugeri (2002b); Morici (2014); Narosky en Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas (1971b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Zapata (1998)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Harris (2008); Narosky et al. (1983); Navas (1971b); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 04-11-1979)

Córdoba
Citas: Esteban (1951); Frenzel (1891); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Navas (1971b); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Ordano (1996); Pereyra (1924, 1927e); Salvador (1983); Stempelmann y Schulz (1890); White (1883a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, pdto. San Alberto, 05-12-1981)

Entre Ríos
Citas: Peltzer (1998)

La Pampa
Citas: Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Navas (1971b); Navas y Bó (1986); Noriega et al. (1993); Pereyra (1937); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: De la Peña (2013c); Sosa (1995)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (1988, 2004); Contreras (1977b); Cory y Hellmayr (1925); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Navas (1971b); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Esteban (1951); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005); Navas (1971b); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Piacentini et al. (2003); Trejo et al (2010)

Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

San Luis
Citas: Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Salvador (1988)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Esteban (1951); Gould y Darwin (1838-1841); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Narosky et al. (1983); Navas (1971b); Oustalet (1891); Santillán et al. (2010); Stone (1928); Zapata (1967)

Santa Fe
Citas: Caballero et al. (2020); De la Peña et al. (2003b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Esteban (1951); Humphrey et al. (1970); Navas (1971b)

Tucumán
Citas: Navas (1971b)

BANDURRITA ANDINA *Upucerthia validirostris* (Burmeister, 1861)

Otros nombres: Bandurrilla. Bandurrita blanca. Bandurrita blancuzca. Bandurrita del suelo. Bandurrita ocrácea. Bandurrita oscura. Chichiviro. Minera de pico curvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 32,5 g (Rango: 30,0 a 34,6)
Navas y Bó (1987a): N= 1 (M) X= 49,9 g, N= 1 (H) X= 59,3 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 45 g

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal parda. Cejas y parte ventral ocráceas. Alas castañas con puntas pardas. Cola parda con las plumas externas castañas.

Alimentación
Olrog (1956). **Insectos. Otros:** Cáscara de huevos.
Salvador et al. (2017). Insectos.

HÁBITAT
Estepas altoandinas y áreas montañosas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Nidifica en túneles o en cuevas en barrancas. Tapiza la base de la cámara con pastos y plumas. A baja altura. Oculto. Elaborado.

Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, dos nidos.
Höy en Narosky et al. (1983). Cordillera de Salta, 18-11-1980, 2 huevos. El nido era de pastos, al final de un túnel de 1,40 m de largo.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, pichones.
Salvador (1992). Cerro Famatina, La Rioja, 04-11-1985, nido en una barranca de tierra, 2 huevos. El Infiernillo, Tucumán, 05-12-1987, un huevo.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, 03-11-1988, nido con 2 huevos.
De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy. 23-02-1979. Nido en un hueco en una barranca, en la orilla de una ruta. A 2,50 m. del suelo. Boca de 6 x 7 cm. de diámetro y una profundidad de 70 cm. En la cámara un platito de pajitas y algunas plumas. De 9 x 10 cm. de diámetro. Tenía 2 pichones. Otro nido, en un hueco en una barranca a 1,90 m. del suelo. Tenía 2 huevos.
Salvador (2015). Paso San Francisco, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, nido con un pichón.
Uranga en De la Peña (2016d). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy. El 08-02-2001, nido en un hueco en una barranca, a 2,10 m. del suelo. Tenía 2 huevos.



Azul Pampa. Jujuy. 23-01-1979

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy en Narosky et al. (1983): 26,7 a 28,0 x 21,5 a 22,0 X= 27,3 x 21,7 (N= 2)
Salvador (1992): 27,3 a 28,0 x 20,0 a 21,0 X= 27,7 x 20,5 (N= 3)
Salvador y Salvador (2012): 27,7 x 20,3 y 27,9 x 20,8 (N= 2)

Peso
Höy en Narosky et al. (1983): cáscaras 0,348 g

Observaciones
Navas y Bó (1987a). Villavicencio, dpto. Las heras, Mendoza, hembra con 3 huevos formados.

Más información:

Areta y Pearman (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo y curvo. Ventral ocrácea. Cola parda y castaña.
Diferenciarla de la Bandurrita espetaria.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Upucerthia validirostris jelskii Taczanowski, 1883 en Salta y Jujuy; *Upucerthia validirostris validirostris* (Burmeister, 1861) entre los 2000 y los 4000 m de altura, desde Jujuy, Salta y Tucumán hasta Neuquén. También Tucumán y el oeste de Córdoba; *Upucerthia validirostris rufescens* Nores 1986 en La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Andes en Perú, Chile, Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Upucerthia jelskii pallida Taczanowski, 1883

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Cococnier (2005b); Di Giacomo et al. (2007); Mamaní et al. (2018); Mazar Barnett et al. (1998a); Monteleone y Roesler (2005)

Salta
Citas: Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione et al. (2013); Narosky (1983); Zotta (1938)

Upucerthia validirostris validirostris (Burmeister, 1861)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Salvador (2015); Vides Almonacid (1999)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Olrog (1979); Salvador y Salvador (2012); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

La Rioja
Citas: Koslowsky (1895); Zotta (1938)

Jujuy
Citas: Areta y Pearman (2013); Camperi et al. (2013); De la Peña (2013c); Fiora (1933); Narosky et al. (1983)

Mendoza
Citas: Esteban (1951); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Fontana (1908); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Contreras (1977b); Del Valle et al. (1989); Del Valle y Funes (1994)

Salta
Citas: Areta y Pearman (2013); Esteban (1951); Moschione et al. (2013); Narosky et al. (1983); Nores (1995)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Areta y Pearman (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Esteban (1951); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

Upucerthia validirostris rufescens Nores 1986

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Chebez (2005); Nores (1986, 1995); Salvador (1992)

REMOLINERA MALVINERA *Cinclodes antarcticus* (Garnot, 1826)

Otros nombres: Piloto antártico. Piloto negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Cursach et al. (2012): N= 21 (M) X= 61 g; N= 10 (H) X= 64,6 g

Coloración. Pico negro, comisura y base de la mandíbula amarillento. Patas negras. Iris pardo oscuro. Color general pardo oscuro. Garganta más clara, punteada de ocráceo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Moluscos:** marinos.
Reynolds (1932). **Insectos:** Moscas.

HÁBITAT
Costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Construye el nido en grietas o en túneles. Acolcha la base de la cámara con pastos y plumas.

Cawkell y Hamilton (1961). Islas Malvinas. Nidos en octubre y noviembre.
Woods (1975). Islas Malvinas. Nidos en setiembre a diciembre. En tinglados y en túneles de *Pelecanoides*. Ponen de 1 a 3 huevos.
Dacuik (1983c). Nidifica en Malvinas.
Woods (2006). Islas Malvinas. Nido.
Otley et al. (2008). Islas Malvinas. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Cawkell y Hamilton (1961): 27,0 a 29,4 x 20,5 a 22,2 X= 28,3 x 21,6 (N= 5)

Más información:
Reynolds (1935). Tierra del Fuego. Isla Barnevelt. (Chile). Nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cinclodes antarcticus (Garnot, 1826) en las islas Malvinas

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinclodes antarcticus (Garnot, 1826). Islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Islas Malvinas
Citas: Cawkell y Hamilton (1961); Dacuik (1983c); Esteban (1951); Wace (1921); Woods (1975, 1988, 2006)

REMOLINERA NEGRA *Cinclodes maculirostris* Dabbene, 1917

NIDIFICACIÓN
La Grotteria (2018). Se localizó nido en construcción en Islote Lés Éclaireurs, el 15 de diciembre de 2017. Un integrante de la pareja recolectaba hilachas y pelos en un catamarán y se introdujo en una cueva en la isla.
Retamar et al. (2019). Isla Becasses e Isla de los Estados, nidificando.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Residente de extremo sur Chile y Argentina. Tierra del Fuego e islas vecinas

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Chebez et al. (1998); Humphrey et al. (1970); La Grotteria (2018); Retamar et al. (2019); Zotta (1938)

REMOLINERA PARDA *Cinclodes fuscus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Alondra parda. Barrero. Cachirinquí. Churrete. Churrete acanelado. Kachirinquí. Meneacola. Pajarito del agua. Piloto. Remolinera alas barradas canelas. Remolinera alcalde de agua. Remolinera serrana. Tuiro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiore (1933): N= 10 X=27,6 g (Rango: 26 a 31,2)
Humphrey et al. (1970): 28 g
Navas y Bó (1990): N= 2 (M) 39,3 y 40,4, X= 39,8 g; N= 1 (H) 32 g
Camperi (1992a): N= 2 (M) 29,5 y 33,7, N= 2 (H) 25,7 y 30,4 g

Camperi (1992c): N= 1 (M) 40,0 g
Camperi y Darrieu (2005): N= 2 (M) 31,0 y 34,2 g; N= 3 (H) 27,6, 28,3 y 33,3 g
Salvador (2914a): N=7 (?) X= 32,2 g (Rango: 30,6 a 34,1)

Coloración. Pico pardo negruzco. Patas pardas oscuras. Iris pardo oscuro.
Dorsal parda. Cejas ocráceas. Garganta blanquecina punteada de pardo. Ventral parda clara. Abdomen blanquecino. Alas pardas con banda canela claro. Cola parda con la punta de las plumas externas ocráceas.

COMPORTAMIENTO
Terrícola, a veces se posa en ramas o troncos bajos. Anda solitaria. Recorre las orillas de ambientes acuáticos.

Alimentación
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros. Hormigas. Tucura. **Vegetales.**
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae, Carabidae). Dípteros.
Reynolds (1935). **Insectos:** Polillas. Larvas. **Anélidos.**
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Chrysolelidae). Hemípteros. Himenópteros. **Arácnidos. Moluscos:** (*Littoridina piscium*). **Piedritas. Vegetales.**
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Himenópteros (*Pheidole*). **Moluscos:** (*Lithoridina* sp.). **Minerales.**
Olrog (1956). **Insectos. Moluscos:** Gasterópodo acuático. **Piedritas. Arena.**
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Coleoptera. Larvas.
Beltzer y Neffen (1989). **Insectos:** Coleópteros (Coccinelidae, Dytiscidae, Carabidae, Hydrophilidae) (Curculionidae, *Neochetia* sp.). Dípteros (Chironomidae, *Chironomus domizii*) (Stratiomidae). Hemiptera (Reduviidae). Hymenópteros (Vespidae, Formicidae). Lepidópteros. **Moluscos:** (Planorbidae) *Heleobia parchappii* (Hydrobiidae)
Beltzer (1997). **Insectos:** Coleópteros (Noteridae, *Suphisellus* sp.) (Curculionidae, Hydrophilidae, Helodidae) (Dytiscidae, *Derallus* sp.). Dípteros (Chironomidae, *Chironomus domizii*). **Crustáceos:** (Hyalellidae, *Hyalella curvispina*). **Moluscos:** (Planorbidae). **Vegetales:** Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Lycidae, no identificado). Ephemeroptera. Hemiptera (Corixidae). Hymenoptera (Formicidae). Insectos (larvas acuáticas). Lepidoptera (orugas). **Moluscos:** (Planorbidae: *Biomphalaria* sp., Bulimulidae: *Bulimulus apodemetes*, Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres).

HÁBITAT
Orillas de ríos, arroyos, lagunas, esteros, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Neuquèn, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Construye el nido en grietas o en túneles. Acolcha la base de la cámara con pastos y plumas.

Nidifica en túneles, cuevas, grietas, caños. Tapiza la base de la cámara con pastos, cerdas, lanas, pelos.
Se reproduce de octubre a diciembre.

Pemberton (W. F.). Huanca Luan, Río Negro, 07-12-1911, 3 huevos; Nauhel Huapi, dpto. Bariloche, Río Negro, 4 huevos; Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 22-11-1914, 2 huevos.

Olrog (1950). Archipiélago de Cabo de Hornos, nidifica desde noviembre.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, San Cruz, 18-09-1961, nido en construcción; 17-11-1961, pichones.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nido en diciembre.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz. Nidifica entre octubre y diciembre.
Nelson C. en WFVZ, en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Salvador y Eroles en Salvador (2016a). Chubut. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25,5 x 22,5

PICHONES
Observaciones
Pagano en Salvador (2016a). Santa Cruz. Adulto con pichones

Depredadores
De adultos: Anfibio: Rana criolla (*Leptodactylus latrans*) Spegazzini (1922)
Tyto alba en Chubut, Noriega et al. (1990), en La Pampa, Noriega et al. (1993), en Buenos Aires, Morici (2009), *Falco femoralis* en La Pampa, Liébana (2015), *Falco peregrinus* en Tierra del Fuego, McNutt (1981)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración parda, más clara ventralmente. Cejas ocráceas. Banda alar canela. Garganta punteada.
Diferenciarla de la Remolinera chica.

Esperanza. Santa Fe. 10-06-2000

Esperanza. Santa Fe. 13-07-2007

Esperanza. Santa Fe. 25-05-2009

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cinclodes fuscus (Vieillot, 1818) desde San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. En otoño migra hasta el norte del país. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Sur de Argentina y Chile, en invierno migra hasta Uruguay, Paraguay y sureste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Esteban (1951); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Leveau y Leveau (2011b); Marelli (1933); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b); Pugnali y Chamorro (2008); Sasín et al. (2009); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1932); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Salvador (1983); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes

Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); Nores e Yzurieta (1983a)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Pagnoni (2012b); Sainz-Trápaga (2014); Sasín et al. (2009)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Noriega et al. (1993); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Calí et al. (2008); Darrieu y Segura (2015); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Fitzgerald (1899); Lucero (2013f); Olivera et al. (2009); Martínez et al. (1997a); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988, 2004); Del Valle et al. (1989); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Becerra Serial y Grigera (2005); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984a, 2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Pemberton en Narosky et al. (1983); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Sasín et al. (2009)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993); Nores (1995)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Dabbene (1919c); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Humphrey et al. (1985); Imberti y Albrieu (2001); Imberti (2005e); Oustalet (1891); Peri (2013); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1997); Beltzer y Neffen (1989); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Torres y Michelutti (2001a)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Esteban (1951); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Cocimano et al. (2005); Esteban (1951); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

REMOLINERA SERRANA *Cinclodes comechingonus* Zotta y Gavio 1944

Otros nombres: Piloto. Remolinera de Córdoba.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-17 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 20 (M) X= 29,7 g (Rango: 27,4 a 32,4); N= 26 (H) X= 28,3 g (Rango: 25,0 a 34,0)
Salvador (2014a): N=3 (?) X= 27,0 g (Rango: 26,7 a 27,3)

Coloración. Pico: maxila pardo negruzca, mandíbula pardo oscura con base pardo amarillenta. Patas pardas negruzcas. Iris pardo oscuro.
Cejas blanquecinas. Dorsal parda, más rojiza en las cubiertas alares. Garganta blanca con puntos pardos. Pecho, flancos y subcaudales pardoa acaneladoa. Vientre blanquecino.
Alas pardas con ancha banda rojiza. Por debajo de ésta una angosta banda negruzca. Cubiertas de primarias negruzcas y rojizas.
Cola negruzca con las plumas centrales pardo-rojizas. Punta de las plumas externas, canela.

COMPORTAMIENTO
Terrícola, se posa en rocas. Anda solitaria o en pareja. Recorre las orillas de ambientes acuáticos. Suele parar la cola.

Alimentación
Zotta y Gavio (1944). **Insectos:** Cucurlíonidos. Hemípteros. Lepidópteros (*Colias*). **Moluscos:** (Gastrópodo: *Littoridina*, Bivalvo: *Sphaerium*). **Vegetales:** Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Hydrobiidae, no identificado). Hemiptera. Insectos (larvas). Lepidoptera (crisálidas). **Moluscos:** (Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). Orthoptera. **Anfibios:** renacuajos.

HÁBITAT
Orillas de ríos, arroyos, lagunas, en montañas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Nidifica en huecos, grietas entre piedras, túneles, cuevas, caños. Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pelusas vegetales suaves, pajitas, pelos, cerdas, lanas, plumas.

Partridge (MACN). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 15-11-1963, 2 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 07-01-1981, dos nidos, con 2 pichones cada uno.
Navas y Bó (1987a). Córdoba. Nido.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 11-01-1983, 2 nidos con 2 pichones; 17-12-1983, nido con 3 pichones; 21-12-1986, nido con 2 huevos; 19-12-1987, 2 nidos con 2 pichones; 24-01-1988, nido con 2 pichones.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, entre los años 1982 y 2006 se localizaron 16 nidos, desde octubre a enero.

De La Peña (2013c). Desde el 05-12-1981 a 25-11-1990 se localizaron 6 nidos en Pampa de Achala, Córdoba y uno en Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba. En huevos o grietas entre las piedras y uno en un caño, con huevos y con pichones.
Uranga en De la Peña (2016d). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 04-01-2015, 2 huevos.
Nores, Yzurieta y Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 01-12-1973, dos nidos, uno en una grieta de la roca; otro en barranca de tierra, 2 huevos.

Pampa de Achala. Córdoba. 25-11-1990

Pampa de Achala. Córdoba. 25-11-1990

Pampa de Achala. Córdoba. 04-01-2015
Foto: Máximo Uranga

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Narosky en Narosky et al. (1983): 24,9 a 25,3 x 18,8 a 19,3	X= 26,1 x 19,0	(N= 2)
Salvador y Salvador (2012): 23,7 a 26,1 x 18,9 a 19,8	X= 24,8 x 19,3	(N= 22)
De La Peña (2013c): 24,7 a 25,9 x 19 a 20,1	X= 25,3 x 19,5	(N= 4)

Pesos

Salvador y Salvador (2012): 4,6 a 5,4	X= 5,1	(N 18)
De La Peña (2013c): 4,7 a 5,2	X= 4,9	(N= 4)

De La Peña (2013c): cáscaras 0,24 a 0,30 X= 0,28 (N= 4)

PICHONES

Descripción

Salvador y Salvador (2012). Los pichones al nacer tienen los ojos cerrados. La piel es de color carne con plumón dorsal, ralo color pardo grisáceo. Comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo intenso.

Peso al nacer

Salvador y Salvador (2012): 4,0 a 4,3

Observaciones

Salvador y Salvador (1988). Ambos padres incuban y alimentan a los pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Parecida a la Remolinera parda, pero tiene banda alar rojiza más notable y amarillo en la mandíbula.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cinclodes comechingonus Zotta y Gavio 1944 sierras altas de Córdoba y San Luis. En otoño migra por el oeste de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán hasta Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Especie endémica de las Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chaco

Citas: Moschione (2005f)

Córdoba

Citas: Cabanis (1878); Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Esteban (1951); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Yzurieta (1995); Zotta y Gavio (1944)

Observaciones: De la Peña (Tanti, dpto. Punilla, 28-11-1982)

Formosa

Citas: Nores et al. (1996)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores e Yzurieta (1981)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Olrog (1972, 1979); Torres y Michelutti (2001a)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983); Olrog (1972, 1979); Ortiz y Ruiz (2011)

REMOLINERA ANDINA *Cinclodes albiventris* (R.A. Philippi y Landbeck, 1861)

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 10 X= 27,6 g (Rango: 26,0 a 31,2)
Salvador (1990a): N= 1 (?) 29,2 g; N= 1 (H) 33,8 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 5 X= 28,8 g (Rango: 25 a 32) (*albiventris*); N= 28 X= 26,1 g (Rango: 23 a 30) (*tucumanus*)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 12 X= 26,3 g (Rango: 25,0 a 29,0)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Ventral blanquecino. Tinte rojizo en dorsal. Banda alar blanquecina.

HÁBITAT
Orillas de ríos, arroyos, lagunas, en montañas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Nidifica en huecos, grietas entre piedras, túneles, cuevas. A baja y mediana altura.
Oculto. Elaborado. Acolcha la base de la cámara con pelusas vegetales suaves, pajitas, pelos, cerdas, lanas, plumas.

Hartert y Venturi (1909). Dinelli, sin fecha, un nido en Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, nido en la barranca de un río.
Handford (1983). Valle de Tafí, provincia de Tucumán, nidos.
Salvador (1992). El Infiernillo, Tucumán, 05-12-1987, nido en una pirca a 0,80 m de altura. Casquete de gramíneas, elementos vegetales suaves y cerdas, 2 huevos.
Capllonch et al. (2011b). Tucumán. Nido.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 29-11-1978, nido en un hueco en una ladera terrosa, a 2,50 m del suelo, 2 huevos. Túnel curvo de 35 cm. de largo y 8 cm. de diámetro.
Salvador (2015). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, nido con 2 pichones. El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 14-11-2003, nido con 2 huevos.
Fernández Campos (2016). Jujuy. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). La Rioja. Nido.



Valle Encantado. Salta. 29-11-1978

Valle Encantado. Salta. 29-11-1978

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Ovoidales, blancos.

Medidas
Salvador (1992): 24,6 x 18,3 y 25,1 x 18,8
De la Peña (2013c): 24,0 a 24,3 x 19,7 a 19,8 X= 24,1 x 19,8 (N= 2)
Salvador (2015): 24,8 x 18,4 y 24,9 x 18,8

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 0,26 a 0,28 X= 0,27 (N= 2)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cinclodes albiventris albiventris (R. A. Philippi y Landbeck, 1861) entre los 3500 y los 4500 metros de altura en Jujuy y noreste de Salta; *Cinclodes albiventris tucumanus* Chapman 1919 entre los 2000 y los 3000 metros de altura en Tucumán. También Jujuy, Salta, La Rioja; *Cinclodes albiventris riojanus* Nores 1986 en La Rioja; *Cinclodes albiventris rufus* Nores 1986 en Catamarca; *Cinclodes albiventris yzurietae* Nores 1986 a más de 1600 metros de altura en Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Se extiende por la Puna de Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cinclodes albiventris albiventris (R.A. Philippi y Landbeck, 1861)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Budin (1931); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Esteban (1951); Fiora (1933); Mamaní et al. (2018); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1974); Salvador (2015); Sanín et al. (2009)

Observaciones: De la Peña (Tres Cruces, dpto. Humahuaca, 10-02-83)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Hayward (1967)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); De la Peña (1983c); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Esteban (1951)

Cinclodes albiventris tucumanus Chapman 1919

D.G. Entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura en Tucumán. También en Jujuy, Salta, La Rioja.

Catamarca
Citas: Olrog (1974)

Jujuy
Citas: Fiora (1933)

La Rioja
Citas: Olrog (1974)

Salta
Citas: Camperi (1990); Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2020); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Olrog (1974); Ortiz et al. (2018b); Salvador (1990, 1992, 2015); Sanín et al. (2009)

Cinclodes albiventris riojanus Nores 1986

La Rioja
Citas: Nores (1986, 1995); Olrog (1974)

Cinclodes albiventris rufus Nores 1986

Catamarca
Citas: Nores (1986)

Cinclodes albiventris yzurietae Nores 1986

Catamarca
Citas: Nores (1986, 1995)

REMOLINERA CHOCOLATE *Cinclodes olrogi* Nores e Yzurieta, 1979

Otros nombres: Piloto. Remolinera de Olrog.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-17 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 12 (M) X= 27,4 g (Rango: 24,7 a 29,5); N= 5 (H) X= 27,1 g (Rango: 24,2 a 32,2)
Salvador et al. (2017): N= 3 X= 26,7 g (Rango: 25,3 a 28,8)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal castaña. Cejas y garganta blancas. Resto de lo ventral pardo acanelado. Abdomen y subcaudales blanquecinos.
Alas pardas con una banda blanquecina-amarillenta, y por debajo de ésta una franja negruzca que la separa del pardo de las remeras. Cubiertas alares de las primarias ocráceo-amarillentas.
Cola negruzca con las plumas centrales castañas y la punta de las laterales acaneladas.

COMPORTAMIENTO
Terrícola, se posa en rocas. Anda solitaria o en pareja.

Alimentación
Heredia et al. (2010). **Anfibios:** Renacuajos.
Salvador et al. (2017). Insectos.

HÁBITAT
Orillas de ríos, arroyos, lagunas, en montañas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Nidifica en grietas o en cuevas en barrancas. En la cámara, construye una taza de fibras vegetales finas, pelos de vacas, pelos de liebre.

Nores e Yzurieta (1979). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, noviembre un nido en construcción, diciembre dos nidos en grietas de rocas, pichones.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 17-12-1983, nido con pichones; 21-12-1986, nido con 2 huevos; 20-12-1987, nido con 2 pichones.
Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, Córdoba. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, entre los años 1982 y 2006 se localizaron 19 nidos, desde octubre a enero.
De la Peña (2013c). Pampa de Achala, Córdoba, 3 nidos, uno con huevos y 2 con pichones, el 14-11-80; otro con 2 huevos el 25-11-90, estaban en hueco entre piedras y tierra, hueco en un puente, hueco en una barranca, hueco entre piedras. Medidas: diámetro del túnel: de 8 a 10 cm. Largo del túnel: de 30 a 45 cm. Diámetro total de la taza: de 12 a 15 cm. Diámetro interno: de 6 a 7 cm. Profundidad: de 1,5 a 3 cm. Alto: 5 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Río Los Tabaquillos, base del Champaquí, dptos. Calamuchita y San Javier, Córdoba, J. Heredia, en diciembre de 2004 localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Pampa de Achala. Córdoba. 25-11-1990

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Salvador y Salvador (1988): 24,4 x 19,3 y 24,9 x 18,6		
Salvador y Salvador (2012): 24,4 a 25,9 x 18,4 a 19,2	X= 25,1 x 18,9	(N= 15)
De la Peña (2013c): 24,3 a 26,2 x 18,7 a 19,1	X= 25,1 x 18,9	(N= 4)

Pesos

Salvador y Salvador (2012): 4,4 a 5,3	X= 4,9	(N= 8)
De la Peña (2013c): 4,5	X= 4,5	(N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,23 a 0,23	X= 0,23	(N= 4)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Al nacer tienen los ojos cerrados. La piel de color carne, con plumón dorsal ralo de color pardo gris oscuro. Comisuras blanco amarillentas, interior de la boca amarillo intenso.

Observaciones
Salvador y Salvador (1988). La pareja incuba y alimenta a los pichones.
Heredia et al. (2010). Cerro Champaquí, dptos. Calamuchita y San Javier, Córdoba. Un adulto alimentando a un juvenil con renacuajo.
Salvador y Bodrati (2014a). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Se parece a la Remolinera castaña pero es de menor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cinclodes olrogi Nores e Yzurieta, 1979, Sierras altas de Córdoba y San Luis, en invierno a menor altura.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de las Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Córdoba
Citas: Chebez (1994); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Heredia et al. (2010); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b, 1980c); Olrog (1979); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores e Yzurieta (1979)

REMOLINERA CASTAÑA *Cinclodes atacamensis* (R.A. Philippi, 1857)

Otros nombres: Bandurrita de Atacama. Cachila del agua. Churrete de alas blancas. Piloto castaño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 5 (M) X= 47,0 g (Rango: 45,2 a 47,7); N= 5 (H) X= 50,8 g (Rango: 46,7 a 56,3) (*atacamensis*)
Navas y Bó (1987a): N= 4 (M) X= 47,7 g (Rango: 45,8 a 49,0); N= 6 (H) X= 50,1 g (Rango: 47,9 a 52,2) (*schocolatinus*)
Salvador (1990a): N= 1 (?) 51,2 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 6 X= 47,3 g (Rango: 42 a 51 g) (*atacamensis*)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 48,5 g
Pagano y Salvador (2017): N=1 (¿?) 47,7 g (*schocolatinus*)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Dorsal parda con tono castaño. Cejas y garganta blancas. Ventralmente grisácea jaspeada en el pecho de blanquecino. Abdomen pardo con tono castaño. Alas pardas con álulas y banda en las primarias blancas. Cola parda con la puntas blancas en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros. Lepidópteros. **Arácnidos. Minerales.**
Heredia et al. (2010). **Anfibios:** Renacuajo de Rana Trepadora Cordobesa (*Boana cordobae*)
Salvador et al. (2017). Insectos.

HÁBITAT
Orillas de arroyos y ríos serranos y altoandinos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en huecos o en grietas, en barrancas o en piedras. En la cámara, construye un platito de pastos, pelos, lanas, plumas, hilos. Oculto. Elaborado.

Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, Córdoba, 01-11-1972, nido en construcción.
Salvador y Narosky (1984). 17-12-1983, Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, 17-12-1983, nido con un pichón.
Navas y Bó (1987a). Partridge localizó en Pampa de Achala, Córdoba, el 15-11-1963, un nido con 2 huevos.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba. 17-12-1983, nido con un pichón. 21-12-1986, nido con 2 pichones. 20-12-1987, nido con pichones.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 17-12-1997, 2 huevos. El nido se hallaba en una barranca de tierra sobre un arroyo, a 2,6 m en un túnel de 9 cm de boca y 40 cm de profundidad, casquete elaborado con pajitas y gramíneas de 9,5 cm de diámetro y 2,5 cm de altura.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, entre los años 1982 y 2006 se localizaron 8 nidos, desde octubre a diciembre.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 06-12-1977, 2 nidos con pichones; 30-11-1978 nido con 2 huevos; Copina, dpto. Punilla Córdoba, 05-12-1981, pichones; Pampa de Achala, Córdoba, 25-11-1990, 3 nidos 2 con huevos y uno con pichones. Medidas: diámetro del túnel: de 6 a 10 cm. Largo del túnel: de 0,60 a 1,00 m. Diámetro total de la taza: de 10 a 12 cm. Profundidad: 1 cm. Alto: 3,5 cm.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22-12-1983, nido con 2 pichones.
Salvador en Salvador (2016a). Mendoza. Nido.

Pampa de Achala. Córdoba. 25-11-1990

Valle Encantado. Salta. 30-11-1978

Valle Encantado. Salta.30-11-1978

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 27,3 x 21,1 y 27,1 x 21,2
Salvador y Salvador (2012): 25,8 a 27,3 x 19,9 a 21,2 X= 26,4 x 20,4 (N= 6)
De la Peña (2013c). 24,2 a 27,5 x 18,6 a 19,6 X= 25,6 x 19,0 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c). 3,7 a 3,8 X= 3,75 (N= 2)
De la Peña (2013c). 0,228 a 0,300 X= 0,263 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Tienen comisura amarilla o amarillo claro y el interior de la boca amarillo fuerte.

Peso
Salvador (2015): 44 y 46 g

Observaciones
Salvador y Salvador (1988). Ambos padres alimentan a los pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Oscuro, con las cejas, garganta, punta de la cola y notables bandas alares blancas. Pico largo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cinclodes atacamensis atacamensis (R.A. Philippi, 1857) entre los 2000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza y *Cinclodes atacamensis schocolatinus* Reichenow, 1920 en el oeste de Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se distribuye por la cordillera de los Andes en Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cinclodes atacamensis atacamensis (R.A. Philippi, 1857)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Navas y Bó (1987a); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Dabbene (1919a); Di Giacomo et al. (2007) ; Esteban (1951); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Navas y Bó (1987a)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007)

Mendoza
Citas: Esteban (1951); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Fitzgerlad (1899); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sanzín (1918)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); De la Peña (1983c, 2013c); Esteban (1951); Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1987a); Nores (1995)

San Juan
Citas: Cajal (1998); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2013, 2016)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2020); Echevarría et al (2008c); Esteban (1951); Handford (1983); Lucero (1983); Navas y Bó (1987a); Nores (1995); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014); Ortiz et al. (2013c); Salvador (2015)

Cinclodes atacamensis schocolatinus Reichenow, 1920

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c); Esteban (1951); Heredia (2006); Heredia et al. (2010); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Pagano y Salvador (2017); Partridge (1953c); Salvador y Narosky (1984); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Ahala, dpto. San Alberto, 14-11-1980)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores y Yzurieta (1981)

Tucumán
Citas: Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b)

REMOLINERA CHICA *Cinclodes oustaleti* Scott, 1900

Otros nombres: Curucucha de laguna. Churreta clara. Churretito. Piloto chico. Piloto claro. Piloto rayado chico. Remolinera andina. Remolinera cordillerana. Remolinera de flancos grises. Remolinera oscura.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 10 (?) X= 30,5 gr (Rango: 28 a 33,4)
Navas y Bó (1987a): N= 3 (M) X= 28,4 g (Rango: 27,0 a 29,7); N= 6 (H) X= 26,5 g (Rango: 22,6 a 31,0)

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas pardas.
Corona parda grisácea. Dorsal parda. Cejas blanquecinas. Garganta blanquecina jaspeada de pardo grisáceo. Ventral grisácea. Pecho jaspeado de ocráceo. Alas pardas con mancha canela. Cola parda oscura con las plumas externas manchadas de ocre oscuro.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Humphrey et al. (1970). Insectos. Larvas. Arena.
Salvador (obs. pers.). Insectos acuáticos.

HÁBITAT
Orillas de ríos serranos y costas del mar.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Nidifica en grietas o en cuevas en barrancas. En la cámara, construye una taza de fibras vegetales finas, pelos de vacas, pelos de liebre.

Chebez en Narosky et al (1983). Puerto Parry, isla de los Estados, Tierra del Fuego, octubre de 1981, nido en una cueva a 4 m del suelo, en una barranca sobre el mar.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al (1983). Vallecitos, dpto. Luján, Mendoza, 17-11-1982, 2 nidos con pichones, 18-12-1982, 2 pichones.
Uranga en De la Peña (2019b). Laguna del Diamante, dpto. San Carlos, Mendoza, 22-12-2017. Nido en pequeña cavidad de una de pirca a 1,20 m del suelo. Pichones.

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos.

Observaciones
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al (1983). El nido del18 de diciembre los pichones eran alimentados por sus padres y por una pareja de *Cinclodes atacamensis*.

Otros
Veiga (2001). Copahue, dpto. Ñorquín, Neuquén, un ejemplar con albinismo.

Laguna del Diamante. Mendoza. 22-12-2017. Fotos: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cejas blanquecinas. Garganta y pecho jaspeado. Banda alar canela.
Se parece a la Remolinera araucana, pero es más clara ventralmente. De la Remolinera parda se diferencia por ser grisácea ventralmente y las plumas externas de la cola ocre oscuro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cinclodes oustaleti oustaleti Scott, 1900 en San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; *Cinclodes oustaleti hornensis* Dabbene, 1917 en Tierra del Fuego. En invierno migra hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Chile y Argentina. En invierno, estepa patagónica, costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cinclodes oustaleti oustaleti Scott, 1900

Mendoza

Citas: Barros (1930); Calí et al. (2008); Darrieu y Segura (2015); Esteban (1951); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Puente del Inca, dpto. Las Heras, 11-01-1982; Castllos de Pincheira, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén

Citas: Acerbo (2000); Christie (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Nores e Yzurieta (1982b); Olrog (1979); Veiga et al. (2005); Veiga (2001)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Povedano (2016)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2016)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2003, 2005e)

Cinclodes oustaleti hornensis Dabbene, 1917

Chubut
Citas: Navas y Bó (1987a)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2009); Imberti (2003, 2005); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2005)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1984, 1986); Esteban (1951); Humphrey et al. (1970); Navas y Bó (1987a); Olrog (1948); Zotta (1938)

REMOLINERA ARAUCANA *Cinclodes patagonicus* (J.F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Churreta. Churrete. Churreta parda. Meneacola. Piloto pardo. Piloto rayado. Piloto rayado grande. Remolinera. Remolinera estriada. Remolinera parda. Remolinera pardo café. Remolinera patagónica. Remolinero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Contreras (1975): 15 (?) X= 39,7 g (Rango: 36,7 a 44)

Coloración. Pico y patas pardo oscuro. Iris pardo.
Dorsal parda oscura. Cejas blancas. Garganta blanquecina jaspeada de pardo grisáceo. Ventral parda grisácea estriada de blanco. Alas pardas con banda canela. Frente de las alas blanquecino. Cola parda con la punta de las plumas externas, ocráceas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Crawshay (1907). **Crustáceos:** *Orchestia chilensis*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos. Moluscos:** *Chilina* sp.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Canta con preferencia de madrugada en época de reproducción. Es un largo ChirrrrrrRRrrrrr... ChirrrrrrRRrrrrr... con una notable modulación de amplitud. Este canto es complementado con movimientos de elevación de las alas y girando el cuerpo hacia un lado y otro.

HÁBITAT
Orillas de lagos y arroyos y costas del mar.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Construye el nido en huecos en barrancas, en pircas, troncos, construcciones. Acolcha la base con pastos y plumas.

Crawshay (1907). Tierra del Fuego. Nido.
Pemberton (W. F.). Río Lista, dpto. Río Chico, Santa Cruz, 10-11-1914, en túnel de roedor, lecho de raicillas y plumas, 3 huevos**.**
Wetmore (1926b). Río Negro. Nido.
Reynold (1934). Isla Conejo, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, nidos en huecos en el suelo, cavidades en troncos y huecos en galpones.
Castellanos (1937). Bahía San Juan, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, nido en barranca turbosa, pichones.
Narosky en Narosky et al (1983). 2 nidos: Arroyo Gutierrez, dpto. Bariloche, Río Negro, 03-01-1972, hueco a poca altura en pared montañosa, pichones; 07-01-1972, nido en barranca de un río a un metros de altura.
Olrog (1950). Archipiélago del Cabo de Hornos, de noviembre a enero nidos con 2 ó 3 huevos. También se ven con pichones.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y diciembre.
Milat (1988). Río Olivia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 22-12-1986, 2 nidos. Uno tiene el túnel de tiene 35 cm de largo y 16 cm de ancho, 2 pichones. El otro con 2 pichones. Bariloche, dpto. Bariloche, Río Negro, nido con 3 huevos.
Parmelee y Rasmuseen (1994). Tierra del Fuego. Nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nidos en noviembre-diciembre.
De la Peña (2013c). Lago Futalaufquen, dpto. Futaleufú, Chubut. 02-02-1976, un ejemplar llevaba algas y materiales vegetales hasta hacer una “pelotita” en el pico y se internaba en el bosque. Confluencia. dpto. Los Lagos, Neuquén. 20-11-1998, nido en un hueco entre unas piedras, a 4 m. de altura, con pichones. La pareja traía comida.
Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Neuquén.Nido.
Sympson P. a Rumboll en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
González, R. a Rumboll en Salvador (2016a). Santa Cruz. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 23,6 a 29,5 x 19,4 a 21,0 X= 26,2 x 20,1 (N= 16)

Observaciones
Reynolds (1934). Tierra del Fuego. Adulto con pichones.

Depredadores

De adultos. *Glaucidium nanum* en Santa Cruz, Imberti (2005e)
Falco peregrinus en Tierra del Fuego, McNutt (1981)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardo con cejas y garganta blancas. Ventral estriada de blanco. Pico largo.
Diferenciarla de la Remolinera chica.

Lago Futalaufquen. Chubut. 02-02-1976

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cinclodes patagonicus chilensis (Lesson, 1828) desde el sur de Mendoza, oeste de La Pampa, Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz y *Cinclodes patagonicus patagonicus* (J. F. Gmelin, 1789) en Tierra del Fuego, sur y centro de Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Chile y Argentina en región andino patagónica.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cinclodes patagonicus chilensis (Lesson, 1828)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Lago Futalaufquen, dpto. Futaleufú, 02-02-1976)

La Pampa
Citas: Maceda y Erro (2010)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Chebez et al. (1993); A. Elías y D. Ferrer en Ferrer et al. (2019)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988, 2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Dabbene (1919a); De la Peña (2013c); Esteban (1951); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945, 1951); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Lago Huechulafquen, dpto. Huiliches, 28-01-1976)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuck (1977); Gelain (2001, 2004, 2007b, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Pereyra (1951); Povedano (2016); Straneck (1990a)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Imberti (2005e); Narosky et al. (1983)

Cinclodes patagonicus patagonicus (J. F. Gmelin, 1789)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2009); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Pemberton en Narosky et al. (1983)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); McNutt (1981); Milat (1988); Olrog (1948, 1950); Peri (2013); Reynolds (1934)

PICOLEZNA ESTRIADO *Heliobletus contaminatus* (Berlepsch, 1885)

Otros nombres: Papahormigas. Pico filoso. Pico-filoso pardo. Ticotico de dorso estriado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm
Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 14 y 15g; N= 1 (H) 13 g

Coloración. Iris pardo. Pico negruzco, base de la mandíbula más claro. Patas grises verdosas.
Corona parda estriada de negro. Cejas ocráceas. Dorsal parda con estrías ocres en la espalda. Garganta blanco-amarillenta. Ventral parda grisácea estriada de ocráceo. Alas pardas oscuras. Cola castaña.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Nidos en Misiones

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nidifica en huecos en los árboles.

Cockle et al. (2012a, 2015). Misiones. Nido.
Bodrati y Pagano en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2017). Parque Nacional Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, el nido referido en Cockle et al. (2012a), estaba a 7,60 m de altura en un hueco de un árbol. Tenía 2 huevos blancos.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

Pichones
Cockle y Bodrati (2017). Pico color marfil, interior de la boca roja. Plumón gris.Cañones emergiendo de la piel y ojos abiertos el día 10 de edad.

Más información:
Cockle y Bodrati (2017)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona, nuca y espalda estriadas. Garganta ocrácea. Ventral estriada.
Se diferencia del Picolezna rojizo por tener el pico recto, garganta más amarillenta y sin castaño en la rabadilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Heliobletus contaminatus camargoi da Silva y Stotz, 1992 en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Endémico de la Selva Atlántica en el este de Paraguay, sureste de Brasil (Espírito Santo) y noreste de Argentina desde el nivel del mar hasta 1800 metros.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Heliobletus contaminatus camargoi da Silva y Stotz, 1992

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Cockle y Bodrati (2017), Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Giraudo et al. (1993); Navas y Bó (1988b)

TICOTICO CABEZA NEGRA *Philydor atricapillus* (Wied, 1821)

Otros nombres: Tico-tico. Ticotico anaranjado. Tico-tico gorrinegro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Belton (1984): N= 3 (H) de 21 a 22 g
Storer (1989): N= 1 (M) 18 g; N= 1 (H) 19 g; N= 1 (?) 19 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más claro. Patas gris oliva. Iris pardo.
Cabeza negra. Líneas oculares y malares negras, separadas por líneas canelas. Dorsal parda con tono castaño. Garganta y ventral canelas. Alas pardas oscuras. Cola castaña.

Alimentación
Mallet Rodrigues (2001). **Insectos:** Blattaria, Coleoptera (larvas y adultos). Dermaptera. Diptera (larvas y adultos). Embioptera. Heteroptera. Homoptera. Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (larvas y adultos). Lepidoptera (larvas

y adultos). Orthoptera. Psocoptera. Thysanoptera (Tysanura). **Arácnidos:** Acari, Aracneae, Opilionida, Scorpionida, Pseudoescorpionida.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de información.

PICHONES
Observaciones
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Misiones. Adulto con pichones

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza oscura con dos líneas negras y dos canelas. Ventral canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Philydor atricapillus (Wied, 1821) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra en la Selva Atlántica del sureste de Brasil, este de Paraguay ynoreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Chebez y Rolón (1969); Navas y Bó (1988b)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1975)

TICOTICO GRANDE *Philydor rufum* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Tico-tico común. Tico-tico rojizo. Titirí acollarado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 25 g; N= 1 (H) 27 g
Darrieu (1986): N= 1 (H) 28,1 g
Storer (1989): N= 1 (H) 28 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más claro. Patas gris oliváceas. Iris pardo rojizo.
Frente, cejas, cara y ventra, canelas. Corona y nuca grises. Dorsal parda olivácea. Alas castañas con puntas pardas oscuras. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattaria (ootecas). Coleoptera (adultos). Hemiptera. Homoptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (larvas y adultos). **Arácnidos:** Araneae.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una serie de agudos y metálicos silbos, emitidos con una marcada modulación de amplitud que asciende y luego desciende: ChilchilchilchilCHILCHILCHIL-CHILCHILchilchilchil.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Nidifica en huecos en barrancas o en el suelo.

Olrog en Narosky et al. (1983). Dpto. Caingas, Misiones, 14-10-1949, nido en un hueco, a 2 m del suelo, 3 huevos; dpto. Guaraní, Misiones, 10-11-1949, 2 huevos y un pichón. (*). Posiblemente se trate de otra especie.
Bodrati en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2017). Se localizaron 24 nidos en túneles debajo de tierra. En barrancas de arroyos y en un pozo abandonado. La base del túnel con materiales vegetales.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

PICHONES
Observaciones
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Adulto con pichones

Más información:
Cockle y Bodrati (2017)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente, cara y ventral canelas. Corona y nuca oscuras. Alas y cola castañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Philydor rufum rufum (Vieillot, 1818) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Presenta 2 poblaciones separadas. Una en la Selva Atlántica en el este de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina. La otra se extiende por Costa Rica, Panamá y luego siguiendo los Andes tropicales por Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Philydor rufum rufum (Vieillot, 1818)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu (1986)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Cockle y Bodrati (2017); Dabbene (1914a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b)

TICOTICO CEJA BLANCA *Anabacerthia amaurotis* (Temminck, 1823)

Otros nombres: Titirí de ceja blanca. Titirí coronado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Onoki (1981): N= 4 (?) X= 18,8 g (Rango: 16,8 a 20)

Coloración. Pico córneo. Patas pardo oliva. Iris pardo.
Cabeza parda moteada de negro en la nuca. Cejas y garganta ocráceas. Dorsal parda con fuerte tono castaño. Ventral olivácea con estrías ocráceas. Alas pardas oscuras. Cola castaña.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza oscura. Cejas y garganta ocráceas. Ventral con estrías. Cola castaña.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, sureste de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati y Cockle (2006); Chebez (1996a); Partridge (1961)

TICOTICO OCRÁCEO *Anabacerthia lichtensteini* Cabanis y Heine, 1859

Otros nombres: Ticotico chico. Ticotico de pico corto. Ticotico oliváceo. Ticotico ocráceo chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 20 y 21 g
Capllonch et al. (2015b): N=1 (?) 20 g

Coloración. Pico pardo, base de la mandíbula gris. Patas gris oliva. Iris pardo.
Cabeza gris. Cejas ocres canelas. Dorsal parda olivácea. Ventral canela. Cobijas alares castañas. Alas pardas oscuras con barbas externas castañas. Cola con las plumas centrales pardas oliváceas, las externas castañas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera. Formicidae. Hemiptera., Mallophaga. **Arácnidos**: Araneae.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N		

Nidifica en huecos en árboles.

Saibene (1995). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 07-09-1991, nido en construcción, a 15 m de altura en un hueco.
Bodrati, A., F. Di Sallo y C. Ferreyra en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2017). Parque Nacional Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 05-10-2015, nido en un hueco de un árbol a 25 m de altura, contenía 3 pichones.

PICHONES
Observaciones
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Adulto con pichones.

Descripción
Cockle y Bodrati (2017). Piel rosada. Plumón en cabeza y espalda. El 19 de octubre estaban emplumados, except la cola.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza gris con cejas ocre-canelas. Dorsal parda olivácea. Ventral canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anabacerthia lichtensteini Cabanis y Heine, 1859 en Corrientes y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica en el este y sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: López-Lanús et al. (2013b)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capllonch et al. (2015b); Chebez (1996a); Cockle y Bodrati (2017); Dabbene (1914a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Saibene (1995); Saibene et al. (1996)

TICOTICO ESTRIADO *Syndactyla rufosuperciliata* (Lafresnaye, 1832)

Otros nombres: Titirí. Titirí común. Titiritá. Trepador. Vinchuquero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 3 X= 23,0 g (Rango: 22,0 a 25,0)
Contreras (1983c): N=2 (M) 26,5 y 23,0 g
Salvador (1988): N= 4 (M) X= 27,7 (Rango: 26,0 a 29,0)
Salvador (1990a): N= 1 (?) 27,5 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 2 (M) 27,5, 29,0 g; N= 2 (H) 25,3; 26,4 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 75 X= 26,4 g (Rango: 23 a 36 g)

Salvador y Di Giacomo (2014): N= 8 X= 26,3 g (Rango: 24,6 a 28,0); N= 3 26,2, 26,8 y 27,5 g
Capllonch et al. (2015b): N= 2 (?) X= 25 g (Rango 23 a 27)

Coloración. Pico: maxila negruzca, mandíbula negruzca con base corneo rosada. Patas pardo oliváceas o pardo amarillentas con tinte oliváceo. Iris pardo.
Dorsal parda olivácea, con estrías ocráceas en la espalda. Cejas ocráceas. Garganta blanca. Ventral olivácea estriada de ocráceo blanquecino. Alas pardas oliváceas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera. Formicidae. **Arácnidos:** Acari. Araneae.
De la Peña (obs. pers.). Gusanos.
Salvador (obs. pers.). **Insectos:** Lepidoptera (polillas).
Blake y Rougés (1997). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Formicáridos. Hemípteros. Hymenoptera. Neurópteros. Orthópteros. Larvas. **Arácnidos**. **Vegetales:** Solanaceae.
Rougés y Blake (2001). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Formicáridos. Hemípteros. Hymenoptera. Larvas. Neurópteros. Orthópteros. **Arácnidos.**

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en huecos en los árboles o en construcciones y en tubos. Acolcha la base con tallitos, pecíolos.

Girard (MACN). Dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 19-11-1911, un huevo.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 29-10-1905 y 01-11-1905, nidos en huecos.
Capllonch (1997). Tucumán. Nido.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, noviembre de 1991, 2 nidos, uno en un hueco en una pared de una vivienda y el otro en un tubo de fibrocemento cerca de una casa. Semiesfera acolchada con tallitos y pecíolos, tenía 4 huevos.
Auer et al. (2007). Salta. Nido.
Coconier et al. (2007). Salta. Nido.
De la Peña (2013c). Concordia, dpto. Concordia, Entre Ríos, 10-12-2002, nido en un hueco en un Sauce, a 5,5 m del suelo. Pichones.
Bodrati, A. en Salvador (2016a).Chaco. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Cockle y Bodrati (2017). Parque Nacional Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, se localizaron 17 nidos en cavidades de árboles y 2 en Tubuna. La base acolchada con vegetales.



Huevos
Pone 2 a 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Girard (MACN): 24,7 x 17,2
Hartert y Venturi (1909): 24,1 a 25,0 x 17,0 a 17,2 X= 24,5 x 17,1 (N= 2)
Di Giacomo y López Lanús (1998): 23,1 a 24,2 x 17,5 X= 23,6 x 17,5 (N= 4)

Pesos
Di Giacomo y López Lanús (1998): X= 3,9

Observaciones
Darrieu y Camperi (1990). Provincia de Corrientes, un huevo formado, octubre.
De la Peña (2013c). La pareja traía larvas (gusanos) a los pichones.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Adulto con pichones
Cockle y Bodrati (2017). Los pichones eran alimentados con Grillos (Orthoptera) y Cucaracha (Blattaria)

Más información:
Di Giacomo y López Lanús (1998). Cockle y Bodrati (2017)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal parda. Garganta blanquecina. Ventral “escamada”. Cola castaña, en punta. Trepa por las ramas y troncos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Syndactyla rufosuperciliata oleaginea (P. L. Sclater, 1884) en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y este de Catamarca, hasta los 2500 m de altura y *Syndactyla rufosuperciliata acrita* (Oberholser, 1901) en Misiones, este de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, noreste de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Presenta 2 poblaciones separadas, una que viene por los Andes en Perú, Bolivia y noroeste de Argentina y otra en la región sur de Selva Atlántica y Bosques húmedos adyacentes del sureste de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Syndactyla rufosuperciliata oleaginea (P. L. Sclater, 1884)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores et al. (2000)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Di Giacomo y López Lanús (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1933); Lucero (1982); Pagano et al. (2012); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvadori (1897)

Observaciones: De la Peña (Laguna de Yala, dpto. Capital, 07-02-1983; Los Lapachos, dpto. El Cármen, 11-02-1983)

La Rioja
Citas: Lobo Allende et al. (2014); Lucero (2012f)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Auer et al. (2007); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (La Caldera, dpto. La Caldera, 11-02-1983)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Echevarría et al (2008a); Fanjul y Echevarría (2015); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Narosky et al. (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

Syndactyla rufosuperciliata acrita (Oberholser, 1901)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (1997b, 2006); Darrieu y Camperi (2001a); Haene y Blanco (1990); Hartert y Venturi (1909); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b)

Observaciones : E. Sierra, 28-12-2007, puente arroyo de los Cueros, acceso a la localidad de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro. Un individuo aislado.

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Camperi (1992a); De la Peña (2012b, 2013c); Marateo et al. (2009); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Straneck (1990c)

Formosa
Citas : Contreras (1987c); López-Lanús y Mencia (2017)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Cockle y Bodrati (2017); Chebez (1996a); Contreras (1983c); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1951)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2004); Martinez Achenbach (1957)

TACUARERO *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859)

Otros nombres: Encucuruchado. Encurrucado. Espinero del monte. Remolinera tacuatí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (H) 52,5 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula máss claro. Patas gris verdosa. Iris pardo.
Cabeza y cola castañas. Dorso castaño claro. Cejas ocráceas. Garganta blanquecina punteada a los lados de pardo oscuro. Ventral grisácea. Alas pardas y castañas.

HÁBITAT
Tacuarales en selvas.

NIDIFICACIÓN
Nidos en Misiones

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Bodrati, A. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

PICHONES
Observaciones
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Adulto con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal castaña. Ventral grisácea. Garganta blanca orillada de puntos pardos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlántica, frecuente pero no exclusivamente en matorrales de tacuarales, en el este de Paraguay, sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2005d, 2005e, 2010b); Bodrati y Cockle (2005b, 2006a, 2006b); Chebez (1994, 1996a); Chebez et al. (1998); Chebez y Casañas (2000); Chebez y Rolón (1989); Cockle y Bodrati (2005a); Esteban (1951); Gil y Ciarmiello (2005); Partridge (1954); Rey (2005a); Saibene et al. (1996); Savigny (2013)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 09-02-1973)

TICOTICO OJO BLANCO *Automolus leucophthalmus* (Wied-Neuwied, 1821)

Otros nombres: Arapassú colorado. Tacuarero ojoblanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 33,5 g

Coloración. Pico pardo, base de la mandíbula grisácea. Patas grisáceas. Iris blanco.
Dorsal castaña. Garganta blanca. Ventral ocrácea. Alas pardas oscuras con las barbas externas castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera (adultos). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (larvas y adultos). Duraes y Marini (2005). **Insectos:** Coleoptera (adultos). Diptera. Heteroptera. Homoptera. Hymenoptera. Lepidoptera (larvas y adultos). Neuroptera (larvas). **Arácnidos:** Araneae.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz más común es una serie de sílabas con modulación de frecuencia descendente: Plüeplüeplüeplüe .. Plüeplüeplüe.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Construye el nido en túneles en la tierra. Forra la base con materiales vegetales.

Bodrati, A. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Cockle y Bodrati (2017). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 10-11-2012, nido en una barranca de un arroyo. Otro estaba en un túnel horizontal, 40 cm debajo del borde de un pozo natural grande, el 27-11-2014 tenía 2 huevos blancos

Más información:
Remsen (2003). Cockle y Bodrati (2017)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal castaña. Iris y garganta blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Automolus leucophthalmus sulphurascens (M. H. K. Lichtenstein, 1823) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Endémico de la Selva Atlántica o Paranaense que se extiende por en noreste de Brasil, a este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Automolus leucophthalmus sulphurascens (M. H. K. Lichtenstein, 1823)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Cockle y Bodrati (2017); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990h)

TICOTICO GOTEADO *Margarornis squamiger* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Rahbek et al. (1993): N= 6 (?) X= 17,7 g (Rango: 16 a 18,5)

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula rosada. Patas pardo grisáces. Iris pardo.
Dorsal rojiza. Cejas amarillentas. Garganta amarillenta. Ventral parda grisácea goteada de amarillento. Alas y cola rojizas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y garganta amarillentas. Ventral goteada de amarillento.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Margarornis squamiger squamiger (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se encuentra en la Nuboselva de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Margarornis squamiger squamiger (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Pearman, en Mazar Barnett y Pearman (2001)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Di Giacomo et al. (1995); Di Giacomo et al. (1998); Moschione et al. (2013)

RAYADITO *Aphrastura spinicauda* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Bullicioso. Comesebo chico. Rayadito de cola espinosa. Tintica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): 12 g
Contreras (1975): N= 23 (?) X= 11,5 g (Rango: 9,5 a 12,8)
Christie et al. (2004): N= 1 (M) 11 g; N= 1 (H) 11 g; N= 5 (?) X= 10,6 g (Rango: 9,0 a 13)
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 11 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula blanquecina. Patas pardo verdosas. Iris pardo.
Cabeza negra. Cejas canelas. Dorsal parda con tono castaño. Rabadilla castaña. Ventral blanca. Alas pardas con manchas canelas y blanquecinas. Cola parda con plumas externas castañas.

COMPORTAMIENTO
Trepa por los troncos y ramas. Solitario o en grupos. Muy bullanguero. Inquieto.

Alimentación
Grigera (1982). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae: Trequinae, Chrysomelidae: Halticinae, Curculionidae: Brachiderinae). Diptera (Asilidae: larvas). Hymenoptera (Ichneumonidae: pupas, Formicidae). Lepidoptera (larvas) Orthoptera. Psocoptera. Hemiptera (Liqueidae, Nitidulidae: *Pycnocephalus argentinus*). Homoptera (Psillidae). **Arácnidos:** Arachnida (Acarina, Pseudoscorpionida). **Vegetales:** Semillas (no determinadas)
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Diptera. Hymenoptera.
Estades (2001). **Vegetales:** Semilla *Pinus radiata.*

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Tiene varias vocalizaciones, una es una serie de muy agudas notas, Tsi. tsi. tsi. tsi tsi tsi tsi..tsi, otra es un agudo, áspero y ondulado Tirrieorrieorrieorrieo...

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Construye el nido en huecos u oquedades en ramas o troncos de árboles y en construcciones. En la cámara elabora una taza de raicillas, con cerdas y plumas en la parte interna. Oculto. Elaborado.

Humphrey et al. (1970). Tierra del Fuego, 9 de diciembre, pichones; 14 de diciembre, 2 pichones.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidos en noviembre-diciembre.
De la Peña (2013c). Lago Huechulafquen, dpto. Huiliches. Neuquén. 27-01-1976, hueco en un árbol cortado, a 0, 50 m, 4 pichones. Medidas: diámetro del túnel: 4 cm. Largo del túnel: 35 cm. Diámetro total de la taza: 4 cm. Profundidad: 4 cm.
Retolaza, J. a Rumboll en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Crossin, R. en WFVZ, en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Straneck, R. a Rumboll en Salvador (2016a). Tierra del Fuego. Nido.



Huevos
Pone 3 ó 4, ovoidales, blancos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 16,5 a 19,6 x 14,0 x 14,8 X= 18,3 x 14,4 (N= 15)

Bariloche. Río Negro. 08-05-2016 Fotos: María Fernanda Gauna

Lago Huechulafquen. Neuquén. 27-01-1976. Ubicación nido

PICHONES
Observaciones
Keith en Humphrey et al. (1970). Tierra del Fuego. Adulto con pichones

Depredadores
De adultos: *Accipiter chilensis* en Tierra del Fuego, Reynold en Humphrey et al. (1970), en Río Negro, Ojeda et al. (2004), *Buteo albigula* en Río Negro, Trejo et al. (2006b), *Tyto alba* en Río Negro, Trejo et al. (2004), *Glaucidium nana* en Santa Cruz, Imberti (2005e)

Más información:
Moreno et al (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza oscura con notables cejas canelas. Ventral blanca. Cola con puntas. Trepa por los troncos y ramas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aphrastura spinicauda spinicauda (J. F. Gmelin, 1789) por el oeste, desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. También este de Santa Cruz. Accidental en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. En centro y sur de Chile y y suroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aphrastura spinicauda spinicauda (J. F. Gmelin, 1789)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 02-02-1976)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1993); Christie et al. (2004); Contreras (1975); De la Peña (2013c); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Narosky et al. (1983); Navas (1978); Pereyra (1945, 1951); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 30-01-1976; Huechulafquen, dpto. Huiliches, 27-11-1998)

Río Negro
Citas: Becerra Serial y Grigera (2005); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuck (1977); Gelain (1984a, 2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Grigera (1982); Hecker y Vidoz (1998); Ippi y Trejo (2003); Ojeda et al. (2004); Pereyra (1951); Povedano (2016); Trejo y Seijas (2003); Trejo et al. 2004, 2006b); Vuilleunier (1967)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Imberti y Albrieu (2001); Imberti (2005e); Peri (2013); Roesler et al. (2014); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (El Calafate, dpto. Lago Argentino, 26-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1970); Keith (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Ripley (1950); Vuilleumier (1991)

COLILARGA *Sylviorthorhynchus desmursii* des Murs, 1847

Otros nombres: Cola de alambre. Cola de helecho rojizo. Cola de paja. Colilarga del Sur. Coludito. Coludito rojizo. Cuatroplumas. Dos plumas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23,5 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 4 (?) X= 9,2 g (Rango: 8,5 a 9,9)
Christie et al. (2004): N= 1 (H) 9,6 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula blanquecina. Patas pardas. Iris pardo.
Dorso canela. Frente castaña. Ventral canela clara. Alas pardas. Cola castaña con punta parda.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es una aguda y sostenida serie de sílabas: Chidilitchidilitchidilitchidilit...

HÁBITAT
Tacuarales y vegetación arbustiva en los bosques patagónicos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

El nido es globular, con entrada lateral, construido con palitos, pastos, hojas y musgos.

Radboone (1935). Lago San Martín, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, noviembre, 3 huevos.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 20,3 a 21 x 15,6 a 16,1

PICHONES
Observaciones
Salvador en Salvador (2016a): Neuquén. Adulto con pichones

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Canela, con dos plumas muy largas y finas (16 cm.) en la cola y dos más cortas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sylviorthorhynchus desmursii des Murs, 1847 por el oeste, desde Neuquén a Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sur de Chile y suroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Camperi (1998); Vidoz (1995)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1993); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b); Dabbene (1913); Daciuk (1978); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945, 1951); Veiga et al. (2005);

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004 Contreras et al. (1980b);); Daciuck (1977); Gelain (2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Pereyra (1951); Povedano (2016); Straneck (1990a)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009). Imberti (2003, 2005e); Radboone (1935)

COLUDITO CANELA *Leptasthenura fuliginiceps* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Coludito copetón canela. Coludito de cabeza rojiza. Tijerita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15,5 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 1 (M) 11,3 g; N= 2 (H) 9,5, 10,0 g
Salvador (1988): N= 4 (?) 13,0, 13,0, 12,0 y 12,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 5 X= 10,8 g (Rango: 10 a 11,50 g)

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula blanquecina. Patas gris oliváceas. Iris pardo.

Frente y corona castañas. Dorsal parda con tono canela. Ventral parda grisácea. Alas pardas con ancha banda castaña. Frente de las alas ocráceos. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja.

Alimentación
Olrog (1956). **Insectos:** Coleópteros (huevos)

HÁBITAT
Quebradas y estepas arbustivas altoandinas y áreas serranas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N								

Construye el nido en grietas o en huecos en paredes rocosas, en construcciones. barranca de tierra sobre un arroyo,Acolcha la cámara con pastos, pelos, plumas y materiales algodonosos. Oculto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Dinelli localizó un nido en Tucumán, en abril con pichones.
Höy (1968c). Luracatao, dpto. Molinos, Salta, enero de 1964, 2 pichones, febrero de 1965, 2 huevos y nuevamente 2 huevos frescos. Este nido fue usado 3 veces y además como dormidero.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Achala, Córdoba, 10-01-1983, 3 pichones.
Salvador y Salvador (1988). Córdoda. Nido.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, nido en una barranca de tierra sobre un arroyo, a 1,6 m en un hueco de 10 cm de boca y 15 cm de profundidad, semiesfera chata elaborada de gramíneas y revestido interiormente con lana y abundantes plumas, con un diámetro externo de 9 cm, diámetro interno 5 cm, altura 6 cm y 3 cm de profundidad, 2 huevos.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, 10-01-1983, nido en hueco en un macizo de helechos, musgos e hiervas, a 1,80 m de altura. Tenía 3 pichones. El 19-12-1994, nido con 2 huevos.
Salvador (2015). Sierra de Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 05-03-1986, nido con 2 huevos. Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 2 pichones.
Uranga en De la Peña (2016d). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy. 08-02-2001. Nido en un hueco en una pared de una casa abandonada, a 2,30 m. del suelo. La cámara estaba forrada con pajitas y plumas. La taza mide 7,5 cm. de diámetro y 2 cm. de profundidad.Tenía 3 huevos.



Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy (1968c): 18,2 a 18,9 x 14,5 a 14,6 (N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 18,2 x 13,9 y 18,5 x 14,1
Salvador y Salvador (2012): 18,1 x 13,8 y 18,4 x 13,9
Uranga en De la Peña (2016d): 18,5 x 14,5, 18,5 x 14,6, 18,6 x 14,5

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 1,9 y 2,0

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012).Comisuras amarillas y el interior de la boca amarillo fuerte.
La pareja alimentaba a los pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete y larga cola castaña.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leptasthenura fuliginiceps paranensis P. L. Sclater, 1862 entre los 1000 y los 2500 metros de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. En invierno a menor altura.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Andes del oeste de Bolivia, noroeste y Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptasthenura fuliginiceps paranensis P. L. Sclater, 1862

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Hartert y Venturi (1909); Navas y Bó (1987a); Salvador (2015); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi et al. (2013); De la Peña (2013c); Mamaní et al. (2018); Salvador (2015)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Giannini et al. (2001)

Mendoza

Citas: Bianchini y Arenas (2013b); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Salta
Citas: Hartert y Venturi (1909); Höy (1968); Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1987a)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1988)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b)

COLUDITO YUNGUEÑO *Leptasthenura yanacensis* Carriker, 1933

Otros nombres: Coludito ocráceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Remsen (2003): de 10 a 12 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula rosada. Patas pardo oliva. Iris pardo.
Dorso pardo leonado. Anterior de la corona y supracaudales rojizos. Ventral leonada.
Alas pardas. Primarias orilladas de rojizo. Cola rojiza.

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Remsen (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal parda con supracaudales rojizas. Alas pardas y rojizas. Cola rojiza

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leptasthenura yanacensis Carriker, 1933 en Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sureste de Perú, Bolivia y extremo noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Di Giacomo et al. (2007); González et al. (2011); Mamaní et al. (2018); Mazar Barnett et al. (1998a); Mazar y Pierman (2001); Moschione et al. (2011); Moschione y Segovia (2005); Pearman (2001)

Salta
Citas: Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione et al. (2013); Pearman (2001)

COLUDITO COPETÓN *Leptasthenura platensis* Reichenbach, 1853

Otros nombres: Cambalachero de cola parda. Coludito. Coludito copetón pálido. Coludito de copete. Coludito tijerita. Ratona coluda. Ratonera coluda. Tirititi.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 5 (M) X= 10,6 g (Rango: 10,0 a 11,2); N= 2 (H) X= 10,2 g (Rango: 9,8 a 10,6)
Salvador (1988): N= 1 (?) 11,6 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 1 (M) 10 g
Camperi (1992a): N= 1 (H) 10,0 g
Camperi (1992c): N= 1 (M) 10,0 g
Blendinger (1999): 9,4 g
Blendinger (2005): X= 9,1 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 46 X= 9,5 g (Rango: 7,5 a 13 g)
Salvador (2014a): N= 9 X= 10,3 g (Rango: 9,2 a 11,6)

Coloración. Pico pardo oscuro con base de la mandíbula blancuzca. Patas pardo amarillentas o pardo oliváceo. Iris pardo oscuro.
Dorsal parda grisácea. Copete pardo grisáceo estriado de ocráceo. Garganta blanquecina estriada de pardo grisáceo. Ventral grisácea. Alas pardas con banda castaña. Secundarias orilladas de ocráceo. Cola parda, plumas externas canelas.

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos en el suelo, ramas y follaje, hasta 4 m. de altura.

Alimentación
Olrog (1956). Insectos. Arácnidos.
Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. Lepidópteros.
Genise et al. (1993). **Vegetales:** Savia *de Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa*
Blendinger (1999). **Vegetales:** Savia *de Prosopis flexuosa*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Arácnidos:** ácaros.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Coccinellidae, Chrysomelidae, Prionidae, no identificado). Dermaptera. Hemiptera. Homoptera (Aphidae, Membrasidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). **Arácnidos:** arañas.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es una aguda y silbada serie con modulación de amplitud descendente: Sitsitsitsitsisisisi....

HÁBITAT
Praderas y estepas arbustivas, bosques, montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Catamarca, La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

N								N	N	N	N

Construye el nido en grietas, huecos, cavidades, cajas nidos y en nidos abandonados por otras aves. Acolcha y/o forra la cámara con pajas e internamente plumas y cerdas. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Dpto. San Lorenzo, Santa Fe, 25-11-1902, 2 huevos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 18-10-1925, 3 huevos.
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, noviembre, huevos.
Pereyra, C. B. de. (1942). Estancia "Ranchos" provincia de Buenos Aires, nido en uno de *Furnarius rufus*.
Masramón (1971). San Luis, nidifica en oquedades o en nidos abandonados.
Earnshaw en Narosky et al (1983). Pdo. de Magdalena, Buenos Aires, 10-11-1938 y 18-11-1938, en nidos de *Furnarius rufus*, 3 huevos.
Zelich en Narosky et al (1983). Tres nidos: Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 29-09-1968, en hueco en tronco, 2 huevos; 24-10-1968, en hueco en árbol, un huevo: 27-10-1969, en nido de *Furnarius rufus*, 3 pichones.
Masramón en Narosky et al (1983). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 05-12-1979, 2 huevos.
Salvador en Narosky et al (1983). Ballesteros Sud, dpto. Unión, Córdoba, 06-11-1982, en nido de *Furnarius rufus*, 4 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al (1983). 4 nidos: Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 04-11-1970, 2 nidos en nidos de *Furnarius rufus*, uno con un huevo y el otro con 2 huevos; Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 25-11-1980, en construcción en *Furnarius rufus*; Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 23-12-1970, en nido roto de *Furnarius rufus*, 2 huevos.
Salvador y Fraga en Narosky et al (1983). Villa María, dpto. San Martín. Córdoba, 29-10-1982, en nido de *Furnarius rufus*, 3 pichones y un huevo infértil.
Salvador y Narosky en Narosky et al (1983). Unión, dpto. Gdor. Dupuy. San Luis, 16-11-1982, 2 nidos en nidos de *Cranioleuca pyrrhophia*, con 4 pichones y 4 huevos respectivamente.
Mason (1985). Buenos Aires. Nido.
Navas y Bó (1987a). Lagunas Largas, dpto. San Martín, Mendoza, 19-11-1963, nido con 5 pichones.
Navas y Bó (1987a). San Luis. Nido.
Nellar Ramonella (1993). San Gerónimo, dpto. Capital, San Luis, 26-10-1984, nido en nido de Hornero.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Nidifica.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 23 nidos.
Mérida y Bodrati (2006). Buenos Aires. Nido.
Salvador (2011c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, 37 nidos en nidos de *Furnarius rufus*, 9 en nidos de *Anumbius annumbi*, 7 en nidos de *Coryphistera alaudina* y 6 en nidos de *Cranioleuca pyrrhophia*.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 59 nidos. Se reproduce de setiembre a enero. Posturas de 3 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 27 nidos desde el 20-10-1970 al 22-09-2004, 24 en provincia de Santa Fe y 3 en provincia de Córdoba. Casi todos en nidos de *Furnarius rufus* y algunos en nidos de *Phacellodomus striaticollis, Schoeniophylax phryganophila, Melanerpes cactorum* y Caja-nido. Un nido en Esperanza, del 03-11-1990 tenía 2 huevos y 1 de *Tapera naevia.*
Salvador y Bodrati (2013a). Catamarca, Córdoba. Nido.
Salvador y Bodrati (2013a, 2013c). Entre Ríos. Nido.
Pintos et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Short, L. en WFVZ, en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Catamarca. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). La Pampa. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 16,5 x 13,1 y 17,4 x 13,3		
Smyth (1928): 18,5 x 13,0 a 13,5		
Masramón (1971): 17,0 x 13,0		
Salvador en Narosky et al (1983): 17,5 a 18,2 x 13,9 a 14,1	X= 17,8 x 13,9	(N= 4)
Narosky en Narosky et al (1983): 16,8 a 17,5 x 13,3 a 14,2	X= 17,1 x 13,5	(N= 6)
Salvador y Fraga en Narosky et al (1983): 16,8 x 14,2		(N= 1)
Mezquida (2001b): 17,3 x 13,0		
Salvador (2013b): 16,4 a18,8 x 13,0 a 14,4	X= 17,7 x 13,8	(N= 61)
De la Peña (2013c): 16,1 a 19,2 x 13 a 14,4	X= 18,4 x 13,6	(N= 15)

Pesos

Salvador en Narosky et al (1983): 1,9		
Salvador (2013b): 1,4 a 1,9	X= 1,7	(N= 45)
Mezquida (2001b): 1,5		
De la Peña (2013c): 1,7 a 2,0	X= 1,8	(N= 4)
De la Peña (2013c): 0,08 a 0,10	X= 0,94	(N= 8)

Generalidades
Mason, P. en Narosky et al (1983). El período de incubación es de 14 días y los pichones permanecen en el nido de 15 a 16 días.
Mezquida (2001b). Los huevos son puestos en días corridos. Período de incubación 15 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 15 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 13-15 días. Pone en días alternos. Período de incubaciión 14-15 días. Los pichones permanecen en el nido 16 días. Son alimentados por ambos padres.

PICHONES
Descripción.
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne, con ralo plumón dorsal gris. Pico pardo amarillento, comisuras amarillo claro. Interior de la boca amarillo.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 1,2 a 1,5 X= 1,4 (N= 6)

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Plumón en las zonas ptéridas, gris.
Pico claro.Piel color natural. Comisura amarillo claro. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja.

3 días. Ojos cerrados. Vainas de las plumas alares y de la cola, grises. Emite grititos.
4 días. Abre los ojos.
5 días. Ojos abiertos, marrones.
6 días. Pico amarillento con punta oscura. Plumón gris. Cañones de las alas y cola, apareciendo las láminas parduscas con punta ocrácea. Ventralmente grisáceo.
11 días. Muy vivaracho. Patas grises en la parte anterior, amarillenta en la posterior.
Ala: primarias y secundarias pardas con las plumas orilladas de ocre-castaño. Cola: plumas externas rojizas. Centrales pardo oscuro. Dorsalmente pardo grisáceo. Ventralmente grisáceo. Garganta y pecho jaspeado de pardo grisáceo.

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 14 a 16 días.
De la Peña (2013c). Los dos padres alimentan a los pichones. A los 11 días si son molestados se escapan del nido.

Otros
Salvador (2011c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). De la Peña et al. (2003a).Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Depredadores
De pichones y de huevos: *Pseudoseisura lophotes* en Entre Ríos, Salvador y Bodrati (2013c)

Más información:
Mason (1985). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

DENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete. Garganta estriada. Cola con plumas largas.

Esperanza. Santa Fe. 03-11-1990
Nido parasitado por *Tapera naevia.*

Esperanza. Santa Fe. 02-05-2008

Esperanza. Santa Fe. 11-04-2008

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptasthenura platensis Reichenbach, 1853 desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su distribución abarca principalmente Argentina y Uruguay. También en pequeñas áreas adyacentes del sur de Brasil y Paraguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c, 2002b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Maugeri (2002b); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999b); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Salvador y Bodrati (2013a); White (1882)

Chubut
Citas: Couve y Vidal (2003); Vuilleumier (1993b)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Dardanelli et al. (2006b); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983, 1988, 2013b); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 04-05-2007; Ascochinga, dpto. Colón, 14-09-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Narosky et al. (1983); Raffo et al. (2008); Salvador y Bodrati (2013c); Smyth (1928)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez (1998)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Cueto et al. (1997); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986, 1987a); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1986); Chebez (2005); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Calí et al. (2008); Cueto et al. (1997); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Mezquida (2001b); Mezquida y Marone (2001); Milesi et al. (2002); Navas y Bó (1987a); Pereyra (1937); Rebollo et al. (2013)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989, 1994); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013); White (1882)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Blendinger (2005); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

Observaciones: De la Peña (Marayes, dpto. Valle Fértil, 16-01-1982)

San Luis
Citas: Masramón (1971, 1983); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Cruz
Citas: Humphrey y Bridge (1970)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2002a, 2003, 2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

COLUDITO COLA NEGRA *Leptasthenura aegithaloides* (Kittlitz, 1830)

Otros nombres : Arañero. Cola negra. Colilarga. Colilarga pálido. Coludito común. Coludito manto liso. Come arañas. Tijeretal. Siete colas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras (1975): N= N= 5 X= 12,9 g (Rango: 11,6 a 13,2), N= 4 X= 12,5 g (Rango: 12,2 a 12,8)
Navas y Bó (1987a): N= 15 (M) X= 9,7 g (Rango: 8,7 a 10,5); N= 10 (H) X= 9,1 g (Rango: 8,0 a 10,7)
Camperi (1992c): N= 3 (M) 10,0, 10,0 y 10,5 g; N= 3 (H) 8,3, 10,0 y 12,0 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 6 X= 8,7 g (Rango: 7,5 a 10 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 9,0 y 10,0 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas parduscas. Iris pardo.
Corona negra estriada de canela. Dorso pardo grisáceo. Garganta blanquecina estriada de pardo. Ventral ocrácea. Alas pardas con mancha canela. Secundarias orilladas de ocráceo. Cola negra con las plumas orilladas de ocráceo, externas ocráceas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en preja o en grupos.

HÁBITAT
Quebradas y estepas altoandinas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Construye el nido en huecos, grietas o cavidades, en árboles, cactus, piedras, barrancas, construcciones o nidos abandonados por otras aves. En la cámara elabora una taza de pajas e internamente coloca pelos, lanas, hilos y plumas.

Partridge (MACN). Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 18-12-1963, 3 huevos.
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas octubre-noviembre. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Lönnberg (1903). Moreno, dpto. Tumbaya, Jujuy, diciembre de 1901, una pareja con nido en las rocas, con 3 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y diciembre.
Pereyra (1937b). La Pampa. Nido.
Contino (1980). En el Noroeste nidifica en los meses de enero y febrero, anida en pequeños nichos en las barrancas, cercos de adobe y a veces utiliza aleros de paja de las viviendas.
Narosky en Narosky et al. (1983). 6 nidos: *L. a. berlepschi*, Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, 22-02-1973, en la cumbrera de un rancho, pichones; en cueva en barranca, pichones; 25-02-1976, hendidura en barranca, pichones; Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1979, 3 huevos. *L. a. pallida*: pdo. Patagones, Buenos Aires, 09-10-1974, 4 huevos; San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río Negro, 17-10-1974, 2 nidos en viejas construcciones de *Asthenes* sp., uno con 4 huevos y el otro con 3.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 27-02-1983, 2 nidos con pichones; Aparzo, dpto Huamhuaca, Jujuy, 02-03-1983, 3 nidos con 2 y 3 pichones y 2 huevos respectivamente.
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 16-11-1983, en un nido viejo de *Asthenes patagonica,* 3 huevos; 22-11-1983, 4 huevos; Pto. Madryn, dpto. Biedma, Chubut 16-11-1983 en nido de *Asthenes patagonica,* 3 huevos; 20-11-1983, 3 huevos.
Narosky et al. (1990). Tornquist, dpto. Tornquist, Buenos Aires, 07-11-1988, un nido.
Voulleumier (1993). Chubut. Nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nidos en noviembre-diciembre.
Harri (2008). Chubut. Nido.
Salvador y Bodrati (2011). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2012f). Chubut, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 04-02-1977, nido en construcción en un hueco en un Cardón; Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1979, hueco entre piedras, 2 pichones; Chorrillos, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, cueva en barranca, 2 huevos; Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 04-11-1979, nido construido dentro de uno abandonado de espinas, en un arbusto, a 1,90 m. del suelo. La cámara acolchada con pelusas vegetales suaves y plumas, de 9 cm. de diámetro, 2 huevos; Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 10-02-1983, 3 nidos en huecos entre piedras, 2 tenían 3 huevos y el otro pichones.
Salvador (2015). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, se hallaron 6 nidos, dos con 2 huevos cada uno, tres con 2 pichones cada uno y uno con 3 pichones. Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1995, 2 nidos, uno con 2 huevos y el otro con 2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis.* Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, 7 nidos, 6seis con 2 huevos cada uno y uno con 2 pichones.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.
Salvador (2015a). Jujuy. Nido.
Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Mendoza. Nido.
Moroni en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Salvador y Eroles en Salvador (2016a). Chubut. Nido
Uranga en De la Peña (2016d). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 08-02-2001 nido con 3 huevos.
Uranga en De la Peña (2019b). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 25-01-2016. Nido en una hendidura entre dos chapas. En un túnel de chapa, bajo la ruta, por el que circulaba agua. Tenía 2 huevos.



Azul Pampa. Jujuy. 25-01-2016. Fotos: Máximo Uranga

Azul Pampa. Jujuy. 10-02-1983

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Narosky en Narosky et al. (1983): 17,5 a 17,1 x 13,8 a 14,8	X= 17,6 x 14,1 (N= 3)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 18,5 a 19,4 x 13,5 a 14,7	X= 18,9 x 14,1 (N= 2)
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosk (1985): 17,8 a 18,6 x 13,2 a 13,8	X= 18,3 x 13,5 (N= 6)
De la Peña (2013c): 17 a 18,9 x 13,1 a 14,5	X= 17,6 x 13,6 (N= 10)
Salvador (2015): 17,8 a 18,9 x 14,1 a 14,9	X= 18,5 x14,3 (N= 12)

Pesos

De la Peña (2013c): 1,6 a 1,9	X= 1,7	(N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,08 a 0,10	X= 0,93	(N= 10)
Salvador (2015): 1,9 a 2,2	X= 2,1	(N= 12)

PICHONES
Descripción
Salvador (2015). Nacen con los ojos cerrados. Piel de color carne naranja con suave plumón dorsal grisáceo. Comisuras amarillas e interior de la boca amarillo intenso.

Otros
Friedmann (1963). Salvador y Bodrati (2011). Salvador (2012f). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* en Patagonia, Ellis et al. (2001), *Glaucidium nana* en Parque Nacional Lanín, Neuquén, Cusano, E. (2018). EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 22/05/2019.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona estriada. Sin copete. Cola larga, negra, plumas externas ocráceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leptasthenura aegithaloides berlepschi Hartert, 1909 entre los 2000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y *Leptasthenura aegithaloides pallida* Dabbene, 1920 desde San Juan, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Santa Cruz. En invierno llega a Córdoba, norte de Buenos Aires, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. En el Altiplano de Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptasthenura aegithaloides berlepschi Hartert, 1909

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Narosky et al. (1983); Salvador y Bodrati (2011); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvador (2015)

Salta
Citas: Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

Tucumán
Citas: Capllonch et al. (2020); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Leptasthenura aegithaloides pallida Dabbene, 1920

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Maugeri (2002b); Morici (2014); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas y Bó (1987a); Pagano y Mérida (2009); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: White (1882)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Dabbene (1920b); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Harris (2008); Navas y Bó (1987a); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995); Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Laguna del Rosario, dpto. Futaleufú, 03-02-1976)

Córdoba

Citas: Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); Di Giacomo et al. (2005); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986, 1987a); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895); Navas y Bó (1987a); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Cueto et al. (1997); Darrieu y Segura (2015); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Fitzgerald (1899); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Partridge en Narosky et al. (1983); Pereyra (1927e, 1937); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Christie et al. (1988, 2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Dabbene (1920b); Gorgoglione (1997, 2005); Matarasso (2007); Navas (1978); Navas y Bó (1987a); Pereyra (1951); Straneck (1990a); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Dabbene (1920b); Daciuck (1977); Gelain (2001, 2004, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a, 1990); Paz et al. (2004); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Chapman (1919); Dabbene (1920b); Fava y Acosta (2016); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Dabbene (1920b); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993);

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988a); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Imberti y Albrieu (2001); Navas y Bó (1987a); Stone (1928)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Nores e Yzurieta (1981)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Esteban (1953); Lucero (1983**)**

COLUDITO DE LOS PINOS *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824)

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Belton (1984): 11 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas gris verdosas. Iris pardo.
Corona negra estriada de blanquecino. Dorsal castaña. Garganta blanquecina estriada de pardo grisáceo. Ventral canela. Alas pardas y canelas. Cola parda y castaña.

HÁBITAT
Bosques de Araucarias.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

El nido es redondeado, con entrada lateral superior. Emplea en la construcción musgos y hojas de araucarias. (Bóçcon 1993)

Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Misiones. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Misiones. Nido.

Más información:
Belton (1984). Bóçon (1993)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete oscuro estriado de blanquecino. Cola larga, parda y castaña. Dorso castaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica en el sureste de Brasil (Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul) y extremo moreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1989a, 1992, 1996a); Krauczuk (2001); Partridge (1954)

ESPINERO FRENTE ROJIZA *Phacellodomus rufifrons* (Wied-Neuwied, 1821)

Otros nombres: Espinero frente roja. Mucho nido.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 8 X= 24,0 g (Rango: 22,0 a 28,4)
Salvador (1990a): N= 5 (?) X= 26,8 g (Rango: 25,5 a 28,0)
Alderete y Capllonch (2010): N= 9 X= 25,2 g (Rango: 24 a 27 g)

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises. Iris pardo.
Frente castaña. Cejas blanquecinas. Dorsal parda. Ventral blanquecina. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae).
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Carabidae).

HÁBITAT
Bosques, sabanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

El nido es globular, alargado, con túnel de entrada. La boca en la parte inferior.de palitos, colgante del extremo de ramas. Forra la cámara con materiales vegetales suaves. Expuesto. Elaborado.

Girard (W. F.). Río Colorado, dpto. Leales, Tucumán, 20-11-1922, 3 huevos.
Dinelli (MACN). Tucumán, noviembre de 1932, 2 huevos.
Girard (MACN). 3 nidos: Simoca, dpto. Montero, Tucumán, 24-10-1907, un huevo; Tucumán, 22-12-1910, 4 huevos; dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 28-11-1911, 2 huevos.
Mogensen (1927). Tucumán, noviembre, 4 huevos.
Smyt (1928). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 2 nidos: 05-03-1922, 4 huevos; 17-11-1923, 4 huevos.
Friedmann et al. (1977). Tucumán, Olrog localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et al. (1995). Salta. Nido.
Bodrati (2005c). Chaco. Nido. Parque Nacional Chaco, Chaco, 28-11-1998, un nido en avanzado estado de construcción, en un Algarrobo (*Prosopis* sp.), a 3,5 m del suelo.
Estancia La Fidelidad (actual Parque Nacional El Impenetrable), dpto. General Guemes, Chaco. Varios nidos encontrados en el riacho Bermejito y el río Bermejo, y en los madrejones: el Breal, la Tapada y Yavorsky. Mayo de 2013.
Coconier et al. (2007). Salta. Nido.
Coria et al. (2013). Santiago del Estero. Nido.
De la Peña (2013c). San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, Jujuy, 06-02-1981, nido sin postura; Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, 18-01-1984, un huevo; Cuesta de Singuil, dpto. Ambato, Catamarca, 17-12-1999, no observado. Medidas del nido de Jujuy: Alto total: 50 cm., Ancho: 22 cm., Diámetro de la boca: 5,5 cm., Largo del túnel: 12 cm., Diámetro interno de la cámara: 10 cm.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero. Nidos.

Rumboll, M. en Salvador (2016a). Salta. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Formosa. Nido.

Cuesta de Singuil. Catamarca. 17-12-1999

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Dinelli (MACN): 22,0 a 22,1 x 16,8 a 17,3	X= 22,0 x 17,0 (N= 2)
(MACN): 24,4 a 25,1 x 17,2 a 17,6	X= 24,8 x 17,4 (N= 4)
Hartert y Venturi (1909): 23,0 a 25,0 x 16,0 a 17,0	
Smyth (1928): 21,5 a 23,5 x 17,0 a 18,0	
De la Peña (2013c): 22,3 x 16,3	(N= 1)

Pesos

De la Peña (2013c): cáscara 0,195	(N= 1)

Otros
Mogensen (1927). Es parasitado por *Tapera naevia*.
Olrog en Friedmann et al. (1977). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredadores
De adultos: *Accipiter bicolor* en Salta, Salvador (2017a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente castaña. Cejas blanquecinas. Alas y cola pardas.
Se diferencia del Espinero andino por no tener castaño en las cubiertas alares ni en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phacellodomus rufifrons sincipitalis Cabanis, 1883 en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa y Chaco.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Se lo encuentra en 4 regiones separadas, dentro de Sudamérica**.** En el norte Colombia y Venezuela, en el oeste, en el sur de Ecuador y norte de Perú, por el este, en en este de Brasil y la población del **sur** en Paraguay, suroeste de Brasil (Mato Grosso), Bolivia y norte de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phacellodomus rufifrons sincipitalis Cabanis, 1883

Catamarca
Citas: Carma (2009); De la Peña (2011a)

Observaciones: De la Peña (Bañados de Ovanta, Dpto. Santa Rosa, Catamarca, 12-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati (2005c)

Observaciones: Bodrati (*in litt*. 2019). Mayo de 2013, especie común en la Estancia La Fidelidad (hoy Parque Nacional El Impenetrable), con importantes densidades en el Teuquito o Bermejito y en el Bermejo, en parejas o grupos familiares en madrejones o "lagunas", sus nidos colgantes eran abundantes en las selvas de los mencionados ambientes.

Formosa
Citas: Bodrati (2005c); Contreras (1987c); Nores et al. (1996)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); De la Peña (2013c); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a, 2017); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. J. de San Martín, 02-02-1977)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Corria et al. (2013)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Alabarce (2002); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Girard en Narosky et al. (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Mogensen (1927); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Smyth (1928)

ESPINERO CHICO *Phacellodomus sibilatrix* P. L. Sclater, 1879

Otro nombre: Espinero.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15 cm.
Peso: Camperi (1992a): N= 1(M) 18,7 g; N= 1 (H) 17,4 g
Di Giacomo (2005h): N= 1 16,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 6 X= 14,5 g (Rango: 12 a 17 g)
Salvador (2014a): N=11 (?) X= 18,6 g (Rango: 17,1 a 19,6)

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula corneo claro. Patas gris claro nacaradas o gris con tinte celeste. Iris pardo oliva claro.
Frente castaña. Dorsal parda grisácea. Ventral blanquecina. Cobijas castañas. Alas pardas. Cola parda con las plumas externas castañas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Kratter et al. (1993). **Insectos:** Escarabajos. Hormigas. Orthopteros. **Arañas.**
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera (Cicadidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, polillas). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Recolecta alimentos (insectos) en el suelo, en hierbas bajas y altas y en arbustos, hasta 2 m. de altura.
El canto que generalmente es a dúo, consiste en una serie de sílabas: til. til. til. til. til. . til. . . til. . . til. . . til. . . til. que son emitidas más seguidas al comienzo y más espaciadas al final.

HÁBITAT
Praderas arboladas, montes, sabanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N

Colgante de ramas de árboles. A veces asentado o sostenido. Globular, algunos con forma más o menos triangular. Túnel curvo. En la parte superior suele presentar una cámara abierta que puede o no estar tapizada con pajitas o algunas plumas. Emplea palitos con y sin espinas. Tapiza la cámara con gramillas, plumas, exuvias, estiércol, resaca y materiales vegetales suaves. Expuesto. Elaborado.

Barrows (1883a). Dpto. Uruguay, Entre Ríos, nidos de octubre a diciembre.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 3 nidos: 15-11-1905, 3 huevos; 02-12-1905, 2 huevos: 08-01-1906, 3 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.

Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nido.
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires, Narosky localizó nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Narosky y Micucci en Narosky et al. (1983). Pdo. de Zárate, Buenos Aires, 2 nidos, 14-01-1967, 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*; 05-11-1967, 3 huevos.
Salvador en Narosky et al. (1983). Monte Yucat, dpto. San Martín, Córdoba, 4 huevos.

Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983).3 nidos: La Banda, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 11-10-1971, 4 huevos, 21-01-1973, Baradero, pdo. Baradero, Buenos Aires, 3 huevos, Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 22-02-1970, sin postura.
Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983).Sumampa, dpto. Quebrachos, Santiago del Estero, 27-10-1980, un nido con 4 huevos y otro con 2 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983).Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 13-10-1982, 2 nidos con 3 huevos cada uno.
Mason (1985). Buenos Aires. Nido.
López Lanús (1997). Parque Nacional "Río Pilcomayo", dpto. Pilconayo, Formosa, nidifica.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en noviembre de 1994.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a enero. A veces hasta mayo. Se observaron 12 nidos.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Soria et al. (2012). Santiago del Estero. Nido.
Salvador (2012f). Santiago del Estero, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 79 nidos. Se reproduce de agosto a febrero. Posturas de 3 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Provincia de Santa Fe, entre el 01-10-1972 y 07-10-2004, se localizaron 127 nidos.
Medidas: Alto: de 35 a 40 cm. Ancho: de 22 a 40 cm. Largo: de 35 a 40 cm. Ancho de la boca: de 4 a 6 cm. Largo del túnel: 20 cm. Diámetro de la cámara: de 9 a 10 cm. La falsa boca mide unos 8 cm. de diámetro y 5 cm. de profundidad.
Nido más bajo: 1,50 m, Nido más alto: 6,00 m. Los nidos superpuestos pueden ser de 2 a 4, en una misma rama.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis* y J. Heredia, en diciembre de 2005, en Las Escobas, ruta 38, dpto. Córdoba, dos nidos parasitados.
Salvador (2013d). Córdoba. Nido
Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 4 huevos cada uno.
Miquel et al. (2015). Chaco. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Salta, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos. Nidos.
Bodrati, L. en Salvador (2016a). Corrientes. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Nido.
Ferrari, C. y S. Vitale en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Rumboll, M. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 3, raramente 4, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 19,0 a 21,0 x 14,5 a 16,0	
Salvador en Narosky et al. (1983): 20,5 a 21,3 x 15,4 a 15,6	X= 20,8 x 15,5 (N= 4)
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 20,1 a 21,0 x 15,2 a 15,7	X= 20,6 x 15,5 (N= 4)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 18,7 a 19,7 x 14,5 a 15,2	X= 19,2 x 14,9 (N= 3)
Di Giacomo (2005h): 18,8 a 21,9 x 14,4 a 16,3	X= 20,5 x 15,5 (N= 16)
Salvador (2013b): 18,9 a 21,4 x 14,3 a 15,9	X= 20,3 x 15,1 (N= 82)

De la Peña (2013c): 19,3 a 21,2 x 14,8 a 15,8 X= 20,3 x 15,2 (N= 20)

Pesos
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,2
Di Giacomo (2005h): 2,5 a 2,8 X= 1,7 (N= 16)
Salvador (2013b): 2,2 a 2,6 X= 2,4 (N= 56)
De la Peña (2013c): 2,1 a 2,4 X= 2,25 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscara 0,125 a 0,180 X= 0,147 (N= 16)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 días. Los huevos son puestos en días discontinuos. Permanecen en el nido de 15 a 17 días. Los pichones son alimentados por ambos padres.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 13 a 15 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación 17 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanen en el nido 14-15 días. Son alimentados por ambos padres.

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. Implumes y la piel es de color carne rosado. Pico pardo muy claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel color natural. Pico amarillento. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillentos. Comisura blanquecina. Escaso plumón (filoplumas) gris, en la cabeza y dorsalmente. En las alas y superior de los flancos gris oscuro.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 1,8 a 2,2 X= 2,0 (N= 13)

Otros
Salvadori en Salvador y Bodrati (2013a), Antoniazzi et al. (2011), Mason (1985). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (2013d). Un nido parasitado por *Tapera naevia*.
Salvador y Bodrati (2014), Heredia en Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Observaciones
De la Peña (2003a). En la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza se realizó un estudio de la nidificación simultánea y dio como resultado en el año 1998, 0,23 nidos por hectárea y en el año 2002, 0,57 nidos.

Más información:
Mason (1985). Salvador (2013b). De la Peña (2019a)

Depredadores
De pichones: *Agelaioides badius* en Córdoba, Salvador (2017a)
De la Peña (1990a). El 31-10-1986 en Esperanza, una Culebra del pastizal (*Philodryas patagoniensis*) estaba comiendo dos pichones, de un nido en un Chañar a 2,30 m. del suelo.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Frente castaña. Dorsal parda. Ventral blanquecina. Plumas centrales de la cola oscuras. El canto. Nido de palitos colgando de ramas.

Esperanza. Santa Fe. 29-09-2007

Esperanza. Santa Fe. 29-09-2007

Esperanza. Santa Fe. 26-11-2005

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phacellodomus sibilatrix P. L. Sclater, 1879 desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Córdoba y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Región chaqueña dl oeste de Paraguay, sur de Bolivia, oeste de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006); Darrieu y Camperi (2001a); Mérida y Bodrati (2006); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky et al. (1983); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); White (1882)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); Heredia (2006); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983, 2013b, 2013d, 2017); Salvador y Bodrati (2014); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1883a); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Esteban (1953); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); De la Peña (2003a, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Coria et al. (2017); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Marigliano et al. (2010, 2017); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

ESPINERO PECHO MOTEADO *Phacellodomus maculipectus* (Cabanis, 1883)

Otro nombre: Espinero serrano

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	

Nido colgante de ramas. Emplea palitos.

Dinelli en Hartert y Venturi (1909). Tucumán. Nido.
Girard (MACN), en Narosky et al. 1983. Dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 30-11-1911, 3 huevos; 27-11-1912, un huevo.
Salvador (1992). Humaya, dpto. Ambato, Catamarca, 30-10-1985, nido de forma triangular, colgante, construido con palitos. El lecho revestido de gramíneas, lo mismo que el túnel. Contenía 3 huevos.
Mazar Barnett et al. (1998c). Salta. Nido.
Girard en Segura et al. (2014b). Tucumán. Nido.
Marcaida (2015b). Jujuy. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.
Uranga, M. en De la Peña (2016d). Laguna de Yala, dpto. Capital, Jujuy, 27-01-2016, nido colgante, en la punta de una rama de un árbol el cual estaba sobre una ladera rocosa resbaladiza.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phacellodomus maculipectus Cabanis, 1883 en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

Catamarca
Citas: Salvador (1992)

Jujuy
Citas: Marcaida (2015b); Pagano, L. en Salvador (2016a); Uranga en De la Peña (2016d)

Salta
Citas: Mazar Barnett et al. (1998c)

Tucumán
Citas: Girard (MACN), en Narosky et al. (1983); Girard en Segura et al. (2014b); Hartert y Venturi (1909)

ESPINERO ANDINO *Phacellodomus striaticeps* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Espinerito blanco. Espinero blanco. Espinero de corona rayada. Espinero de frente estriada. Espinero frentirayada. Ratonero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 40,0 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 7 X= 30,8 g (Rango: 27 a 35 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 32 g

Coloración. Pico córneo, base de la mandíbula más clara. Patas gris verdosas. Iris pardo.
Frente y corona castañas. Dorsal parda con tono castaño. Rabadilla castaña. Ventral gris ocrácea. Cobijas castañas. Alas pardas con banda castaña. Cola con las plumas externas castañas y las centrales pardas oscuras.

HÁBITAT
Quebradas y estepas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

El nido es una estructura grande de palitos, colgante de ramas de arbustos. La cámara es muy mullida con materiales vegetales desmenuzados, pelos, "pelusas" de cardones, plumas, lanas.

Budin (MACN). Maimará, dpto. Tilcara, Jujuy, enero de 1917, 3 huevos.
Smyth (1928). Dpto. Humahuaca, Jujuy, 08-01-1917, 3 huevos.
Friedmann et al. (1977). Tucumán, Olrog localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Vaurie (1980). Lönnberg, localizó un nido en Moreno, dpto. Tumbaya, Jujuy con 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, 23-02-1979, varios nidos con huevos y con pichones. Uno tenía 4 huevos.
Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, nidificando.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). 3 nidos: Chorrillos, dpto. Humahuaca, Jujuy, 25-02-1983, 2 pichones; Iturbe, dpto. Humahuaca, 28-02-1983, pichones; Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, 3 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985). El Infiernillo, dpto. Tafí, Tucumán, 22-12-1983, un huevo.
De la Peña (2013c). 7 nidos: Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 04-02-1977, 4 pichones; Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, 2 nidos con 1 y 4 huevos; en el mismo lugar el 10-02-1983, nido con 3 huevos; El Alamito, dpto. Andalgalá, Catamarca, 16-12-1999, 3 nidos, con 5 huevos, un huevo y el otro no observado en un arbusto que colgaba en la barranca de un río seco. Medidas: Alto: de 50 a 75 cm. Largo total: de 20 a 40 cm. Ancho: de 20 a 40 cm. Diámetro de la boca: de 5,5 a 7 cm. Largo del túnel: de 12 a 25 cm. Diámetro interno de la cámara: de 8 a 10 cm. Profundidad de la taza: 8 cm.
Salvador (2015). Sierra de Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 29-10-1985, nido con 4 huevos; El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15-12-1987, nido con 3 huevos; Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, un nido con 3 huevos y otro con 3 pichones.

Huevos
Pone de 3 a 5 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Budin (MACN): 23,0 x 17,6 a 17,9	X= 23,0 x 17,7	(N= 3)
Smyth (1928): 22,5 a 23,5 x 17,0 a 18,0		
Narosky en Narosky et al. (1983): 23,4 a 24,3 x 16,9 a 17,8	X= 23,8 x 17,4	(N= 4)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 23,0 a 23,2 x 17,8 a 18,1	X= 23,1 x 17,9	(N= 3)
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 24,0 x 17,6		
De la Peña (2013c): 22,3 a 23,4 x 16,5 a 17,3	X= 22,9 x 17,0	(N= 8)
Salvador (2015): 23,1 a 15,1 x 16,3 a 17,1	X= 24,3 x 16,5	(N= 10)

Pesos

Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 3,8		
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 3,8		
De la Peña (2013c): 3,0 a 3,2	X= 3,1	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,21 a 0,23	X= 0,22	(N= 8)
Salvador (2015): 3,2 a 3,7	X= 3,4	(N= 10)

PICHONES
Descripción
Salvador (2015). Comisuras blanco amarillento e interior de la boca amarillo intenso.

Otros
Olrog en Friedmann et al. (1977). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información:
De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cobijas, banda alar y plumas externas de la cola castañas.
El hábitat.
Diferenciarlo del Espinero de frente rojiza.

Azul Pampa. Jujuy. 23-02-1979

El Alamito. Catamarca. 15-12-1999

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phacellodomus striaticeps striaticeps (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 1500 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se encuentra en la cordillera en Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phacellodomus striaticeps striaticeps (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2011a); Nores (1995); Salvador (2015); Vides Almonacid (1999)

Jujuy

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Fiora (1933); Hartert y Venturi (1909); Lönnberg en Vaurie (1980); Mamaní et al. (2018); Narosky et al. (1983); Salvador (2015); Smyth (1928); Straneck (1990f)

La Rioja

Citas: Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1907)

Salta

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Tucumán

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador (2015)

ESPINERO PECHO MOTEADO *Phacellodomus maculipectus* Cabanis, 1883

Otros nombres: Espinero serrano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 22,0 g; N= 10 (?) X= 21,9 g (Rango: 19,5-25,5)
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 20 g

Coloración. Pico: maxila parda, mandíbula parda con base corneo celeste. Patas corneas con tinte celeste violáceo. Iris gris con tinte viláceo.
Frente y corona rojizas. Cejas blanquecinas. Dorso y alas castaños. Pecho canela moteado de blanquecino. Resto de la parte ventral castaño. Cola parta con las plumas externas rojizas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). **Peces.**

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	

Nido colgante de ramas. Emplea palitos.

Girard (MACN). Dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 30-11-1911, 3 huevos; 27-11-1912, un huevo.
Salvador (1992). Humaya, dpto. Ambato, Catamarca, 30-10-1985, nido de forma triangular, colgante, construido con palitos. El lecho revestido de gramíneas, lo mismo que el túnel. Contenía 3 huevos.
Mazar Barnett et al. (1998c). Salta. Nido.
Marcaida (2015b). Jujuy. Nido.
Uranga en De la Peña (2016d). Laguna de Yala, dpto. Capital, Jujuy, 27-01-2016, nido colgante, en la punta de una rama de un árbol el cual estaba sobre una ladera rocosa resbaladiza.

Huevos
Pone 3 huevos, blancos.

Medidas
Girard (MACN): 22,9 a 23,8 x 15,9 a 16,8 X= 23,4 x 16,5 (N= 3)
Salvador (1992): 22,4 a 23,2 x 16,8 a 17,3 X= 23,5 x 17,0 (N= 3)

Peso
Salvador (1992): 3,5, 3,5 y 3,4

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blanquecinas. Frente rojiza. Pecho moteado. Cola parda y castaña.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phacellodomus maculipectus Cabanis, 1883 en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En nuboselva del noroeste de Argentina y adyacente de Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1992)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione y Segovia (2005); Monteleone y Roesler (2005); Salvador (1988)

La Rioja
Citas: Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1988)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

ESPINERO DE PECHO MANCHADO *Phacellodomus striaticollis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Abanico. Espinero pecho manchado. Hornerito grande. Leñatero. Leñera. Ratona de las pajas. Tío-tío.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 7 (?) X= 29,1 g (Rango: 27,2 a 30,8)

Coloración. Pico: maxila parda, mandíbula gris clara. Patas pardas oliváceas. Iris amarillo.
Frente y corona pardas rojizas. Cejas y garganta blanquecinas. Dorsal y alas castañas. Ventral blanquecina con el pecho ocre canela. Cola con las plumas centrales pardas, las externas castañas.

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos (insectos) en el suelo y arbustos e hierbas, hasta 1 m. de altura.

Alimentación
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Elateridae, Chrysomelidae). Dípteros. Hemípteros (Pantatomidae, Coreidae). Orthópteros (Acrididae). **Piedritas.**
Olrog (1956). **Insectos:** Coleópteros.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Hemiptera. Homoptera (Cercopidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orudas, crisálidas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Arácnidos:** (arañas)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces.
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es parecido al del Espinero chico, pero no tan agudo y más vehemente

HÁBITAT
Montes, sabanas, matorrales, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N					N	N	N	N	N

El nido es globular, alargado. Túnel corto, curvo, que da a la cámara. Boca hacia arriba. Emplea palitos con y sin espinas. Forra la base y los costados de la cámara con pajitas, musgos, plumas, pelusas vegetales, pelos. Lo ubica en ramas, hojas de cactáceas, sobre nidos semidestruídos de Espineros o en Pajas bravas. Expuesto. Elaborado.

Withington (1888). Buenos Aires. Nido.
Kerr (1892). Formosa. Nido.
Pereyra (MACN) en Narosky et al. (1983). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, 23-12-1932, 8 huevos entre propios y de *Molothrus bonariensis*.
Gibson (1918). Grand localizó nidos en Cabo San Antonio, Buenos Aires, en octubre-noviembre, 4 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos de setiembre a diciembre, 4 ó 5 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 10 nidos en provincia de Buenos Aires, entre setiembre y enero.
Narosky en Narosky et al. (1983). 16 nidos en provincia de Buenos Aires y uno en Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes.
Fraga en Narosky et al. (1983).San Clemente, pdo. de la Costa, Buenos Aires, 29-10-1979, pichones.
Mason (1986). Buenos Aires, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 02-12-1999, nido con 3 huevos y un pichón de *Tapera naevia*.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 22 nidos localizados entre agosto y diciembre.
Salvador (2011c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 66 nidos. Se reproduce de agosto a febrero. Posturas de 3 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 69 nidos entre el 09-10-1970 y 23-12-2002, 2 en la provincia de Entre Ríos y los restantes en Santa Fe.
Medidas: Alto a nivel de la cámara: de 15 a 24 cm. Ancho: de 15 a 20 cm. Largo externo: de 25 a 35 cm. Ancho de la boca: de 4 a 5 cm. Largo del túnel: de 11 a 20 cm. Diámetro de la cámara: de 9 a 12 cm. Nido más bajo: 0,50 m. Nido más alto: 3,50 m.

Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos Aires, E. M. Earnshaw, en 14-10-1937 localizó un nido con 4 huevos propios y uno de *Molothrus bonariensis.*
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle y Magdalena, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 7 nidos.
Miquel et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 4 huevos, raramente 5, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 22,5 a 24,0 x 16,0 a 18,0
Pereyra (1938b): 21,0 a 22,0 x 18,0
Zapata y Cabrera (1969): 19,9 x 16,0
Narosky en Narosky et al. (1983): 20,1 a 23,8 x 15,1 a 17,5 X= 22,2 x 16,5 (N= 15)
Salvador (2013b): 21,4 a 23,8 x 15,6 a 16,9 X= 22,7 x 16,4 (N= 78)
De la Peña (2013c). 21 a 23 x 15,5 a 17 X= 22,5 x 16,6 (N= 15)

Pesos
Narosky en Narosky et al. (1983): 3,2
Salvador (2013b): 3,1 a 3,6 X= 3,3 (N= 62)
De la Peña (2013c): 3,5 X= 3,5 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscara 0,176 a 0,242 X= 0,202 (N= 11)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 a 17 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 10 a 12 días. Los huevos son puestos en días alternos. El período de incubación es de 16 días.

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. Implumes y la piel es de color carne naranja. Pico pardo claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso o amarillo anaranjado. Descripción.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranjas. Escaso plumón gris.
5 días. Ojos abiertos, pardos. Pico claro con punta oscura. Piel y patas color natural. Comisura blanquecina. Plumón gris. Vainas alares chicas, grises.
8 días. Comisura blanca. Pico gris. Escaso plumón gris. Láminas de las plumas dorsales, alas y cola, marrón-rojizo. Ventralmente blanquecino-ocráceo.
13 días. Pico oscuro. Patas grises.
Quedan algunas vainas en la frente. Ventralmente ocre amarillento con el pecho jaspeado de pardo.
Plumaje de adulto.
16-17 días. Dejan el nido.

Peso al nacer

Salvador (2013b): 2,8 a 3,2 X= 2,9 (N= 11)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 16 a 18 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 16-17 días. Son alimentados por ambos padres.

Otros
Pautasso (2002b). Anfitrión de *Tapera naevia*.
Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Antoniazzi et al. (2011); Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (2011c). Salvador (2013b). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Anfitrión de *Tapera naevia*.

Depredadores
De adultos: *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (2009e)
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Córdoba, Salvador (2011)

Más información:
Withington (1888). Narosky et al. (1983). Mason (1985, 1986). Salvador (2013b). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Iris amarillo. Pecho manchado. Cola parda y castaña.

Esperanza. Santa Fe. 13-03-2008

Esperanza. Santa Fe. 26-04-2007

Esperanza. Santa Fe. 12-12-1997

Esperanza. Santa Fe. 06-10-2006

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phacellodomus striaticollis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se encuentra en la región del Espinal y Chaco Seco en el sureste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Gibson **(**1918**);** Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009e); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Salvador y Bodrati (2014); Soave et al. (1999b); Zapata (1998)

Chaco

Citas: Bodrati y Salvador (2015a)

Córdoba

Citas: Biancucci (1995); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b, 1981); Salvador (2011, 2013b); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); López-Lanús et al. (2013b); Narosky et al. (1983)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Straneck (1990b); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); López Lanús (1997)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Capllonch et al. (2015a)

ESPINERO GRANDE *Phacellodomus ruber* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Añambí. Añumbí rojo. Espinero colorado. Espinero rojo. Tío-tío.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 5 (M) X= 39 g (Rango: 34,9 a 45), N= 2 (H) 35,8 y 38,3 g
Camperi (1992a): N= 1 (M) 37,3 g; N= 1 (H) 36,9 g
Camperi (1992): N= 1 (M) 37,3 g; N= 1 (H) 36,9 g
Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 31,8 g (Rango: 26,0 a 37,7)
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 35 g
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X= 31,3 g (Rango: 28,0 a 36,0)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (?) 31,7 g

Coloración. Pico negruzco con mandíbula gris. Patas gris celeste. Iris amarillo.
Dorsal, alas y cola castañas. Ventral blanquecina.

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos en el suelo e hierbas bajas, hasta 1 m. de altura.
Canta a dúo.

Alimentación
Alessio et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Dytiscidae, Elateridae, Hydrophilidae, Tenebrionidae). Diptera. Hemiptera (Belostomatidae: *Bellostoma* sp., Corixidae). Lepidoptera. **Arácnidos:** Arachnida (Lycosidae, Pysauridae). **Vegetales:** Semilla. Graminae.
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae, Carabidae). Hymenópteros (Formicidae, *Pheidole* sp., *Camponotus* sp.). Hymenoptera (Formicidae). **Moluscos:** (Planorbidae) Phalanguida.
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** Renacuajos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Montes, selvas en galería, árboledas en islas o en orillas de ríos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N		N	N				N	N	N	N

Cuelga el nido del extremo de las ramas. A veces sostenido o asentado. Piriforme, algunos más o menos triangulares. Túnel curvo. Emplea palitos con y sin espinas. Forra la base y los costados de la cámara con pastos y plumas. A veces en el túnel coloca pastos, trozos de plásticos o de género. Expuesto. Elaborado.

Barrows (1883a, 1883b). Entre Ríos. Nido.
Hartert y Venturi (1909). Chaco, de 4 a 5 huevos.
Mogensen (1927). Tucumán. Nido.
Smyth (1928). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 3 nidos: 11-10-1922, 3 huevos, 11-01-1923, 3 huevos, 26-01-1923, 3 huevos.
Zelich en Narosky et al. (1983). Paso López, dpto. Curuzú Cuatiá, Corrientes, 06-11-1968, un huevo.
Narosky en Narosky et al. (1983). Dpto. Mercedes, Corrientes, 15-11-1975, 3 nidos, 2 con 2 huevos y uno con 3; Gral Alvear, dpto. San Martín, Corrientes, 23-11-1976, 2 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). 6 nidos: La Haumonía, dpto. Tapenagá, Chaco, 16-12-1982, 1 y 2 huevos; Cnel. Du Graty, dpto. Fontana, Chaco, nido en construcción; Samuhú, dpto. San Lorenzo, Chaco, 19-12-1982, 2 huevos; Los Amores, dpto. Vera, Santa Fe, 20-12-1982, 4 huevos y otro nido con 3 huevos.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 12 nidos.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, en noviembre nido con huevos.
López Lanús (1997). Parque Nacional "Río Pilcomayo", dpto. Pilconayo, Formosa, nidifica.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019). Parque Provincial Pampa del Indio, dpto. Libertador San Martín, Chaco, 01-12-1999, nido con tres pichones muy desarrollados y prontos a abandonar el nido
Bodrati et al. (2001b). Vuelta de Obligado, pdo. San Pedro, Buenos Aires, 16-12-1990, nido; 16 a 23 de noviembre de 1992, varios nidos; 2 y 3 de mayo de 1998, en construcción.
Bodrati (*in litt*. 2019), 28-04-2004, Isla del Diablo (Fenuil). Entre el km 287 al 290 del río Paraná. Sec 5ta de Islas San Pedro, pdo. San Pedro, Buenos Aires, E. Sierra, G. Bodrati y Emilse Merida. Sobre el borde de un terraplén, nido activo en un sauce.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 21-02-2000, nido en construcción; 26-09-2000, en construcción; 30-10-2000, nido sin postura.
De la Peña et al. (2003a). Santa Fe. Nido.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a enero. Se observaron 30 nidos.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
De la Peña (2013c). Se localizaron 74 nidos entre el 25-10-70 y 27-10-04, 72 en provincia de Santa Fe, uno en Entre Ríos y el otro en Corrientes.
Medidas: Alto en la parte posterior: de 26 a 55 cm. Alto en la parte anterior: de 17 a 20 cm. Ancho: de 22 a 35 cm. Largo: de 40 a 52 cm. Ancho de la boca: de 5 a 8 cm. Largo del túnel: de 17 a 20 cm. Diámetro de la cámara: de 10 a 13 cm. Nido más bajo: 1,40 m. Nido más alto: 5,60 m.
Un nido en Cañada Ombú, dpto. Vera, Santa Fe, localizado el 08-11-1989, estaba asentado en un poste telegráfico a 4 m del suelo.
Los nidos superpuestos pueden ser de 2 a 4, en una misma rama. Puede ocupar el mismo nido más de una vez.
Salvador y Bodrati (2013a). Corrientes. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019). Varios nidos activos en octubre, noviembre y diciembre entre 2007 y 2017, Yapeyú, dpto. San Martín, Corrientes en periferia de la selva del río Uruguay.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido con 3 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
Depino, E. et al. (2015d). En ebird. Salta. Nido.
Bodrati y Salvador (2015b). Chaco. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019), Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, se encontraron 26 nidos activos, con fechas extremas entre 8 septiembre y 5 de

febrero (1997-2003), y un nido con huevos en mayo (1997). Los nidos siempre estuvieron en los extremos de ramas alejados del tronco principal, a una altura de entre 1,6 hasta 3,4 m. El árbol más utilizado fue el algarrobo en 15 ocasiones. Se observaron nidos apoyados en palmeras caranday a mayor altura, entre 8 y 10 metros. Tres nidos contenían 3 huevos y 4 nidos, 4 huevos. Ambos miembros de la pareja construyen, incuban y alimentan a los pichones. Luego de la reproducción algunas parejas continúan utilizando el nido como dormidero. Estructuras viejas son reconstruidas para reutilizarlas.
Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Formosa, Corrientes. Nidos.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019). Puerto Boca, Gualeguaychú, dpto. Gualeguaychú, Entre Rios, claro en la selva de ribera del río Uruguay, nido con 4 huevos, 23 de octubre de 1994.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Chaco, Entre Ríos, Buernos Aires. Nidos.
Sierra, E. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido. E. Sierra (com. Pers. 2019), Isla 2 de Oro, sección 5ta de islas de San Pedro, km 274 del río Paraná, canal de acceso al Puerto de San Pedro y el riacho Baradero, 21-10-1999, nido en construcción, individuos llevando materiales.
De la Peña (2019b). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 09-10-2015, nido en Mora a 3,60 m del suelo; 31-12-2015, nido en un Duraznero, en un camino rural, a 1,60 m del suelo.
De la Peña (2020). Reserva El Pozo. Dpto. La Capital. Santa Fe. 08-10-2016. Nido a 4 m en el extremo de una rama de Timbó blanco (*Albizia inundata*)



Huevos
Pone 4, raramente 5, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25,0 a 27,5 x 17,5 aa 18,5
Smyth (1928): 24,5 a 27,0 x 18,0 a 18,5
Zelich en Narosky et al. (1983): 23,7 x 17,8 (N= 1)
Narosky en Narosky et al. (1983): 28,0 a 29,3 x 17,3 a 18,0 X= 28,6 x 17,6 (N= 2)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 23,2 a 25,1 x 16,7 a 18,6 X= 24,3 x 18,0 (N= 6)
Alabarce y Antelo (1998): 23,0 x 16,7
Di Giacomo (2005h): 22,8 a 26,0 x 16,1 a 19,1 X= 24,5 x 17,8 (N= 34)
De la Peña (2013c): 22,8 a 26,8 x 16,7 a 18,6 X= 24,7 x 17,5 (N= 26)
Bodrati (*in litt*. 2019): 23,2 a 26,3 x 16,3 a 19,3 (N=25)

Pesos
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 4,2
Di Giacomo (2005h): 3,1 a 4,7 X= 4,0 (N= 33)
De la Peña (2013c): 3,5 a 4,5 X= 4,0 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscara 0,122 a 0,261 X= 0,243 (N= 18)

PICHONES
Descripción.
2 días. Ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Piel clara, verdosa. Pico claro. Escaso plumón gris (filoplumas)
4 días. Ojos cerrados. Escaso plumón.
5 días. Abre los ojos, pardo grisáceos.
6 días. Ojos abiertos. Plumón ralo, escasas filoplumas. Se notan apenas las plumas en las zonas pteridas.

9 dias. Gritan. Plumas ventrales blanquecinas y ocres. Dorsalmente marrón. Cubiertas alares con láminas marrones. Primarias oscuras. Cola con láminas marrones.
10 días. Pico gris. Aparecen las láminas. Abriendo las láminas de las plumas dorsales. Cañones de la cola muy chicos de 2-3 mm, abriendo las láminas. Aparecen las plumas ventrales blancas. Escaso plumón. Vainas chicas en las zonas ptéridas.
12 días. Comisura blanquecina. Pico gris oscuro, casi negro. Paladar y lados de la cavidad bucal, amarillentos. Lengua amarillenta con gris en los bordes y en la punta.
Dorsalmente, cubiertas alares y cola, rojizos. Plumas dorsales de 3-4 mm.
Lámina de las primarias pardo rojiza, de 3 mm. Lámina de la cola 5 mm.
Ventralmente blanquecino. Lados del pecho marrón. Flancos ocráceos.
17 días.Plumaje de adulto. Dejan el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
6				0,2					
10	0,9	2,2	3,0	0,9		0,6		0,3	
11	0,9	2,3	3,1	1,0	0,2	0,8	0,5	0,8	
12	1,0	2,4	3,3	1,2	0,3	1,0	0,7	1,2	
13	1,1	2,6	3,6	1,9	1,0	1,6	1,0	1,6	33,2-35,2

Generalidades
Di Giacomo (2005h). La pareja construye. La postura ocurre en días alternados. El período de incubación es de 17 días y la permanencia de los pichones en el nido es de 19 a 21 días. Ambos miembros de la pareja alimentan a los pichones.
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 19 días.
El pichón permanece en el nido 17-18 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 15 a 20 días. Los huevos son puestos en días alternos. Período de incubación 17 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 15-17 días.

Otros
Mogensen (1927). Bodrati y Salvador (2015). Anfitrión de *Tapera naevia*.
De la Peña et al. (2003a). Se constató desde 1 a 16 larvas de moscas del género *Philornis* por pichón.
Antoniazzi et al. (2011). Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Los pichones son afectados por larvas moscas del género *Philornis.*
De la Peña (2003a). En la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza se realizó un estudio de la nidificación simultánea y dio como resultado en el año 1998, 0,18 nidos por hectárea y en el año 2002, 0,25 nidos.
De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
Hudson (1974). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Iris amarillo. Dorsal castaña. Ventral blanquecina.

Esperanza. Santa Fe. 04-10-2007

Esperanza. Santa Fe. 05-10-2009

Esperanza. Santa Fe. 07-10-2008

Esperanza. Santa Fe. 06-10-2007

Esperanza.Santa Fe. 31-12-2015
Nido en duraznero

Esperanza. Santa Fe. 09-10-2015
Hembra de *Molothrus bonariensis* por entrar a un nido

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Tucumán, Chaco, Santa Fe y norte de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área de distribución amplia en el este y centro de Sud América, que comprende centro y suroeste de Brasil, norte de Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati y Salvador (2015a); Bodrati et al. (2001b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Bodrati et al. (2001b, 2006b); Chebez y Haene (1991); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Narosky et al. (1983); Salvador y Bodrati (2014)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 03-05-1988)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1990); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Narosky et al. (1983); Ordano et al. (2008); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2011b); Mancini (2011); Muzzachiodi (2001a, 2001b, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Pereyra (1927e)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Grant (1911); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Narosky et al. (1983); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Chebez et al. (1998); Salvadori (1897)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Esteban (1953); Giraudo et al. (1993); Heinonen y Chebez (1989); Krauczuk (2005); Navas y Bó (1988b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); Alessio y Beltzer (2010); Antoniazzi et al. (2011); De la Peña (2003a, 2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Narosky et al. (1983); Ordano et al. (1999); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Smyth (1928)

LEÑATERO *Anumbius annumbi* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Añumbí. Canastero. Carpintero. Chicha María. Chichirrió. Chichurrió. Chinche María. Chinchero. Chinchibirre. Chinchibirro. Chinchirinela. Chonchoraria. Chucarrero. Espinero. Kikirikí. Leñero. Leñatera. Leñatero añumbí. Palillero. Quisquirilo. Ramero. Tiru-tiru. Titirí. Tititití. Tituriru. Vizcachero.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 27,0 g
Contreras y Davies (1980): N= 6 (M) X= 34,75 g (Rango: 32,2 a 36,8); N= 7 (H) X= 35,4 g (Rango: 32,8 a 37,4)
Camperi (1992c): N= 3 (M) 37,0, 32,0 y 33,0 g; N= 1 (H) 33,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 31 g
Salvador (2014a): N= 12 (?) X= 37,2 g (Rango: 34,5 a 40,2)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 34 g

Coloración. Pico: maxila pardo acanelada, mandíbula corneo clara. Patas crema oliváceas. Iris pardo castaño. Frente castaña. Dorsal parda jaspeada de pardo oscuro. Cejas blanquecinas. Garganta blanca bordeada de puntos negros. Ventral ocrácea. Alas pardas con tono canela. Cola con las plumas centrales pardas. Las externas negras con el tercio terminal blanco.

COMPORTAMIENTO

Recolecta alimentos (insectos) en el suelo, a veces en hierbas bajas (0,50 m)

Alimentación

Marelli (1919). **Insectos:** larvas. **Vegetales.**
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros. **Vegetales.**
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Hemípteros. **Vegetales:** Semillas.
Haro (1998). **Insectos:** Hemiptera. Lepidoptera (larvas). **Arácnidos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Dermaptera. Hemiptera (Pentatomidae) Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae). **Arácnidos:** arañas.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Salvador et al. (2017). **Anfibio:** Rana de bigotes (*Leptodactylus mystacinus*)

Voces

Straneck en De la Peña (2016d). Canta generalmente a dúo con su pareja. Consiste en una serie de agudas sílabas que terminan con un trino final: Chipchipchipchiri .. chipchipchirri .. chipchipchirri .. chirri.

HÁBITAT

Sabanas, praderas arboladas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Córdoba, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N

El nido es sostenido en ramas de arbustos, árboles, postes, molinos. Es una estructura globular, alargada en sentido vertical. Emplea palitos con y sin espinas. Boca en la parte superior. Túnel curvo en espiral, hasta la cámara. En la entrada del túnel coloca plumas, hilos o trozos de nylon o géneros. Acolcha la cámara con vegetales suaves y plumas.
A veces presenta dos bocas o dos túneles, que pueden o no desembocar en la cámara. Expuesto. Elaborado.

White (1882). Buenos Aires. Nido.
Barrows (1883a). Buenos Aires y Entre Ríos, hace un nido voluminoso, se hallan huevos frescos entre octubre y enero, pone de 4 o 5 huevos.
Holland (1892). Estancia El Espartillar, pdo. General Paz, Buenos Aires, cría a partir de octubre, pone hasta 6 huevos.
Grant (1911c). El nido es una gran estructura de palos, generalmente espinosos, colocado en un árbol o arbusto, el agujero de entrada está en la cima, desde donde un túnel en zigzag conduce hasta la cámara, a menudo a lo largo de toda la longitud del túnel tapizado con lana.
Hussey (1916). La Plata, Buenos Aires, noviembre, nido construido dentro de un semáforo de ferrocarril.
Gibson (1918). Cabo San Antonio, Buenos Aires, posturas de octubre a diciembre.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidificando.
Wilson (1926).Santa Fe. Nido.
Friedmann (1927). Entre Ríos. Nido.
Smyth (1928). Entre Ríos. Nido.
Smyth (1928). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 03-10-1920 y 06-11-1920, 5 huevos cada uno.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica.
Castellanos (1934). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Alimentan pichones de *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, nidos en octubre, 4 huevos.
Pereyra (1938b). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, 06-09-1936, nido con pichones.
Masramón (1962). San Luis, nidifica.
Zapata y A. de Cabrera (1969). Buenos Aires. Nido.
Masramón (1971). San Luis, nidifica.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidos en *Eucaliptus.*
Zelich en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 01-09-1970, un huevo.
Masramón en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 13-12-1960, pichones, 15-11-1969, 4 huevos.
Gallegos y Beltrán en Narosky et al. (1983). Pdo. Las Heras, Buenos Aires, 26-12-1977, 4 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). 10 nidos en provincia de Buenos aires.
Nores e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 8 nidos en provincia de Buenos Aires y uno en Santa Fe.
Fraga en Narosky et al. (1983). Pdo. Lobos, Buenos Aires, entre 22-09 y 10-11, 6 nidos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Oleán, pdo. Punilla, Córdoba, 16-10-1982, 4 huevos.
Mason (1985). Nido.
Gómez y Massoia (1987). Benito Juárez, pdo. Benito Juárez, Buenos Aires, 22-01-1987, 6 huevos.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Nellar Ramonella (1993). La Carolina, dpto. Pringles, San Luis, 20-10-1991, nido en construcción.
Nores (1995). Córdoba. Nido.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en octubre.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a noviembre.
Tajer et al. (2007). Buenos Aires. Nido.
Turienzo y Di Iorio (2008, 2014a). Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa. Nidos.
Chatellenaz (2008c). Formosa. Nido.
Delhey et al. (2010). Buenos Aires, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Delhey et al. (2011). Buenos Aires. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 101 nidos. Se reproduce de agosto a febrero. Posturas de 4 a 5 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 37 nidos desde el 28-09-1970 a 01-11-2004 en la provincia de Santa Fe y 4 en Entre Ríos. Medidas: Alto: de 40 a 65 cm. Ancho: de 28 a 40 cm. Ancho de la boca: de 8 a 10 cm. Largo del túnel: de 40 a 50 cm. Diámetro de la cámara: de 10 a 15 cm. Nido más bajo: 1,00 m. Nido más alto: 7,00 m.
Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.

Salvador (2013b). Córdoba. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a). Capitán Solari, dpto. Sargento Cabral, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Chaco. Nido.
Turienzo y Di Iorio (2014a). Chaco. Nido.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 2 nidos.
Miquel et al. (2015). La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos. Nidos.
Pintos et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Formosa, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires. Nidos.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Quiroga y Llugdar (2019c). Nidos en La Banda, Santigo del Estero, el 21-07-2017, de la temporada anterior.



Huevos
Pone 4 huevos, a veces más, ovoidales, blancos.

Medidas
Harter y Venturi (1909): 23,0 a 26,0 x 17,0 a 18,0
Gibson (1918): 24,0 x 17,0
Serié y Smyth (1923): 24,0 a 26,0 x 18,0 a 19,0
Smyth (1928): 23,0 a 25,5 x 17,5 a 18,5
Castellanos (1932): 21,0 a 22,0 x 15,0 a 16,0
Zapata y Cabrera (1969): 23,2 a 26,2 x 17,5 a 18,8 X= 24,4 x 18,3 (N= 6)
Masramón (1971): 25,0 x 18,0
Gallegos y Beltrán en Narosky et al. (1983): 24,1 a 25,4 x 17,5 a 18,0 X= 24,8 x 17,8 (N= 4)
Narosky en Narosky et al. (1983): 22,4 a 25,3 x 16,7 a 18,4 X= 23,8 x 17,8 (N= 13)
Fraga en Narosky et al. (1983): 23,1 a 24,5 x 17,3 a 18,1 X= 23,8 x 17,8 (N= 6)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983):23,5 a 24,7 x 16,8 a 17,7 X= 24,1 x 17,3 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 22,5 a 24,3 x 17,4 a 19,0 X= 23,5 x 18,3 (N= 14)
Salvador (2013b): 22,1 a 25,1 x 16,1 a 18,1 X= 23,5 x 17,1 (N= 89)
De la Peña (2013c): 23,5 a 25 x 17,4 a 18,7 X= 24,0 x 17,8 (N= 16)

Pesos
Zapata y Cabrera (1969): 4,0 a 5,0 X= 4,5 (N= 3)
Fraga en Narosky et al. (1983): 3,8
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 3,7
Di Giacomo (2005h): 3,3 a 4,6 X= 3,8 (N= 14)
Salvador (2013b): 3,2 a 4,1 X= 3,7 (N= 56)
De la Peña (2013c): 3,1 a 3,8 X= 3,56 (N= 6)
De la Peña (2013c): 0,20 a 0,26 X= 0,23 (N= 11)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 a 17 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 15 a 17 días. Los huevos son puestos en días alternos. Período de incubación de 16-17 días.

PICHONES

Descripción

Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, con plumón dorsal gris claro. Pico pardo claro, comisuras amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua amarillos. Piel clara. Largo plumón gris.
4 día. Apenas se ven las vainas de alas y cola.
5 día. Abren los ojos.

Peso al nacer

Salvador (2013b): 3,1 a 3,6 X= 3,4 (N= 12)

Observaciones

Camperi (1992). Hembras con huevos en formación.
Di Giacomo (2005h). La permanencia de los pichones en un nido fue de 20 días.
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 19 a 21 días.
De la Peña (2013c). Los pichones permanecen en el nido 18 días.
De la Peña (2013c). Un nido del 11-10-2002, en Esperanza, tenía entre los palitos dos costillas de Zorro.
A veces los nidos presentan dos bocas y dos túneles, que pueden o no desembocar en la cámara. Un nido tenía dos bocas que se unían en un túnel para terminar en la cámara.

Otros

Castellanos (1934). Friedmann (1963). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Urcola (2011). Dos ejemplares con plumaje blanco en garganta, pecho, abdomen, muslos, subcaudales y alas. (Dilución pastel)
De la Peña, Salvador, Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Fraga (1984) Mason (1985) Antoniazzi et al. (2011); (Nores 1995). Es afectado por moscas del género *Philornis.*

Más informacion en:
Masramón (1971). Hudson (1974). Fraga (1979b). Mason (1985). Nores (1995). Chatellenaz (2008c). Delhey et al. (2010). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

Depredadores

De adultos: *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (1990a, 2009e), *Falco sparverius* en Entre Ríos, Fiedmann (1927), *Falco femoralis* en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), en Córdoba, Salvador (2012h), en La Pampa, Liébana (2015)
De pichones: Reptiles: Culebra del pastizal (*Philodryas patagoniensis*) en Buenos Aires, Delhey et al. (2010), De la Peña (inéd.), en Esperanza, *Agelaioides badius* en Córdoba, Salvador (2017a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cejas blanquecinas. Garganta blanca bordeada de negro. Cola oscura con blanco en las plumas externas.

Esperanza. Santa Fe. 04-10-2012

Neuquén Capital. 24-05-2019 Foto: Cynthia Arenas

Esperanza. Santa Fe. 20-12-2004

Esperanza. Santa Fe. 22-08-2006

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) desde Jujuy, este de Salta, Formosa, sur de Misiones y Corrientes hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se extiende por un área relativamente amplia de Paraguay, sur de Brazil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2010); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Gidson (1918); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (1990a, 2009e, 2012b); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky et al. (1983); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1937, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Smyth (1928); Soave et al. (1999b); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Salvador y Bodrati (2014)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Kovacs, C. et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Frenzel (1891); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983, 2012h, 2013b, 2013e, 2017); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Freyre, dpto. San Justo, 18-09-2002; Villa Albertina, dpto. Isquillín, 19-09-2002)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1987b); Darrieu y Camperi (1990); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b, 2013c); Fiedmann (1927); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Ferrer et al. (2019); Roig (1965)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Castello et al. (1982); Gelain y Tolosa (2011); Hudson (1974); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. Gral. Roca, 28-11-1998)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Contreras y Davies (1980); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2013c, 2011); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Nores et al. (1991); Quiroga y Llugdar (2019c)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2005b);Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

CRESTUDO *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860

Otros nombres: Burrito. Chirrí. Collita. Copetudo. Crestudo cordobés. Crestudo rayado. Espinero copetón. Espinero crestudo. Leñero. Leñatero copetón. Mulita. Pirirí. Quishquilo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 2 (M) X= 30,6 g (Rango: 28,4 a 32,8); N= 3 (H) X= 32,30 g (Rango: 30,7 a 35,5)
Camperi (1992a): N= 2 (M) 33,3 y 37,6 g; N= 1 (H) 38,4 g
Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 28,2 g (Rango: 26,5 a 30,0 g)
Alderete y Capllonch (2010): N= 23 X= 27,8 g (Rango: 22 a 32)
Salvador (2014a): N=11 (?) X= 30,7 g (Rango: 27,5 a 33,6)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X= 30,9 g (Rango: 27,0 a 32,5)
Pagano y Salvador (2017): N=2 (H) 32,8 y 34,6 g

Coloración. Pico: maxila parda acanelada, mandíbula pardo acanelada con base canela claro. Patas pardo claras con tinte naranja o amarillo claro. Iris pardo.
Copete pardo oscuro. Dorsal negruzca con las plumas ribeteadas de blanquecino. Ventralmente blanquecino estriado de castaño. Alas pardas oscuras con las secundarias ribeteadas de blanquecino. Cola negruzca con las plumas externas castañas en la base.

COMPORTAMIENTO
Anda en general en grupos de 4 a 6 ejemplares. Bastante terrícola.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos. Vegetales.**
Olrog (1956). **Insectos:** Coleópteros. Hormigas. **Moluscos:** Gasterópodos.
Martínez et al. (1975). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae).
Kratter et al. (1993). **Insectos:** Escarabajos. Hormigas (larvas y adultos). **Arácnidos.**

Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Scarabaeidae). Hymenoptera (Formicidae). Orthoptera (Acridiidae: *Dichroplus elongatus*).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Gryllotalpidae). **Arácnidos:** (arañas). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es un agudo y hueco trino que finaliza con un grave cloqueo de poco alcance: Juiirrrrrrrrriirrr ... clüclüclüclü...

HÁBITAT
Montes, sabanas, praderas arboladas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Santiago del estero, Formosa, Chaco, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N

El nido es sostenido en las ramas de los árboles, arbustos, molinos, postes telefónicos, columnas. Es redondeado, con la boca hacia arriba. Túnel de entrada curvo. Emplea palitos con y sin espinas. Forra la mitad inferior de la cámara con materiales diversos: pajitas, estiércol, trozos de nylon, telas, plumas. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Santa Fe. Nido.
Girard (W. F.). Atahona, dpto. Simoca, Tucumán, 18-10-1928, 4 huevos.
Smyth (1928). 3 nidos: Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 17-11-1922, 5 huevos; Santa Elena, dpto. La Paz, Entre ríos, 30-11-1924, 5 huevos y 13-12-1925, 4 huevos.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica.
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, en noviembre, 4 huevos.
Davis (1940c). Entre Ríos. Nido.
Partridge (1953). Los Molinos, dpto. Santa María, Córdoba, 09-01-1948, 2 huevos.
Masramón (1971). San Luis, nidifica.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidos en Eucaliptus.
Contreras (1980o). Gustavo André, dpto. Lavalle, Mendoza, diciembre de 1975, 3 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*.
Masramón en Narosky et al. (1983).Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 03-10-1968, 4 huevos.
Salvador en Narosky et al. (1983).Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 04-10-1980, 4 huevos; Villa Nueva, dpto. San Martín, Córdoba, 30-10-1982, 4 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 11-10-1966, 2 nidos con 4 huevos cada uno; Cura Brochero, dpto. San Alberto, Córdoba, 13-01-1981, 4 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 4 nidos: Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 01-11-1970, 2 nidos con 4 huevos cada uno: pdo. Médanos, Buenos Aires, 03-12-1971, en construcción; 13-12-1972, Bahía Blanca, Buenos Aires, sin postura.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 11-10-1982, 7 huevos.

Salvador y Fraga en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 29-10-1982, 3 nidos, uno con 4 huevos, otro con 4 pichones y uno con 4 pichones y un huevo.
Narosky et al. (1990). Argerich, dpto. Villarino, Buenos Aires, 09-11-1988, un nido en construcción y otro con 5 huevos.
Haro y Gutierrez (1992). Córdoba. Nido.
De la Peña et al. (2003a). Santa Fe. Nido.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a noviembre.
Areta y Bodrati (2007). Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, entre 1997 y 2003 se localizaron 38 nidos; Pozo Cercado y El Cantor, dpto. Ramón Lista, Formosa, 2 nidos.
Martín et al. (2009). Santiago del Estero. Nido.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 97 nidos. Se reproduce de agosto a febrero. Posturas de 4 a 5 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 52 nidos desde el 25-10-1970 al 25-10-2004 en provincia de Santa Fe y 3 en provincia de Córdoba. Medidas: Alto externo: de 30 a 50 cm. Ancho externo: de 30 a 35 cm. Largo externo: de 30 a 35 cm. Ancho de la boca: de 8 a 9 cm. Largo del túnel: de 25 a 42 cm. Diámetro de la cámara: de 10 a 11 cm. Nido más bajo: 2,00 m. Nido más alto: 11,00 m.
Salvador y Bodrati (2013a). Chaco, Córdoba. Nidos.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio y Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis* y adultos alimentando pichones del parásito.
Salvador y Bodrati (2014a). Entre Villa Giardino y La Cumbre, dpto. Punilla, Córdoba, J. Heredia, en enero de 2002, localizó dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 4, 4 y 5 huevos cada uno.
Turienzo y Di Iorio (2014b). Chaco, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero. Nidos.
Miquel et al. (2015). Chaco, Córdoba. Nidos.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Salta, Mendoza, Formosa, Entre Ríos. Nidos.
Ferrari, C. y S. Vitale en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Dinelli, L. en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Girard, P. en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 22,0 a 23,5 x 17,0 a 18,0
Smyth (1928): 22,0 a 24,0 x 18,0
Pereyra (1937b): 22,5 x 18,5
Masramón (1971): 23,0 x 18,0

Salvador en Narosky et al. (1983): 22,4 a 23,2 x 16,8 a 17,2	X= 22,7 x 17,0 (N= 4)
Narosky en Narosky et al. (1983): 21,8 a 23,2 x 17,2 a 18,2	X= 22,7 x 17,5 (N= 13)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 22,5 a 23,4 x 16,4 a 17,8	X= 22,9 x 17,1 (N= 7)
Di Giacomo (2005h): 21,3 a 23,7 x 15,7 a 18,3	X= 22,9 x 17,4 (N= 4)
De la Peña (2013c): 21 a 25,1 x 16 a 18,6	X= 23,2 x 17,2 (N= 25)

Salvador (2013b): 22,2 a 24,3 x 16, a 18,8 X= 23,1 x 17,5 (N= 88)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 2,5 a 3,5	X= 3,2 (N= 4)
Salvador (2013b): 3,4 a 4,2	X= 3,8 (N= 65)
De la Peña (2013c): 3,5 a 3,7	X= 3,56 (N= 5)
De la Peña (2013c): 0,31 a 0,37	X= 0,35 (N= 20)

Generalidades

Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 días. La pareja incuba.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 14 a 15 días. Los huevos son puestos en días alternos. Período de incubación 15-16 días.

PICHONES

Descripción

Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja. Pico amarillento, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento. Piel rosada. Patas natural.Comisura amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Plumón gris.
3 días. Aparecen las vainas en las alas.
4 días. Apenas se ven los cañones alares y muy pequeños en la cola, grises.
5 días. Abren los ojos.
6 días. Ojos abiertos. Comisura amarilla. Pico amarillento. Plumón gris claro. Cañones en alas y cola, grises. Ventralmente aparecen plumas blanquecinas (crema).
9 días. Dorsalmente aparecen las láminas, pardas. Ventralmente crema jaspeado de pardo.
12 días. Pico claro.Ventralmente blanquecino estriado de castaño. Alas y cola con las láminas pardo oscuras orilladas de ocráceo. Dorsalmente láminas chicas, jaspeadas. Escaso plumón.
18 días. Dejan el nido.

Peso al nacer

Salvador (2013b): 3,0 a 3,6 X= 3,2 (N= 16)

Observaciones

Areta y Bodrati (2007). Ocupan el nido como dormidero. El número de individuos para este fin fue de 4 a 14.
Di Giacomo (2005h). Ocupa el nido como dormidero.
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 16 a 18 días.
De la Peña (2013c). Ocupa un mismo nido una o más veces.
En un nido al comenzar la postura andaban ocho ejemplares. Durante la incubación quedó una pareja. Luego del nacimiento de los pichones se reunían siete individuos.

Otros

Contreras (1980o). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*
De la Peña et al. (2003a). Salvador y Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima de larvas de moscas del género *Philornis.*
Urcola (2011). Un ejemplar con plumaje canela pálido (Dilución pastel)

Más información:
Areta y Bodrati (2007). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

Depredadores

De adultos: *Falco sparverius* en Formosa, Di Giacomo (2005h), en Córdoba, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010), *Falco rufigularis* en Formosa, Di Giacomo (2005h)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete. Muy jaspeado en ventral y en dorsal.

Esperanza. Santa Fe. 01-10-2008

Esperanza. Santa Fe. 14-08-2007.

Esperanza. Santa Fe. 16-11-2008

Esperanza. Santa Fe. 16-11-2008

Esperanza. Santa Fe. 25-01-2005

Esperanza. Santa Fe. 16-11-2008

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coryphistera alaudina alaudina Burmeister, 1860 desde Jujuy, Salta, Formosa y Corrientes hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Región chaqueña del este de Bolivia, oeste de Paraguay, sur de Brasil, oeste de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Coryphistera alaudina alaudina Burmeister, 1860

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Narosky (1983); Narosky et al. (1990); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Contreras (1980h)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981; Singuil, dpto. Ambato, 14-12-1999)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Areta y Bodrati (2007); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras (1980h); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Contreras (1980h); De la Peña (2013c); Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010); Frenzel (1891); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983, 2013b); Salvador y Bodrati (2014); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1888); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Carlos Paz, dpto. Punilla, 25-05-200; Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1980h, 1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Contreras (1980h); De la Peña (2011b); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Areta y Bodrati (2007); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1980h); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Di Giacomo et al. (2007); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Contreras (1980h); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Pereyra (1937); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: **Capllonch et al. (2020);** Capurro y Bucher (1986); Contreras (1980h); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g, 1980h); Contreras y Davies (1980); Contreras y A. Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Marone (1992a); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918)

Río Negro
Citas: Contreras y Davies (1980); Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2010); Capurro y Bucher (1988); Contreras (1980h); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Contreras (1980h); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Contreras (1980h); De la Peña (2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b) Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Contreras (1980h); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Capllonch y Ortiz (2006); Contreras (1980h); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Narosky et al. (1983); Ortiz et al. (2013c); Smyth (1928)

CANASTERO ROJIZO *Asthenes dorbignyi* (Reichenbach, 1853)

Otros nombres: Canastero castaño. Canastero rojo. Colilarga.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15,7 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 1 (M) 19,8 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 19 X= 17,1 g (Rango: 14,5 a 22)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 17,9 g

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula pardo clara. Patas corneas con leve tinte violáceo. Iris pardo oscuro.
Cabeza y dorsal, pardos. Cejas grises. Supracaudales y mancha gular, castañas. Ventral ocráceo. Flancos y subcaudales, canelas claro. Alas pardas con castaño. Plumas externas de la cola castañas, centrales pardas oscuras.

HÁBITAT
Quebradas y estepas arbustivas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N							N	N	

El nido es globular, alargado en sentido vertical. Boca arriba, hacia un costado. Emplea palitos. Acolcha la cámara con materiales vegetales, pelos, lanas. Sostenido en arbustos. A baja altura. Expuesto. Elaborado.

Höy (1980b). Salta, 18-11-1977, 2 huevos.
Nores en Narosky et al. (1983). Purmamarca, dpto. Tumbaya, Jujuy, 16-10-1980, en construcción.
Narosky en Narosky et al. (1983). Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1979, nido en álamo a 3,50 m de altura.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Dpto. Tunuyán, Mendoza, 15-11-1982, 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Chorrillos, dpto. Humahuaca, Jujuy, 25-02-1983, pichones.
Salvador y Salvador (1984). Mendoza. Nido.
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Amaichá del Valle, dpto. Tafí, Tucumán, 2 nidos en cardones (*Trichocereus*) uno en construcción y el otro con 3 huevos.
Navas y Bó (1987a). Mendoza. Nido.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1995. El nido se hallaba en una ladera que cae a 45º y a 30 m de un arroyo, a 1,3 m de altura en un *Prosopis ferox,* de forma globular elaborado con palitos espinosos y la cámara de cría forrada de lana y abundantes plumas, con 30 cm de alto, boca de entrada 4 cm, diámetro de cámara de cría 10 cm.
Di Iorio et al. (2010). La Poma, Salta y Cuesta de los Cardones, El Infiernillo, Tucumán, nidos.
Di Iorio et al. (2010). Salta. Nido.
Capllonch et al. (2011b). Tucumán. Nido.
Turienzo y Di Iorio (2013). La Poma, Salta, 16 nidos; Cuesta de los Cardones, El Infiernillo, Tucumán, 4 nidos.
De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, nido en arbusto a 1,50 m del suelo, 2 huevos.
Medidas: Largo total: 35 cm. Ancho: 17 cm. Diámetro de la boca: 3,5 cm. Largo del túnel: 20 cm. Diámetro interno de la cámara: 6 cm.
Turienzo y Di Iorio (2013). Salta. Nido.
Salvador (2015). Sierra de Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 05-03-1986, nido con 2 pichones. Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, nido con 2 pichones. Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 3 pichones.
Miquel et al. (2015). Salta. Nido.
Turienzo y Di Iorio (2013). La Poma, Salta, 16 nidos; Cuesta de los Cardones, El Infiernillo, Tucumán, 4 nidos.
Uranga De la Peña (2016d). Tafí del Valle, dpto. Tafí del valle, Tucumán, 09-02-2001, 3 huevos.
Salvador en Salvador (2016a). La Rioja. Nido.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos o con tono verdoso o gris.

Medidas

Höy (1980b): 21,1 a 21,6 x 15,4 a 15,9	X= 21,3 x 15,6 (N= 2)
Budin (MACN) en Narosky et al. (1983): 19,7 a 20,2 x 15,0 a 16,6	X= 20,3 x 15,2 (N= 3)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983):21,8 a 22,0 x 16,7 a 17,7	X= 21,9 x 17,0 (N= 2)
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 20,5 a 25,9 x 16,6 a 18,0	X= 23,3 x 17,2 (N= 3)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 21,9 x 16,6 y 21,7 x 16,4	
De la Peña (2013c): 22,0 a 23,1 x 16,0 a 17,5	X= 22,5 x 16,5 (N= 5)

Pesos

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 3,4 y 3,2		
De la Peña (2013c): cáscaras 0,17 a 0,17	X= 0,17	(N= 2)

PICHONES
Salvador (2015). Comisura amarilla e interior de la boca amarillo intenso.

Observaciones
Nores en Narosky et al. (1983). La pareja construye.

Otros
Narosky et al. (1983). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Azul Pampa. Jujuy. 23-02-1979

Depredadores
Falco femoralis en Salta, Salvador (2017a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Mancha gular, alas, supracaudales y plumas externas de la cola, castañas.
Se diferencia del Canastero chaqueño, por tener menos castaño en la cola y ser más larga.

Del Canastero castaño, por tener mancha en la garganta y la cola negra con menos castaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes dorbignyi dorbignyi (Reichenbach, 1853) entre los 2.500 y los 4.000 metros de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca hasta Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Andes del oeste de Peru, norte de Chile, oeste de Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asthenes dorbignyi dorbignyi (Reichenbach, 1853)

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Navas y Bó (1987a); Nores (1995); Salvador (2015); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2020); Castellano (1932); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Hartert y Venturi (1909); Mamaní et al. (2018); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvador (2015)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Navas y Bó (1987a); Narosky et al. (1983)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); Di Iorio et al. (2010); Höy (1980b); Moschione et al. (2013); Nores (1995); Salvador (2017a); Turienzo y Di Iorio (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Cajal (1998); Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); De la Peña (2013c); Di Iorio et al. (2010); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Soria et al. (2010); Turienzo y Di Iorio (2013)

CANASTERO CHAQUEÑO *Asthenes baeri* (Berlepsch, 1906)

Otros nombres: Canastero. Canastero argentino. Coludo de garganta castaña. Canastero de pico corto. Chotoy.

DESCRIPCIÓN

Largo: 15 cm.
Peso: Camperi (1992a): N= 1 (M) 21,5 g; N= 1 (H) 11,0 g
Camperi (1992c): N= 1 (M) 17,0 g; N= 4 (H) 17,3, 16,0, 17,0 y 17,5 g
Blendinger (1999) 25,6 g
Blendinger (2005): X= 17,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 26 X= 13,4 g (Rango: 12 a 15)
Alderete y Capllonch (2010): N= 40 X= 17,3 g (Rango: 16 a 20,5)
Salvador (2014a): N=9 (?) X= 16,6 g (Rango: 15,5 a 17,3)

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula parda con base cornea. Patas gris azuladas. Iris pardo oscuro o pardo grisáceo.
Corona y dorsal pardas grisáceas. Mancha castaña en la garganta. Ventral gris clara. Alas pardas grisáceas. Las plumas centrales de la cola son pardas oscuras, las externas castañas

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos en el suelo.

Alimentación
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Cerambycidae). Himenópteros. Ortópteros (Acrididae).
Martínez et al. (1975). **Insectos:** Coleoptera. **Arácnidos:** Araneida (pedipalpo).
Kratter et al. (1993). **Insectos:** Dermapteros. Dípteros. Escarabajos. Hormigas.
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Carabidae). Mecoptera. **Arácnidos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, no identificado). Dermaptera. Diptera. Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas, polillas). Orthoptera (Gryllidae). **Crustáceos:** (Isópteros terrestres). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*). **Arácnidos:** (arañas). (Opilionidos).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su canto es un agudo CirrrRRRiirrrrhhh.... repetido esporádicamente.

HÁBITAT
Estepas arbustivas, sabanas, montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Sostiene el nido en ramas de arbustos o de árboles. Es redondeado, alargado en sentido vertical. Boca hacia arriba. Corto túnel curvo. Emplea palitos con y sin espinas. Tapiza la cámara con musgos, líquenes, materiales vegetales desmenuzados, "pelusas" vegetales, pelos, plumas. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Tucumán. Nido.
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, nidos en noviembre, 3 ó 4 huevos.
Höy, G. en Friedmann (1963). Salta. Nido.
Höy y Ottow (1964). Salta, 10-03-1957, nido abandonado, parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1971). San Luis, nidifica.

Partridge (MACN) en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 18-12-1963, 3 huevos; dpto. La Paz, Mendoza, 22-11-1963, un huevo y uno de *Molothrus bonariensis*.
Masramón en Narosky et al. (1983). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 02-10-1968, 3 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 5 nidos: Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1968, en construcción; 19-12-1968, 3 huevos, 02-11-1970, en construcción, 05-11-1970, 3 nidos, uno con un huevo, 2 con 3 huevos; Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 14-10-1971, pichones.
Narosky en Narosky et al. (1983). 3 nidos: Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 17-10-1968, 3 huevos; Ycho Cruz, dpto. Punilla, Córdoba, 08-10-1973, en construcción; Mina Clavero, dpto. San Alberto, Córdoba, 08-01-1981, 3 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). 4 nidos: Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 11-10-1982, 3 pichones; 12-10-1982, 3 huevos; Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 13-10-1982, 2 nidos con 3 huevos; Unión, dpto. Gdor. Dupuy, San Luis, 15-11-1982, un huevo.
Fraga en Narosky et al. (1983). El Palmar, dpto. Colón, Entre Ríos, 06-12-1982, 4 huevos.
Salvador y Salvador (1984). Pedro Luro, pdo. Villarino, Buenos Aires, 3 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Leiva et al. (2004). Santa Fe. Nido.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 2 nidos.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 57 nidos. Se reproduce de setiembre a febrero. Posturas de 3 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 19 nidos entre el 21-10-1974 y 04-10-04, en provincia de Santa Fe y 1 en San Juan.
Medidas: Alto total: de 24 a 30 cm. Ancho: de 16 a 20 cm. Diámetro de la boca: de 4 a 6 cm. Diámetro interno de la cámara: de 7 a 10 cm. Nido más bajo: 1,20 m. Nido más alto: 4,00 m.
Durante la incubación agrega materiales a la cámara y repara el nido.
Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a). Argerich y Chapalcó, pdo. Villarino, Puán, pdo. Puán, Buenos Aires, A. Di Giacomo localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). San Luis. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Elisa. Santa Fe. Fotos: Víctor Merlino

Esperanza. Santa Fe. 29-12-2005 | Esperanza. Santa Fe. 21-10-1974

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 21,0 x 16,6 y 22,3 x 15,8		
Masramón (1971): 20,0 x 15,0		
Narosky en Narosky et al. (1983): 19,6 a 21,7 x 15,5 a 16,3	X= 20,6 x 15,9	(N= 6)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 20,5 a 21,5 x 14,9 a 15,4	X= 20,9 x 15,2	(N= 9)
Fraga en Narosky et al. (1983): 19,8 a 21,9 x 15,4 x 15,4	X= 21,0 x 15,7	(N= 3)
Mezquida (2001b): 21,5 x 16,0		
Salvador (2013b):19,4 a 21,9 x 14,9 a 16,6	X= 20,5 x 15,5	(N= 82)
De la Peña (2013c): 19,5 a 23,3 x 14,6 a 16,0	X= 21,7 x 15,4	(N= 13)

Pesos

Hartert y Venturi (1909): 2,9		
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,5		
Mezquida (2001b): 3,2		
Salvador (2013b): 2,3 a 3,1 X= 2,6 (N= 58)		
De la Peña (2013c): 2,3 a 2,4	X= 2,33	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,14 a 0,16	X= 0,15	(N= 10)

Generalidades

Mezquida (2001b). Período de incubación 15,5 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 14 a 15 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 20 a 26 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación 15-16 días.

PICHONES

Descripción

Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, implumes. Pico pardo claro, comisuras blancas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Pico blanquecino. Piel color natural. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillento. Escaso plumón gris (filoplumas) en las zonas pteridas.
4 días. Ojos abiertos, marrones. Desaparece el plumón y tiene pequeñas vainas en las zonas pteridas.
El resto de la piel desnuda. Aparecen las vainas de las plumas alares y de la cola.
7 días. Plumas de la cabeza, dorsales y cubiertas alares, parduscas. Primarias más oscuras. Plumas laterales de la cola, canelas, centrales pardo oscuro. Plumas de los flancos y ventrales, canela claro, más oscuro en la garganta.
12 días. Grita. Comisura blanquecina. Pico gris con una bandita blanquecina cerca de la punta y extremo negro. Primarias oscuras. Secundarias y dorsal marrón. Cola : plumas externas rojizas, cuatro centrales pardo oscuro. Ventralmente gris claro. Garganta un poco más oscura.
Patas grises.

Peso al nacer

Salvador (2013b): 2,0 a 2,5 X= 2,2 (N= 14)

Observaciones

Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 15 a 16 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 14 días.

Otros

Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Antoniazzi et al. (2011); Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
De la Peña (2013c). Es parasitado por *Molothrus bonariensis* y *Tapera naevia*
Partridge (MACN) en Narosky et al. (1983). Salvador y Bodrati (2014a). Höy y Ottow (1964). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredadores

De adultos: *Tyto alba* en Buenos Aires, Morici (2009e)
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Córdoba, Salvador (2011)

Más información:
Masramón (1971). Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Mancha en la garganta castaña. Cola erguida. Pico corto. La cola es más corta y el pico más grueso que el del Canastero coludo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asthenes baeri baeri (Berlepsch, 1906) desde el norte del país hasta Río Negro y *Asthenes baeri neiffi* (Contreras, 1980) en el oeste de Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se extiende por el este de Bolivia, Argentina, exceptuando Misiones y la Patagonia (en diversos habitats: Monte, Chaco y Espinal), oeste de Paraguay, extremo sureste de Brasil y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asthenes baeri baeri (Berlepsch, 1906)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Mérida y Bodrati (2006); Morici 2009e; 2012b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Bodrati (2014); Savigny (2002a); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001a); Haro y Gutierrez (1992); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Olrog (1979); Partridge (1953c); Salvador (1983, 2011, 2013b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Villa Santa Isabel, dpto. Calamuchita, 26-11-1990; Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000; Ascochinga, dpto. Colón, 01-10-2009)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Hartert y Venturi (1909); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Navas (1982); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Ordano et al. (1999)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Di Giacomo et al. (2007) ; Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Maceda y

Kin (2001); Navas y Bó (1986); Pereyra (1937); Siegenthaler et al. (1990); Straneck (1990d); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Contreras (1979g, 1980f); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); López de Casenave (2001); López de Casenave et al. (2008); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1992a); Martínez et al. (1997a); Mezquida (2001b, 2003); Partridge en Narosky et al. (1983); Roig (1965); Sanzin (1918); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2003); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu (2004); De la Peña (2013c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Masramón (1971, 1983); Narosky et al. (1983); Nellar Romanella (1993);

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al (2015a, 2020); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Asthenes baeri neiffi (Contreras, 1980)

Córdoba
Citas: Conteras (1980g); Nores et al. (1983); Nores (1996)

ESPARTILLERO PAMPEANO *Asthenes hudsoni* (P.L. Sclater, 1874)

Otros nombres: Canastero de pico largo. Canastero manchado pajizo. Canastero picolargo. Cola aguda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 1 (?) 26,3 g

Coloración. Pico: maxila corneo pardusca oscura, mandíbula corneo grisáceo con ápice pardusco. Patas corneo parduscas claras. Iris pardo claro.

Dorsal parda canela con ancho jaspeado pardo oscuro. Márgenes de las plumas más claros. Cejas blanquecinas. Mancha gular anaranjada. Ventral ocre canela. Alas pardas con banda canela. Cola parda con las plumas externas canelas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros (Pentatomidae). Himenópteros.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros. Lepidópteros.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).

HÁBITAT

Vegetación palustre, pajonales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

El nido es redondeado, con entrada lateral. Lo ubica en la base de matas de pastos.

Holland (1892). Estancia El Espartillar, pdo. General Paz, Buenos Aires, cría a medidos de noviembre, pone 5 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Barracas al Sur, Buenos Aires, nidos en octubre y noviembre.
Grant (1911), Buenos Aires, el nido es difícil de encontrar, lo oculta en las hierbas; es una estructura en forma de cúpula de la hierba, forrado con con plumas. Parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Gibson (1918). Cabo San Antonio, Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos en noviembre y diciembre, 3 ó 4 huevos.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.
Pereyra (1923b). Zelaya, pdo. Pilar, buenos Aires, anida entre los pastos.
Wetmore (1926b). Cabo San Antonio, Partido de la Costa, Buenos Aires, 06-11 -1920, 3 huevos.
Wilson (1926). Dpto. Gral. López, Santa Fe, nido entre los pastos o al pie de cardos.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos, 3 ó 4 huevos.
Hudson (1974). Nido entre pastos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Pdo. San Vicente, Buenos Aires, 2 nidos: 25-11-1970, 3 pichones, 02-12-1970, 2 pichones.
Runnacles (MLP) en Fraga y Narosky (1985). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, 14-11-1933, 2 nidos con un huevo cada uno; 25-11-1933, 3 huevos; 04-12-1933, 2 huevos y 25-11-1937, 3 huevos.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 2 nidos. Se reproduce de noviembre y diciembre. Posturas de 2 a 3 huevos.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

Huevos

Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 21,0 a 22,0 x 16,0 a 16,5
Wetmore (1926b): 21,4 a 22,2 x 16,5 a 16,8 X= 21,4 x 16,7 (N= 3)
Pereyra (1938b): 21,0 a 22,0 x 18,0 a 19,0
(MACN) en Narosky et al. (1983): 21,9 a 22,8 x 17,1 a 17,6 X= 22,2 x 17,3 (N= 4)

Runnacles (MLP) en Fraga y Narosky (1985): 20,4 a 21,4 x 16,6 a 17,6 X 21,0 x 16,9 (N= 9)
Salvador (2013b): 22,1 a 22,6 x 16,8 a 17,4 X= 22,3 x 17,2 (N= 2)

Peso
Salvador (2013b): 3,3 a 3,5 X= 3,4 (N= 2)

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b).Pico pardo amarillento, comisuras amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres.

Otros
Grant (1911). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información:
Hudson (1974)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal muy jaspeada (parece "aperdizada"). Ventral acanelada. Cola larga.
Diferenciarlo del Espartillero serrano.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes hudsoni (P.L. Sclater, 1874) Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, este de Río Negro y de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su distribución restringida a un área de la región Pampeana del este de Argentina, sureste de Brasil (Rio Grande do Sul) y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Carrizo et al. (2001); Chebez et al. (1998); Codesido et al. (2013); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1918); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2006, 2008); Savigny et al. (2005); Wetmore (1926b)

Córdoba
Citas: De Francesco (2005); Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Salvador (1983); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1987)

Chaco
Citas: Chebez (2009)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); De la Peña y Tittarelli (2011)

Río Negro,
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); Fandiño y Pautasso (2011); Wilson (1926)

ESPARTILLERO AUSTRAL *Asthenes anthoides* (P. P. King, 1831)

Otros nombres: Canastero. Canastero austral. Canastero de garganta rojiza. Canastero de la puna. Canastero del Sur. Canastero manchado. Canastero manchado andino. Canastero manchado chico. Canastero manchado patagónico. Pajera del Sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 4 (?) X= 21,4 g (Rango: 21 a 22,7)

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula blanquecina. Patas grisesas. Iris pardo.
Dorsal parda con grueso jaspeado negro. Cejas blanquecinas. Mancha gular amarillenta. Ventral ocrácea con el pecho punteado de pardo oscuro. Alas pardas con banda canela. Cola parda oscura con canela en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Tenebrionidae) Hemípteros (Pentatomidae).
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Carabidae) Hemípteros (Pentatomidae).
Crawshay (1907). **Insectos.**
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Insectos.** Larvas

HÁBITAT
Estepas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N			

Nido cerrado de palitos, pajas, plásticos, plumas.

Roesler et al. (2014). Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 11-04-2009, nido posiblemente abandonado. Túnel de 25 cm de largo, boca de 6 cm de diámetro. Estancia La Alice, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, 26-09-2009, nido en construcción.

Más información:
Goodall et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal muy jaspeada de oscuro. Pecho punteado de pardo.
Diferenciarlo del Espartillero serrano.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes anthoides (P. P. King, 1831) desde Mendoza, Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego. También en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sur de Argentina y Chile hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. En invierno puede migrar algo más al norte.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Camperi (1998); Hartert y Venturi (1909)

Mendoza
Citas: Martínez et al. (2008)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (2004); Collar et al. (1992); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Narosky et al. (1983); Olrog (1979); Pereyra (1945); Ralph (1985); Veiga et al. (2002, 2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (1988b, 2001, 2010); Gelain y Tolosa (2011); Povedano (2016)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2003, 2005); Imberti y Albrieu (2001); Roesler et al. (2014); Stone (1928)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Crawshay (1917); Chebez y Bertonatti (1994); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Salvadori (1900)

Islas Malvinas
Citas: Woods (1988)

ESPARTILLERO ESTRIADO *Asthenes maculicauda* (Berlepsch, 1901)

Otros nombres: Canastero andino. Canastero estriado. Canastero tucumano. Espinero rayado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas gris oliváceass. Iris pardo.
Dorsal parda jaspeada de oscuro. Frente castaña. Garganta blanca. Ventral blanquecina. Pecho levemente jaspeado. Alas pardas con banda castaña. Cola parda estriada y punteada de negro.

HÁBITAT
Estepas de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cola escalonada. Frente castaña. Ventral blanquecina. Garganta blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes maculicauda (Berlepsch, 1901) en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su distribución está limitada a un área restringida de los Andes, sur de Peru, norte de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Di Giacomo et al. (2007)

Salta
Citas: Chebez (2006); Cowper Coles et al. (2009); Höy (1969a); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Tucumán
Citas: Berlepsch (1901); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1919a); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2005, 2013c)

ESPARTILLERO SERRANO *Asthenes wyatti* (Sclater & Salvin, 1871)

Sinonimia: *Asthenes sclateri* (Cabanis, 1878)

Otros nombres: Canastero cordobés. Canastero manchado serrano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Navas y Bó (1982): N= 11 (M) X= 25,7 g (Rango: 21 a 27,5); N= 8 (H) X= 24,6 g (Rango: 20,8 a 27,3)
Salvador (1990a): N= 1 (H) 26,0 g; N= 1 (?) 25, 8 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 2 X= 16,2 g (Rango: 16 a 16,5)
Salvador et al. (2017): N= 1 (?) 24,7 g

Coloración. Pico gris oscuroo, base de la mandíbula más clara. Patas verdosas. Iris pardo.
Dorsal parda clara estriada de pardo oscuro. Cejas blanquecinas. Mancha gular anaranjada. Ventral gris ocrácea.
Alas pardas con banda canela. Cobijas alares canelas. Cola parda con canela en las plumas externas.

HÁBITAT
Pastizales altoandinos y serranos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, San Luis, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

El nido es redondeado. La entrada está en la parte lateral y es redondeada. Emplea pastos. Lo ubica en el suelo, en la base o dentro de matas de yuyos. Puede emplear como elementos parte de los yuyos donde está ubicado y tener además una rampa de acceso. Expuesto. Elaborado.

Höy (1975). Salta, 09-01-1975, 2 huevos.
Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Pampa de Achala, Córdoba, 01-12-1973, 2 huevos.
Montaldo en Narosky et al. (1983). Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 15-01-1980, 2 huevos.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Achala, Córdoba, 2 nidos: 13-01-1983, 3 pichones, Copina, dpto. Punilla, Córdoba, un huevo propio y uno de *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1984). Córdoba. Nido.
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, 4 huevos.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba. 21-12-1986, nido con 2 pichones; 19-12-1987, 2 nidos, uno con 3 huevos y otro con 2 pichones.
Nellar Ramonella (1993). Cerro Agua Hedionda, Sierras Centrales, Sal Luis, 30-01-1988, nido con dos huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Capllonch et al. (2011b). Tucumán. Nido.
Salvador y Bodrati (2011). Córdoba. Nido.

Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, entre los años 1982 y 2006 se localizaron 14 nidos, desde octubre a enero.
De la Peña (2013c). Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 28-11-1982, nido entre pastos, 1 huevo.
Medidas: Alto: 15 cm. Ancho: 12 cm. Diámetro de la boca: 3 cm. Largo: 10 cm. Desde la boca a la base: 10 cm. Largo de la rampa: 35 cm.
Salvador en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.

Los Gigantes. Córdoba. 28-11-1982

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Höy (1975): 23,5 a 24,3 x 19,2 a 19,3	X= 23,9 x 19,2	(N= 2)
Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 23,3 a 17,9		(N= 1)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 22,6 x 17,9		(N= 1)
Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 23,9 a 24,6 x 17,8 a 18,9	X= 24,2 x 18,1	(N= 4)
Salvador y Salvador (1988): 23,9 a 24,4 x 18,0 a 18,4	X= 24,2 x 18,2	(N= 3)
Salvador y Salvador (2012): 22,6 a 24,6 x 17,6 a 18,9	X= 23,9 x 17,9	(N= 14)
De la Peña (2013c): 24,0 x 17,8		(N= 1)

Pesos

Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 4,0		
Salvador y Salvador (2012): 3,6 a 4,2	X= 3,9	(N= 10)
De la Peña (2013c): 4,025		(N= 1)
De la Peña (2013c): cáscara 0,26		(N= 1)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Comisuras amarillas y el interior de la boca amarillo fuerte.

Observaciones
Salvador y Salvador (1988). La pareja alimenta a los pichones.

Salvador y Salvador (2012). Dos nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.

Más información:
Salvador y Salvador (2012)

Depredadores
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Córdoba, Salvador (2017a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal jaspeada de oscuro. Cola erecta, parda con canela.
Se diferencia del Espartillero pampeano por tener menor proporción de canela en la cola. Además tiene distinta distribución geográfica.
Del Espartillero austral por no tener punteado el pecho, cola más larga y por su distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes wyatti cuchacanchae (Chapman, 1921) en el norte de Salta; *Asthenes wyatti lilloi* (Oustalet, 1904) en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y *Asthenes wyatti sclateri* (Cabanis, 1878) en las sierras de Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Se distinguen 2 poblaciones separadas, una en los Andes de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina y otra en las Sierras de Córdoba / Serranías Centrales en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asthenes wyatti cuchacanchae (Chapman, 1921)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Asthenes wyatti lilloi (Oustalet, 1904)

Catamarca
Citas: Brandán y Antelo (2001); Carma (2009); Navas y Bó (1982); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Navas y Bó (1982); Nores (1995); Salvador (1990a)

Salta
Citas: Chebez et al. (1998); Höy (1969a, 1975); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Nores (1995); Nores y Salvador (1996)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Lucero (1983); Navas y Bó (1982); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Asthenes wyatti sclateri (Cabanis, 1878)

Córdoba
Citas: Cabanis (1878); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Höy (1973a, 1965); Miatelo et al. (1999); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1982); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1983); Ordano (1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador y Bodrati (2011); Salvador (2017a); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, dpto. San Alberto, 05-12-1981; 25-11-1990)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995)

CANASTERO PÁLIDO *Asthenes modesta* (Eyton, 1851)

Otros nombres: Canastero. Canastero de la patagonia. Canastero de manto pálido. Chercán de la cordillera. Chiru-chiru. Coludo austral.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 3 X= 14,0 g (Rango: 13,0 a 15,0)
Navas y Bó (1987a): N= 9 (M) X= 15,5 g (Rango: 13,2 a 17,2); N= 3 (H) X= 15,1g (Rango: 14,4 a 16,5) (*navasi*)
Navas y Bó (1987a): N= 6 (M) X= 19,0g (Rango: 16,3 a 21,7); N= 4 (H) X= 19,4 g (Rango: 17,5 a 22,7) (*modesta*)
Salvador (1988): N= 1 (?) 15,0 g
Salvador (1990a): N= 3 (?) 18,5, 20,5 y 21,5 g
Navas y Bó (1990); N= 1 (M) 16,5 g
Camperi (1992c): N= 1 (H) 15,0 g
Christie et al. (2004): N= 1 15 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 14 X= 15,5 g (Rango: 14 a 20 g) (*modesta*)
Salvador et al. (2017): N= 2 (?) 19,3 y 21,1 g (*cordobae*)

Coloración. Pico pardo negruzco, con la base de la mandíbula más clara. Patas pardas o pardo oscuras. Iris pardo. Dorsal gris pardusca. Cejas ocráceas. Mancha naranja en la garganta punteada de blanco.Ventral gris ocrácea. Alas pardas con banda canela. Cola castaña con los vexilos internos pardos oscuros.

COMPORTAMIENTO
Bastante terrícola, corre con la cola erecta.

Alimentación
Olrog (1956). **Insectos:** Coleópteros.
Zotta (1932). **Insectos:** Himenópteros (hormigas). Ortópteros (Blatidae).

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su canto es un Chichichi . chiri . chiri...chichichi . chiri . chiri. Compuesto por tres sílabas, la primera más larga y las otras dos más cortas.

HÁBITAT
Estepas patagónicas y altoandinas. Serranías, terrenos montañosos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Chubut, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Construye el nido con pajitas, lanas, pelos y plumas. Lo ubica en oquedades, cuevas, entre piedras o entre raíces de arbustos o en nidos abandonados o semidestruidos de otras aves (principalmente de furnáridos). Oculto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Dinelli en Tucumán, nido en huecos, pichones.
Contreras (1979d). Mendoza. Nido.
Vaurie (1980). Pemberton en Río Negro, 22 de setiembre a 22 de octubre de 1911, 12 nidos.
Contreras (1980f). Los Gigantes, Córdoba, 18-12-1982, nido en un hueco entre rocas, 2 huevos.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba. 21-12-1986, nido con 2 pichones y un huevo.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nido en diciembre.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, 16-01-1988, nido con 2 pichones; 24-11-1996, nido con 3 pichones.
Marinero y Cortez (2012). Cordillera de los Andes, dpto. Calingasta, San Juan, 2008, nido en construcción en hueco.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 30-11-1978, 2 huevos; Abra Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1979, 2 pichones; San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río Negro, 03-11-1979, 2 pichones; Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 04-11-1979, 2 pichones; Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 05-12-1981, 2 pichones; Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 18-12-1982, 2 huevos; Pampa de Achala, 25-11-1990, 3 huevos.
Uranga en De la Peña (2019b). Laguna del Diamante, dpto. San Carlos, Mendoza, 22-12-2017. Nido en un hueco entre el piso y una vega, 2 huevos.
Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Nacional El Leoncito, dpto. Calingasta, San Juan. El 13 de enero 1999 se halló y confirmó un nido activo de esta especie, en la terraza alta del arroyo El Leoncito, en la margen opuesta al área operativa de la Reserva a 2.375, m.s.n.m., este sector es dominado por plantas de los géneros *Atriplex* y *Larrea*, el nido se encontraba dentro de un pequeño cañon de esta terraza, con una profundidad de 2, 10 m. y 9, 60 m. de pared a pared. El mismo estaba sobre una Mata Zampa rodeada por una Jarilla (*Larrea nitida*), aunque ambas plantas funcionaban como sostén (sobre tres ramas principales de *Atriplex*, una de las cuales estaba dentro de la maza del nido y una de Larrea.), a una altura de 1,08 m. En días previos (9 de enero), se había visto un ejemplar adulto ingresando al citado nido portando alimento, el día 13 se observó un pichón en la boca del nido al ser alimentado por un adulto que efectuaba continuos viajes, ausentándose por cortos períodos, en uno de estos viajes el pichón salió del nido y fue alimentado fuera de este, minutos después emitiendo voces ásperas de reclamo siguió volando con dificultad al adulto hasta matas cercanas. Este nido (posiblemente de Furnárido) se colectó.
Detalles: Medidas nido: perimetro: 60cm., altura: 24 cm., largo: 36 cm. Forma: Globular algo alargada y desprolija e irregular.
Materiales: Principalmente palitos no espinosos sueltos y ramillas completas de Mata Zampa de diversa medida, en menor medida palitos pertenecientes a plantas de los géneros *Larrea* y *Baccharis*, interiormente, (cámara) en la parte blanda hojas secas, inflorecencias y frutos de diversas plantas (*Tessaria*, *Senecio*, *Baccharis, Larrea*, *Atriplex*), diminutas cortezas de Jarilla y Mata Zampa, ligadas a la armazón de la parte blanda con telarañas, importante cantidad de plumas de distintos tamaños de columbidos de los géneros, *Zenaida* y *Metropelia*, también plumas de *Carduelis* y Furnáridos.

Los Gigantes. Córdoba. 18-12-1982

Abra pampa. Jujuy. 22-02-1979. Ubicación nido

Laguna del Diamante. Mendoza. 22-12-2017. Fotos: Máximo Uranga

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Salvador y Salvador (1988): 21,8 x 16,2		
De la Peña (2013c): 22,0 a 22,2 x 16,4 a 16,9	X= 22,1 x 16,6	(N= 2) (*modesta*)
De la Peña (2013c): 20,0 a 23,0 x 15,3 a 15,9	X= 21,3 x 17,6	(N= 5) (*cordobae*)

Pesos

De la Peña (2013c): 2,33 a 2,60	X= 2,47	(N= 5) (*cordobae*)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,14 a 0,15	X= 0,14	(N= 5) (*cordobae*)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,16 a 0,18 X= 0,17 (N= 2) (*modesta*)

PICHONES

Descripción

Salvador y Salvador (2012). Comisuras amarillas y el interior de la boca amarillo fuerte.
La alimentación estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.

Observaciones

Navas y Bó (1987a). Pampa de Achala, Córdoba, 13-11-1963, hembra con un huevo formado y 15-11-1963, otra con 3 huevos formados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Mancha gular anaranjada. Larga cola que lleva erecta.
Se diferencia del Canastero coludo por tener el pico más grande, distinta distribución de los colores de la cola y por su comportamiento.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asthenes modesta modesta (Eyton, 1851) entre los 2500 y los 3500 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan; *Asthenes modesta hilereti* (Oustalet, 1904) en Tucumán y Catamarca (Aconquija y cumbres Calchaquíes); *Asthenes modesta serrana* Nores 1986 a más de 3000 metros de altura en La Rioja; *Asthenes modesta cordobae* Nores e Yzurieta, 1980 en Córdoba y San Luis y *Asthenes modesta navasi* (Contreras, 1979) desde San Juan, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Por la cordillera de los Andes entre 2500 y 3500 metros de altura en Perú, Bolivia y toda la Argentina hasta Santa Cruz.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asthenes modesta modesta (Eyton, 1851)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Navas y Bó (1987a); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Jujuy

Citas: Alderete y Capllonch (2010); Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1933); Lönnberg (1903); Mamaní et al. (2018); Monteleone y Roesler (2005); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897); Zotta (1932)

Salta

Citas: Alderete y Capllonch (2010); De la Peña (1983c, 2013c); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Bodrati et al. (2003); Contreras y Davies (1980); Contreras (1978, 1980f, 1980j); Chebez (1994); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987, 1996b); Haene et al. (1995); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1987a, 2001); Nores (1995); Nores e Yzurieta (1982); Nores y Salvador (1996); Ortiz y Murúa (1994); Ortiz et al. (2016)(*); Reed (1914)

Asthenes modesta hilereti (Oustalet, 1904)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Dinelli en Hartert y Venturi (1909); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Olrog (1949, 1979); Ortiz et al. (2013c)

Asthenes modesta serrana Nores 1986

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1907); Nores (1986, 1995)

Asthenes modesta corbobae Nores e Yzurieta, 1980

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1980a); Ordano (1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Salvador et al. (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores e Yzurieta (1985)

Asthenes modesta navasi (Contreras, 1979)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (1992); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas y Bó (1987a); San Cristóbal y Moschione (1987)

Chubut
Citas: Contreras (1979d, 1980f); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Harris (2008); Navas y Bó (1987a); Pagnoni (2012a); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegrnthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Contreras (1979d, 1980f); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2011, 2019); Ferrer (2016); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (1987a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982; Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1979d, 1980f); Feinstein (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas y Bó (1987a, 1990); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Acerbo (2000); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Christie (1998); Christie et al. (2004); De la Peña (2013c); Feinstein (1999); Gelain (2012b); Llanos et al. (2011); Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Paz Barreto (1997b); Povedano (2016)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Lucero (2013i); Navas y Bó (1987a)

San Luis
Citas: Nores e Yzurieta (1985); Salvador (1990a)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1979d, 1980f); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Imberti en Darrieu et al. (2009); Imberti y Albrieu (2001); Navas y Bó (1987a); Straneck (1990a)

Santa Fe

Observaciones: Straneck (Wildermuth, dpto. San Martín, 20-08-2000)

CANASTERO COLUDO *Asthenes pyrrholeuca* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Canastero. Canastero chico. Canastero cordillerano. Canastero común. Canastero de cola larga. Coludo. Coludo de gargantilla. Coludo del Sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 14,0 g; N= 3 (?) X= 13,2 g (Rango: 12,5 a 13,5)
Salvador (1990a): N= 1 (M) 14,2 g
Camperi (1992c): N= 2 (M) 14,2 y 14,9 g; N= 6 (M) X= 12,2 g (Rango: 12,0 a 13,0); N= 2 (H) 12,7 y 12,0 g
Christie et al. (2004): N= 4 X= 13,8 g (Rango: 13,0 a 14,5)
Blendinger (2005): X= 13,2 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 7 X= 12,2 g (Rango: 11 a 14)
Alderete y Capllonch (2010): N= 5 X= 12 g (Rango: 9 a 16 g)
Alderete y Capllonch (2010): N= 2 X= 18,5 g (Rango: 18 a 19)
Salvador (2014a): N= 6 (?) X= 12,8 g (Rango: 12 a 13,8)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 14 g

Coloración. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula cornea con ápice pardo. Patas pardo violáceas. Iris pardo oscuro.
Corona y garganta grises. Mancha gular canela. Dorsal y ventral pardas grisáceas. Alas pardas con banda canela. Cola parda con las plumas externas castañas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en grupos.

Alimentación
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae,Chrysomelidae). Diptera. Hemiptera. Hemípteros (Membracidae).
Grigera (1982). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae: Brachiderinae, Scarabaeidae: Melolontinae). Diptera. Hemiptera (Lyguaeidae). Hymenoptera (Formicidae). **Vegetales:** Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, no identificado). Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus sporadicus*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Estepas arbustivas y patagónicas y vegetación palustre.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

El nido es redondeado u ovoidal, boca lateral con corto túnel de entrada. Emplea palitos. Internamente materiales vegetales suaves, pelos, lanas y plumas. Lo ubica en arbustos o en matorrales. Expuesto. Elaborado.

Durnford (1877a). Chubut. Nido.

Wetmore (1926b). Dpto. Gral. Roca, Río Negro, 03-12-1920, 2 huevos.
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, noviembre, 3 ó 4 huevos.
Nores e Yzurieta (1975). Córdoba. Nido.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.
Nores e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Bañados del río Dulce, Córdoba, octubre, 4 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Cardenal Cagliero, pdo. Patagones, Buenos Aires, 14-12-1972, 3 huevos.
Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Altos de Chipión, dpto. San Justo. Córdoba, 27-11-1980, 2 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Tunuyán, dpto. Tunuyán, Mendoza, 23-11-1982, 3 huevos; El Salto, dpto. Luján, Mendoza, 20-11-1982, 2 huevos.
Salvador y Salvador (1984). Pedro Luro, pdo. Villarino, Buenos Aires, 2 huevos propios y 5 de *Molothrus bonariensis*;
Vuilleumier (1993b). Chubut. Nido.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 2 nidos.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidos en noviembre.
De la Peña (2013c). San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río Negro, 03-11-1979, 2 pichones; Junín de los Andes, dpto. Huiliches, Neuquén, 26-11-1998, un huevo. Llancanelo, dpto. Malagüe, Mendoza, 15-10-2004, nido con 3 pichones y un huevo.
Medidas: Largo total: de 30 a 35 cm. Ancho: de 15 a 17 cm. Diámetro de la boca: de 3 a 4 cm. Largo del túnel: 15 cm. Diámetro interno de la cámara: 10 cm.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Chubut. Nido.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Smyth (1928): 20,5 a 21,5 x 15,5
Wetmore (1926b): 18,0 a 18,4 x 14,4 a 14,6 X= 18,2 x 14,5 (N= 2)
Nores e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 18,7 a 19,1 x 14,4 a 15,1 X= 18,9 x 14,7 (N= 4)
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 17,3 a 18,3 x 14,3 a 14,4 X= 17,9 x 14,3 (N= 3)
Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983): 18,6 a 19,2 x 14,0 a 14,3 X= 18,9 x 14,1 (N= 2)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 18,3 a 19,8 x 14,2 a 15,7 X= 18,7 x 15,0 (N= 5)

De la Peña (2013c): 19,0 a 20,0 x 14,5 a 15,8 X= 19,5 x 15,1 (N= 2)

Pesos

Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,4

De la Peña (2013c): 2,1	X= 2,1	(N= 2)
De la Peña (2013c): cáscara 0,085	X= 00,85	(N= 2)

PICHONES

Descripción.

De la Peña (2013c). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillos. Plumón gris, fino, en la cabeza y dosalmente.

Otros

Salvador y Salvador (1984). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico fino. Mancha gular canela. Cola larga.

Diferenciarlo del Canastero pálido y del Canastero chaqueño.

La Gallareta. Santa Fe. 24-07-1972

Llancanelo. Mendoza. 15-10-2004

Lago Epulafquen. Neuquén. 02-01-2016 Foto: María Fernanda Gauna

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca (Vieillot, 1817) en Córdoba y sureste de Buenos Aires, este de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En otoño migra a las provincias del noreste; *Asthenes pyrrholeuca sordida* (Lesson, 1839) en San Juan, Mendoza, Neuquén y oeste de Río Negro. En otoño migra por el oeste hasta Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Nidifica en Argentina y Chile. Migra en invierno hacia provincias norteñas en Argentina, llegando hasta Uruguay, Paraguay, y Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Holland (1923); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Klimaitis (1993); Marelli (1933); Maugeri (2002b); Morici (2014); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Salvador (1984); Salvador y Di Giacomo (2014); Zapata (1998)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Hartert y Venturi (1909); Pagnoni (2012a, 2012b); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995); Vuilleumier (1993b)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Narosky (1971); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996) (*); Nores e Yzurieta (1975, 1980b); Pereyra (1927e); Salvador (1983); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1888); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Rosa de Calamuchita, dpto. Calamuchita, 18-01-1979; Morteros, dpto. San Justo, 18-09-1989)

Corrientes

Citas: Contreras (1987b); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Wetmore (1926b)

La Pampa

Citas: Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1927); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Blendinger (2005); Contreras y Fernández (1980); De la Peña (2013c); Ferrer (2016); Ferrer et al. (2019); Narosky et al. (1983)

Misiones
Citas: Chebez et al. (1989); Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); De la Peña (2013c); Gorgoglione (2005)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); De la Peña (2013c); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Paz et al. (2003); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

San Luis
Citas: Bo (1965); Masramón (1971, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988a, 1998); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Hellmayr (1925); Imberti (2005e); Sclater (1874)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013d); Pautasso (2002, 2002b)

Santiago del Estero
Citas: Capllonch et al. (2015a); Nores et al. (1991) (*), Salvador (1988)

San Juan
Citas: Blendinger (2005); Camperi y Darrieu (2004); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Ortiz et al. (2016)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2015a); Ortiz et al. (2013c)

Asthenes pyrrholeuca sordida (Lesson, 1839)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Salvador (1990a)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Straneck (1990a)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Esteban (1953); Salvador (1988)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907); Hartert y Venturi (1909); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Barros (1930); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); De la Peña (2013c); Fitzgerald (1899); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Marone (1992a); Navas y Bó (2001) (*); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); De la Peña (2013c); Del Valle et al. (1989); Doering (1881); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); De la Peña (2013c); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera (1982); Grigera y Pavic (2007); Llanos et al. (2011); Pereyra (1951); Peters (1923b); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2001)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2015a, 2020); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011)

CANASTERO QUEBRADEÑO *Asthenes heterura* (Berlepsch, 1901)

Otros nombres: Canastero andino. Canastero de la quebrada. Canastero maquis. Canastero puneño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.

Coloración. Pico pardusco, base de la mandíbula rosada. Patas grises verdosas. Iris pardo.
Dorso pardo rojizo. Garganta rojiza punteada de blanco. Ventral parda grisácea. Alas pardas rojizas. Cola rojiza con las plumas centrales pardas oscuras.

HÁBITAT
Arbustales en zonas áridas montañosas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardo con la garganta rojiza con puntos blancos.
Diferenciarlo del Canastero coludo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asthenes heterura (Berlepsch, 1901) en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra en los Andes del oeste de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Di Giacomo et al. (2007); González et al. (2011); Mamaní et al. (2018); Mazar Barnett et al. (1998a); Mazar y Pierman (2001); Monteleone y Roesler (2005); Moschione (2005); Pierman (2001); Poverano en Chebez (2008)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Pearman (2001)

Tucumán
Citas: Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Pearman (2001)

PAJONALERA PICO RECTO *Limnoctites rectirostris* (Gould, 1839)

Otros nombres: Hornerita chica. Pajera de pico recto. Pajera pico recto.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 16 y 18,5 g; N= 1 (H) 21 g
Olson et al. (2005): N= 5 (?) X= 19,2 g (Rango: 15,6 a 24,5)

Coloración. Pico negruzco, base de la mandíbula más clara. Patas gris verdosas. Iris naranja rojizo. Dorsal parda olivácea. Cejas y parte ventral blancas. Flancos parduscos. Alas pardas y castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zorrilla de San Martín (1963). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros. Homópteros. Lepidóptera.

HÁBITAT
Juncales, pajonales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Globoso, alargado en sentido vertical. La boca en la parte lateral-superior. Es construido con fibras vegetales. Internamente fibras suaves, pelusas.

Pereyra (1938b). Campana, pdo. Campana, Buenos aires, 6 de enero, nido con un pichón. Daguarre, en Paranacito, Entre Ríos, el 17-11-1931, encontró un nido con un huevo.
Ricci y Ricci (1984). Benavidez, pdo. Tigre, Buenos Aires, 23-10-1983, nido con 3 huevos.
López Lanús et al. (1999). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nidos a mediados de setiembre. Nido parasitado por *Molotrhus bonariensis*.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 8 nidos entre setiembre y enero, de 2 a 4 huevos.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Ricci y Ricci (1984): 20,2 a 20,4 x 15 a 15,5 X= 20,3 x 15,3 (N= 3)

Otros
López Lanús et al. (1999)**.** Ambos sexos incuban.
Babarskas et a. (2003). Anfitrión de *Molotrhus bonariensis*.

Más información:
López Lanús et al. (1999)

Depredadores
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Buenos Aires, Babarskas et al. (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, recto. Cejas y ventral blancas. Cola con plumas en puntas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limnoctites rectirostris (Gould, 1839) en el sur de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área de distribución muy reducida, en sureste de Brasil, Uruguay y este de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Babarskas y López de Casenave (1998); Babarskas y Fraga (1998); Darrieu y Camperi (2001a); López Lanús et al. (1999); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938a, 1938b); Ricci y Ricci (1984); Veiga (2005)

Entre Ríos
Citas: Babarskas y Fraga (1998); Beltzer et al. (2006); Daguerre en Pereyra (1938); Daguerre (1933); Olrog (1979)

CURUTIÉ OCRÁCEO *Cranioleuca sulphurifera* (Burmeister, 1969)

Otros nombres: Cachilito. Coludito garganta amarilla. Curutié pardo. Garganta amarilla. Pajerito de garganta amarilla. Trepadorcito ocráceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Camperi (1992a): N= 2 (M) 14,1 y 15,5 g; N= 2(H) 14,0 y 14,9 g
Camperi (1992b): N= 2 (M) 14,1 y 15,5 g; N= 2 (H) 14 y 14,9 g

Coloración. Pico negruzco, base de la mandíbula más clara. Patas grises verdosas. Iris rojizo.
Dorsal parda con tono canela. Cejas ocráceas. Mancha gular amarilla. Ventral grisácea. Cubiertas castañas y pardas. Alas pardas y canelas. Cola parda con tono castaño.

COMPORTAMIENTO
Solitario o en pareja.

Alimentación

HÁBITAT
Juncales, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

El nido es redondeado o alargado en sentido vertical, de fibras vegetales. En la cámara coloca plumas. Lo ubica a baja altura en plantas acuáticas o de bañados. También ocupa la base de nidos de *Phleocryptes melanops*. A baja altura. Expuesto. Elaborado.

Gibson (1918). Buenos Aires. Nido.
Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.
Grand (1911a). Pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, 3 huevos.
Pereyra (1938b). Pdo. Gral Lavalle, Buenos Aires, nidos de octubre a diciembre, 4 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Pdo. San Vicente, Buenos Aires, 15-11-1970, 5 nidos: uno en construcción, uno con un huevo, otro con 2, otro con 3, otro con 3 huevos; el 22-11-1970, 4 nidos: uno en construcción, uno con un huevo, uno con 3 huevos, otro con 2 pichones y un huevo; 28-09-1976, 2 huevos.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando. Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en octubre y otro en noviembre con 3 huevos.
DECB (2011). Buenos Aires. Nido.
De la Peña (2013c). San Javier, dpto. San Javier, Santa Fe, 02-12-1981, 2 nidos, uno con 3 huevos y el otro con 2. Los dos nidos estaban en una mata de Paja brava, a 40 cm. del suelo. En uno de los nidos observados, a los pocos minutos el ave tiró uno de los huevos al suelo.
Medidas: Alto: de 18 a 19 cm. Ancho: de 11 a 12 cm. Ancho antero-posterior: 14 cm. Diámetro de la boca: 3,5 cm. Diámetro interno de la cámara: de 7 a 9 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.

San Javier. Santa Fe. 02-12-1981

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

(MACN): 19,7 a 19,9 x 15,4 a 15,9	X= 19,8 x 15,7	(N= 3)
Hartert y Venturi (1909): 19,0 a 20,0 x 14,0 a 15,5		
Pereyra (1938b): 22,0 x 16,0		
Narosky en Narosky et al. (1983): 18,3 a 19,3 x 14,9 a 15,9	X= 19,2 x 15,4	(N= 8)
De la Peña (2013c): 19,0 a 19,9 x 14,9 a 15,5	X= 19,6 x 15,2	(N= 5)

Pesos

Gibson 81918): 2,35		
De la Peña (2013c): cáscaras 0,127 a 0,129	X= 0,128	(N= 2)

Otros
Darrieu et al. (1988). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal parda. Ventral grisácea. Cejas finas ocráceas. Mancha gular amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cranioleuca sulphurifera (Burmeister, 1969) en el sur de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y noreste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sureste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Grant (1911a); Hartert y Venturi (1909); Hudson

(1872); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Petracci et al. (2004); Straneck (1990c)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Tittarelli (2002)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Navas y Bó (1988b)

Río Negro
Citas: Povedano (2016)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2013c, 2011); Pautasso (2002)

CURUTIÉ BLANCO *Cranioleuca pyrrhophia* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Cachilito. Coludito trepador. Curutié de cabeza estriada. Curutié vientriblanco. Trepador. Trepadorcito. Trepadorcito de vientre blanco. Trepadorcito garganta amarilla.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 13,0 g
Salvador (1988): N= 1 (?) 11,7 g
Camperi (1992c): N= 2 (M) 12,5 y 13,5 g; N= 3 (H) 12,0, 12,0 y 12,7 g
Blendinger (1999) 11,0 g
Blendinger (2005): X= 10,8 g
Camperi y Darrieu (2005): N= 1 (H) 12,0 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 28 X= 11,4 g (Rango: 9,5 a 14)
Salvador (2914a): N=7 (?) X= 12,5 g (Rango: 11,1 a 13,6)

Coloración. Pico: maxila parda, mandíbula corneo rosada con ápice pardo. Patas pardas grisáceas con tinte oliva. Iris pardo anaranjado.
Cabeza parda con estrías oscuras. Cejas blancas. Dorsal parda. Ventral blanca. Alas pardas. Cobijas alares castañas. Plumas centrales de la cola pardas, externas castañas.

COMPORTAMIENTO
Trepa por los troncos y ramas. A veces hurga y picotea, algarrobos, quebracho blanco y chañares, desde 2,50 a 5 m. Construye una estructura con palitos y materiales suaves, con dos bocas dirigidas hacia abajo, que ocupa como dormidero. Lo ubica en las ramas de los árboles.

Alimentación
Martínez et al. (1975). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Elateridae). Lepidoptera (larvas). **Arácnidos:** Araneida.
Genise et al. (1993). **Vegetales:** Savia *Aspidosperma quebracho-blanco*, *Prosopis flexuosa*
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera. Dermaptera. Hemiptera (Coreidae). Hymenoptera (Formicidae: *Solenopsis sacvissima*, *Holcopenera brasiliensis*). Lepidoptera (larvas). Orthoptera (Proscopiidae). **Arácnidos:** Araneae.
Blendinger (1999): **Vegetales:** Savia *Prosopis flexuosa.*

Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Elateridae). Hymenópteros (Formicidae). Lepidóptera (Larva).
De la Peña (2001d). **Insectos:** mariposas.
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:** Coleópteros (Staphylinidae, Buprestidae, Curculionidae Hymenópteros (Formicidae). **Arácnidos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Elateridae, no identificado). Diptera. Hemiptera. Homoptera (Aphidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, polillas). **Arácnidos: (**arañas, ootecas).
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es una serie de sílabas con ligera modulación ascendente y trino final: ti.ti.ti.ti.ti.tiritiritiritiri..

HÁBITAT
Bosques, sabanas, montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

El nido es redondeado, de palitos con y sin espinas. Internamente pajitas, materiales vegetales suaves, plumas, lana. La boca está en el costado, da a la cámara. Lo sostiene en arbustos o en árboles. Expuesto. Elaborado.

Girard (MACN). Suncho Corral, dpto. Matará, Santiago del Estero, 03-12-1907, 2 nidos con 2 y 3 huevos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 2 nidos: 22-10-1922, un huevo, 29-11-1925, 3 huevos.
Pereyra (1937b). Nidifica en La Pampa.
Pereyra (1951). Villa Valeria, dpto. Gral. Roca, Córdoba, 2 nidos.
Pereyra (1951). San Luis. Nido.Nido.
Höy y Ottow (1964). Valle de Lerma, Salta, 14-02-1961, 3 pichones propios y 2 de *Molothrus bonariensis*.
Zapata y Cabrera (1969). Laguna Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, nido con un huevo.
Masramón (1971). San Luis, nidifica.
Höy (1971). Valle de Lerma, Salta, es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Zelich en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 22-10-1970, 4 nidos con 3 huevos y un nido con 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 3 nidos: Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 15-10-1968, 2 huevos; Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 10-12-1969, un huevo y un pichón; Kishka, dpto. La Banda, Santiago del Estero, 14-10-1971, 3 pichones.
Salvador y Fraga en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 29-10-1982, 3 pichones.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Unión, dpto. Gdor. Dupuy, San Luis, 15-11-1982, 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*; 24-11-1982, 3 pichones.
Salvador y Salvador (1984). San Luis. Nido.
Fraga, R. en Fraga y Narosky (1985). Nido.
Haro y Gutierrez (1992). Córdoba. Nido.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Nidifica.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 2 nidos.
Babarskas et al. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con pichones en diciembre.

Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a fines de diciembre. Los 7 nidos observados estaban construídos dentro de matas de claveles del aire. Tres nidos estaban altos, entre 8 y 11 m, cerca de nidos activos de Aguilucho colorado, Milano plomizo y Ñacurutú.
Salvador (2011c). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fandiño y Pautasso (2011). Santa Fe. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 58 nidos. Se reproduce de setiembre a febrero. Postura de 3 huevos.
Salvador y Bodrati (2013c). Entre Ríos, Córdoba. Nidos.
De la Peña (2013c). Se localizaron entre el 03-10-1970 y 03-10-70, 19 nidos en provincia de Santa Fe y 3 en provincia de Córdoba.
Medidas: Alto: de 18 a 20 cm. Ancho: de 20 a 25 cm. Diámetro de la boca: de 3 a 4 cm. Diámetro interno de la cámara de 6 a 7 cm. Nido más bajo: 1,70 m. Nido más alto: 5 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 4 nidos con 3, 3, 3 y 2 huevos cada uno.
Bodrati y Salvador (2015b). Parque Nacional Chaco, dpto. Sargento Cabral, Chaco, 27-11-2015, nido parasitado por *Tapera naevia*.
Schaaf et al. (2015b). Estancia Santo Domingo, cercana a Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, 30-11-2013, nido con 2 huevos.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Salta. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Río Negro. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Formosa, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires. Nidos.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
Bodrati (*in litt*. 2019). Área Natural Protegida Malabrigo, Gral. Almada, Entre Rios, 14-10-2006, 3 nidos activos y 2 dormideros.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Girard (MACN): 19,3 a 21,0 x 14,9 a 15,5	X= 20,0 x 15,2 (N= 5)
Hartert y Venturi (1909): 19,0 a 20,0 x 14,0 a 15,0	
Smyth (1928): 19,0 a 19,5 x 14,0 a 14,5	
Pereyra (1937b): 19,0 x 15,0	
Zapata y Cabrera (1969): 19,2 x 14,5	
Masramón (1971): 19,0 x 14,0	
Zelich en Narosky et al. (1983): 20,1 a 20,9 x 16,1	X= 20,5 x 16,1 (N= 2)
Narosky en Narosky et al. (1983): 18,3 a 20,7 x 14,0 a 16,0	X= 19,4 x 15,0 (N= 5)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 18,4 a 19,3 x 14,3 a 15,2	X= 18,9 x 14,8 (N0 3)
Mezquida (2001b): 19,5 x 14,2	
Di Giacomo (2005h): 16,8 a 18,5 x 13,3 a 15,0	X= 17,8 x 14,2 (N= 7)
Salvador (2013b): 18,6 a 21,1 x 14,1 a 15,7	X= 20,0 x 14,8 (N= 63)
De la Peña (2013c): 18,7 a 20,5 x 13,3 a 15,4	X= 19,9 x 14,4 (N= 15)
Schaaf et al. (2015b):	X= 18,3 x 13,8 (N=2)

Pesos

Mezquida (2001b): 2,2	
Di Giacomo (2005h): 1,3 a 2,1	X= 1,7 (N= 7)
Salvador (2013b): 1,9 a 2,6	X= 2,3 (N= 41)

De la Peña (2013c): 2,5 a 2,6 X= 2,56 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,114 a 0,140 X= 0,131 (N= 10)
Schaaf et al. (2015b): X= 1,8 (N= 2)

Generalidades
Mezquida (2001b). Los huevos son puestos en días alternos. Período de incubación 15 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 15 días. Los huevos son puestos en días discontinuos. La pareja incuba.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 10-11 días. Pone en días alternos. Período de incubación 15 días

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne, con escaso plumón dosal gris claro. Pico amarillento, comisuras amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarillo claro. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. Escaso plumón gris.
1 día. Escaso plumón en la cabeza y dorsal de las alas.
3 días. Se notan vainas en la línea dorsal y ventral. Ojos cerrados.
4-5 días. Abren los ojos.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 1,7 a 2,2 X= 1,92 (N= 10)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 14 a 16 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen dentro de las 24 horas. Permanencia de los pichones en el nido15 días.

Otros
Fraga en Fraga y Narosky (1985). Cruz Chica, dpto. Punilla, Córdoba, 03-12-1983. Cada uno de los miembros de la pareja tiene un dormidero individual a 15 m uno de otro.
Oscar (2011). Un ejemplar con leucismo en la provincia de San Luis.
Salvador y De la Peña en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (2013b). Höy y Ottow (1964). Höy (1971). Salvador (2011c). Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Zelich en Narosky et al. (1983). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). El Dormidero. Es redondeado. Con un túnel y dos bocas de entrada, dirigidas hacia abajo. Es construido con palitos, claveles del aire. Internamente lo forra con pajas, barba de viejo, vilanos de cardos.
Bodrati y Salvador (2015b). Es parasitado por *Tapera naevia*.
De la Peña (Inéd.). Los pichones son afectados por larvas de moscas del género *Philornis*

Depredadores
De pichones y huevos: *Pseudoseisura lophotes* en Entre Ríos, Salvador y Bodrati (2013c)

Más información
Masramón (1971). Höy (1971). Mason (1985). Salvador (2013b). Schaaf et al. (2015b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral y cejas blancas. Corona estriada. Cola con puntas, parda y castaña. Trepa por los troncos y ramas.
Se diferencia del Curutié oliváceo por tener estriada la corona y la parte ventral blanca.

Esperanza. Santa Fe. 11-11-2007

Esperanza. Santa Fe. 13-01-2008

Esperanza. Santa Fe. 13-01-2008

Esperanza. Santa Fe. 14-01-2008. Dormidero

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia (Vieillot, 1818) desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Bolivia, Paraguay, extremo sur de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia (Vieillot, 1818)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Maugeri (2002b); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 11-03-1981)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Bodrati y Salvador (2015b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador 1983, 2013b); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1889); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); White (1883b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Chancani, dpyo. Pocho, 30-03-2003; Marull, dpto. San Justo, 17-09-2004; Ascochinga, dpto. Colón, 18-02-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006); Ordano et al. (1999); Smyth (1928)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Salvador y Bodrati (2013c); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1933); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986); Pereyra (1927e, 1937); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmorw (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Contreras (1979); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida (2001b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Del Valle et al. (1989); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi y Darrieu (2005); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

San Juan
Citas: Fava et al. (2013); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1971, 1983); Narosky et al. (1983); Nellar Romanella (1993); Oscar (2011); Partridge (1953c); Pereyra (1951)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1971); Höy y Ottow (1964); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Alabarce (2002); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983); Mamaní et al. (2017); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Quiroga (2017b)

CURUTIÉ OLIVÁCEO *Cranioleuca obsoleta* (Reichenbach, 1853)

Otros nombres: Coludito ratonero. Ratonero. Trepadorcito oliváceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (M) 13,4 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 18 (M) X= 13,1 g (Rango: 11,0 a 13,9); N= 10 (H) X= 12,6 g (Rango: 12,0 a 14,2)

Coloración. Pico negruzco, base de la mandíbula más clara. Patas grises verdosas. Iris rojizo.
Dorsal parda olivácea. Cejas blancas. Ventral ocrácea. Cobijas alares castañas. Alas pardas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Trepa por las ramas y troncos.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es similar a la del Curutié blanco.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Nido cerrado, globoso con entrada lateral. Oculto.

Castelino y Saibene (1989). Dos Hermanas, dpto. Gral. Belgrano, Misiones, 25-11-1986, nido a 12 m de altura en una rama cubierta de orquídeas. Globoso, con entrada lateral, de musgos ocultoentre las orquídeas. Tenía 3 huevos blancos.

Bodrati, A. en Salvador (2016a). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019). Reserva Natural Cultural Guaraní, Reserva de Biosfera Yaboty, dpto. Guaraní, Misiones, 20-10-2005, nido activo a 5 metros de altura en un *Patagonula americana*, muy oculto entre epífitas, dos individuos ingresando con alimento.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral ocrácea. Cejas blancas. Cola en punta, castaña. Trepa por los troncos.
Diferenciarlo del Curutié blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) en Misiones y norte de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Este de Paraguay, sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Short (1971)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Castelino y Saibene (1989); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Navas y Bó (1988b); Straneck (1990h)

CANASTERO PATAGÓNICO *Pseudasthenes patagonica* (d´Orbigny, 1839)

Otros nombres: Canastero de garganta negra. Canastero de garganta pecosa. Canastero gris. Canastero gris patagónico. Coludito. Coludo de patagonia.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 9 (M) X= 17,9 g (Rango: 14,0 a 26,2); N= 10 (H) X= 16,8 g (Rango: 15,6 a 18,8)
Navas y Bó (1990); N=1 (M) 18,5 g; N=1 (H) 17,8 g
Camperi (1992c): N= 3 (M) 17,0, 17,0 y 18,0 g

Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris pardo.
Dorsal parda grisácea. Garganta blanquecina con estrías negras. Ventral gris. Subcaudales canelas claras. Alas pardas. Cola parda oscura con castaño en las plumas más externas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Contreras (1980a). **Insectos:** Avispas. Coleópteros. Hormigas (*Acromyrmex* sp.). Mosca Syrphidae. Tábano. Tucura. **Arácnidos. Otros:** Arena gruesa.

HÁBITAT
Estepas arbustivas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Río Negro, Chubut, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

El nido tiene forma globular, con túnel alargado. Emplea palitos. Forra la cámara con materiales vegetales suaves.

Wetmore (1926b). Dpto. Gral. Roca, Río Negro, 24-12-1920, 3 huevos.
Contreras (1980i). Puesto Chañar, dpto. Las Heras, Mendoza, 25 de diciembre, 3 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Carmen de Patagones, pdo. Patagones, Buenos Aires, 16-12-1972, 3 huevos propios, uno de *Molothrus bonariensis* y 2 pichones (?); 17-10-1974, nido en actividad.
Narosky en Narosky et al. (1983). Trelew, dpto. Rawson, Chubut, 11-10-1974, 2 huevos.
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 16-11-1983, 3 nidos con 2 con 3 huevos y uno con 1; 22-11-1983, uno con 3 huevos y otro con 4; Pto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 20-11-1983, dos nidos con 2 huevos y otro con 4.
Narosky (1983b). Buenos Aires. Nido.
Vuilleumier (1993b). Chubut. Nido.
Delhey y Pérez (2013). Chubut. Nido.
Salvador y Eroles en Salvador (2016a). Chubut. Nido.
Sainz-Trápaga en De la Peña (2016d). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 29-12-2014, nido.

Puerto Madryn. Chubut. 29-12-2014. Foto: Santiago Sainz-Trápaga

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Wetmore (1926b): 20,1 a 20,9 x 14,5 a 15,1 X= 20,5 x 14,8 (N= 2)
Contreras (1980i): 19,4 a 21,2 x 15,0 a 15,8 X= 20,3 x 15,4 (N= 2)
Narosky en Narosky et al. (1983): 21,2 a 21,3 x 15,4 a 15,5 X= 21,2 x 15,4 (N= 2)
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 19,5 a 21,4 x 14,9 a 15,3 X= 20,4 x 15,2 (N= 11)

Pesos
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 2,35

Otros
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Grisáceo con estrías negras en la garganta. Cola oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pseudasthenes patagonica (d´Orbigny, 1839) en San Juan, Mendoza, Neuquén, sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico del sur de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); D´Orbigny (1835/44); Darrieu y Camperi (2001a); Hudson (1872); Narosky (1983); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987)

Chubut
Citas: Contreras (1980i.); Delhey y Pérez (2013); Harris (2008); Narosky en Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Pagnoni (2012a); Sainz-Trápaga (2014); Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 06-11-1973)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Navas y Bó (1986, 1987a); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1980i); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Navas y Bó (1987a); Martínez et al. (1997a); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1980); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1925); Matarasso (2007); Narosky et al. (1983); Olrog (1979); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Contreras (1980i); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005, 2011); Navas y Bó (1987a, 1990); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Wetmore (1926b)

San Juan
Citas: Navas y Bó (1987a)

Santa Cruz
Citas: Ridgely y Tudor (1994); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005)

CANASTERO CASTAÑO *Pseudasthenes steinbachi* (Hartert, 1909)

Otro nombre: Coludo de garganta blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 2 (M) 18,9; 19,6 g; N= 1 (H) 19,3
Salvador (1990a): N= 1 (M) 19,5 g
Blendinger (2005): X= 16,5 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 4 20,5 g
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 19 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas pardas. Iris pardo.
Cabeza y dorsal pardaos. Rabadilla castaña. Ventral ocrácea. Flancos y subcaudales canelas claros. Alas pardas con castaño en las secundarias. Los dos pares de plumas externas de la cola castaños, centrales pardas oscuras.

HÁBITAT
Áreas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, La Rioja, Mendoza.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

El nido es una estructura globular de palitos.

Höy en Narosky et al. (1983). Cordillera de Salta, 14-01-1981, nido en cardón a 2 m del suelo.
Salvador (1992). Agua blanca, dpto. Castro Barros, La Rioja, 01-11-1985, nido en un arbusto, a 1,50 m del suelo. Forma oval, de 34 cm de altura, 28 cm de ancho, boca de entrada en la parte superior de 5 cm de diámetro. La cámara de 9 cm de diámetro esteba revestida con gramíneas, dertitos vegetales y plumas. Tenía 3 huevos.
Uranga, M. (*in litt*.). Pareditas, dpto. San Carlos, Mendoza. 15-01-2019. Nido.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

Medidas
Höy en Narosky et al. (1983): 19,8 a 20,0 x 15,8 X= 19,9 x 15,8 (N= 2)
Salvador (1992): 20,2 a 21,2 x 15,3 a 16,5 X= 20,9 x 15,8 (N= 3)

Pesos
Salvador (1992): 2,6, 2,65 y 2,55

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Rabadilla castaña. Plumas externas de la cola castañas.
Difícil de diferenciar del Canastero rojizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pseudasthenes steinbachi (Hartert, 1909) Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, oeste de San Luis, Neuquén y Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Especie endémica del Desierto de Monte de Argentina distribuyéndose en la pendiente este de los Andes desde Salta hasta Neuquén y Río Negro.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Dabbene (1918d.); Navas y Bó (1987a); Salvador (1990)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); De la Peña (2013c)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Chebez (2005); Di Giácomo et al. (2007); Hayward (1967); Lobo Allende et al. (2009, 2010); Lobo Allende y Juri (2008); Navas y Bó (1987a, 1987b); Salvador (1992); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Bianchini y Arenas (2013b); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Navas y Bó (1987a); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Areta et al. (2012a); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Areta et al. (2012a); Povedano (2016)

Salta
Citas: Hartert y Venturi (1909); Narosky et al. (1983)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Blendinger (2005); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1987); Ortiz et al. (2016)

San Luis
Citas: Clark en Nellar Romanella (1993); Contreras (1979b); Nellar Romanella (2006)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2011b, 2020); Esteban (1953); Handford (1983); Lucero (1983); Olrog (1949); Ortiz et al. (2013c)

ESPARTILLERO ENANO *Spartonoica maluroides* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Canasterito. Canastero enano. Coludo enano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Camperi (1992a): N= 1 (M) 13,3 g; N= 1 (H) 11,6 g
Cardoni et al. (2009): (M) X= 12 g (Rango: 11 a 13,5); (H) X= 11,8 g (Rango: 10,5 a 14)
Salvador (2014a): N= 1 (?) 11,9 g

Coloración. Pico: maxila corneo oscura, mandíbula corneo grisáceo clara. Patas corneo grisáceas. Iris amarillo. Frente y anterior de la corona castañas. Cejas blanquecinas. Dorsal parda olivácea con grueso jaspeado negro. Ventral blanquecina con leve tono canela en el pecho, flancos y subcaudales. Alas pardas con banda canela. Cola castaña con banda parda oscura a lo largo de las plumas centrales.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros. Himenópteros. Neurópteros.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Diptera. **Arácnidos:** arañas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). El canto es agudo y chirriado con un arco de modulación ascendente y descendente: tchrrrrriiirrrrrrrhh ... tchrrrrriiirrrrrrrhh. Similar a un insecto.

HÁBITAT
Pajonales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

Construye el nido en el suelo, en la base de gramillas o de juncos. Abierto, emplea materiales vegetales.

Durnford (1878b). Buenos Aires, hacen nidos en el centro de espesos mechones de paja, que crecen en el agua, hace una estructura abierta, forrada con algunas plumas y un poco de lana.
Grand (1911a). Ajó, pdo. de la Costa, Buenos Aires, 3 huevos.
Gibson (1918). Buenos Aires. Nido.
Daguerre (1922). Buenos Aires. Nido.

Runnacles (MLP). 6 nidadas, Gral. Lavalle, pdo. Buenos Aires: 03-11-1932, 3 huevos; 11-11-1932, 3 huevos; 21-12-1932, 3 huevos; 27-12-1932, 3 huevos; 10-12-1933 4 huevos y 17-12-1933 2 huevos.
Pereyra (1933b). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, en diciembre, nido con 3 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos en octubre.
Narosky (1973c). Pdo. de San Vicente, Buenos Aires, 3 nidos: 02-12-1970, 3 pichones y un huevo, 23-11-1971, 4 pichones, 03-12-1971, 3 pichones.
Nores e Yzurieta (1979c). Córdoba. Nido.
Runnacles en Fraga y Narosky (1985). Buenos Aires. Nido.
Llambías et al. (2009). Provincia de Buenos Aires (36º 25´S, 56º 58´W), 42 nidos entre 2004 y 2007.
Cardoni et al. (2012, 2015a). Buenos Aires. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizó un nido, el 28-09-2000, con 2 pichones.
Runnacles en Segura et al. (2014b). Buenos Aires. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Nores e Yzurieta en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
(MACN): 17,4 a 17,8 x 12,7 a 13,8 X= 17,6 x 13,4 (N= 3)
Runnacles (MLP) en Fraga y Narosky (1985): 15,9 a 18,5 x 13,7 a 15,1 X= 17,7 x 14,0 (N= 18)
Hartert y Venturi (1909): 17,0 x 14,0
Pereyra (1933b): 19,0 x 16,5
Pereyra (1938b): 19,0 x 15,0 a 16,0

Generalidades
Llambías et al. (2009). El período de incubación es de 13 días.

Más información:
Llambías et al. (2009), Cardoni et al. (2015)

Depredadores
De adultos: *Circus cinereus* en Buenos Aires, Baladrón et al. (2012), *Caracara plancus* en Buenos Aires, Vargas et al. (2007), *Falco peregrinus* en Buenos Aires, Notarnicola y Seipke (2004)
Mamíferos: Gato montés (*Leopardus geoffroyi*) en Buenos Aires, Canepuccia et al. (2007)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente, banda alar y larga cola en puntas castañas. Dorsal muy estriada. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Spartonoica maluroides (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, La Pampa y Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sur de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Baladrón et al. (2012); Canepuccia et al. (2007); Codesido et al. (2013); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De Francesco (2005); Durnford (1878); Fiameni (1994); Gasparri et al. (2018); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Llambías et al. (2009); Narosky y Di Giacomo (1993); Notarnicola y Seipke (2004); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1933b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Sclater (1890); Straneck (1990b); Vargas et al. (2007); Veiga (2005)

Chaco
Citas: Nores e Yzurieta (1995)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987, 1987b); Darrieu (1986); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Olrog (1979); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); López-Lanús et al. (2013c); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Nores e Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999)

Mendoza
Citas: Contreras (1979); Ferrer et al. (2019)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Giraudo et al. (2003)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Di Giacomo et al. (2001); Fandiño y Pautasso (2011); Manassero y Luna (2009a); Maugeri et al. (2009); Pautasso (2002); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

CACHOLOTE CASTAÑO *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853)

Otros nombres: Alonso grande. Cachalote. Cachilote. Cacholote. Caserote. Caserote castaño. Cherloco. Chorloca. Chuchumento. Colla. Comehuevos. Coperote. Coperote castaño. Capirote. Hornero copetón. Hornero grande. Hornerote. Rúa.

DESCRIPCIÓN
Largo: 26 cm.
Peso: Navas y Bó (1987a): N= 2 (M) 70,1; 85,3 g; N= 1 (H) 65,9 g

Contreras y Davies (1980): N= 4 (M) X= 82,7 g (Rango: 76,8 a 88,7); N= 4 (H) X= 75,50 g (Rango: 69,3 a 80,1)
Camperi (1992a): N= 2 (M) 91,8 y 101,3 g; N= 1 (H) 78,1 g
Blendinger (1999): 64,0 g
Blendinger (2005): X= 66,5 g
Camperi y Darrieu (2005): N= 3 (M) 82,3, 82,9 y 85,1 g; N= 2 (H) 73,2 y 88,7 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 11 X= 68,7 g (Rango: 60 a 79 g)
Salvador (2014a): N= 9 (?) X= 83,8 g (Rango: 77,2 a 88,7)

Coloración. Pico: maxila pardo clara o pardo grisáceo oscura, mandíbula gris clara o corneo celeste con fino ápice pardo. Patas pardo oliváceo. Iris marfil, amarillo claro o pardo amarillento claro.
Coloración general parda con tono castaño. Copete más oscuro. Cara y garganta castañas. Ventral gris con tono castaño. Subcaudales, rabadilla y cola castañas. Alas pardas.

COMPORTAMIENTO
En parejas. Se posa en árboles o en el suelo.
Picotea y hurga entre chauchas secas de Acacia negra. Recolecta alimentos en el suelo, y en ramas hasta 7 m. de altura. También en plataformas de palitos de nidos viejos.

Alimentación
Rodríguez (1918a). Huevos de gallina.
Marelli (1919). **Insectos**. **Vegetales:** Semillas.
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros (*Poecilaspis bonariensis*). Hormigas. **Vegetales:** Semillas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Scarabeidae).
Kratter et al. (1993). **Insectos:** Escarabajos. Insectos (Larvas). **Vegetales:** Frutos
Genise et al. (1993). **Vegetales:** Savia *Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa.*
Nores y Nores (1994). Huevos (aves).
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae: *Gonipterus* sp.). Dermaptera. Hemiptera. Hymenoptera. (Formicidae: *Solenopsis sacvissima*). Lepidoptera (Pieridae). Orthoptera (Acridiidae: *Dichroplus elongatus,* Tettigonidae). **Artrópodos:** Chilopoda.
Blendinger (1999). **Vegetales:** Savia *Prosopis flexuosa*
Mezquida (2001b). Huevos (aves).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Artrópodos:** Chilopoda (ciempiés).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Elateridae, Prionidae, Scarabaeidae). Dermaptera. Diptera (Muscidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas, crisálidas, polillas). Odonata (libélulas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae). **Arácnidos:** arañas. **Mamíferos:** Cricetidae (*Colomys* sp.,no identificado). **Vegetales:** Frutos de *Schinus molle*, *Passiflora caerulea,* Solanácea. Semillas de *Chenopodium* sp. Gramíneas *Panicum mileaceum.***Otros:** Huevos (aves)
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Salvador y Bodrati (2013c). **Aves:** Huevos y pichones de *Cranioleuca pyrrhophia* y *Leptastenura platensis*. Huevos de *Columbina picui* y *Zenaida auriculata*. Pichones de *Pitangus sulphuratus*. **Mamíferos:** *Calomy*s sp.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
De la Peña y Pensiero (2017): Fruto de Tala (*Celtis ehrenbergiana*). Semillas de Brucuyá (*Passiflora caerulea*)
Salvador (2017b): **Aves:** Pichones de *Passer domesticus.* **Anfibios:** Ranita del zarzal (*Boana pulchella*), *Leptodactylus* sp. **Reptiles**: Lagartija verde (*Teius oculatus*), Lagarto (*Anos kingii*), Geko norteño (*Homonota borelli*). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Calomys* sp. Insectos. Anélidos. Moluscos. Chilópodos. Crustáceos. Arácnidos. Anfibios. Aves. Huevos. **Vegetales:** frutos, semillas.
Slongo, H. en Salvador y Fariña (2018). **Reptiles:** Yarará ñata (*Bothrops ammodytoides*)
De la Peña (2019b). Esperanza: Pan, 10-09-2016, 05-09-2017, 28-07-2018; Maiz, 15-09-2016; Sebo vacuno, 15-09-2016, 28-07-2018, 03-08-2018; Naranja, 28-07-2018; Larvas debajo corteza de rama de Pino, a 6 m de alto, 10-08-2018.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es estridente e inconfundible, canta a dúo. Emite una larga serie de silbos ásperos con modulación de frecuencia y amplitud ascendente y luego ambos descendentes: Cher . cher . cher . cher . cher . cher . cher. cher . chepchepchep .

HÁBITAT

Montes, sabanas, praderas arboladas, áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, La Pampa, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N	N	N	N	N

El nido es globular, alargado horizontalmente. La boca hacia abajo. Túnel largo. Emplea palitos con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con pocos pastos. Externamente puede agregar trozos de género, nylon o plumas. Lo ubica en las ramas de los árboles o en estructuras metálicas. Expuesto. Elaborado.

Girard (MACN). Suncho Corral, dpto. Matará, Santiago del Estero, 21-11-1904, 3 nidos con 2,3 y 3 huevos.
Barrows (1883a). Dpto. Uruguay, Entre Ríos, postura de 3 ó 4 huevos.
Hartert y Venturi (1909). La Rioja. Nido.
Rodríguez (1918a). Límites de San Luis, La Pampa y Córdoba, setiembre a noviembre de 1916. Algunos nidos.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidificando
Friedmann (1927). Entre Ríos. Nido.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 06-10-1921, 18-11-1923 y 24-11-1926, todos con 3 huevos.
Pereyra (1937b). Norte de La Pampa, nido en noviembre, 4 huevos.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica.
Davis (1940c). Entre Ríos. Nido.
Masramón (1962, 1971). San Luis. Nidifica.
Eberhard (1996). Entre Ríos. Nido.
Masramón (1971). San Luis, nidifica.
Wilson en Narosky et al. (1983). Dpto. Mercedes, Corrientes, 12-10-1972, 3 huevos.
Zelich en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 21-10-1969, 2 nidos con 4 huevos cada uno.
Masramón en Narosky et al. (1983). Concarán, dpto. Chacabuco, San Luis, 05-12-1979, 2 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 01-11-1970, 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). San Luis, dpto. Capital, San Luis, 18-02-1980, 3 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Pampa de Oleán, dpto. Punilla, Córdoba, 14-10-1982, 3 huevos.
Salvador y Fraga en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 29-10-1982, 2 nidos con 3 huevos cada uno.
Navas y Bó (1987a). Partridge localizó en Marayes, dpto. Caucete, San Juan, el 29-11-1963 un nido con 3 huevos.
Haro y Gutierrez (1992). Córdoba. Nido.
Nellar Ramonella (1993). San Luis. Nidifica.
Narosky y Di Giacomo (1993). Buenos Aires. Nido.
Nores y Nores (1994). Monte Cristo, dpto. Río Primero, Jardín Zoológico y Santa Isabel, dpto. Capital, Córdoba, desde abril de 1989 a marzo de 1993 se observaron 368 nidos.
Nores (1995). Córdoba. Córdoba.Nido.
Babarskas et al. (1996). Neuquén. Nido.

Bodrati y Sierra (2003). Vuelta de Obligado, pdo. San Pedro, Buenos Aires, octubre de 2002 a setiembre de 2003 varios nidos.
Bodrati et al. (2006b). Buenos Aires. Nido.
Aramburú y Campos Soldini (2008). Entre Ríos. Nido.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 113 nidos. Se reproduce de agosto a enero. Postura de 3 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 28 nidos en provincia de Santa Fe y uno en provincia de Córdoba, desde el 04-10-1970 a 25-10-2004. Medidas: Largo total: de 0,90 a 1,20 m. Alto externo en la cámara: de 40 a 60 cm. Ancho externo en la cámara: de 40 a 80 cm. Ancho de la boca: de 6 a 9 cm. Largo del túnel: de 30 a 80 cm. Diámetro de la cámara: de 20 a 35 cm.
Nido más bajo: 3,50 m. Nido más alto: 7,50 m.
Salvador y Bodrati (2013a). Córdoba.Nido.
Turienzo y Di Iorio (2014a). Córdoba, La Pampa, Entre Ríos. Nidos.
Girard en Segura et al (2014a). Santiago del Estero. Nido.
Miquel et al. (2015). Córdoba. Nido.
Rumboll, M. en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). La Pampa, San Luis, La Rioja, Formosa, Chaco,Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos. Nidos.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Salta, Chaco, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos. Nidos.
Statenini y Gómez (2017). Nido en Córdoba.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 29,0 a 30,0 x 20,0 a 21,0		
Rodríguez (1918a): 27,0 a 29,0 x 21,0 a 22,0		
Serié y Smyth (1923): 29,0 a 32,0 x 21,0 a 23,0		
Smyth (1928): 28,5 a 31,0 x 21,0 a 21,5		
Masramón (1971): 29,0 x 21,0		
Narosky en Narosky et al. (1983): 25,8 a 31,5 x 19,6 a 21,4	X= 28,6 x 20,4	(N= 9)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 28,5 a 30,1 x 20,3 a 20,8	X= 29,3 x 20,6	(N= 3)
Salvador y Fraga en Narosky et al. (1983): 25,4 a 30,6 x 20,0 a 21,1	X= 28,5 x 20,7	(N= 9)
Nores y Nores (1994): 25,5 a 29,1 x 19,1 a 21,5	X= 27,1 x 20,8	(N= 135)
Salvador (2013b): 25,4 a 30,3 x 19,6 a 21,4	X= 28,6 x 20,7	(N= 93)
De la Peña (2013c): 27,1 a 30,0 x 20,0 a 22,0	X= 28,5 x 21,0	(N= 11)
Bodrati (*in litt*. 2019): 26, 3 a 29,5 x 19,7 x 21,1		(N=13)

Pesos

Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 6,5		
Salvador y Fraga en Narosky et al. (1983): 6,4		
Nores y Nores (1994): 6,8 a 8,5	X= 7,6	(N= 135)
Salvador (2013b): 5,4 a 7,1	X= 6,7	(N= 66)
De la Peña (2013c): 6,7 a 7,6	X= 7,0	(N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,377 a 0,449	X= 0,427	(N= 8)

Generalidades

Nores y Nores (1994). Demora en la construcción del nido de 15 a 37 días. El período de incubación es de 18 a 20 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 20 a 30 días. Los huevos son puestos en días alternos. Período de incubación 18-19 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 18 a 19 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.

PICHONES

Descripción

Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, con plumón dossal gris pardusco oscuro. Pico pardo claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel y pico grises. Comisura blanquecina amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillentos. Plumón gris.
2 días. Abundante plumón gris oscuro en la cabeza, dorsal y alas.
5 días. Ojos cerrados. Pico y patas grises. Piel grisácea. Comisura blanca. Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillos. Abundante plumón gris.
6 días. Ojos abiertos, marrones.
7-8 días. Vainas grises.
10 días. Parte dorsal del pico claro, costados oscuro.
Aparecen las láminas en las plumas dorsales, alas y cola. Tienen plumón dorsal pardo, ventral grisáceo.
17 días. Plumaje de adulto.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	0,8-1,0	1,0-1,1						5,5-6,5
2	0,6	1,0-1,2	1,2-1,3						6,7-8,5
3	0,7	1,2-1,4	1,5-1,7						7,0-12,7
4	0,6-0,8	1,0-1,5	1,7-2,0						7,9-15,0
5	0,7-0,9	1,1-1,7	1,8-2,1						8,5-17,2
6	0,8-0,9	1,2-2,1	1,9-2,3						9,0-18,5
7	0,9	1,3-2,6	2,0-2,6						9,4-20,0
8	1,0	1,4-2,9	2,0-2,9	0,1-0,2		0,1			10,0-22,5

Peso al nacer

Salvador (2013b): 4,9 a 5,9 X= 5,5 (N= 9)

Observaciones

Fraga en Fraga y Narosky (1985). Un pichón permaneció en el nido entre 22 y 25 días.
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 22 a 24 días.
De la Peña (2013c). Los pichones permanecen en el nido 20 días.

Otros

Nores y Nores (1994). Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Darrieu y Camperi (1990). Provincia de Corrientes, un huevo para poner en setiembre.
De la Peña (2013c). El 02-10-1974, en Esperanza un nido tenía dos bocas, situadas una en cada extremo del nido. Estaba habitado.

De la Peña y Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Nores (1995). Antoniazzi et al. (2011). Víctima de moscas del género *Philornis.*

Depredadores
De adultos: *Tyto alba* en La Pampa, Noriega et al. (1993), *Falco femoralis* en Córdoba, Salvador (2012), en La Pampa, Liébana (2015)
De huevos: Comadreja overa (*Didelphis albiventris*) y Rata (*Rattus rattus*) en Córdoba, Nores y Nores (1994), Rata (*Rattus rattus*), en Córdoba, Salvador et al. (2017)

Más información:
Masramón (1971). Hudson (1974). Nores y Nores (1994). Salvador (2013b, 2017b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general parda-castaña. Notable copete. El canto.

Ascochinga. Córdoba. 25-01-2005

Esperanza. Santa Fe. 12-07-2009

Esperanza. Santa Fe. 04-12-2012

Esperanza. Santa Fe. 27-11-2005

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pseudoseisura lophotes argentina Parkes, 1960 desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Neuquén y Río Negro.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Sur de Brasil, oeste de Paraguay, sur de Bolivia, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pseudoseisura lophotes argentina Parkes, 1960

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Barbetti et al. (1985); Bodrati et al. (2001b, 2006b); Bodrati y Sierra (2003); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Hudson (1870a); Lynch Arribálzaga (1878); Narosky (1983); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Cory y Hellmayr (1925); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Burmeister (1861); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Fraga (2002); Frenzel (1891); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983); Navas y Bó (1987a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Nores (1994); Partridge (1953c); Salvador (1983, 2012, 2013b, 2013e); Salvador et al. (2017); Sclater y Hudson (1888); Sferco y Nores (2003); Statenini y Gómez (2017); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Tanti, dpto. Punilla, 06-12-1981; La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000; La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, 30-04-2000)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006); Marelli (1918); Narosky et al. (1983)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Barrow (1883); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Eberhard (1996); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Esteban (1953)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Camperi (1992a); Chebez et al. (1998); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); Dean (1971); De la Peña y Tittarelli (2011); Liébana (2015); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Narosky (1983); Navas y Bó (1986); Noriega et al. (1993); Pereyra (1923a, 1937); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (1999, 2005); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Davies (1980); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Gómez (2006); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Mezquida (2001b, 2003); Mezquida y Marone (2002, 2003a); Milesi et al. (2002); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi y Darrieu (2005); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Humphrey y Bridge (1970); Llanos et al. (2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1988); De la Peña (2013c); Hoy (1976); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); De la Peña (2013c); Fava y Acosta (2016); Fava et al. (2017); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Hartert y Venturi (1909); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1987a); Ortiz et al. (2016, 2018e)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Contreras y Davies (1980); Masramón (1971); Masramón (1983); Narosky en Narosky et al. (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Girard en Narosky et al. (1983); Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983)

CACHOLOTE PARDO *Pseudoseisura gutturalis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Cachalote. Cachilote. Cacholote. Cacholote garganta blanca. Cacholote pálido. Caserote. Cserote pardo. Chorlote. Chorlote pardo. Chuchumenta. Comehuevos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 8 X= 74,5 g (Rango: 67,0 a 79,0)
Contreras y Davies (1980): N= 6 (M) X= 75,0 g (Rango: 63,4 a 90,58); N= 2 (H) X= 66,2 g

Navas y Bó (1987a): N= 4 (M) 69,5, 70,7, 71,5 y 76,1 g; N= 2 (H) 65,3 y 70,0 g
Navas y Bó (1990); N=1 (M) 87,4 g; N=1 (H) 73,1 g
Salvador (1990a): N= 2 (?) 63,3 y 73,5 g
Camperi (1992c): N= 5 (M) 76,9, 69,0, 72,0, 73,0, 76,0 g; N= 1 (H) 82,7 g
Christie et al. (2004): N= 1 (H) 77,0 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises. Iris amarillo.
Ligero copete. Dorsal parda grisácea. Garganta blanquecina. Collar gris oscuro. Ventral gris. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Pérez et al. (2009). **Reptiles:** Matuasto de Bell (*Leiosaurus belli*)

HÁBITAT

Terrenos arbustivos andinos y patagónicos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Ubica el nido en arbustos o en árboles. Es una estructura globular, con entrada alargada horizontalmente. Emplea palitos. En la base de la cámara coloca pajitas. Expuesto. Elaborado.

Hudson (1872a, 1885). Río Negro. Nido.
Durnford (1877a). Chubut. Nido.
Peters (1923b). Río Negro. Nido.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 09-11-1961, 4 pichones y un huevo.
Höy (1976b). Salta, nido con 4 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y diciembre.
Contreras (1980o). Río Papagayo, dpto. Capital, Mendoza, 03-11-1974, 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Carmen de Patagones, pdo. Patagones, Buenos Aires, 16-12-1972, 2 pichones.
Camperi (1992c). Buenos Aires. Nido.
Casas (1992a). Río Negro. Nido.
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, Chubut, 18-11-1983, 3 huevos; Viedma, dpto. Río Negro, 3 huevos y otro con un huevo.
Navas y Bó (1987a). San Juan. Nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónco, nido con pichones en noviembre.
Harris (2008). Chubut. Nido.
Lambertucci et al. (2009). Río Negro. Nido.
Lobo Allende et al. (2010). La Rioja. Nido.
Gelain (2012b). Río Negro. Nido.
De la Peña (2013c). Cafayate, dpto. Cafayate, Salta, 07-02-1777, un nido con 4 huevos y otro con pichones; Talacasto, dpto. Ullún, San Juan, 15-02-1982, sin postura; Malargüe, dpto. Malargüe, 15-10-2004, un nido con pichones y 2 sin postura. Medidas: Largo total: de 0,70 a 1,50 m. Alto externo en la cámara: de 0,38 a 1,0 m.

Ancho externo en la cámara: 35 cm. Ancho de la boca: 8 cm. Largo del túnel: de 35 a 40 cm. Diámetro de la cámara: de 18 a 25 cm.
La cámara de postura es más redondeada (no aplanada) que en el de *Pseidoseisura lophotes*
Delhey y Pérez (2013). Chubut. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). Catamarca.Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). La Rioja. Nido. Termas de Santa Teresita de Mazán, dpto. Arauco, La Rioja. Febrero de 2012. Nido activo en Chañar a 2, 3 metros de altura, en el borde de un salar.
Salvador, S. en Salvador (2016a). La Rioja. Nido.
Salvador y Narosky en Salvador (2016a). Neuquén. Nido.
Salvador, S. en Salvador (2016a). Mendoza, Salta. Nidos.
Salvador y Eroles en Salvador (2016a). Chubut. Nido.



Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy (1976b): 27,9 a 29,6 x 21,3 a 22,0
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985): 27,1 a 28,8 x 20,0 a 20,6 X= 27,9 x 20,3 (N= 2)
De la Peña (2013c): 28,9 a 29,9 x 21,4 a 21,8 X= 29,2 x 21,6 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscara 0,413 a 0,475 X= 0,444 (N= 4)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Los pichones tienen comisura amarilla. El interior de la cavidad bucal y la lengua, anaranjado-amarillento. Ojos marrones. Piel rosada. Patas grises.
Vainas y láminas en la cabeza, marrón-castaño. Garganta crema. Dorsal, vainas negras, láminas castañas. Ventralmente gris claro. Flancos castaños.

Otros
Contreras (1980o). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Camperi (1992c). Mayor Buratovich, Villarino, Buenos Aires, ejemplar capturado con 2 huevos formados.

Más información
Hudson (1974)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ligero copete. Garganta blanca. Collar oscuro.

Llancanelo. Malargüe. 15-10-2004

Talacasto. San Juan. 15-02-1982

Cachi. Salta. 07-02-1977

Rentería. Río Negro. 27-06-2016
Foto: Cynthia Arenas

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Pseudoseisura gutturalis ochroleuca Olrog, 1959 en el suroeste de Jujuy y Salta, oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza y *Pseudoseisura gutturalis gutturalis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Mendoza, Neuquén, Río Negro, sur de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Endémico de Argentina donde se extiende por el oeste hasta la Patagonia y desde allí hasta Santa Cruz por la estepa.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pseudoseisura gutturalis ochroleuca Olrog, 1959

Catamarca
Citas: Carma (2009); Lobo Allende et al. (2009, 2010); Mogensen (1930); Olrog (1959c); Salvador (1990a)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Rioja
Citas: Capllonch et al. (2020); Chebez (2005); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895); Lobo Allende et al. (2009, 2010)

Mendoza
Citas: Contreras (1977c, 1979); Contreras y Fernández (1980); Contreras y Davies (1980); De la Peña (2013c); Ferrer et al. (2019); Pereyra (1927e); Sanzín (1918)

Salta
Citas: Capllonch et al. (2020); Dabbene (1910a); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Höy (1976b); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: De la Peña (2013c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Navas y Bó (1987a); Olrog (1963)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2020); Lucero (1983); Olrog (1958); Ortiz et al. (2013c)

Pseudoseisura gutturalis gutturalis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Contreras y Davies (1980); Darrieu y Camperi (2001a); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1959a); Zapata (1998)

Chubut
Citas: Contreras (1977a); Delhey y Pérez (2013); Harris (2008); Olrog (1959a); Pagnoni (2012a); Sainz-Trápaga (2014)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005b); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Navas y Bó (1986); Rainer Cinti (1983); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Veiga et al. (2009)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Darrieu y Segura (2015); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (1987a); Roig (1965); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975a, 1977a, 1977b); Cory y Hellmayr (1925); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1978); Navas y Bó (1990); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Christie et al. (2004); Contreras (1977a); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Hartert y Venturi (1909); Hudson (1968); Hudson y Sclater (1872); Lambertucci et al. (2009); Llanos et al. (2005, 2011); Piacentini et al. (2003); Povedano (2016); Wetmore (1926b)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988a); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2005e);

Zapata (1967, 1969)

CHOTOY *Schoeniophylax phryganophilus* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Coludito elegante. Coludo chotoy. Chotito coludo. Choto.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 5 (M) 20,0, 22,5, 18,0, 16, 9 y 19,5 g; N= 1 (H) 17,8 g
Di Giacomo (2005h): N= 4 X= 16,9 g (Rango: 16,0 a 18,0)
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 15 g
Salvador (2014a): N= 9 (?) X= 17,1 g (Rango: 15,1 a 17,9)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 15 g, N= 4 X= 17,8 g (Rango: 14,5 a 20,2)
Pagano y Salvador (2017): N=1 (M) 17 g

Coloración. Pico: maxila gris negruzca, mandíbula corneo claro. Patas corneo rosadas. Iris pardo castaño. Frente parda. Corona con tono castaño. Finas cejas ocráceas. Cara parda y blanquecina. Dorsal parda estriada de pardo oscuro. Garganta superior amarilla, inferior negra. Lados del cuello blancos. Pecho canela. Resto de lo ventral blanquecino. Alas pardas. Cubiertas rojizas. Cola pardo grisácea. Plumas centrales largas.

COMPORTAMIENTO
Anda entre matorrales, arbustos o en el suelo. Solitario o en pareja. Se posa en los alambres de los campos. Recolecta alimentos en el suelo, follaje y en hierbas bajas, hasta 1 m. de altura.

Alimentación
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros. Orthópteros (Locustidae).
Alessio et al. (2005). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Dytiscidae, Hydrophilidae). Hymenoptera (Formicidae). Orthoptera (Grillotalpidae, Paulinidae: *Paulinia* sp.). **Arácnidos:** Arácnida (Pysauride). **Vegetales:** Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (no identificado). Dermaptera. Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera (Aphidae, Cicadidae). Hymenptera (Formicidae y Vespidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (huevos, orugas, crisálidas). **Arácnidos. Semillas**.
Klimaitis et al. (2014). **Insectos:** Orugas de Lepidópteros. Mariposas (ropalóceros). Polillas (heteróceros). Langostas (Acrididae). Saltamontes (Tettigoniidae). Libélulas (Anisoptera). Caballitos del diablo (Zygoptera). Abejorros (Apidae). Escarabajos (Coleoptera). Chinches (Hemíptera). **Arácnidos**.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
De la Peña (2019b). Esperanza. 12-03-2016. Come semillas de Maicillo. Andaba una pareja y uno se posó en la vara y sacó una semilla.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Canta a dúo. La voz es una serie de notas gorgoteantes que hace a dúo la pareja: Glüglüglüglüglü..

HÁBITAT
Praderas arboladas, sabanas, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Tiene forma globular, con túnel de entrada alargado. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. Acolcha la base de la cámara con hojitas, líquenes, musgos y pajitas.
Lo sostiene en ramas, troncos, enredaderas o sobre nidos viejos. Expuesto. Elaborado.

Barrows (1883a). Dpto. Uruguay, Entre Ríos, 26-01-1880, 4 huevos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 10-10-1925, 2 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos.
Davis (1940c). Entre Ríos. Nido.
Salvador (1982). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 04-01-1981, pichón de *Tapera naevia*.
Earnshaw en Narosky et al. (1983). Pdo. Magdalena, Buenos Aires, 01-11-1938, 29-11-1938 y 11-12-1938, los 3 nidos con 4 huevos cada uno; 05-01-1940, 5 huevos.
Klimaitis en Narosky et al. (1983). Los Talas, pdo. Berisso, Buenos Aires, 23-10-1976, 5 huevos.
Salvador en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 15-01-1981, 3 huevos y 3 pichones. Los 6 pichones fueron criados exitosamente; 08-11-1981, en un nido 4 huevos frescos y 4 muy incubados.
Narosky en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre ríos, 14-10-1968, 3 nidos, con 3, 5 y 5 huevos cada uno; pdo. Magdalena, Buenos Aires, 20-09-1971, nido en construcción
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Cnel. Du Graty, dpto. Fontana, Chaco, 17-12-1982, 4 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. (1983). Chaco. Nido.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nidos.
Darrieu y Camperi (1990). Provincia de Corrientes, en diciembre nido con 4 huevos.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nidos.
López Lanús (1997). Parque Nacional "Río Pilcomayo", dpto. Pilconayo, Formosa, 07-02-1992, Serventi, observó un nido con 5 huevos.
Bodrati y Pietrek (2000). Chaco. Nido.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 03-11-2000 nido en construcción.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en construcción en agosto, dos con pichones en octubre y noviembre.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre hasta abril. En 20 nidos observados la altura del suelo fue de 0,60 a 3,20 m
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 60 nidos. Se reproduce de octubre a marzo. Posturas de 4 a 6 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron entre el 18-10-1971 a 03-11-04, 86 nidos, en la provincia de Santa Fe.
Medidas: Diámetro interno de la cámara: de 10 a 15 cm. Externamente: 30 a 35 cm. o más. Largo del túnel: de 40 a 55 cm. Diámetro del túnel: de 3,5 a 5 cm.
Nido más bajo: 0,30 m. Nido más alto: 17,00 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Capital Solari, dpto. Sargento Cabral, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Klimaitis et al. (2014). Los Talas, pdo. Berisso, Buenos Aires, en 1976-77 se observaron 17 nidos y en 1984-85, 23 nidos. Se reproduce desde setiembre a febrero.
Miquel et al. (2015). Buenos Aires. Nido.
Pagano en Salvador (2016a). Formosa. Nido.
Wilson en Salvador (2016a). Corrientes. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Nores e Yzurieta en Salvador (2016a).Córdoba. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.
De la Peña (2019b). Llambi Campbell. Dpto. La Capital. Santa Fe. 13-01-2016. Una pareja saca palitos de un nido viejo de *Phacellodomus* sp. Que cuelga de un Algarrobo.
Esperanza. 16-09-2018. Nido en construcción en un Chañar a 2,80 m del suelo. Sacó pichones.
Quiroga y Llugdar (2019c). Nido en El 45, dpto. Mitre, el 17-11-2012, Santiago del Estero.



Huevos
Pone 4 ó 5, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 19,0 a 23,0 x 14,5 a 17,0
Smyth (1928): 21,5 x 16,0 a 16,5
Pereyra (1938b): 20,0 x 16,0
Klimaitis en Narosky et al. (1983): 20,1 a 21,7 x 14,5 a 15,4 X= 20,7 x 15,0 (N= 13)
Salvador en Narosky et al. (1983): 19,3 a 21,0 x 14,0 a 15,5 X= 20,0 x 15,2 (N= 8)
Narosky en Narosky et al. (1983): 19,9 a 20,1 x 15,9 a 16,2 X= 20,0 x 16,0 (N= 3)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 20,5 a 21,2 x 15,6 a 16,6 X= 20,8 x 15,9 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 19,2 a 22,1 x 14,2 a 16,2 X= 20,3 x 15,3 (N= 42)
Salvador (2013b): 18,9 a 21,3 x 14,0 a 16,3 X= 20,2 x 15,1 (N= 68)
De la Peña (2013c): 18,7 a 22,4 x 14,1 a 16,3 X= 20,3 x 15,3 (N= 33)
Klimaitis et al. (2014): 18,4 a 21,7 x 14,1 a 15,2 X= 20,3 x 15,5 (N= 40)

Pesos
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,8
Di Giacomo (2005h): 1,9 a 2,8 X= 2,4 (N= 42)
Salvador (2013b): 2,3 a 2,9 X= 2,6 (N= 43)
De la Peña (2013c): 2,1 a 3 X= 2,4 (N= 14)
De la Peña (2013c): 0,131 a 0,163 X= 0,148 (N= 24)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 15 a 16 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 18 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 20-27 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación 15-16 días.
Klimaitis et al. (2014). Demora en la construcción del nido de 32 a 64 días. El período de incubación es de 16-17 días.

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, con escaso plumón dorsal pardo grisáceo. Pico pardo claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Comisura blanca. Cavidad bucal y paladar, amarillo-naranja. Piel clara.
1 día. Abundante plumón gris oscuro.
5 días. Abre los ojos.
7 días. Cavidad bucal y paladar, amarillos. Alas y cola con vainas gris oscuro.
8 días. Pico gris. Patas claras. Cañones de las plumas primarias grises. Abriendo las láminas en las plumas dorsales, alas y cola. Plumas ventrales crema.
11 días. Plumas de las alas pardas orilladas de ocráceo. Dorsalmente pardo. Ventralmente blanquecino.
14 días. Grita. Color de adulto.
16 días. Dejan el nido.
Klimaitis et al. (2014). Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada, con algunos plumones dorsales gris oscuro y otros en los costados del pecho. Comisuras amarillas. Al 6º día comienzan a abrir los ojos.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 2,0 a 2,4 X= 2,2 (N= 8)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 16 a 18 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 15 a 16 días.
Klimaitis et al. (2014). Los pichones permanecen en el nido 18-19 días.

Otros
De la Peña et al. (2003a). Klimaitis et al. (2014). Víctima de larvas de moscas del género *Philornis*.
De la Peña (2013c). Tres nidos estaban parasitado por *Tapera naevia*
De la Peña (2013c). El 09-01-1979 en Miguel Escalada, dpto. San Justo, Santa Fe, una pareja alimentaba a un juvenil de *Tapera naevia*
Salvador (2013b). Es parasitado por *Tapera naevia.*
Salvador y Bodrati (2014a). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredadores
De pichones: Culebra del pastizal (*Philodryas patagoniensis*) en Buenos Aires, Klimaitis et al. (2014)

Más información:
Hudson (1974). Salvador (2013b). Klimaitis et al. (2014). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta amarilla y negra, bordeada de blanco. Pecho canela. Cola larga. El canto.

Esperanza. Santa Fe. 04-10-2012

Esperanza. Santa Fe. 01-10-2008

Esperanza. Santa Fe. 14-03-2008

Esperanza. Santa Fe. 17-10-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus (Vieillot, 1817) desde Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes y Misiones, por el este hasta Córdoba y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Sur y suroeste de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Bodrati y Salvador (2015a); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Klimaitis et al. (2014); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky et al. (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Narosky et al. (1983); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Salvador (1983, 2013b); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995); Zotta (1944a)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 18-01-2010)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1990); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1883a); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Contreras (1979f); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Narosky et al. (1983); Pereyra (1927e); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Grant (1911); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky y Lozzia (1988); Pagano y Salvador (2017); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Navas y Bó (1988b); Salvador y Narosky (1987)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); Alessio y Beltzer (2009); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2002a, 2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Straneck (1990e)

Santiago del Estero
Citas: Durando (2016); Ferrari et al. (2016); Heredia (2011); Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2016); Quiroga y Llugdar (2019c)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Laredo et al. (1987); Ortiz et al. (2013c)

CURUTIÉ COLORADO *Certhiaxis cinnamomeus* (J.F. Gmelin, 1789)

Otros nombres : Curutié. Curutié rojizo. Chotoy. Espinerito. Pijuí curutié. Titirí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 14 g; N= 1 (H) 16,9 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 3 X= 14,3 g (Rango: 14 a 15 g)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 11,0 y 15,5 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises. Iris rojizo.
Corona y dorsal pardas con tono canela. Lados de la cabeza y lorum grisáceos. Superior de la garganta amarillenta. Cejas y ventral blanquecinas. Alas y cola castañas.

COMPORTAMIENTO
Se alimenta de insectos. Recorre juncales, se desplaza sobre los repollitos. Anda desde el suelo hasta 3-4 m. de alto en los árboles. Canta a dúo.

Alimentación
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Lepidoptera (larva). Hemípteros (Pentatomidae). Hymenópteros (Formicidae, *Camponotus* sp.). Ortóptera (Grillidae).
Alessio et al (2005). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae: *Neochetina* sp., Hydrophilidae, Noteridae: *Suphisellus* sp.). Hymenoptera (Formicidae: *Atta* sp.). **Vegetales:** Semillas Compositae, Graminae.
Heredia et al. (2010). **Peces.**
Salvador y Bodrati (2013c). **Anfibios:** Renacuajos.

HÁBITAT
Juncales, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N						N		N	N	N

El nido es globular, con túnel de entrada curvo hacia arriba. Emplea en la construcción palitos con y sin espinas. A veces acolcha la base de la cámara con vegetales suaves. Es sostenido en arbustos, pajas bravas, juncos, árboles caídos, en bañados y esteros. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 08-11-1905, un pichón de *Tapera naevia*, 28-12-1905 2 pichones de *Tapera naevia.*
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 06-02-1925, 3 huevos.
Nores e Yzurieta (1981). Córdoba. Nido.
Zelich en Narosky et al. (1983). Paso López, dpto. Curuzú Cuatiá, Corrientes, 07-11-1968, con huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). 3 nidos: Bouvier, dpto. Pilcomayo, Formosa, 19-02-1974, en construcción; Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 25-02-1975, en construcción; La Cruz, dpto. San Martín, Corrientes, 17-11-1976, sin postura.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Los Amores, dpto. Gral. Obligado. Santa Fe, 20-12-1982, 4 huevos.
Nores et al. (1983). Córdoba. Nido.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 3 nidos.
Babarskas y López Lanús (1993). Reserva Costanera Sur, Capital Federal, Buenos Aires, 02-11-1988, nido con 3 huevos; 22-11-1988 y 07-10-1991, nidos en construcción; Ramallo, pdo. Ramallo, 24-11-1989, un nido sobre el cual un adulto alimentaba a un juvenil de *Molothrus bonariensis*, el 8 y 9 de diciembre este nido tenía 3 huevos.Otro nido con un huevo y uno de *Molothrus bonariensis*, otro en construcción y otro con pichones; 17-12-1989, nido con un huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*; 25-02-1990, dos nidos, uno con 4 huevos y el otro con 3 huevos.
López Lanús (1997). Parque Nacional "Río Pilcomayo", dpto. Pilconayo, Formosa, 09-02-1992, nido parasitado por *Tapera naevia.*
Miatello et al. (1999). Córdoba. Nido.
Pautasso (2000). Santa Fe. Nido.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 14-12-1999, nido sin postura; 18-10-2000, nido con un huevo.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en octubre.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde noviembre hasta abril.
De la Peña (2013c). Se localizaron 37 nidos en provincia de Santa Fe desde 10-10-1970 a 02-01-2004.
Medidas: Largo total: de 31 a 35 cm. Alto en la cámara: de 20 a 30 cm. Ancho: de 15 a 20 cm. Diámetro de la boca: de 4 a 4,5 cm. Largo del túnel: 20 cm. Diámetro interno de la cámara: de 9 a 10 cm.
Nido más bajo: 0,40 m. Nido más alto: 3,50 m.
Bodrati y Salvador (2015b). Chaco. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Córdoba. Nido.
Savador y Narosky en Salvador (2016a). Formosa. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Chaco. Nido.
Salvador et al. (2017). Nido en Córdoba.
De la Peña (2019b). Villa Roda, dpto. La capital, Santa Fe, 12-09-2017, nido en construcción en una Cina-cina caída a 70 cm. del suelo y 25 cm sobre el agua.
E, Sierra (*in litt*. 2019). Nido activo. 08-09-1999, Isla del Medio km 287 río Paraná. Sección 5ta de Islas de San Pedro, partido San Pedro, Buenos Aires; 12-12-2013, Pie de barranca del río Paraná, Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, la pareja construyendo en un Curupí (*Sapium*), a 2 metros de altura; 13-10-2015, Puente del arroyo Espinillo, camino Mansilla hacia localidad de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, nido en construcción aunque aparentemente terminado, oculto en un juncal entre caraguatales.
Quiroga y Llugdar (2019c). Nidos en construcción el 23-08-3014 en Los Corbalanes, dpto. La Banda y el 21-08-2016, en isla Tara Inti, dpto. Río Hondo, Santiago del Estero.



Huevos
Pone de 3 a 5 huevos, ovoidales, verde pálido a blanco verdosos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 17,5 a 20,5 x 14,0 a 15,0
Smyth (1928): 18,0 a 18,5 x 14,0 a 14,5
Zelich en Narosky et al. (1983): 19,1 x 14,3
Narosky en Narosky et al. (1983): 19,3 a 20,2 x 14,5 a 15,1 X= 19,9 x 14,7 (N= 4)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 19,7 a 20,9 x 14,7 a 15,0 X= 20,3 x 14,9 (N= 4)
Babarskas y López Lanús (1993): 19,2 a 20,9 x 14,2 a 15,2 X= 19,9 x 14,6 (N= 14)
Di Giacomo (2005h): 16,4 a 21,2 x 12,7 a 16,0 X= 19,2 x 15,0 (N= 62)
De la Peña (2013c): 18,3 a 21,8 x 14,3 a 16,5 X= 19,6 x 15 (N= 28)

Pesos
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,3
Di Giacomo (2005h): 1,3 a 2,5 X= 2,1 (N= 62)
De la Peña (2013c): 1,4 a 2,4 X= 2 (N= 10
De la Peña (2013c): 0,127 a 0,141 X= 0,137 (N= 24)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). La pareja construye el nido y demora de 10 a 15 días. El período de incubación es de 17 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 14 a 16 días. Los huevos son puestos en días corridos. Período de incubación 15 a 16 días.

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Pico oscuro. Comisura, cavidad bucal y paladar, naranja-amarillentos. Patas grises. Plumón gris.
4-5 días. Abren los ojos.
5 días. Tiene plumón gris oscuro. Ojos abiertos, marrones.
6 días. Cañones de las alas y de la cola, grises con punta castaña. Extremo de las plumas del dorso, canela. Garganta, lados del pecho y flancos, blanquecinos amarillentos.

Observaciones
Contreras (1990b). El pichón permanece en el nido 16-18 días.
Di Giacomo (2005h). Permanencia de los pichones en el nido es de 16 a 19 días. Ambos padres alimentan a los pichones.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen dentro de las 24 horas. Permanecen en el nido de 16 días. La pareja alimenta a los pichones.

Otros
Friedmann (1963). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
De la Peña et al. (2003a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.* Un pichón tenía 11 larvas: 2 en la cabeza, 2 en el ala derecha, 3 en el ala izquierda, 1 en la zona axilar, 2 el dorsal y 1 en un muslo.
Di Giacomo (2005h). Hospedador del Crespín (*Tapera naevia*). Sobre 45 nidos observados, 12 estaban parasitados (26,6%).
De la Peña (2013c). 5 nidos estaban parasitados por *Tapera naevia.*
De la Peña (2013c). Un nido contenía un huevo de Pirincho (*Guira guira*) posiblemente estaba desde antes de la construcción del nido.
En un caso, tres nidos superpuestos. El superior estaba activo.
La pareja trae materiales (palitos) que buscan hasta 40 m. del nido. Demoran bastante en acomodar, 5 o más minutos. Cuando uno llega canta y el otro responde suave.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal, alas y cola, castañas. Ventral blanquecina. Larga cola en punta.

Cayastá. Santa Fe. 14-11-2008

Esperanza. Santa Fe. 08-12-2007

Cayastá. Santa Fe. 22-12-1978

Cayastá. Santa Fe. 14-11-2008. Ubicación nido

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Certhiaxis cinnamomeus russeola (Vieillot, 1817) desde Salta, Jujuy, Formosa y Misiones por Chaco, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hasta Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Ocho subespecies. Amplia zona de distribución por Sudamérica, a excepción de Amazonia y Costa del Pacífico, siempre en relación con ambientes húmedos. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas y López Lanús (1993); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991, 1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1981); Salvador et al. (2017); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1987b, 1980-81, 1990b); Darrieu y Camperi (1990); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Heredia et al. (2010); López-Lanús et al. (2013b); Narosky et al. (1983); Ordano et al. (2008); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Muzzachiodi (2001a); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky et al. (1983); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Esteban (1953)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chatellenaz (2007); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014); Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Narosky et al. (1983); Ordano et al. (1999); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rossetti y Giraudo (2003); Straneck (1990e)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Quiroga et al. (2017); Quiroga y Llugdar (2019c)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Capllonch et al. (2005b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

PIJUÍ CANELA *Synallaxis scutata* P. L. Sclater, 1859

Otros nombres: Pijuí anaranjado. Pijuí ocráceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 13,5 g, N= 1 (M) 12,0 g
Salvador (1990a): N= 2 (?) 14,5 y 16 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 7 X= 12,8 g (Rango: 9,5 a 17)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X= 13,5 (Rango: 11,7 a 14,9)

Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula negruzca con base córnea Patas córneas con tinte verdoso o tinte rosado. Iris castaño rojizo.
Corona parda. Dorsal parda con tono castaño. Lados de la frente blancos. Cejas ocráceas. Garganta blanca. Mancha negra en anterior del cuello. Ventral canela. Abdomen blanquecino. Cobijas y cola castañas. Alas pardas y castañas.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Souto (2010). **Insectos:** Coleoptera (adultos y larvas). Hemiptera. Heteroptera. Hymenoptera (Formicidae). Orthoptera. **Arácnidos:** Araneae.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es un suave Juit.tijui...juit.tijui...juit.tijui.. muy similar a la del Pijuí negruzco.

HÁBITAT
Estratos bajos en bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Es redondeado con túnel alargado. Emplea palitos, cortezas, hojas y líquenes. Acolcha la cámara con fibras finas. Lo ubica en el suelo o a baja altura.

Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, 08-11-1991, nido al pie de una barranca de 50 cm de alta, apoyado en el suelo. La pareja construía.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Serranía de las Pavas, Parque Nacional Baritú, dpto. Santa Victoria, Salta, nido localizado a mediados de noviembre de 1992, estaba en un pozón con 30 cm de agua, en plena selva. A 20 cm del nivel del agua, apoyado sobre plantas acuáticas. Contenía 3 pichones.
Salvador y Salvador en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Huevos
Pone 3 huevos blancos.

Medidas
Teixeira y Luigi (1993): 21,2 a 21,6 x 15,5 a 15,7

Más información:
Teixeira y Luigi (1993). Di Giacomo y López Lanús (1998)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Notable garganta blanca y mancha negra en anterior del cuello. Cejas ocráceas. Ventral canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis scutata whiti (Oren, 1985) en Salta y sureste de Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se distribuye por noreste de y centro de Brasil, sureste de Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Synallaxis scutata whiti (Oren, 1985)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Di Giacomo y López Lanús (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (1998); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

PIJUÍ NEGRUZCO *Synallaxis cinerascens* Temminck, 1823

Otros nombres: Pijuí ceniciento. Pijuí oscuro. Pijuí plomizo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Contreras (1980d): N= 3 (H) X= 15,4 g (Rango: 14,4 a 16)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 13,5 g
Capllonch et al. (2015b): N=1 12 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises verdosas. Iris rojizo.
Corona y dorsal pardas con tono castaño. Mancha gular negra. Ventral gris oscura. Cobijas alares castañas. Alas pardas y castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Moojen et al. (1941). **Insectos:** Coleoptera. Lepidoptera. Orthoptera.
Manhaes et al. (2010). **Insectos:** Blataria. Coleoptera. Hymenoptera (Formicidae). Isoptera.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es un suave Juit.tijui...juit.tijui...juit.tijui... que repite oculto entre el follaje.

HÁBITAT
Tacuarales en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N					N	N		

Partridge (MACN). 2 nidos en arroyo Uruguaí, km. 30, dpto. Iguazú, Misiones, 07-10-1954, 3 huevos y 25-10-1960, 4 huevos.
Oscar (2012). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 09-04-2012, nido.
Bodrati (*in litt*. 2019). Parque Provincial Cruce Caballero, 15-9-2016, nido apoyado en el suelo entre pasto al costado de un camino vehicular intransitado, 2 huevos. El 26-9-2016 contenía 2 pichones alimentados por un adulto.

Más información
Belton (1984)**.** Simon y Pacheco (1996)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral gris oscura. Corona parda. Cola castaña.
Se parece al Pijuí plomizo, pero es de menor tamaño y con diferente color de corona y cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 en Misiones y norte de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlántica en sureste de Brasil, este de Paraguay, norte de Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1980p, 1987b); Darrieu (1986)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990h); Zotta (1938)

PIJUÍ CORONA ROJIZA *Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819

Otros nombres: Pijuí de cabeza rojiza. Pijuí de vientre sepia.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 3 (H) 15,8, 16,0 y 14,4 g
Darrieu y Camperi (1990): N= 4 (M) 13,0, 14,0, 14,7, 15,1 g; N= 2 (H) 14,0, 15,4 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 1 10 g
Capllonch et al. (2015b): N=2 (?) X= 15,5 g (Rango 15 a 16)

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises verdosas. Iris rojizo.
Frente y corona castañas brillantes. Cejas ocráceas. Lados de la cara y cuello grises. Dorsal parda con tono castaño. Ventral gris con tono ocráceo. Cobijas alares castañas brillante. Alas pardas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Moojen et al. (1941). **Insectos:** Coleoptera (Cicindelidae). Diptera. Hemiptera (Cicadellidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera. Orthoptera (Acridiidae). **Arácnidos:** Araneae.
Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattodea (ootecas). Coleoptera. Formicidae. Hemiptera. Hymenoptera. Lepidoptera (larvas y adultos). Pupas. **Arácnidos:** Araneae. **Vegetales:** Semillas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La vocalización que repite insistentemente en época de reproducción es un frrrrcuik...frrrrcuik...frrrrcuik... de poco alcanece.

HÁBITAT
Estrato bajo de bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Partridge (MACN). Arroyo Uruguaí, km. 30, dpto. Iguazú, Misiones, 07-10-1954, 4 huevos y 21-10-1960 un huevo.
Short (1971). Corrientes. Nido.
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt.* 2019). Parque Provincial, 25-10-2009, nido en construcción, una semana después contenía 3 huevos. El 01-12-2016, 4 huevos blancos, a 2,4 metros de altura, muy oculto entre enredaderas.
Bodrati y Salvador (2015b). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 14-11-2011, nido parasitado por *Tapera naevia*.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos blancos.

Medidas
Partridge (MACN): 18,5 a 20,8 x 15,2 a 15,7 X= 19,5 x 15,4 (N= 5)

Pesos
Partridge (MACN): cáscara 0,12 g

Otros

Short (1971). Colonia Garabí, dpto. Santo Tomé, Corrientes, 30-09-1967, hembra al parecer incubando.
Bodrati y Salvador (2015b). Es parasitado por *Tapera naevia*.

Mas información
Simon y Pacheco (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente, corona y cobijas alares castañas brillante. Cejas ocráceas.
Se diferencia del Pijuí de cejas canelas por tener la frente castaña y carecer de mancha gular negra. Además tiene diferente distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 en Misiones, norte de Corrientes y este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Este de Paraguay, sureste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1979f, 1987b, 1980-81); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006); Short (1971)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati **y** Salvador **(**2015b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capllonch et al. (2015b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b); Straneck (1990h)

PIJUÍ PLOMIZO *Synallaxis spixi* P. L. Sclater, 1856

Otros nombres : Chiclí. Pijuí. Pijuí chiclí. Pijuí de vientre gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1990): N= 3 (M) 11,9, 12,4, y 13,5 g

Coloración. Pico negro, base de la mandíbula más clara. Patas grises verdosas. Iris rojizo.
Frente y corona castañas. Dorsal parda. Mancha gular negra. Ventral gris. Cubiertas castañas. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Formicidae) (*Solonopsis, Pheidole*)

Lopes et al. (2005). **Insectos:** Blattaria (adultos y ootecas). Diptera. Gastropoda. Hemiptera. Orthoptera. **Arácnidos:** Araneae.
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:** Isoptera (Termitas).

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz es un estridente Kuit. Türürürü... kuit. Türürürü... kuit. Türürürü

HÁBITAT
Sabanas, montes, matorrales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

El nido es globular, con túnel de entrada alargado. Emplea palitos. Acolcha la cámara con hojas, musgos, pelos. Lo ubica en arbustos o matorrales. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidificando.
Wilson (1926). Santa Fe. Nido.
Pereyra (1927c). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, 8 de diciembre, nido con 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 2 nidos: 11-11-1921, 5 huevos; 16-11-1922, 3 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de Buenos Aires, nidos desde octubre a diciembre.
Davis (1940c). Entre Ríos. Nido.
Narosky en Narosky et al. (1983). 3 nidos: Pereyra, pdo. de Berazategui, Buenos Aires, 13-11-1966, 4 huevos; 22-11-1968, 4 huevos; Los talas. Pdo. Berisso, Buenos Aires, 23-11-1970, en construcción.
Saibene, Carman y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires. 05-11-1983, 2 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, se localizaron 12 nidos entre setiembre y noviembre, con 1 a 4 huevos o con pichones. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Bodrati et al. (2010b). Misiones. Nido. Bodrati (*in litt*. 2019), dos nidos encontrados en temporadas consecutivas (2008 y 2009) entre septiembre y noviembre en una capuera en la zona de acceso al Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 25-09-2008 con 3 huevos, el 18 de octubre pichones emplumados, hacia fines de noviembre un pichón del nido fue observado cuando un adulto lo alimentaba. El 10-11-2009, otro nido en el mismo sector con 3 huevos.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 3 nidos: 24-11-1976, 3 huevos; 13-01-1978, 2 huevos y 1 de *Tapera naevia;* 24-12-1978, 5 huevos.
Medidas: Largo total: de 30 a 40 cm. Largo del túnel: de 20 a 25 cm. Diámetro interno del túnel: de 3 a 5 cm. Diámetro externo del túnel: de 10 a 12 cm. Alto externo de la cámara: de 25 cm. Ancho externo de la cámara: de 16 cm. Diámetro interno de la cámara: 12 cm.
Salvador y Bodrati (2013a). Misiones. Nido.
Bodrati (*in litt*. 2019). Bajos del Cazador, partido de Escobar, nido con dos huevos incubados, 02-12-1995.



Huevos
Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, verde pálido o blanco verdosos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 17,0 a 21,0 x 13,5 a 15,5
Serié y Smyth (1923): 20,0 a 21,0 x 15,0 a 16,0
Smyth (1928): 19,0 a 21,0 x 14,5 a 16,0
Pereyra (1938b): 18,0 a 19,0 x 15,0 a 16,0
Narosky en Narosky et al. (1983): 19,5 a 20,0 x 15,5 X= 19,8 x 15,5 (N= 4)
De la Peña (2013c): 18,0 a 19,6 x 13,9 a 14,6 X= 18,7 x 14,3 (N= 10)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 0,102 a 0,127 X= 0,119 (N= 10)

Otros
Babarskas et a. (2003). Darrieu et al. (1988). Fraga y Narosky (1985). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Anfitrión de *Tapera naevia.*
García (1952). Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente, corona y cobijas alares castañas. Cola parda.
Se diferencia del Pijuí frente gris por el color de la cola y por ser más oscuro ventralmente.
Diferenciarlo del Pijuí negruzco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis spixi P. L. Sclater, 1856 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
Observado en La Pampa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica o Paranaense en el sureste de Brasil, este de Paraguay y Argentina. Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bauni et al. (2017); Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927c, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999b); Straneck (1990b)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1990); Fandiño et al. (2017); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928)

La Pampa
Citas: Cenizo et al. (2019)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988b)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Giai (1950); Pautasso (2002a); Wilson (1926)

PIJUÍ COLA PARDA *Synallaxis albescens* Temminck, 1823

Otros nombres : Chiclí. Chijuí. Chotoy. Pijuí. Pijuí común de cola parda. Pijuí de pecho blanco. Pijuí pechiblanco. Pipí. Piscuí. Todavoz.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (?) 15,2 g
Camperi (1992a): N= 1 (?) 13,3 g
Di Giacomo (2005h): N= 1 10,0 g
Blendinger (2005): X= 12,3 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 24 X= 12,5 g (Rango: 10 a 14,5 g)
Salvador (2014a): N= 11 (?) X= 14,1 g (Rango: 12 a 15,2)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 11 g

Coloración. Pico: maxila negra o gris negruzca, mandíbula gris oscura o cuerno oscura. Patas pardo oliváceo. Iris pardo o pardo claro.
Frente gris. Corona castaña. Dorsal parda. Mancha gular negra poco notable. Ventral grisácea. Cubiertas castañas. Alas pardas y castañas. Cola parda.

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos (insectos, arácnidos) en el follaje y en las hierbas altas, desde 0,60 a 3 m.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Coccinellidae, Tenebrionidae, no identificado). Demaptera. Hemiptera. Homoptera (Cicadidae). Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulus apodemetes, Bulimulus sporadicus*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Núñez Montellano et al. (2019). Savia.

Voces

Straneck en De la Peña (2016d). La voz es un potente, insistente y áspero frrrrjui... frrrrjui... frrrrjui...

HÁBITAT
Sabanas, montes, matorrales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

El nido tiene forma globular, con entrada alargada. Lo ubica a baja altura en arbustos o en matorrales. Emplea palitos con espinas en la construcción. Acolcha la base de la cámara con hojas y musgos. Expuesto. Elaborado.

Pereyra (MACN). Dpto. Conhello, La Pampa, 01-12-1931, 4 huevos.
Dunford (1878). Buenos Aires, hace un nido de palitos, que coloca en arbustos entre uno y dos metros de altura.
Barrows (1883a). Dpto. Uruguay, Entre Ríos, ponen entre octubre y diciembre de 3 a 4 huevos.
Holland (1895). Buenos Aires, coloca el nido a baja altura en algún arbusto, pone de 3 a 4 huevos.
Hussey (1916). Buenos Aires. Nido.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidificando.
Goodall (1923). Córdoba-San Luis, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 4 nidos: 11-11-921, 4 huevos; 03-11-1922, 3 huevos; 11-11-1925 y 22-11-1925, 2 huevos cada uno.
Castellanos (1932). Los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba. Nidifica.
Pereyra (1937b). La Pampa.Nido.
Pereyra (1938a). Zelaya, Buenos Aires, nido.
Zuberbühler (1953a). Pdo. Junín, Buenos Aires, 1 a 10 de noviembre, en construcción.
Zuberbühler (1971). Buenos Aires. Nido.
Salvador (1982). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos: 11-11-1980, un huevo de *Tapera naevia*; 04-01-1981 y 02-02-1981, un pichón de *Tapera naevia*; 02-02-1981, 3 huevos y uno de *Tapera naevia.*
Salvador en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 7 nidos: 27-11-1979, 3 pichones, 29-11-1980, 4 huevos, 05-12-1981, 4 huevos, 23-01-1981, 4 huevos, 09-03-1981, 3 huevos, 02-02-1982, 3 huevos; Villa Nueva, dpto. San Martín, Córdoba, 3 huevos.
Narosky e Yzurieta en Narosky et al. (1983). Embalse, dpto. Calamuchita, Córdoba, 05-11-1970, 2 huevos; Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, 23-12-1970, un huevo.
Fraga en Narosky et al. (1983). Pdo. de Lobos, Buenos Aires, 24-11-1979, 4 huevos, 05-12-1979, 4 huevos, 16-12-1979, 3 huevos, 15-12-1979, 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Desaguadero, dpto. La Paz, Mendoza, 10-02-1981, 2 huevos.
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983). Unión, dpto. Gdor. Dupuy, San Luis, 15-11-1982, 3 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). 2 nidos: Villa Ángela, dpto. Fontana, Chaco, 15-12-1982, 3 huevos y uno de *Tapera naevia*; Cnel. Du Graty, dpto. Fontana, Chaco, 17-12-1982, 4 huevos.
Salvador y Salvador (1984). Ballesteros Sud, dpto. Unión, Córdoba, 28-12-1983, 2 nidos parasitados, uno con 2 huevos propios, uno de *Tapera naevia* y 1 de *Molothrus bonariensis*; el otro 2 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*;
Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky (1985). Pedro Luro, pdo. Villarino, Buenos Aires, 15-11-1983, dos nidos con 4 huevos cada uno.
Haene et al. (1995). San Juan. Nido.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Mezquida (2000). Mendoza. Nido.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Mezquida (2001b). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza. Setiembre de 1995 a enero de 1999, 2 nidos.

Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 18-11-1999, nido con 3 huevos y 1 de *Tapera naevia*.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 129 nidos. Se reproduce de octubre a marzo. Posturas de 3 a 5 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 9 nidos en provincia de santa fe y uno en provincia de Córdoba, desde el 24-11-1976 a 31-12-2002.
Medidas: Largo total: de 30 a 40 cm. Largo del túnel: de 15 a 30 cm. Diámetro interno del túnel: de 3 a 5 cm. Alto externo de la cámara: de 22 a 35 cm. Ancho externo de la cámara: de 17 a 20 cm. Alto interno de la cámara: de 10 a 12 cm. Ancho interno de la cámara: de 10 a 12 cm.
Nido más bajo: 0,60 m. Nido más alto: 3,10 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Delfín Huergo, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, A. Di Giacomo, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis* y un adulto alimentando un pichón del parásito.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 5 nidos con 4, 1, 1, 1 y 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Conhello, La Pampa, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 2 nidos.
Di Giacomo en Salvador y Bodrati (2014a). La Pampa. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
Smyth, C. en MVZ, en Salvador (2016a). Entre Ríos. Nido.
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blanco-verdosos o verde pálido.

Medidas

Serié y Smyth (1923): 17,0 a 19,0 x 14,0 a 15,0	
Smyth (1928): 18,0 a 20,0 x 13,5 a 15,0	
Salvador en Narosky et al. (1983): 17,6 a 20,1 x 14,1 a 15,5	X= 18,9 x 14,7 (N= 18)
Narosky en Narosky et al. (1983): 19,3 a 19,7 x 14,6 a 14,7	X= 19,4 x 14,7 (N= 3)
Fraga en Narosky et al. (1983): 19,0 a 21,1 x 13,9 a 15,3	X= 20,0 x 14,8 (N= 9)
Salvador y Narosky en Narosky et al. (1983): 19,3 a 19,7 x 14,6 a 14,7	X= 19,4 x 14,7 (N= 3)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 17,9 a 19,1 x 14,6 a 15,3	X= 18,2 x 14,9 (N= 7)
Salvador (2013b): 17,4 a 20,9 x 13,6 a 15,5	X= 18,8 x 14,6 (N= 89)
De la Peña (2013c): 18,4 a 20,3 x 14,3 a 16,0	X= 19,3 x 14,9 (N= 17)

Pesos

Fraga en Narosky et al. (1983): 2,4		
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,0		
Salvador (2013b): 1,9 a 2,6	X= 2,3	(N= 64)
De la Peña (2013c): 2,00 a 2,10	X= 2,05	(N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,101 a 0,147	X= 0,135	(N= 17)

Generalidades
Fraga en Narosky et al. (1983). El período de incubación es de 15 a 16 días.
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 a 18 días. Los huevos son puestos en días continuos.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 12 a 14. Los huevos son puestos en días corridos. Período de incubación 15 a 16 días

PICHONES

Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, con escaso plumón dorsal, gris pardusco. Pico pardo claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Piel clara. Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, naranja.
4-5 días. Abren los ojos.
7 días. Ventralmente, pecho gris, flancos crema.

Peso al nacer
Salvador (2013b): 1,8 a 2,2 X= 2,02 (N= 13)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 14 a 16 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen dentro de las 24 horas. Permanecen en el nido de 15 días.

Otros
Friedmann (1963). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Pautasso (2002b). Salvador (2013b). De la Peña (2013c). Es parasitado por *Tapera naevia*.
De la Peña (2013c). El 20-12-1979 en Esperanza, una pareja alimentaba a un juvenil de *Tapera naevia*

Depredadores
De adultos: *Falco femoralis* en Formosa, Di Giacomo (2005h), *Tyto alba* en La Pampa, Noriega et al. (1990), en Buenos Aires, Morici (2009e.
De huevos: *Molothrus bonariensis* en Córdoba, Salvador (2011)

Más información:
Hudson (1974. Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral blanquecina grisácea. Mancha gular poco notable. Cola parda.
Diferenciarlo del Pijuí frente gris.

Esperanza. Santa Fe. 14-03-2008

Esperanza. Santa Fe. 24-12-1979

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis albescens australis J. T. Zimmer, 1935 desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y RíoNegro y *Synallaxis albescens albescens* Temminck, 1823 en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diez subespecies. Desde Costa Rica en hasta la región patagónica de Argentina presenta una muy amplia área de distribución que comprende: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Synallaxis albescens australis J.T. Zimmer, 1935

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003) Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Isacch et al. (2006); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky et al. (1983); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Bodrati (2014); Soave et al. (1999b); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Narosky et al. (1983)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983, 1988, 2011, 2013b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Straneck (1990d, 1999a); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 16-01-2909)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Darrieu y Camperi (1990); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Narosky et al. (1983); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (Agua Caliente, dpto. El Cármen, 11-02-1983)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Narosky et al. (1983); Noriega et al. (1990, 1993); Siegenthaler (1984, 2004); Straneck (1999); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Capllonch et al. (2020); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Blendinger (2005); Contreras (1979); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida (2001b); Narosky et al. (1983); Sanzín (1918)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Pérez et al. (2006); Povedano (2016)

Observaciones: De la Peña (San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, 03-11-1979)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Clark en Nellar Romanella (1993); Masramón (1971, 1983); Straneck (1999); Narosky et al. (1983)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2013c, 2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Codesido y Bilenca (2000); Coria et al. (2017); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Ortiz (2006); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Synallaxis albescens albescens Temminck, 1823

Corrientes
Citas: Contreras (1987b)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Contreras (1987b); Krauczuk (2008-2009); Navas y Bó (1988b); White (1882)

PIJUÍ FRENTE GRIS *Synallaxis frontalis* Pelzeln, 1859

Otros nombres: Chiclí. Pijuí. Pijuí común. Pijuí común de cola rojiza. Pijuí frentinegra. Roraima.

DESCRIPCIÓN

Largo: 16 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (N) 13,0 g; N= 3 (H) 15,0, 16,0 y 16,3 g
Salvador (1988): N= 1 (?) 14,7 g
Salvador (1990a): N= 1 (?) 15,7 g
Camperi (1992a): N= 4 (M) X= 17,7 (Rango: 15,9 a 19,0), N= 1 (H) 16,5 g
Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 11,7 g (Rango: 10,7 a 12,7 g)
Alderete y Capllonch (2010): N= 48 X= 12,8 g (Rango: 9,5 a 17)
Salvador (2014a): N= 8 (?) X= 14,8 g (Rango: 13,3 a 15,4)

Coloración. Pico: maxila negruzca, mandíbula gris oscura con ápice negruzco. Patas pardas grisáceas con tinte oliváceo. Iris pardo castaño.
Frente gris. Corona castaña. Dorsal parda. Mancha gular negra. Ventral gris ocrácea. Cobijas alares castañas. Alas pardas y castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Recolecta alimentos en el follaje y en las hierbas altas, desde 0,60 a 3 m.

Alimentación
Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. Chinches verdes (Pentatomidae).
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:** Coleópteros. Himenópteros. Lepidópteros. **Arácnidos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chysomelidae, no identificado). Dermaptera. Diptera. Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Acridiidae). **Moluscos:** (*Bulimulidae: Bulimulus apodemetes, Bulimulus sporadicus*)
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.).
Laguna et al. (2005). **Aves:** huevos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). Su voz, repetida constantemente en época de reproducción, es un suave Tijuii..tijuii..tijuii..

HÁBITAT
Praderas arboladas, sabanas, montes, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Chaco, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

Ocultos, a baja altura. El nido tiene forma globular, con entrada alargada. Emplea en la construcción palitos con espinas. La base de la cámara es acolchada con "pelusas" vegetales, hojas o musgos. Lo ubica sostenido en ramas de arbustos, árboles, matorrales o cactáceas. Expuesto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Buenos Aires. Nido.
Smyth (1928). 2 nidos: Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 11-12-1922, 4 huevos; Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 04-12-1924, 4 huevos.
Pereyra (1938b). Girard localizó un nido en Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, el 11 de noviembre, con 3 huevos y uno de *Tapera naevia*.
Höy (1968c). Salta, nidos en diciembre a enero, 3 huevos.

Masramón (1971). San Luis, nidifica.
Salvador (1982). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos: 11-01-1981, pichón de *Tapera naevia*; 24-01-1981 y 10-02-1981, 3 huevos y un pichón de *Tapera naevia*; Mar Chiquita, dpto. San Justo, Córdoba, 11-12-1980, un huevo de *Tapera naevia.*
Zelich en Narosky et al. (1983). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre ríos, 22-11-1970, 3 huevos y 2 de *Tapera naevia.*
Salvador en Narosky et al. (1983). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos: 08-02-1981, 3 huevos; 20-01-1981, 3 huevos; 02-02-1981, 3 huevos.
Narosky en Narosky et al. (1983). Bouvier, dpto. Pilcomayo, Formosa, 22-02-1974, un huevo; Icho Crus, dpto. Punilla, Córdoba, 07-01-1981, 3 huevos.
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983). Villa Ángela, dpto. Fontana, Chaco, 19-12-1982, 3 huevos y 2 de *Tapera naevia*
Darrieu y Camperi (1990). Provincia de Corrirntes, en diciembre, nido con 3 huevos.
Narosky y Di Giacomo (1993). Buenos Aires. Nido.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, 31-10-1991 y 13-11-1991, nidos con 1 y 3 huevos respectivamente.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL “El Pozo”, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-11-2000, nido sin postura.
Babarskas et a. (2003). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos en noviembre y enero.
Di Giacomo (2005h). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Nidifica desde setiembre a fines de enero.
Antoniazzi et al. (2011). Santa Fe. Nido.
Salvador (2013b). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, información recopilada entre los años 1980 y 2012. Se localizaron 46 nidos. Se reproduce de octubre a marzo. Posturas de 3 a 4 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron entre el 29-11-1976 y 03-11-2004, 40 nidos en provincia de Santa Fe y uno en provincia de Córdoba.
Medidas: Largo total: de 35 a 60 cm. Largo del túnel: de 15 a 35 cm. Diámetro interno del túnel de 3 a 5 cm. Diámetro externo del túnel: 12 cm. Alto externo de la cámara: de 22 a 45 cm. Ancho externo de la cámara: de 17 a 25 cm. Alto interno de la cámara de 10 a 15 cm. Ancho interno de la cámara: de 12 a 17 cm.
Nido más bajo: 0,50 m. Nido más alto: 4,00 m.
Salvador y Bodrati (2013a). Chaco. Nido.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 4 nidos con 4, 4, 3 y 3 huevos cada uno.
Girard, P. en WFVZ, en Salvador (2016a). Tucumán. Nido.
Salvador en Salvador (2016a). Santa Fe. Nido.
Bodrati, A. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Pagano, L. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido.
Sierra, E. en Salvador (2016a). Buenos Aires. Nido. Vuelta de Obligado, Reserva Natural Histórica, pdo. San Pedro, Buenos Aires, 19-10-2001, nido a 1,2 m. de altura. Nido en construcción aunque en estado muy avanzado. Largo horizontal 36 cm, entrada hasta la cámara 26 cm, los adultos llevaban ramitas de tala trabándolas fuertemente, la entrada de un diámetro de 3 cm
Salvador et al. (2017). Córdoba. Nido.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verde claro o blanco verdosos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 20,0 a 21,0 x 14,5 a 16,5
Smyth (1928): 18,0 a 19,5 x 14,0 a 15,5
Höy (1968c): 18,5 a 19,7 x 15,1 a 15,4
Masramón (1971): 19,0 x 14,5

Salvador en Narosky et al. (1983): 19,2 a 21,4 x 15,1 a 16,4	X= 20,2 x 15,5 (N= 9)
Narosky en Narosky et al. (1983): 17,7 a 20,9 x 14,5 a 16,8	X= 19,3 x 15,3 (N= 9)
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 17,1 a 18,5 x 14,7 a 15,8	X= 17,9 x 15,2 (N= 3)
Di Giacomo y López Lanús (1998): 18,5 a 19,1 x 15,2 a 15,5	X= 18,7 x 15,4 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 18,2 a 21,9 x 14,8 a 16,4	X= 20,0 x 15,6 (N= 53)
Salvador (2013b): 18,2 a 21,1 x 14,4 a 16,4	X= 19,7 x 15,1 (N= 58)
De la Peña (2013c): 18,0 a 20,5 x 14,0 a 15,7	X= 18,8 x 14,5 (N= 14)

Pesos
Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. (1983): 2,3
Di Giacomo y López Lanús (1998): 2,4

Di Giacomo (2005h): 2,0 a 2,8	X= 2,4 (N= 51)
Salvador (2013b): 2,1 a 3,1	X= 2,6 (N= 49)
De la Peña (2013c): 1,7 a 2,0	X= 1,88 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,117 a 0,153	X= 0,148 (N= 8)

Generalidades
Salvador (2013b). El período de incubación es de 16 a 18 días. Los huevos son puestos en días discontinuos.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 12 a 16. Los huevos son puestos en días corridos.
Período de incubación 15-16 días

PICHONES
Descripción
Salvador (2013b). Nacen con los ojos cerrados. La piel es de color carne naranja, con escaso plumón dorsal pardo negruzco. Pico pardo claro, comisuras blanco-amarillentas. Interior de la boca amarillo intenso.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel clara (anaranjada). Pico amarillento. Comisura blanca. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillo-naranja. Plumón gris, fino largo, en la cabeza, dorsalmente y dorsal de las alas.
5 días. Abren los ojos. Vainas alares y de la cola, grises. Aparecen las vainas en zonas pteridas.
6 días. Vainas blanquecinas ventralmente.
7 días. Línea dorsal, vainas oscuras.
8 días. Abriendo láminas de la cola.

9 días. Pecho oscuro. Ventralmente ocráceo-amarillento. Flancos gris ocráceos. Dorsalmente pardo. Cobijas alares castañas. Primarias pardas.
11 días. Escaso plumón. Color de adulto.
13 días. Color de adulto, sin mancha gular.
15 días. Deja el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,7	0,9						1,4
2	0,3	0,9	1,1						2,4
3	0,4	1,1	1,4						3,1-3,5
4	0,4	1,1	1,5						3,6-4,0
5	0,5	1,2	1,7	0,5		0,4			4,5-5,5
6	0,6-0,7	1,5	1,9	0,7-0,8		0,5-0,8			7,8-8,6
7	0,8	2,1	2,2	0,9		0,8		0,5	10,0
8	0,9	2,1	2,3	1,2	0,2	1,1	0,2	0,8	11,5
9	1,1-1,2	2,1	2,5	1,5	0,3	1,3	0,4	1,2	12,5-12,8
10	1,2	2,2	2,6	1,5	0,8	1,4	1,3	1,8	13,0
11	1,2	2,2	2,6	1,5	1,3	1,5	1,5	2,2	13,3

Peso al nacer
Salvador (2013b): 1,9 a 2,4 X= 2,2 (N= 9)

Observaciones
Salvador (2013b). Los pichones son alimentados por ambos padres. Permanecen en el nido de 15 a 16 días.
De la Peña (2013c). Los pichones nacen dentro de las 24 horas. Permanecen en el nido de 15 días.

Otros
Di Giacomo (2005h). Hospedador de *Tapera naevia*. Sobre 34 nidos observados, 8 estaban parasitados (23,5%)
Salvador (2013b). Anfitrión de *Tapera naevia*.
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). De la Peña et al. (2003a). Antoniazzi et al. (2011); Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
De la Peña et al. (2003a). Antoniazzi et al. (2011). Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información
Salvador (2013b). Salvador et al. (2017). De la Peña (2019a)

Depredadores

De la Peña (2013c). Los pichones comidos por Culebra del pastizal (*Philodryas patagoniensis*)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente gris. Corona, cubiertas alares y cola castañas. Mancha gular negra.
Parecido al Pijuí ceja canela. Se diferencia por tener la cola más corta y las cejas poco notables.
Del Pijuí cola parda se diferencia por ser más oscuro en la parte ventral y con diferente color de cola.
Diferenciarlo además del Pijuí plomizo.

Esperanza. Santa Fe. 06-01-2006

Esperanza. Santa Fe. 22-01-2008

Esperanza. Santa Fe. 09-12-1995

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis frontalis fuscipennis Berlepsch, 1907 en el noroeste y *Synallaxis frontalis frontalis* Pelzeln, 1859 en el centro-este.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Centroeste y sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000a, 2000b); Darrieu y Camperi (2001a); Gasparri et al. (2018); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b, 2014, 2016); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999b)

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Esteban (1953)

Observaciones: De la Peña (Chumbicha, dpto. Capayán, 11-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Narosky et al. (1983); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Bodrati (2014)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Dardanelli et al. (2006b); De la Peña (2013c); Frenzel (1891); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky et al. (1983); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Partridge (1953c.); Salvador (1983, 2013b); Salvador et al. (2017); Sferco y Nores (2003); Stempelmann y Schulz (1890); Torres et al. (2019); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa Tulumba, dpto. Tulumba, 14-11-2001; Marull, dpto. San Justo, 18-09-2002; Jesús María, dpto. Colón, 04-02-2006)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1979f, 1987b); Darrieu y Camperi (1990); Fandiño et al. (2017); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Contreras (1979f); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Smyth (1928); Straneck (1990b); Zeleich en Narosky et al. (1983)

Formosa
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); López-Lanús y Mencia (2017); Narosky et al. (1983); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (1998); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1938)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1997)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Ferrer et al. (2019); Lucero (2013f); Sanzín (1918)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez et al. (1989); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1988b)

San Luis
Citas: Clark en Nellar Romanella (1993); Masramón (1971, 1983); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1968c); Lucero (2013i); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 01-02-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Fava et al. (2017); Haene et al. (1995); Lucero (2013f)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Gastaudo et al. (2019); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Coria et al. (2017); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2010); Antelo y Alabarce (2002); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Antelo y Navarro (2017); Brandán y Navarro (2009); Brandán Fernández y Marigliano (2019); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Ortiz (2006); Fanjul y Echevarría (2015); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Marigliano et al. (2017); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Pereyra (1938); Quiroga (2017b); Rougés y Blake (2001); Smyth (1928)

PIJUÍ CEJA CANELA *Synallaxis azarae* d´Orbigny, 1835

Otros nombres: Pijuí ceja blanca. Pijuí pálido. Pijuí tucumano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 2 (M) 13,0 g; N= 2 (H) 13,0 y 15,0 g
Alderete y Capllonch (2010): N= 37 X= 12,1 g (Rango: 11 a 15)
Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 11,8 g (Rango: 11,5 a 12,3)

Coloración. Pico negruzco con base de la mandíbula gris. Patas grisáceas. Iris pardo rojizo.
Frente parda. Corona castaña. Cejas ocráceas. Dorsal parda. Mancha gular negra. Ventral gris. Cobijas alares castañas. Alas pardas y castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Blake y Rougés (1997). Arácnidos. Insectos.
Rougés y Blake (2001). Insectos.

Voces
Straneck en De la Peña (2016d). La voz es repetida con frecuencia en época de celo, es similar a la del Pijuí frente gris, pero más tímida y vacilante: ti..jui..ti...jui...ti...jui...

HÁBITAT
Estrato bajo de bosques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

El nido es globular, con túnel de entrada lateral. Emplea en la construcción palitos. Acolcha la base de la cámara con hojas.

Girard (MACN). Dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 22-10-1910, 3 nidos con 4 huevos cada uno.
Dinelli (MACN). Tucumán, 12-11-1932, 2 huevos y uno de *Tapera naevia*.
Hartert y Venturi (1909). Dineli describe un nido para Tucumán.
Babarskas et al. (1995). Salta. Nido.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Yala, dpto. Doctor Manuel Belgrano, Jujuy, 07-11-1991. Nido: se hallaba, en un área de selva de transición, en un arbusto a 80 cm de altura, globular con túnel de entrada (similar al de *Synallaxix albescens*), hecho de palitos con y sin espinas, el lecho de gramíneas y forrado con detritos vegetales suave, largo total 42 cm y una altura de 15 cm, largo del túnel 18 cm, diámetro de la boca del túnel 3,5 cm. Contenía 3 huevos.
Contino, A. en WFVZ, en Salvador (2016a). Jujuy. Nido.

Huevos
Pone 4 huevos blancos con tinte verdoso.

Medidas

Girard (MACN): 17,8 a 18,7 x 13,9 a 14,7	X= 18,4 x 14,4	(N= 10)
(IML): 20,0 a 21,3 x 15,2 a 16,6	X= 20,6 x 16,0	(N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 18,7 a 19,4 x 15,3 a 15,4	X= 19,0 x 15,3	(N= 3)

Otros
Dinelli (MACN). Anfitrión de *Tapera naevia*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente parda. Corona, cubiertas alares y cola castañas. Mancha gular negra. Cola larga. Destacables cejas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Synallaxis azarae superciliosa Cabanis, 1883 entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Región montana de los Andes por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Synallaxis azarae superciliosa Cabanis, 1883

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Carma (2009); Nores e Yzurieta (1983a); Nores et al. (2000)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2010); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2010); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Ortiz (2006); Dinelli en Hartert y Venturi (1909); Echevarría et al. (2011b); **Fanjul y Echevarría (2015);** Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Marigliano et al. (2017); Narosky et al. (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Ortiz et al. (2018b); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

AMBIENTES, LUGARES, EXCURSIONES
1982

1982. Equipo fotográfico	1982. Los Caracoles. Mendoza
1982. Tanti. Córdoba.	1982. Valle de la Luna. San Juan.
1982. Cayastá. Santa Fe.	1982. Morteros. Córdoba.
1982. Pampa de Achala. Córdoba. Escalando en nidos de Vencejos.	